Die

Krankheiten

des

menschlichen Auges,

ein

practisches Handbuch

für

angehende Aerzte.

BOSTON MEDICAL
JUL 19 1911
LIBRARY

Dem gegenwärtigen Standpunkte der Ophthalmologie gemäfs, nach fremden und eigenen Erfahrungen bearbeitet

von

Dr. *Carl Heinrich Weller,*

practischem Arzte und Augenarzte zu Dresden.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit 4 ausgemalten, und 1 schwarzen Kupfertafel.

Berlin, 1826.

In der Schüppel'schen Buchhandlung.

9864

Vorrede.

Durch die freundliche Aufnahme, welche auch die zweite Auflage dieses Handbuches erhalten, hat das ärztliche Publikum dem Herausgeber neue Verpflichtungen auferlegt, die er, seiner beschränkten Zeit ungeachtet, mit wahrem Vergnügen übernommen: und obgleich er wohl fühlt, dafs er eine genügende Lösung derselben nicht erreichen konnte, so hat er doch mit seinen geringen Kräften dem Ziele nachgestrebt, und glaubt nicht unbescheiden zu sein, wenn er diese dritte Auflage, als eine wahrhaft verbesserte und bereicherte betrachtet.

Die Augenheilkunde hat wiederum mächtige Fortschritte gethan, die sie vor allen den Meistern dieser heilsamen Wissenschaft zu verdanken hat, und wenn auch die Begierde: neue Entdeckungen, besonders in dem Theile der operativen *Ophthalmologie*, zu Tage zu fördern, unter den Heilkünstlern nachgelassen, so ist doch für diese fast an das Krankhafte gränzende Sucht, ein ruhiges Sichten der Materialien eingetreten, welches eine reiche, practisch brauchbare Ausbeute, sicher hoffen läfst.

Die Umänderungen, so wie die nicht unbedeutende Vermehrung dieser neuen Auflage, in welcher der Herausgeber jede unnütze Erörterung, jeden Pleonasmus möglichst vermieden zu haben glaubt, mögen in dem Vorstehenden ihre Entschuldigung finden, und zwar um so mehr, als das Buch nun auch dem denkenden Practiker sicherer noch helfen und auf der

einzig richtigen Bahn, auf der der Erfahrung, leiten soll, wogegen die früheren Auflagen fast allein für Studierende und Anfänger geschrieben waren.

Mehrere Kapitel wurden hinzugefügt, z. B. das *Emphysema palpebrarum*, die Abtheilung über die Bereitung und Anwendung der örtlichen Arzneimittel, die Literatur u. s. w. Viele andere sind fast gänzlich umgearbeitet oder sehr vermehrt worden, z. B. die Thränensackfistel, die Regenbogenhautentzündungen, die ägyptische *Ophthalmie*, die psorischen Augenentzündungen u. m. a. Bei vielen der merkwürdigsten Krankheiten wurde das eigentliche Wesen derselben tiefer zu ergründen versucht, z. B. bei der Augenwassersucht, bei dem *Pannus*, bei dem *Fungus medullaris retinae* u. b. m. a. Ueberall aber ist die practische Tendenz des Ganzen stets im Auge behalten und der Erfahrung, entfesselt von Einseitigkeit, von Wahn und Vorurtheilen, nach bester Ueberzeugung, gehuldigt worden.

Die sämmtlichen Kupfertafeln sind unverändert geblieben, um eine bedeutendere Steigerung des Preises zu verhüten.

Indem nun der Herausgeber das Buch auf solche Art der Vollständigkeit näher zu bringen suchte, fühlt er sich von dem Wunsche durchdrungen: dafs sowohl der die Augenheilkunde Studierende, als auch der dieselbe Ausübende, wahres Heil darin finden möchte, und dafs: wenn jener Ueberfluſs zum Nachdenken und Anleitung zu seiner Ausbildung, dieser einen sichern Führer *in praxi* sucht, beide sich nicht getäuscht fühlen möchten.

Wenn aber auch der Schüler reiche Gelegenheit fände, seine Begriffe zu berichtigen, der denkende Practiker nur das Individualisiren verstehen dürfte, um in der Behandlung der Krankheiten des Sehorgans glücklich zu sein, so wird der das Handbuch als Leitfaden seiner Vorlesungen nehmende academische Lehrer, welcher tiefer in die einzelnen Augenleiden einzudringen genöthigt ist, dazu freilich noch Ueberfluſs an Stoff in sich vorfinden können.

Dresden,
im Januar, 1826.

W e l l e r.

Inhalt.

Seite.

I. Die Literatur der gesammten Augenheilkunde, x
Einleitung, ... 1
Von der reinen Augenentzündung im Allgemeinen, ... 12
I. Von den Krankheiten derjenigen Theile, welche den Augapfel umgeben 23 bis 168
A. Von den Krankheiten der äufsern Umgebungen der Augen, . . . 23 bis 120
Von der reinen Augenliederentzündung, 23
Die reine Augenliederentzündung überhaupt, *Blepharophthalmitis*, . 24
Die reine rosenartige Augenliederentzündung, *Blepharophthalmitis erysipelatosa, Oedema calidum palpebrarum*, . 28
Die reine Augenliederdrüsenentzündung, *Blepharophthalmitis glandulosa*, . 31
Die Augenentzündung der Neugebornen, *Ophthalmia neonatorum*, . 43
Das reine Gerstenkorn, *Hordeolum*, 53
Die reine rosenartige Nasenwinkelgeschwulst, *Anchylops erysipelatosa*, . 55
Von den Wunden der Augengegend und der Augenlieder, . . 60
Die Schwiele der Augenlieder, *Tylosis*, 70
Das Hagelkorn, *Chalazion*, . 72
Die Verhärtung und der Krebs der Augenlieder, *Scirrhus et cancer palpebrae*, 74
Der Karbunkel der Augenlieder, *Carbunculus palpebrarum*, . . 79
Die Wassergeschwulst der Augenlieder, *Oedema palpebrarum*, . . 80
Die Luftgeschwulst der Augenlieder, *Emphysema palpebrarum*, . . 81
Der Vorfall des obern Augenliedes, *Ptosis palpebrae superioris*, . 82
Der Krampf der Augenlieder, *Blepharospasmus*, . . . 86
Das Haasenauge, *Lagophthalmos*, . 88

Seite.

Die Einwärtswendung der Augenliedränder, *Entropium*, . . 90
Die Einwärtskehrung der Cilien, *Trichiasis*, und die Doppelreihe der Augenlieder-haare, *Distichiasis*, . . 96
Das auswärts gewendete Augenlied, *Ectropium*, . . . 100
Die Verwachsung der Augenliedränder unter sich und mit dem Augapfel, *Anchyloblepharon, et Symblepharon*, . 106
Die Balggeschwülste der Augenlieder und der Umgegend, . . 109
Das Wasserbläschen, Hirsekorn und die Warzen und Maulbeeren der Augenlieder, 115
Exostosen der Orbitalknochen, . 118
Osteosarcome der Orbitalknochen, 119

B. Von den Krankheiten der Organe, die zwischen der *Orbita* und dem *Bulbus* ihren Sitz haben, ... 120 bis 168

Von der reinen Augenhöhlenentzündung überhaupt, . . . 120

Von den Wunden der Augengrube, . 123

a. Von den Krankheiten der Thränendrüse, 127
Die Entzündung der Thränendrüse *Dacryoadenitis*, . . . 127
Der *Scirrhus* der Thränendrüse, *Scirrhus glandulae lacrymalis*, . 130
Der Thränenfluſs, *Dacryorhysis*, . 132
Die abnorm veränderte Thränenfeuchtigkeit, 134
Die Verwachsung der Ausführungsgänge der Thränendrüse, *Atresia ductuum excretoriorum glandulae lacrymalis*, . 135
Die Thränenzellgeschwulst, *Dacryops*, 136
Die Wasserblase der Thränendrüse, *Hydatis glandulae lacrymalis*, . 138

b. Von den Krankheiten des Thränensackes, 140
Die reine Entzündung des Thränensackes, *Dacryocystitis*, . . 140
Der Thränensackbruch, *Hernia sacci lacrymalis*, und die Thränensackwassersucht, *Hydrops sacci lacrymalis*, . 149
Die Thränensackfistel, *Fistula sacci lacrymalis*, . . . 150

c. Von den Krankheiten der Thränenkarunkel, 163
Die reine Entzündung der Thränenkarunkel, *Encanthis inflammatoria*, . 163
Der *Scirrhus* und das *Carcinom* der Thränenkarunkel, *Encanthis scirrhosa et carcinomatosa*, . . . 165

Von den Balggeschwülsten in der Augengrube, 166

Von den Aneurismen in der Augengrube, 167

Seite.

II. Von den Krankheiten des Augapfels, 168
Von den Wunden des Augapfels, . 168

A. Von den Krankheiten der durchsichtigen Theile des *Bulbus*, . . . 179 bis 307

a. Von den Krankheiten der *Conjunctiva*, 179
Die reine Entzündung der *Conjunctiva* des *Bulbus*, *Conjunctivitis*, . . 179
Das dichte Augenfell, *Pannus*, . 180
Das Flügelfell, *Pterygium*, . 188
Das Fettfell, *Pinguecula*, . 190
Die Fleisch- und Fettauswüchse und die *Papula* der *Conjunctiva*, . 191

b. Von den Krankheiten der *Cornea*, . 193
Die reine Entzündung der *Cornea*, *Keratitis*, 193
Die Verdunkelungen und Flecken der Hornhaut, *Obscurationes et maculae corneae*, 196
Die kegelförmige Hervortreibung der Hornhaut, . . . 208
Der Hornhautbruch, *Keratokele*, . 210

c. Von den Krankheiten der Linse, . 212
Die Entzündung der Linse, *Lentitis*, 212
Der graue Staar, *Cataracta*, . 217

d. Von den Krankheiten des Glaskörpers, und der wässrigen Feuchtigkeit, . 292
Das Glaucom, *Glaucoma*, . 292
Die Auflösung des Glaskörpers, *Synchysis*, 298
Die Augenwassersucht, *Hydrophthalmia*, 299

B. Von den Krankheiten der undurchsichtigen Gebilde des *Bulbus*, . . . 307 bis 404

a. Von den Krankheiten der *Iris*, . 307
Die reine Entzündung der Regenbogenhaut, *Iritis*, . . . 307
Die Anomalien der Pupille, enthaltend: *Mydriasis*, *Myosis*, *Atresia pupillae*, und die künstlichen Pupillenbildungen, 319

b. Von den Krankheiten der *Retina* und des Sehnerven, . . . 339
Die reine Entzündung der Markhaut, *Retinitis*, 339
Der schwarze Staar, *Amaurosis*, . 340
Die Anomalien des Gesichts, enthaltend: das Schielen, *Strabismus*, das Schiefstehen des Auges, *Luscitas*, die Kurzsichtigkeit, *Myopia*, die Fernsichtigkeit, *Presbyopia*, das Doppeltsehen, *Diplopia*, die Tagblindheit, *Nyctalopia*, und die Nachtblindheit, *Hemeralopia*, das Mückensehen, *Myiodeopsia*, . . 378
Der Markschwamm der Netzhaut, *Fungus medullaris retinae*, . . 396

Seite.

C. Von den Krankheiten, welche durchsichtige und undurchsichtige Gebilde des Auges zugleich ergreifen, ... 404 bis 428

Die reine äufsere Augapfelentzündung, *Ophthalmitis externa*, . . 404

Die reine innere, von der Netzhaut ausgehende Augapfelentzündung, *Ophthalmitis interna*, . . . 409

Das Hornhautstaphylom, *Staphyloma corneae*, . . . 412

Das Regenbogenhautstaphylom, *Staphyloma iridis*, . . . 422

Die Verwachsung der vordern Fläche der *Iris* mit der Hornhaut, *Synechia anterior*, und die Anwachsung der hintern Fläche der *Iris* an die Linsenkapsel, *Synechia posterior*, . . . 425

D. Von den Krankheiten, welche den *Bulbus* in seiner Totalität ergreifen, . . 428 bis 448

Die reine Entzündung des ganzen Augapfels, *Ophthalmitis universalis*, . 428

Das Schwinden des Augapfels, *Atrophia*, 431

Die allgemeine Varicosität des Auges, *Cirsophthalmia*, . . 438

Der *Scirrhus* und Krebs am Augapfel, *Scirrhus et Carcinoma bulbi*, . 440

Verknöcherungen des Augapfels, . 446

Angeborner Mangel und Ueberfluſs an Augen 447

Von den specifischen Augenentzündungen, 449

Einiges über die specifischen Augenentzündungen im Allgemeinen, . . 449

Von der catarrhalischen Augenentzündung, *Ophthalmia catarrhalis*, . . 453

Von der aegyptischen Augenentzündung, *Ophthalmia Aegyptiaca*, . . 457

Von der rheumatischen Augenentzündung, *Ophthalmia rheumatica*, . . 470

Von der gichtischen Augenentzündung, *Ophthalmia arthritica*, . . 474

Von der variolösen Augenentzündung, *Ophthalmia variolosa*, . . 481

Von der morbillösen und scarlatinösen Augenentzündung, *Ophthalmia morbillosa et scarlatinosa*, . . . 487

Von der syphilitischen Augenentzündung, *Ophthalmia syphilitica*, . . 491

Die gonorrhoische Augenlieder- u. Augapfelentzündung, *Ophthalmia gonorrhoica*, 491

Seite.

Die syphilitische Regenbogenhautentzündung, *Iritis syphilitica*, . . 496
Die syphilitisch-scorbutische Ophthalmoblennorrhoe, *Ophthalmoblennorrhoea syphilitico-scorbutica*, . . 500
Von der psorischen Augenentzündung, *Psorophthalmia*, . . . 501
Von der scrofulösen Augenentzündung, *Ophthalmia scrofulosa*, . . 512
Der scrofulöse Thränensacktripper, *Blennorrhoea sacci lacrymalis scrofulosa*, 525
Von der scorbutischen Augenentzündung, *Ophthalmia scorbutica*, . . 526

Anhang 528

Ueber die Art und Weise, die örtlichen Heilmittel bei Augenkrankheiten richtig zu bereiten und zweckmäfsig anzuwenden, 528
Die Aetzmittel. . . 529
Die Augenbäder. . . 532
Die Augendämpfe. . . 533
Die Augen-Douche. . . 534
Die Augengläser. . . 534
Die Augenpulver . . 547
Die Augensalben. . . 548
Die Augenschirme. . . 551
Die Augenwässer. . . 551
Die künstliche Ausleerung des *Humoris aquei* durch die Hornhaut. . 556
Die Blutigel. . . 556
Die *Cataplasmata*. . . 557
Die Electricität. . . 558
Die Fomentationen. . . 559
Der Galvanismus. . . 561
Die Gasbäder. . . 562
Die Hautreitze. . . 563
Die Kälte. . . . 569
Das Kräuterkissen. . . 570
Das Licht. . . . 572
Die Lichtverminderung. . . 573
Die Luft. . . . 574
Die Pflaster. . . . 575
Die Pinsel. . . . 577
Die Scarificationen am Auge. . 577

I.

Die Literatur der gesammten Augenheilkunde.*)

Grapheus Benevenutus, Ars probata de oculorum affectibus. Venet. 1497. Fol.

Grassus Benvenutus, de oculis, eorumque aegritudinibus et curis. Venet. 1500. 4.

Bonaciolus Ludovicus, de natura oculorum. Argent. 1529. 8.

*) Ich habe die Werke nicht nur mit vorgesetzten Namen der Autoren, sondern auch in chronologischer Ordnung zusammengestellt, und glaube dadurch die Uebersicht des Ganzen zu erleichtern und das Interesse zu erhöhen. Die Zusammenstellung der über einzelne Augenkrankheiten erschienenen Schriften, ist danach leicht zu gewinnen.

Aufser den hier genannten Schriften, mit welchen die Literatur der *Ophthalmologie* fast vollständig abgehandelt worden ist, geben noch folgende Werke eine reiche Ausbeute an wichtigen, die Augenheilkunde betreffenden Gegenständen:

Ephem. natur. curios. — Act. Havniens. — Die kleinen Schriften von *Mauchart* u. A., welche unter dem Titel: Dissert. med. sel. Tubing., oculi human. affectus med. — chir. consideratos sist. Tubing. 1783 — 1785, von *Ch. F. Reuss* herausgegeben wurden. — Halleri opusc. path. — *Joh. Mohrenheim's* Wienerische Beiträge. — Mémoires de l' Academie de chirurgie. — Repertorium chir. u. med. Abhandl. aus den wichtigsten engl. Schriften etc. — Journal des savans. — *Haller's* disp. chir. sel., Lausann. 1755, so wie mehrere andere von ihm herausgegebene Schriften. — Journal de médecine. — *Mursinna's* med. chir. Beobachtungen. Berlin, 1782. — *Schmucker's* chir. Wahrnehmungen. Frankenthal, 1785. — *Richter's* chir. Bibliothek, so wie dessen med. u. chir. Bemerkungen. Göttingen, 1793. — *Hufeland's* Journal der pract. Heilkunde. — Einige der *Arnemann'schen* Schriften. — Mémoires de l'Acad. des sciences. — Dictionnaire des sciences medicales. — Neue Sammlung der auserl. u. neuesten Abhandl. f. W. A. etc. — *Desault's* chir. Nachlafs. Göttingen, 1799. — *Horn's* Archiv f. d. med. Erfahrung. — Mémoires de l'Acad. Royale des sciences. — The London medical Journal, so wie die neueren engl. med. chir. Zeitschriften. — Endlich die Handbücher der Chirurgie, unter denen sich, aufser den *Richter'schen*, folgende besonders auszeichnen: *B. Bell's* Lehrbegriff der Wundarzneikunst. A. dem Engl. Leipzig, 1793. — *Zang's* Darstellung blutiger heilk. Operationen. — *Boyer's* Abhandl. über die chir. Krankheiten. — *Cooper's* neuestes Handbuch der Chirurgie etc. etc.

Jacques Guillemeau, Traité des maladies de l'oil, qui sont en nombre de cent treize, auxquelles il est sujet, etc. Par., 1585.
Joh. Valentini Scheid, visus vitiatus ejusque demonstratio mathematico-medica. Argent. 1677.
Georg Bartisch, Augendienst. Nunmehro zum anderen Mal an den Tag gelegt. Nürnberg, 1686.
Joh. Phil. Eyselii et Theodori Martii, tractat. de re Medica, exhibens visionis statum naturalem et praeternaturalem. Erford, 1696.
G. E. Stahl et Ern. Lange, diss. medica de oculorum affectibus in genere. Halae, 1702.
Peter Kennedy's, Ophthalmographia or a treatise of the Eye. London, 1713.
Antoine Maître-Jan, Traité de maladies de l'oil et de remèdes propres pour leur guérison, enrichi de plusieurs expériences de physique. Paris, 1722. In das Deutsche übers. Nürnberg, 1725.
St. Yves, Nouveau traité de maladies des yeux, les remèdes qui y conviennent, et les opérations etc., avec de nouvelles découvertes sur la structure de l'oil etc. Paris, 1722. — Amsterdam, 1736.
John Taylor, An account of the mechanism of the Eye. Norwich, 1727.
G. Pellier de Quengsy, Recherches des mémoires et d'observations tant sur les maladies qui attaquent l'oil, et les parties qui l'environnent, que sur les moyens de les guérir. Montpellier, 1733.
A Supplement to *Kennedy's* Ophthalmographia or treatise of the Eye. London, 1739.
St. Yves, A new treatise of the diseases of the Eyes. London, 1741.
Syllabus cursus Anatomiae, infirmitatum atque operationum globi ocularis et partium contiguarum. D. Josepho Cervy dicatus a D. Joanne Taylor. Londini, 1743.
Jean Taylor, Le méchanisme ou le nouveau traité de l'anatomie du globe de l'oil, avec l'usage de ses différentes parties, et de celles qui lui sont contigues. Paris, 1748.
Hermanni Boerhaave, praelectiones publicae de morbis oculorum. Gotting., 1746. Edit. secund., quinta parta auctior et emendata. 1750.
Johann Taylor's Mechanismus, oder neue Abhandlung von der künstlichen Zusammensetzung des menschlichen Auges und dem besondern Nutzen desselben, sowohl für sich als in Absicht der anliegenden Theile, nebst seiner Art, dessen Krankheiten zu heilen. Frankfurt a. M., 1750.
Ernst Anton Nikolai, Handbuch von den Fehlern des Gesichts, Bern, 1754.
Herrmann Boerhaaven's Abhandl. von den Augenkrankheiten. A. d. Lat. von Clauder. Nürnberg, 1759. 8.
Deshais Gendron, Lettre a M... sur plusieurs maladies des yeux, causées par l'usage du rouge et du blanc. Paris, 1760.
Demonçeau, Traité des maladies de yeux et des oreilles. Paris, 1766.
Hans Sloane, An account of a most efficacious medicine for sorenefs, weakness and several other distempers of the Eyes. London. — Ins Französische übers. durch Cantwel. Paris, 1766.
John Henry Mauclerc, Nomenclatura critica morborum ocula-

rium, or a critical index to the Distempers of the Eye. London, 1768.
Guérin, Traité sur les maladies des yeux. Lyon, 1769. n das I Deutsche übersetzt. Frankfurt u. Leipzig. 1773. 8.
Louis Deshais Gendron, Traité des maladies des yeux et des moyens et des opérations propres à leur guérison. Paris, 1770.
Jean Janin, Mémoires et observ. anatomiques, physiologiques et physiques sur l'oil et sur les maladies qui affectent cet organe. Lyon et Paris, 1772. In d. Deutsche übers. Berlin, 1788. 8.
Joseph Warner, A description of the human Eye and its adjacent parts, together with their principal diseases and the methods proposed for relieving them. London, 1773.
William Rowley, A treatise on the principal diseases of the Eyes. London, 1773 — 1790. In das Deutsche übers. Breslau und Hirschberg, 1792. 8.
J. Plenk, doctrina de morbis oculorum. Viennae, 1777. In das Deutsche übers. Wien, 1788. 8.
Michele Troja, lezioni intorno alle malattie degli occhi. Napoli, 1780.
Chandler, A treatise on the diseases of the Eye and their remedies, to which is prefixed the anatomy of the Eye etc. London, 1780.
Georg Chandler's Abhandl. über die Krankheit. des Auges. Aus dem Engl. Leipzig, 1782. 8.
Gleize, nouvelles observations practiques sur les maladies de l'oil et leur traitement. Paris, 1786.
A. G. Richter's Anfangsgründe d. W. A. K. 3ter Band. Göttingen, 1790.
E. G. Th. Kortum medicinisch-chirurgisches Handbuch der Augenkrankheiten. Lemgo, 1791 — 1793. 2. Bände. 8.
Joseph Beer, Lehre der Augenkrankheiten. Wien, 1792. 2 Bd. 8.
Ch. F. Bd. Ettmüller, Abhandl. üb. die Krankheiten der Augen. Leipzig, 1799. 8.
Ant. Scarpa, saggio di osservationi et esperienze sulle principale malattie degli occhi etc. Pavia, 1801. Scarpa, trattato degli principali malattie degli occhi; edizione quinta. Pavia, 1816. — Eine franz. Uebersetzung wurde durch *Leveillé*, diese deutsch durch *Martens* 1803 gegeben. Zwei franz. Uebersetzungen mit Zusätzen, erschienen im Jahre 1821, eine derselben durch *Bellanger et Bousquet*, die andere durch *Fournier Pescay* und *Begin* geliefert.
Himly, ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen. 1. St. Bremen, 1801.
Himly und *Adam Schmidt*, ophthalmologische Bibliothek. 1. Bd. St. 1. 2. Jena, 1803. 2. Bd. St. 1. 2. 3. Ibid. 3. Bd. St. 1. 2. 3. Ibid. 1805.
de Wenzel, Manuel de l'Oculiste ou dictionnaire ophthalmologique. Paris, 1808.
James Wardrop, essays on the morbid anatomy of the human Eye. Edinbourgh, 1808. London, 1818.
Ph. F. v. Walther, Abhandlungen aus dem Gebiete der pract. Medicin, besonders der Chirurgie und Augenheilkunde. Landshut, 1810.
Traug. Guil. Benedict, de morbis oculi humani inflammatoriis libr. XXIII. Lips., 1811. Deutsche mit Zusätzen versehene Auflage, 1814.

T. W. G. Benedict, Beiträge für practische Medicin und Ophthalmiatrik. 1. Bd. Leipzig, 1812.
Joseph Beer, die Lehre von den Augenkrankheiten. Wien, 1. Bd. 1813. 2. Bd. 1817. 8.
John Cunningham Saunders, a treatise on some practical points relating to the diseases of the Eye. London, 1816.
Himly, Bibliothek für Ophthalmologie, Kenntnifs und Behandl. der Sinne überhaupt. 1sten Bds. 1s. u. 2s. St., Hannover, 1816.
J. Nep. Rust, Magazin für die gesammte Heilkunde. Berlin, seit 1816.
Langenbeck's neue Bibliothek für Chirurgie und Ophthalmologie. Hannover, seit 1818.
Demours, traité des maladies des yeux. T. 1. 2. 3. T. 4. contenant les planches. Paris, 1818.
G. Quadri, annotazioni pratiche sulle malattie degli occhi. Libro primo. Napoli, 1818. 4.
G. Baratta, osservazioni pratiche sulle principali malattie degli occhi. 2 Bde. Milano, 1818. 8. In d. Deutsche übers. von Güntz. Leipzig, 1823.
Carl Heinrich Weller, die Krankheiten des menschlichen Auges. Berlin, 1819. 2te Auflage. Berlin, 1822.
Himly, Einleitung zur Augenheilkunde. Göttingen, 1820.
John Vetch, a practical treatise on the diseases of the Eye. London, 1820.
F. Delarue, cours complet des maladies des yeux. Paris, 1820.
C. Graefe u. Ph. Fr. v. Walther, Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. Berlin, seit 1820.
A. P. Demours, précis théorique et practique sur les maladies des yeux. Paris, 1821.
G. L. Helling, practisches Handbuch der Augenkrankheiten. 2. Bde. Berlin, 1821.
B. Travers, a synopsis of the diseases of the Eye and their treatment. London, 1821.
W. Guillié, Bibliotheque ophthalmologique, ou recueil d'observat. sur les maladies des yeux; avec des notes et additions par Dupuytren, Alibert, Pariset etc. Paris, 1820 — 1822. 8. Bis jetzt sind 5 Hefte erschienen.
C. H. Weller, Diätetik für gesunde und schwache Augen. Berlin, 1821.
C. H. Weller, a Manual of the Diseases, of the human Eye, for Surgeons commencing practice. Translated from the German by G. C. Monteath. 2. vols. 8. London, 1821.
T. W. G. Benedict, Handbuch der practischen Augenheilkunde. Bd. 1. Leipzig, 1822. Bd. 2. 1823. Bd. 3. u. 4. 1824. Bd. 5. 1825.
L. F. Gondret, observations sur les maladies des yeux. Par., 1823.
R. Guthrei, Lectures on the operative surgery of the Eye. London, 1823. 8.
George Frick, a treatise on the diseases of the Eye, inclading the practice of the most eminent modern Surgeons, and particularly those of the Prof. Beer. Baltimore, 1823. 8.
J. T. Fabini, doctrina de morbis oculorum in usum auditorum. Pesthini, 1823. 8.
L. J. Beck, Handbuch der Augenheilkunde, zum Gebrauch bei Vorlesungen. Heidelberg, 1823. 8.
Carolus Henricus Weller, icones ophthalmologicae seu selecta circa morbos humani oculi. Fasciculus I. Lipsiae et Parisiis, 1825.

II. Literatur der einzelnen Krankheitsformen.

C. Peter Arlanus (Rom.) de suffusione, quam cataractam appellant. Mediolani, 1532.
Joh. Sepast. Moller, diss. de suffusione. Traj. ad Vindr. 1601. 4 1603. 4.
Joh. Kepler,)* paralipomena ad Vitellionem. Francof. 1604. 4.
Thomas Fienus, de praecipuis artis chirurgicae controversiis. Lib. II., de cataracta. Francof., 1649. 4. 1669. 4. London, 1733. 4. Deutsch, Nürnb., 1679. 8.
Joh. Horne, diss. de aegilope. Leidae, 1659. 4.
Guerner Rolfink, diss. de cataracta. Jen., 1664. 4.
Thomas Bartholinus, de oculorum suffusione epistola. Hafniae, 1664.
J. Henric. Meibom, diss. de suffusione. Helmstad., 1670. 4.
J. Arnold Friderici, diss. de suffusione. Jenae, 1670. 4.
Joh. Dan. Major, diss. de amaurosi et gutta serena. Eiloniae 1673. 4.
Bernard Albin, diss. de aegilope. Franc. ad V., 1675. 4.
Matthias Harder, diss. de cataracta. Basil.. 1675. 4.
Hieronymus Niemand, diss. de suffusione. Argentorat., 1676. 4.
Joh. Valent. Scheid, diss. de visu vitiato. Argentor. 1677. 4.
Dom. Battieri, diss. de Mydriasi. Basil., 1679.
Paul Sperling, aeger suffusione laborans. Jenae, 1684. 4.
Everard Papelier, aeger suffusione laborans. Argentorat., 1684. 4.
E. R. Camerarius, pleuritis et abscessus pectoris cum succedente colica et gutta serena. Tubing., 1690. 4.
Bernard Albinus, diss. de cataracta. Francof. ad V., 1695. 4. Mit 1 Kupfer.
Georg Wolfg. Wedel, diss. de aegilope. Jenae, 1695. 4.
G. E. Hamberger, de opticis oculorum vitiis. Jenae, 1696. 4.
Günther Christoph Schellhammer, diss. de suffusione. Jenae, 1697. 4.
Berger, de morbis oculorum. Vitteb. 1698. 4.
Georg Ernest Stahl, de fistula lacrymali. Halae, 1702.
J. E. Schaper, diss. de lippitudine crystallifera. Rostoch., 1704. 4.
Vater, de trachomate. Vitteb., 1704. 4.
Georg Wolfg. Wedel, diss. de cataracta. Jenae, 1706. 4.
Petrus Brisseau, nouvelles observations sur la cataracte. Tournay, 1706.
Id. Suite des observations sur la cataracte. Tournay, 1708. 12. — Beide Schriften zusammen, Paris, 1709. 12. — Ins Deutsche v. J. Caspar Sommer. 1743. 8.
Christ. Joh. Lang, diss. de cataracta. Paris, 1706.
Christ. Vater, diss. de visus laesionibus, in specie de Myosi et Mydriasi. Viteb. 1706. 4.

---

*) Obgleich diese, so wie einige andere hier angeführte Schriften, die Krankheiten der Augen nicht unmittelbar betreffen, so glaube ich doch Entschuldigung zu finden, wenn ich in geschichtlicher Hinsicht die vorzüglichsten derer, welche die Physiologie und Anatomie des Sehorgans zum Gegenstande haben, nicht übergehe. Kepler war es, welcher zuerst die Entstehung des Bildes auf der Netzhaut zeigte.

Godofr. Bidloo, de oculo purulento. In Decade I. exercitationum anatomico-chirurgicarum. L. B., 1708. 4.
Godofr. Bidloo, de encanthide. In Decade II. exercitationum anatomico-chirurgicarum. Leid., 1708. 4,
Ludov. Frider. Jacobi, de cataractae nova pathologia. Erford., 1708. 4.
Alex. le François et J. Nic. de la Hire: Potest stare visio absque lente crystallina? Paris, 1708. 4.
Brisseau, traité de la cataracte et du glaucome. Par., 1709.
Wolff, diss. de Amaurosi imperfecta. Traject. ad. Rh., 1709.
L. Heister, diss. de cataracta in lente crystallina. III. Altdorf., 1711, 12, 13. 4. Zusammen unter dem Titel: De cataracta, glaucomate et amaurosi tractatus. Altdorf., 1713. 4.
Alb. Ludw. Chappujau, de cataracta. Ludg. Bat., 1711.
Anel, obs. singulière sur la fistule lacrymale. Turin, 1713. 4. Auch: traité de la nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales. Turin, 1714. 4. Auch: diss. sur la nouvelle découverte de l'hydropsie au conduct lacrymal. Paris, 1716. 12.
Alex. Chr. Gakenholz, diss. de visione per cataractam impedita. Helmstad., 1713. 4.
J. Ern. Schaper, diss. de hydrophthalmia. Rostoch., 1713. 4.
Abr. Vater, de duobus visus vitiis, altero dimidiato, altero duplicato. Viteb. 1713.
L. Heister, de amaurosi salivatione curata. Altdorf., 1713. 8.
J. Bapt. Bianchi, de ductibus lacrymalibus novis. Taurin., 1715. 4.
Christ. Vater, diss. de suffusione oculorum. Viteb. 1715. 4.
Jacobi Hovii, tractatus de circulari humorum motu in oculis. Lugd. Bat., 1716. 8.
Heister, apologia et uberior illustratio system. sui de Cat., Glauc. et Amaur. contra Woolhous. Altdorf., 1717.
Clariss. Woolhousii, diss. ophthalm. de Cataracta et Glaucomate contra syst. sic. dict. nov. D. Brissai, Antonii, Heisteri et aliorum. E gall. in lat. linguam translata a Ch. le Cerf. Franc. ad M., 1719.
Franz Wiedemann, Bericht vom Stein, auch Brüche zu schneiden und Staar zu stechen. Augsburg, 1719. 8.
Heister, vindiciae sent. suae de Catar. etc. adversus ultimas adversiones atque objectiones. Altdorf., 1719.
Sincerus Fidelis, kurze Kritiken über des parisischen Oculisten Woolhous, von dem jungen D. le Cerf herausgegebene Lügen und Schandschriften, etc. Frankfurt u. Leipz. 1719.
J. Mich. Lichtmann, Beschreibung des Staares. Nürnb., 1720. 4.
J. Valent. Scheid, diss. de quibusdam visus vitiis. Argentor., 1720. 4.
Andr. Fischer, tumor oculi sinistri scirrhosus feliciter exstirpatus. Erford., 1720. 4.
Hampe, de scarificatione oculorum Hippocratica. Duisb., 1721. 4.
Anton. Celestin. Cocchi, epistola ad Morgagnium de lente crystallina oculi humani, vera suffusionis sede. Romae, 1721. 8.
Anton. Ferrein, quaestio medica, quinam sint praecipui, quomodo explicentur et curentur lentis crystallinae morbi. Monspelii, 1722. 4.
Laur. Roberg, diss. de cataracta. Upsal., 1722. 4.
Laur. Heister, de Trichiasi oculorum. Helmstad. 1722. 4.
Cortum, de Trichiasi. Francof. 1724.

Jac. Gering, praxis vitia partium oculi cognoscendi et curandi. Misen., 1725. 4.
Mauchart, diss. de ophthalmoxysi Hippocratica et Woolhousiana. Tubing., 1726. 4.
Jac. Doebel von Doebeln, de cataractae natura et cura. Londin. Scanor. 1727. 4.
Cornutus Wigelius, diss. de cataracta. Upsal., 1727. 4.
Zach. Platner, de scarificatione oculorum. Lips., 1728. 4.
Joh. Daniel. Coschwitz, diss. de Hypopyo. Halae, 1728. 4.
Anton. le Moine, diss. an deprimendae cataractae exspectanda sit maturatio. Par., 1728.
Praetorius, de scarificatione oculor. Lips., 1729.
Bened. Duddel's treatise of the diseases of the horny coat of the Eye, with supplements. London, 1729.
Fr. Hofmann, diss. de cataracta. Halae, 1729. 4.
Maur. Henric. Henrici, diss. de cataracta. L. B., 1729. 4.
Franc. Petit, lettre, dans laquelle il demontre, que le Crystallin est près de l'Uvée et rapporte de nouvelles preuves, qui concernent l'operation de la cataracte. Paris, 1729. 4; et lettre contenant des réflexions sur les découvertes faites sur les yeux. Paris, 1732. 4. In Halleri disp. chir. sel. T. V. p. 601.
Anton Tizes, diss. de cataracta. Monsp., 1731.
Mich. Alberti, de visus obscuratione a partu. Halae, 1732. 4.
J. Herm. Franken, overnet stryken van verschiedene Cataracten. Amst. 1733.
Aegid. Orato. Keck, de Ectropio. Tubing., 1733. Auch in diss. sel. Tubingensibus. Tom. III. Tubing. Cotta, 1785. 8.
J. Louis Petit, sur la fistule lacrymale, in Mémoires d. l'Acad. d. sciences. A. 1734. p. 135. et 1740. p. 155.
A. Fischer et Breyer, diss. de ophthalmia venerea et peculiari in illa operatione. Erford., 1734. 4.
John Taylor, new treatise on the diseases of the crystalline humeur of the Eye or of the cataract and glaucoma. London, 1736. 8.
Fr. Hofmann, diss. de variis visionis vitiis. Halae, 1736. 4.
P. Ant. Lepy et Des. Frèremont: Non ergo fistulae lacrymali cauterium actuale. Paris, 1738. 4.
Anton. Florlin: Non ergo fistulae lacrymali cauterium actuale. Paris, 1738. 4.
Kästner, de motu ligamenti ciliaris in oculo. Lips., 1738. 4.
Conr. de Reverhorst, diss. de aegilope s. fistula lacrym. Leidae, 1738. 4.
Hermann Paul Juch, diss. de suffusione. Erford., 1738. 4.
Franc. van de Wynpersse, diss. de Amaurosi. Lugd. Bat., 1738.
Joh. Taylor, de vera causa strabismi. Lisbon., 1739. 8.
Guil. Fr. Habermann, diss. sistens historiam cataractae in puella septem annorum observatae. Jenae, 1740. 4. 16. S.
Zacharias Platner, de vulneribus superciliis illatis, cur coecitatem inferant, ad locum Hippocratis. Lips., 1741. 4. In opusculis Tom. II. p. 166. Lips., 1749. 4.
Zach. Platner, de noxis ex suppuratione cohibita in nonnullis oculorum morbis. Lips., 1742. 4.
G. de la Faye: Ergo vera cataractae sedes in lente. Par., 1742. 4.
Elias Col de Villars: Ergo vera cataractae sedes in lente. Par., 1742. 4.
C. Gl. Hebenstreit, de oculo lacrymante. Lips., 1743.

Jos.

Jos. de la Sone et Arcelin diss.: Starene potest visio absque crystallina? Paris, 1743.

Jac. Daviel, sur une nouvelle méthode de guérir la cataracte par l'extraction. In den Mémoires de l'Acad. d. chirurg. T. II. 337.

Christ. Jac. Trew, de cataracta in commercio litterario. Noric. 1745. p. 36.

Godofr. Hoerle, de staphylomate fungoso. Giessenae, 1746. 4.

Berger, diss. de maculis, punctulis, scintillis aliisque corpusculis visui observantibus. Francof., 1747. 4.

J. Jac. Roscius, disput. de cataracta vera lactea crystallina. Regiomont., 1748. 4.

Sam. Th. Quellmalz, progr. depositionis cataractae effectus exponens. Lips., 1748. 4.

Just. Godofr. Güntz, diss. de staphylomate. Lips., 1748. 4.

B. D. Mauchart, diss. de staphylomate. Tubing., 1748. 4.

B. G. Oehme, diss. de Amaurosi. Lips., 1748. 4.

Janus Reghellini, lettera chirurgica sopra l'offesa della vista consistente nel radoppiamento degli oggetti. Venet. 1749. 8.

Sylvester O Hallorum, a new treatise on Glaucoma or Cataract. Dublin, 1750. 8.

Palucci, hist. de l'operation de la cataracte. Paris, 1750.

A. G. Buchner, diss. de inflammatione oculorum a rachitide cum tuberculis in palpebrarum tunica interiori. Hal., 1751. 4,

Raimond de Vermale, lettre sur l'extraction du crystallin. Paris, 1751.

H. F. Delius, diss. de phantasmatibus ante oculos volitantibus, affectu oculorum singulari. Erlang., 1751. 4.

Georg Fr. Siegwart, diss. chir. de extractione cataractae. Tubing., 1752. 4.

Fr. Busse, quaestio med. chir., an in deprimenda cataracta ipsius capsula interne et postice imprimis secanda sit. Paris., 1752. 4.

J. Gf. Zinn, de ligamentis ciliaribus. Gott., 1753. 4.

Andr. El. Buchner, disp. de cataracta omni tempore deponenda. Hal., 1753. 4.

Triller, de scarificatione et ustione oculorum ab Hippocrate descripta. Viteb., 1754.

J. Gf. Zinn, descript. anat. oculi hum. iconn. illust. Gott., 1755. c. suppl. notisque H. A. Wrisbergii. 1780.

Bassuel et Le Maire, diss. de Hypopyo. Paris., 1757. 4.

C. J. Theroude de Valun et J. Descemet: Non ergo sola lens cataractae crystallinae sedes. Par., 1758.

P. Pott, observations on that disorder of the corner of the Eye, commonly called fistula lacrymalis. London, 1758.

Lauder, diss. de cataracta. Edinb., 1758.

Sabatier et Pet. Dion. Matin, de cataractae extrahendae variis modis, Par., 1759. 4.

Jacob Ludwig Schürer, quaestio, num in curatione suffusionis lentis crystallinae extractio depressioni sit praeferenda. Argent., 1760. 4.

A. J. Palucci, methodi curandae fistulae lacrymalis. Vindob. 1762. 117. S.

J. B. Morgagni, epistola de obstructione ductuum lacrymalium. — In opusc. miscellan. Venet. 1763. Fol. p, 1.

C. F. Kaltschmidt, de puero XII. annor. Ancyloblepharo laborante curato. Jenae, 1764. 4.

* *

Janin, sur une fistule lacrymale occasionnée par un coup de feu Paris, 1765. 8.

Jean Colombier, diss. nova de suffusione seu cataracta. Paris, 1765.

Paul Gabriel Lepeaux: Num impeditis lacrymarum viis parari debeat lacrymis artificiale iter in cavum, quod juxta majorem oculi canthum inter superficiem internam palpebrae et oculi globum deprehenditur. Par., 1766. 4. 1770. 4.

Andry et de la Poterie, incisione corneae in Hypopyo praestat embroche. Paris, 1766.

Jean Astruc et Elias de la Poterie: Ergo incisioni corneae in curatione cataractae praeferenda embroche. Par., 1766. 4.

Jean Colombier: Ergo in multiplici cataractae genere multiplex *ενχειρησις*. Par., 1768. 4.

Franç. Guil. le Vacher et P. Victor Coutouly, de cataracta nova ratione extrahenda. Par., 1768. 4.

Carsten Rönnow, om en ben och otenatis starr, etc. Stockholm, 1768. 8.

Lettre d'un étudiant en méd., dans laquelle on examine et réfute les doutes, qu'un anonyme a répendu dans le public sur l'observation donnée à l'Académie roy. par M. Ronnow, touchant une cataracte osseuse ou pierreuse. Stockh. 1769. — Doutes que la cataracte etc. Ibid. 1768.

Réponse à l'étudiant, etc. Ibid. 1769. — Remarque sur la critique d'un anonyme etc. Ibid. 1770.

J. F. Haeseler, Betrachtungen über das menschliche Auge. Hamburg, 1771.

J. D. Metzger, curationum chirurgicarum, quae ad fistulam lacrymalem hucusque fuerunt adhibitae, historia critica. Monasterii, 1772. 8.

Johann Bischoff, practische Abhandl. der Dioptrik etc. Mit 9 Kupfert. Stuttgart, 1772. Neue Aufl. Stuttgart, 1800.

Aug. Gott. Richter, Abhandl. von der Ausziehung des grauen Staares. Göttingen, 1773.

Peter Rathlauw, over de Cataracta. Amst., 1773.

Joh. Caspar Hellmann, der graue Staar und dessen Herausnehmung, nebst einigen Beobachtungen. Magdeburg, 1774.

Carolus Szén, diss. de cataracta ab effluviis aquae fortis nata. Jenae, 1774.

R. Klincke, diss. de Diplopia. Gotting., 1774.

J. Franç. Achilles Lalouette: Ergo faustum omen in amaurosi periodus. Par., 1774.

Georg Bostwik, treatise upon the extraction of the crystalline lens. Edinburgh, 1775.

Gisb. de Witt (zu Amsterd.), Vergleichung der verschiedenen Methoden, den Staar auszuziehen. Giefsen, 1775. S. 130 Neue Ausgabe. 1778. 8.

George Chandler, a treatise of the Cataract. etc. With copperplates. London, 1775. 116. S.

W. Rowley, an essay on the Ophthalmia or inflammation of the Eye and the diseases of the transparent Cornea. London, 1776.

Ch. E. Wünsch, visus phaenomena quaedam explicat. Lips., 1776.

J. Marat, on the nature of a singular disease of the Eye. London, 1776.

J. Frid. Licht, de praecipuis viarum lacrymalium morbis. Argentor., 1776.

Jac. Christ. Vogel, de fistula lacrymali eamque sanandi methodis tractatus. Edit. tertia. Gryphisw., 1776. 4.
Percival Pott, chirurgische Krankheiten. A. d. Engl. Berlin u. Lüneburg, 1776. 8. D. Engl. Orig. London, 1775.
Thomas Mejean, diss. de cataracta. Monsp., 1776. 4. 40. S.
M. Lange, de ophthalmia. Tyrn., 1777.
Christ. Polycarp. Leporin. diss. de Hypopyo. Gotting., 1778.
J. G. Walter, epist. anat. ad W. Hunter de venis oculi. Berol., 1778.
Georg, H. Vogler, diss. de maculis corneae. Gott., 1778.
Percival Pott, Abhandl. von der Thränenfistel und Mastdarmfistel. A. d. Lat. Dresden, 1779. 8.
J. Witte, de fistula lacrymali. Erford., 1779.
Wenzel, diss. de extractione cataractae. Par., 1779. Derselbe: Traité de la cataracte, avec des observations. Paris, 1786. 8. 224. S. A. d. Franz. M. 1 Kupf. Nürnberg, 1788. 8.
Cusson, remarques sur la cataracte. Montpellier, 1779.
Bretcher, diss. de suffusione. Halae, 1779.
Lorenzo Nannoni, dissertazione sulla cateratta. Milano. 61. S. 12.
Daniel Nootnagel, diss. de Amaurosi. Erlang., 1779. 4.
James Ware, remarks on the ophthalmy. London, 1780.
H. W. M. Olbers, de oculi mutat. internis. Gotting., 1780.
J. Georg Schulze, diss. de fistulam lacrymalem sanandi methodis. Argent., 1780. 80 S. 4.
Giov. Bortolazzi, sopra una cieca nata etc. in cui trattasi di cateratta connata. Verona, 1781. A. d. Ital. Leipz., 1784.
Trnka de Krzowitz, historia amauroseos. T. II. Vindob., 1781. 8. Uebers. v. G. Ph. Mogalla. Th. I. Breslau, 1790.
Trnka de Krzowitz, historia ophthalmiae etc. Vindob., 1783.
Fr. Siegerist, Beschr. u. Erkl. d. Staarnadel-Messers und Gegenhalters z. Auszieh. d. grauen Staares. Gräz, 1783. 8.
Christ. Gotthold Teller, de methodis suffusionem oculorum curandi a Casamatta et Simone cultis diss. Lips., 1783. 72 S.
A. Butter, a new method of extracting the cataract etc. London, 1783.
Ch. Fr. Ludwig, de suffusionis per acum curatione. Lips., 1783. 8.
Marchand, mém. sur un nouveau moyen de prévenir l'aveuglement, qui a pour cause la cataracte. Nismes, 1784.
Demours, fils, mém. sur la cataracte. Par., 1784.
Jonathan Wathen, a dissertation on the theory and cure of the cataract. London, 1785. 8. 166. S.
C. W. Hildebrand, de accuratiore cataractae deponendae methodo. Francof. 1785. 4.
Ant. Carl von Willburg, Betrachtung über die bisherigen gewöhnlichen Operationen des Staares. Nürnberg, 1785.
J. H. Harder, diss. de Ectropio Entropio et Trichiasi. Jen., 1785.
G. J. Badendyk, diss. de Ancyloblepharo. Jen., 1785.
Theod. Singeisen, de ophthalmia ex vitio ventriculi. Erlang., 1786.
Blizard, a new method of treating the fistula lacrymalis. London, 1786.
J. Ant. Wilsen, diss. sist. annotationes quasdam circa ophthalmiam epidemicam a. 1786 observatam. Stuttgard., 1787. 4.
Barussaldi, diss. della fistula lacrymali. Venet., 1787.
E. A. L. Brunner, diss. inaug. med. chir. de cataracta. 1787.
Reil, diss. sist. quaedam de systematis oculorum glandulosi inflammatione. Hal., 1788. 8.

J. S. S. Schacht, diss. de Epiphora et Lippitudine. Halae, 1789. 8.
Hennings, comment. de Ptosi. Gryphisw. 1789.
C. A. Otto, diss. in qua visus vitia contemplantur. Butzow., 1789.
J. Fr. Corvinus, diss. de Amaurosi. Tubing., 1789. 4.
Trampel, über die eiterartige Augenentzündung. I. d. Beobacht. u. Erfahr. Lemgo, 1790.
J. God. Goetz, de ophthalmia infantum recens natorum. Jenae, 1791.
G. J. Beer, pract. Beobacht. üb. verschiedene vorzügl. aber üb. jene Augenkrankheiten, welche aus allgem. Krankh. des Körpers entspringen etc. Wien, 1791.
Georg Rud. Foelsch, diss. de corneae maculis. Halae, 1791.
G. J. Beer, pract. Beobacht. üb. den grauen Staar u. d. Krankheiten der Hornhaut. Wien, 1791.
Joh. Heinr. Jung, Methode den grauen Staar auszuziehen etc. Marburg, 1791. Mit 4 Kupf. 134. S. 8.
J. C. Loder, observationis Hypopyi et inde enatae Synizeseos pupillae pars I. Jenae, 1792.
Jonathan Th. Wathen, a new and easy method of curing the fistula lacrymalis. The second edition, with considerable improvements. London, 1792.
Gerrit. Jan Van Wy, nieuwe manier van Staarsnyding. Aruhem, 1792.
J. G. A. Wardenburg, diss. inaug. de methodo cataractae extrahendae nova. Gotting., 1792. 4.
N. Avellan, praes. Ad. Murray, diss. inaug. de Trichiasi. Upsal., 1792. 32. S.
J. S. Fest, Winke aus der Geschichte eines Augenkranken etc. Leipzig, 1793.
Wilh. Frid. Dreyssig, diss. de ophthalmia recens natorum. Erford., 1793. 4.
C. G. G. Richter, diss. de Amaurosi. Gotting., 1793. 4.
J. Crampton, diss. de Amaurosi. Edinb., 1793.
J. Ch. Reil, de lentis crystallinae structura fibrosa. Hal., 1794.
Hederborg, praes. Car. Fr. Liliewalch, de ophthalmia Lundae, 1794.
J. H. Pfeifer, diss. de Hypopyo absque operatione sanando. Erlangae, 1794.
J. F. Merzdorff, diss. de fistula et blennorrhoea viarum lacrymalium. Halae, 1794. 8.
G. C. Conradi, Bemerkungen über einige Gegenstände der Ausziehung des grauen Staares. Leipzig, 1795.
G. G. Santarelli, ricerche per facilitare il Cateterismo e la estrazione della cateratta. Vienna, 1795.
James Ware, an inquiry into the causes wich have most commonly prevented success in the operation of extractiony the cataract. London, 1795. Uebers. v. Leune. Leipz., 1799.
J. Henr. Chr. Vogler, diss. de. maculis ante oculos volitantibus. Helmstad., 1795. 33 S. 4.
J. N. Thomann, Geschichte einer metastat. Augenentz. Würzb., 1796.
J. V. H. Köhler, Versuch einer neuen Heilart der Trichiasis. Leipzig, 1796. 106 S. Mit 1 Kupf.
Rud. Abrah. Schiferli, theoretisch-practische Abhandl. über den grauen Staar. Jena u. Leipz., 1797. 8. 112 S.
J. Barth, etwas über die Ausziehung des grauen Staares, für den geübten Operateur. Wien, 1797. 8.

G. J. Beer's Methode, den grauen Staar sammt der Capsel auszuziehen. Wien, 1799.
G. J. Beer, bibliotheca ophthalmica etc. Vindob. 1799
J. K. Sybel, diss. d. quibusdam materiae et formae oculi aberrat. a statu normali. Halae, 1799.
G. J. Beer, Pflege gesunder und geschwächter Augen. Wien, 1800.
George Adams, Anweisung zur Erhaltung des Gesichts und zur Kenntnifs der Natur des Sehens. Aus dem Engl. u. m. Anm. vers. v. Fr. Kries. 2te Aufl. Gotha, 1800.
G. J. Beer, Auswahl a. d. Tagebuche eines pract. Augenarztes. Wien, 1800.
Edw. More Noble, a treatise on Ophthalmy. Birmingham, 1800. Uebers. und mit Anmerk. von K. G. Kühn. Leipzig, 1802.
A. Schmidt, über Iritis und Nachstaar. Wien, 1801. 4.
S. T. Sömmering, Abbild. des menschl. Auges. Frankf. a. M., 1801. Fol. mit 16 Kupf. Auch abgedruckt in Demours Kupferwerke.
James Earle, an account of a new method of operation for the removal of the opacity in the Eye, called Cataract. London, 1801. Mit 2 Kupf. In Langenbeck's Bibl. I. 1, 496.
G. Le Febure, v. d. Augenentz. u. d. daraus entstehenden Augenkrankh. Frankfurt am M., 1802.
J. A. Hassenmüller, diss. novum ad curationem Trichiaseos remedium sistens. Dorpat., 1802.
J. Ad. Schmidt, über die Krankheiten des Thränenorgans. Wien, 1803. 8.
Lacournière, considérations sur l'opération de la cataracte. Strasb., 1803.
J. A. Tittmann, von den topischen Arzneimitteln gegen Augenkrankh. Dresden, 1804.
Arthur Edmonston, a treatise on the varieties and consequences of Ophthalmia. Edinb., 1806.
G. J. Beer's Ansicht der staphylomatösen Metamorphosen des Auges und der künstlichen Pupillenbildung. Wien, 1806.
J. Spindler, über Entzündungen des Auges. Würzburg, 1807.
C. A. Weinhold, Anleitung, den verdunkelten Krystallkörper im Auge des Menschen jederzeit bestimmt mit seiner Kapsel umzulegen. Meifsen, 1809. 2te Ausg., 1812.
Wardrop, observations on Fungus haematodes. Edinburgh, 1809.
Jac. Ware, chir. Beobacht. über die Augen; aus dem Engl. übers. von J. G. Runde. Göttingen, 1809.
T. Benedict, diss. de morbis humoris vitrei in oculo humano. Lips., 1809. 4.
F. T. Flemming, diss. inaug. de Dacrycystitide. Vitebergae, 1810.
M. Bratsch, diss. inaug. de panno oculi. Landishuti, 1810.
J. F. Schröter, das menschliche Auge in einer vergröfserten Darstellung a. e. ausgemalt. Tafel nach Sömmering. Weimar, 1810.
Guil. Henr. Buchhorn, de Keratonyxide, nova cataractae aliisque oculorum morbis medendi methodo chirurgica. Magdeb., 1810.
J. Ch. Rosenmüller, partium extern. oculi hum., impr. lacrymal. descript. anat. Lipsiae, 1810.
T. Benedict, de pupillae artificialis conformatione. Lipsiae, 1810.
C. H. Wachter, diss. de pupilla artificiali. Groeningae, 1810.
G. G. Voit, commentatio medica exhibens oculi humani ana-

tomiam et pathologiam ejusdemque in statu morboso exstirpationem. Norimbergae, 1810.

Buchhorn, die Keratonyxis, eine neuere, gefahrlosere Methode, den grauen Staar zu operiren, nebst einigen erläuternden Operationsgeschichten. Magdeburg, 1811.

J. Rainer, diss. de carcinomate oculi. Landish., 1811.

Gibson, practical observations on the formation of an artificial pupil. London, 1811.

Fr. R. K. Tissot, diss. sist. varias auctorum opiniones de staphylomate. Erlang., 1811.

E. J. M. Langenbeck's Prüfung der Keratonyxis. Göttingen, 1811.

J. Scheuring, Parallele der Vortheile und Nachtheile der vorzüglichsten Operationsmethoden des grauen Staares. Bamberg und Würzburg, 1811.

Paolo Assalini, ricerche sulle pupille artificiale. Milano, 1811. Uebersetzt und mit Anmerk. v. F. A. Pönitz. Dresden, 1813.

D. H. Kieser, Ueber die Natur, Ursachen, Kennzeichen und Heilung des schwarzen Staares. Göttingen, 1811.

J. C. Winkler, Anleitung zur Erhaltung des Gesichts nach optischen Grundsätzen. Leipzig, 1812.

J. P. Maunoir, mémoires sur l'organisation de l'iris et l'opération de la pupille artificielle. Paris, 1812.

F. Jaeger, de keratonyxidis usu. Viennae, 1812.

William Adams, practical observations on Ectropium or Eversion of the Eye-lids, with the description of a new Operation for the cure of that disease; on the modes of forming an artificial Pupil and on Cataract. London, 1812.

G. J. Beer, das Auge, oder Versuch das edelste Geschenk der Schöpfung vor dem höchst verderblichen Einflusse unseres Zeitalters zu sichern. Wien, 1813.

J. B. Wenzl, über den Zustand der Augenheilkunde in Frankreich, nebst kritisch. Bemerk. über denselben in Deutschland. Nürnberg, 1813.

James Ware, remarks on the Ophthalmy, Psorophthalmy and purulent Eyes of new born childern. London, 1814.

T. W. G. Benedict, Monographie des grauen Staares. Breslau, 1814.

Fr. Reisinger, diss. de exercitationibus chirotechnicis et de constructione atque usu phantasmatis in ophthalmologia. Gotting., 1814.

L. Schmid, praes. J. H. F. Autenrieth, diss. de pupilla artificiali in sclerotica aperienda et de gravi morbillorum epidemia Gomaringensi. Tubing., 1814.

Helling, Beobachtungen über die im Feldzuge 1813 — 14 bei den preufs. Soldaten gleichsam epidemisch gewordene Augenkrankheit. Berlin, 1815.

C. A. Weinhold, über eine heftige, der ägyptischen Ophthalmie ähnliche epidemische Augenkrankheit. Dresden, 1815.

Ant. Rosas, diss. quae, rejecta fistulae lacrym. idea, veram fist. lacr. notionem et sanandi methodum, excepta occlusi ductus nasalis operatione proponit. Viennae, 1815.

F. E. Niesar, de rheumatismi in oculum humanum effectu. Vratisl. 1815.

F. J. Hohlfeld, diss. de pupillae artificialis conformat. Berol., 1815.

Ph. Heineken, Ophthalmobiotik, oder Regeln und Anweisung zur Erhaltung der Augen. Bremen und Leipzig, 1815.
Th. Baltz, die Augenentzündung unter den Truppen in den Kriegsjahren 1813 — 15, oder die Ophthalmia catarrhalis bellica. Berlin, 1816.
Ph. Ant. Bayer, über Trichiasis und Entropium, nebst Beschreibung einer verbesserten Augenliedzange. Nürnberg, 1816.
J. C. Bock, diss. de choroideae morbis. Berol. 1816.
Alban, Versuch einer Anleitung zur richtigen Gesundheitspflege der Augen, für den Nichtarzt. Rostock, 1816.
Ferd. Lehmann, Wahrnehmungen bei Behandlungen der Augenentzündungen in dem Feldzuge 1815. Leipzig, 1816.
F. Vasani, storia dell' ottalmia contagiosa dello spedale militare d'Ancona. Verona, 1816. 8.
A. Omodei, cenni sull' ottalmia contagiosa d' Egitto e sulla sua propagazione in Italia. Milano, 1816. In das Deutsche übersetzt von Wolf. Frankfurt am Main, 1820. 8.
J. H. Reveillé-Parise, hygiène oculaire etc. Paris, 1816.
John Vetch, observations relative to the treatment by Sir William Adams of the ophthalmic cases of the Army. London, 1816. In das Deutsche übersetzt von Michaelis. Berlin, 1817.
W. Mensert, Verhandeling over de Keratonyxis. Amst., 1816.
J. G. Betz, diss. inaug. de amovenda cataracta per keratonyxidem. Jenae, 1816.
Reisinger, Darstellung eines neuen Verfahrens, die Mastdarmfistel zu unterbinden, und einer neuen Methode, künstliche Pupillen zu bilden. Augsburg, 1816.
F. T. Fabini, diss. inaug. de Amaurosi. Viennae, 1816.
William Adams, a Letter to the Directors of Greewich Hospital, etc. for the Extermination of the Egyptian Ophthalmia. London, 1817.
Jüngken: Nunquam lux clara Ophthalmiae neonatorum causa est occasionalis. Berol., 1817.
Hirschfelder, diss. inaug. de iridis inflammatione diversa. Berolini, 1817.
H. Friedländer, de medicina oculorum apud Celsum commentarius. Hal., 1817.
F. Beer, diss. inaug. de inflammatione lentis crystallinae. Landishuti.
K. F. Gräfe, Repertorium augenärztlicher Heilformeln. Berlin, 1817.
William Adams, a practical Inquiry into the Causes of the frequent Failure of the Operations of Depression, and of the Extraction of the Cataract as usually performed. Lond., 1817.
J. C. Jüngken, diss. inaug. de pupillae artificialis per coreoncion Graefianum conformatione. Berolini, 1817.
Löbenstein-Löbel, Grundrifs der Semiologie des Auges. Jena, 1817.
Jos. Syller, diss. de haemophthalmo. Landish., 1817.
J. Ch. Jüngken, das Coreoncion, ein Beitrag zur künstlichen Pupillenbildung. Berlin und Leipzig, 1817.
J. B. Seveneik, diss. inaug. de Amaurosi. Berolini, 1817.
C. Behr, diss. inaug. de spasmo iridis. Halae, 1817.
Xav. Hatzler, de Ophthalmitide in genere. Monachii, 1818.
Detm. W. Sömmering, comment. inaug. d. oculor. hominis animaliumq. sectione horizontali. Gotting., 1818.
Hazard-Mirault, traité pratique de l'oeil artificial. Paris, 1818.

F. W. Wallroth, syntagma de medicina oculorum veterum. spec. med. philol. Halae, 1818.
F. Fabini, diss. inaug. de Hypopyo. Tubing., 1818.
M. J. Chelius, über die durchsichtige Hornhaut des Auges, ihre Function und ihre krankhaften Veränderungen. Karlsruhe, 1818.
Guillié, nouvelles recherches sur la cataracte et la goutte sereine. Ed. 2. Paris, 1818.
Ch. F. H. Busse, pathologia oculi generalis. P. I. Berol. 1818. 8.
Jos. à Gendre, diss. inaug. sist. diversarum cataractae operandae methodorum inter se comparationem. Landishuti, 1818.
G. Wagner, commentatio de Coremorphosi, sist. brevem methodorum ad pupillae artificialis conformationem hucusque adhibitarum adumbrationem novique ad Iridodialysin instrumenti descriptionem. Gotting., 1818.
J. Emden, diss. de Raphiankistro, novo instrumento ad novam Coremorphoseos methodum perficiendam. Gotting., 1818.
Schlagintweit, über den gegenwärtigen Zustand der künstlichen Pupillenbildung in Deutschland. München, 1818.
G. C. Luce, diss. de Ectropio sarcomatoso per ferramentum candens sanando. Berolini, 1818.
J. H. Schnörr, de cognoscenda curandaque Amaurosi. Halae, 1818.
Schindler, commentatio ophthalmologica de iritide chronica ex keratonyxide suborta. Vratislaviae, 1819.
Godofr. Tuchmann, diss. inaug. sist. ophthalmiam recentioribus temporibus frequentissime in exercitibus observatam. Gottingae, 1819.
Rotermundt, diss. inaug. de ophthalmia scrophulosa. Ratisbonae, 1819.
F. Miller, anatom. und physiol. Darstellung des menschlichen Auges. Wien, 1819. 8.
Ph. v. Walther, merkwürdige Heilung eines Eiterauges, nebst Bemerkungen über die Operation des Hypopyons. 2te Aufl. Landshut, 1819.
J. Purkinje, Beiträge zur Kenntnifs des Sehens in subjectiver Hinsicht. Prag, 1819.
Zimmer, diss. inaug. de Hypopyo. Landishuti, 1819.
B. Kirchmayr, diss. inaug. de cataracta ejusque per extractionem curandae methodo. Landish., 1819.
C. L. Bieske, animadversiones de cataractae genesi et cura. Erlangae, 1819.
A. G. Römer, diss. inaug. de ophthalmiis. Rostochii, 1820.
Bätcke, diss. inaug. de quibusdam oculi inflammationibus. Berolini, 1820.
Joh. Nep. Rust, die aegyptische Augenentzündung unter der Königl. Preufs. Besatzung in Mainz. Berlin, 1820.
F. Böhme, diss. inaug. de ophthalmia syphilitica. Berolini, 1820.
G. J. Guthrie's Treatise on the Operation for the Formation of an artificial Pupil. London.
G. J. Guthrie's Treatise on Cataract and Inflammation of the Iris. London.
Hoffbauer, diss. inaug. de cornea ejusque morbis. Berolini, 1820.
Heilbronn, diss. inaug. de variis cataractae curandae methodis. Berolini, 1820.
E. T. Schulze, diss. inaug. de pupillae artificialis conformatione. Berolini, 1820.
J. C. Lindner, de variis pupillae artificialis conformat. Vratisl., 1820.

Andr.

Andr. Daiminger, diss. inaug. de Amaurosi. Wirceburgi, 1820.
C B. Lorenz, diss. inaug. de Nystagmo. Berolini, 1820.
Metsch, diss. inaug. de blepharophthalmia blennorrhoica recens natorum. Berolini, 1821.
Theveng, diss. inaug. de blepharophthalmia infantum recens natorum. Berolini, 1821.
J. B. Müller, Erfahrungssätze über die contagiöse und aegyptische Augenentzündung. Mainz, 1821.
Philippi, diss. inaug. de ophthalmia scrophulosa. Berolini, 1821.
E O. Dann, diss. inaug. de ophthalmia arthritica et rheumatica. Halae, 1821.
C. F. Kaemper, diss. inaug. de iritide syphilitica. Gottingae, 1821.
C. A. Werres, erstes Schutzmittel und Specificum gegen die kontagiöse Augenentzündung am Niederrhein; eine Streitschr. Cölln, 1821.
C. W. Diener, diss. inaug. de operationis fistulae lacrymalis ratione. Landishuti, 1821.
Phil. Chilwell de la Garde, a treatise on cataract, intended to determine the operations required on the different forms of that disease. London, 1821.
Bartolomeo Panizza, annotazioni anatomico-chirurgiche sul fungo midollare dell'occhio e sulla depressione della cateratta. Con tre tavole. Pavia, 1821.
C. H. Weller, über künstliche Pupillen, und eine besondere Methode, diese zu fertigen. Berlin, 1821.
F. A. Ammon, Ophthalmoparacenteseos historia. Gotting., 1821.
Aktenstücke über die kontagiöse Augenentzündung. Auf Veranlassung des Ministeriums der geistlichen-, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten herausgegeben. Berlin, 1822. 8.
Giuseppe Giorgi, memoria sopra un nuovo instrumento per operare la cateratta e per formare la pupilla artificiale. Imola, 1822.
F. A. Klose, diss. medic. de nonnullis visus vitiis. Gottingae, 1822.
J. F. Riemannn, Staphylomatis nosologiae specimen. Berolini, 1822.
M. G. Martini, diss. pathol.-chir. de fili serici usu in quibusdam viarum lacrymalium morbis. Lipsiae, 1822.
J. L. Friederich, diss. inaug. de staphylomate.
E. F. Gräfe, die epidemische kontagiöse Augenblennorrhoe Aegyptens in den europäischen Befreiungsheeren. Berlin, 1823. Fol.
J. H. Leuw, über die jetzt herrschende kontagiöse aegyptische Augenkrankheit. Essen, 1823.
M. Vausevendow, spec. sistens aetiologiam prophylaxinque ophthalmitidis in Belgarum exercitu jam dudum grassatae. Lovanicae, 1823.
J. B. Müller, die neuesten Resultate über das Vorkommen und die Behandlung einer ansteckenden Augenliederkrankheit unter den Bewohnern des Niederrheins. Leipzig, 1823.
J. H. M. Poppe, die ganze Lehre vom Sehen etc. Mit 9 Steintafeln. Tübingen, 1823.
H. A. J. Ströser, diss. de iritide syphilitica. Lipsiae, 1823.
Natale Catanoso, osservazioni cliniche sopra l'estrazione del crystallino. Messina, 1823. 8.

***

Lusardi, mémoire sur la cataracte congéniate. Montpellier, 1823. 4.

C. H. E. Haertelt, diss. de extractionis cataractarum praestantia methodique strenue antiphlogisticae ipsa peracta usu. Vratisl. 1823. 4.

A. Fr. Schmidt, diss. de Trichiasi et Entropio. Berol., 1823. 8.

G. L. F. Hegeler, diss. de staphylomate. Lipsiae, 1823.

Th. R. Baltz, über die Entstehung der Augenentzündung, welche seit mehreren Jahren unter den Soldaten geherrscht hat. Eine gekrönte Preisschrift. Berlin, 1824. 8.

Lodovico Pacli, osservazioni sull ottalmia, che hanno offerto i militari di Livorno. Livorno, 1824. 8.

James Hewson, observations on the history and treatment of the Ophthalmia accompanying the secundary form of lues venerea. Dublin, 1824. 8.

John Stevenson, a treatise on Cataract and the cure of that disease in its early stages. London, 1824. 8.

John Bowen, practical observations on the cure of every species of Cataract by Hyalenyxis or vitreous operations. London, 1824. 8.

C. J. Karl, Anleitung kranke Augen zu untersuchen, nebst Berücksichtigung ihrer consensuellen Verhältnisse. Wien, 1824.

William Kitchiner, die Oekonomie der Augen; oder Vorschriften zur Erhaltung und Verbesserung des Gesichts, nebst Bemerkungen über das Tragen der Brillen und den Gebrauch der Operngucker, so wie astronomischer und terrestrischer Telescope. Aus dem Engl. Weimar, 1825.

Einlei-

BOSTON MEDICAL
JUL 19 1911
LIBRARY

Einleitung.

Bevor ich zur Beschreibung der einzelnen Augenkrankheiten selbst übergehe, ist es nöthig, einige Worte vorauszuschicken, mit denen ich denn vorzüglich die Verschiedenheiten, welche zwischen der reinen und der specifischen Augenentzündung obwalten, anzugeben mich bemühen werde.

Wir bemerken im und am Sehorgane so mancherlei und so himmelweit verschiedene entzündliche Zustände, dafs es nicht immer leicht ist, jeden einzelnen gehörig zu erkennen, und dem gemäfs zu behandeln. Deswegen ist eine deutliche und practisch brauchbare Eintheilung derselben, eine bedeutende Hülfe, weil diese jedes Durcheinanderwerfen verschiedenartiger Zustände, möglichst verhindert.

Um diesem, so weit es angeht, zu genügen, habe ich eine reine, und hinsichtlich dieser, eine specifische Entzündung im Auge zu beschreiben, deren eine wohl von der andern unterschieden werden mufs, wenn eine rationelle Behandlung möglich sein soll.

Eine reine Entzündung, meine ich, sei diejenige, welcher niemals eine specifische Krankheit zum Grunde liegt, in welcher vielmehr die *Phlogosis* in ihrer Grundform verläuft, weder im ersten Zeitraume noch im zweiten, specifisch alienirte Erscheinungen zeigt, und dem gemäfs, bei Berücksichtigung der noch anzuge-

benden Nebenumstände, nur ein quantitatives Entzündungsverhältnifs denken läfst. Wie sich diese Grundform im Allgemeinen ausspricht, weifs jeder Arzt. Indefs äufsert sich diese eine und dieselbe Entzündung in mehrerer Hinsicht verschieden, und zeigt, wie zu erwarten, mancherlei pathologische Modificationen, denn bald sehen wir Symptome, die durch die individuelle Structur und Function des Gebildes, welche eben von der Entzündung ergriffen wurde, veranlafst werden, bald modificirt sich die reine Entzündung im Auge nach der Constitution des leidenden Subjects, nach dem Alter und Geschlecht desselben, bald nach den entfernten Ursachen, u. s. w. Vorzüglich finden fast in allen Fällen Verschiedenheiten Statt, welche durch die, bei den einzelnen Entzündungsarten näher zu erörternden Eigenheiten der jedesmal ergriffenen Gebilde zu Stande kommen, und meistentheils eine besondere Berücksichtigung bei der Heilung verdienen. Sonach sind z. B. die Zeichen, welche die reine Entzündung der Meibomschen Drüsen charakterisiren, ganz andere als die, welche eine entzündete *Cornea*, *Iris*, *Retina* u. s. w. ankündigen; denn so äufsert sich erstere bei geringem Grade, oder auch bei heftigem Grade im zweiten Zeitraume, durch abnorm vermehrte Schleimsecretion: Die Entzündung der Hornhaut aber, bei nicht gar grofser Heftigkeit derselben, durch eine weifslichte Farbenumänderung der afficirten Haut: Die normal braune *Iris*, durch eine in's röthlichte fallende Entfärbung derselben, u. s. w. Bei allen dergleichen reinen Entzündungsarten ist die Behandlung im Allgemeinen gleich; jede einzelne hingegen bedarf, nach der Function und Structur des in Rede stehenden Gebildes, wiederum eigne Berücksichtigungen bei der Heilung.

Ebenso kommt hinsichtlich der Zeichen- und Kurverschiedenheiten, wie schon gesagt, die Körpercon-

stitution und das Alter sehr in Anschlag; denn so giebt es reine *Ophthalmien*, die bei schwächlichen oder alten Personen auftreten, in welchen die *Phlogosis* nie recht praedominirt, vielmehr quantitativ sehr herabgestimmt ist, und wo deswegen der erste Zeitraum äufserst schnell vorübergeht, oder von dem Arzte wohl gar nicht bemerkt werden kann (asthenische Entzündung). Hier können auch wohl ohne alle früher da gewesene oder noch jetzt vorhandene Zeichen von Entzündung, Symptome eintreten, die gewöhnlicherweise dem zweiten Stadium einer Entzündung angehören, allein nur in einer aufserordentlichen Erschlaffung der kranken Theile gegründet sind. *)

Ob nun gleich auch bei der asthenischen Entzündung öfters ein erstes Stadium, in welchem die *Phlo-*

---

*) Haftet in diesem Falle die Erschlaffung an den Augenliedern, und besonders in den Meibomschen Drüsen, findet man also, dafs erstere des Morgens zusammenkleben, zeigt sich bei nicht beständiger Reinigung auch am Tage, vorzüglich im innern Augenwinkel, verhärtete und weiche, aus jenen Drüsen abgesonderte Masse, war niemals Schmerz, niemals Röthe, niemals Jucken, und waren keineswegs Excoriationen zugegen, so habe ich in dieser, zuweilen bei alten Leuten erscheinenden Erschlaffung, das eintäglich mehrmalige Aufstreichen von *Spir. corn. cerv.* Anfangs mit der Hälfte *Aqua opii* verdünnt, späterhin erstern rein, mit grofsem Nutzen angewendet.

Die *Aqua opii* ist übrigens nichts anders als ein, über reinem *Opium*, abgezogenes Wasser, wo von einem Pfunde *Opium*, vier Pfunde oder noch etwas mehr Wasser gefertigt werden können. Der Apotheker kann es leicht als Nebenprodukt bei Bereitung des gewöhnlichen *Extr. opii* gewinnen, wenn er die Abrauchung der wäfsrigen *Opium*auflösung zwar wie gewöhnlich im Wasserbade, aber in einer kleinen Retorte mit gehörig anlutirter Vorlage unternimmt. Ein solches Wasser riecht, vorzüglich wenn es einige Tage alt geworden ist, sehr stark nach *Opium*, mufs aber im Gewölbe in einer mit Glasstöpsel wohl verwahrten Flasche aufgehoben werden, weil sonst der Geruch sich in gar kurzer Zeit vermindert und endlich fast ganz verloren geht, weswegen man auch nur wenig Vorrath anfertigen darf.

gosis merklicher oder unmerklicher vorherrscht, beobachtet wird, so darf ein solches dennoch gewöhnlicherweise nicht antiphlogistisch behandelt werden, weil es ohnedies schon sehr rasch verläuft, und ein desto längeres, dem Auge öfters habituell werdendes, zweites Stadium zurückläfst, welches nicht selten sehr destruirend für's Auge verlaufen kann, und deswegen sorgfältig, nicht blos örtlich, sondern auch allgemein durch angemessene Diät und Medicamente behandelt werden mufs.

Aber nicht bei jedem Alten, nicht bei jedem Schwächlichen werden reine Entzündungen einen solchen Verlauf machen; vielmehr kann auch bei allgemeinem Kraftmangel die Inflammation sehr heftig und sehr acut verlaufen, was denn vorzüglich von der *Causa remota* und dem eben jetzt besonders erhobenen Kraftzustande des Sehorgans, abhängt.

Wenn die wahre *Phlogosis* bei einer Augenentzündung nicht mehr vorherrscht, vielmehr ein sogenanntes asthenisches Stadium eintritt, so ist vorzüglich *Opium* mit Wein örtlich äufserst nützlich, und wird deswegen auch allgemein von den berühmtesten Augenärzten ganz besonders empfohlen. Solche Fälle sind es auch, in denen die *Externa* mit Nutzen lauwarm angewendet werden. Sind die Entzündungen hier mehr torpider Natur, so müssen die anzuwendenden Mittel reitzender, eingreifender sein.

Wohl zu unterscheiden ist die reine Entzündung von der idiopathischen, denn obgleich letztere meistentheils rein ist, so wird dennoch nicht jede rein zu nennen sein, weil gar leicht der Reitz, welchen die *Causa remota* auf das Auge machte, zugleich als Lockspeise für eine sich eben im Körper befindende specifische Krankheit dienen kann, woher es denn z. B. kommt, dafs in's Auge gekommener Sand u. s. w. bei einem scrofulösen Kinde, die idiopathische Entzün-

dung zugleich in eine scrofulöse umwandeln kann. Selbst wenn nur eine scrofulöse Krankheitsanlage zugegen ist, geschieht es zuweilen, dafs sich die vorhandene Idee der Krankheit, durch den erst gewordenen Reitz der entfernten Ursache, im Auge verwirklicht.

Zuweilen gehen reine Augenentzündungen aus einer andern im Körper existirenden Krankheit hervor und sind dann zugleich sympathische Krankheitszustände. So können z. B. sehr heftige reine Entzündungen im Auge auftreten, welche durch unterdrückte gewohnte Blutflüsse verursacht worden sind; solche Entzündungen entstehen gewöhnlicherweise sehr schnell, sind gleich anfangs mit Fieber vergesellschaftet und pflegen sehr rasch und heftig zu verlaufen. — Auch bei entzündlichen Fiebern kann sich die *Phlogosis* auf das Sehorgan verbreiten und hier eine Entzündung zu Stande bringen, die, wie im vorigen Falle, rasch und heftig verläuft, und im Allgemeinen wie das entzündliche Fieber behandelt werden mufs.

Die reine Entzündung kann sich in jedem Gebilde des Auges niederlassen, kann sich demnach in jeder der vorzutragenden Formen äufsern, thut dies auch häufig und wird, je nachdem ihr Entstehungspunkt die *Sclerotica*, *Cornea*, *Retina* u. s. w. ist, auch unter den Namen *Sclerotitis*, *Keratitis* u. s. w. aufgeführt; auch bei der Verbreitung des entzündlichen Zustandes über jene Theile, pflegt man diese Namen bis zu einem bestimmten Punkte noch beizubehalten, welcher letztere indefs erst bei der Abhandlung der einzelnen Entzündungsformen selbst näher zu bestimmen ist.

Geht eine reine Entzündung in Eiterung über, so hat erstere zwar an intensiver Gröfse verloren, allein sie bleibt immer noch so kräftig, dafs sie ihr Produkt (die Eiterung) gehörig darstellen und dadurch verloren gegangene Theile ersetzen kann. Wird jedoch die

Phlogosis entweder durch ein zu heftiges antiphlogistisches Verfahren im ersten Zeitraume, oder durch zu lange Fortsetzung dieser Heilmethode, so sehr herabgesetzt, dafs sie einen guten Eiter nicht mehr zu Tage fördern kann. Fand sich die Entzündung in einem sehr schwächlichen Subjekte vor, ist sie asthenisch, so entsteht eine jauchigte Eiterung, und der so afficirte Theil ergiebt sich schon halb und halb den todten Gesetzen der Chemie, was im Brande endlich gänzlich geschieht.

Einer specifischen Augenentzündung liegt immer eine specifische Ursache zum Grunde, die sich auf eine eigenthümliche Qualität der Lebensthätigkeit bezieht und häufig schon die ganze Körperconstitution umgeändert hat. Aus jener specifischen Ursache entspringen bei jeder einzelnen Entzündungsart specifische Eigenschaften, die nur ihr zukommen und wodurch sie sich von jeder andern Art zu unterscheiden pflegt. Von der reinen Entzündung ist die specifische qualitativ verschieden und erfordert auch eine Heilart, die sich nicht blos nach dem Grade der Entzündung und den Eigenthümlichkeiten des ergriffenen Gebildes, und nicht blofs nach der starken oder schwachen Körperconstitution richtet, sondern besonders nach der *Causa specifica* ausgeführt werden mufs.

In der specifischen Augenentzündung hat sich immer das wahrhaft Entzündliche mit dem Specifischen, welches gerade die Art der Entzündung setzt, gleichsam amalgamirt. Prädominirt hier die *Phlogosis*, und ist in sofern die Lebenskraft, neben ihrer qualitativen Umänderung, im Auge zugleich abnorm gesteigert, wird also ein erstes Stadium von dem Arzte beobachtet, so wird sich die Entzündung immer durch heftigere Symptome charakterisiren, als im entgegengesetzten Falle. Hier darf man die vorherrschende *Phlogosis* nicht immer durch antiphlogistisches Kurverfahren herabstim-

men, weil der erste Zeitraum ohnedies bald vorüber gehen wird. Ist nun zu gleicher Zeit ein gröfserer oder geringerer allgemeiner Schwächezustand vorhanden, wie dies z. B. bei der scorbutischen, gichtischen oder scrofulösen Augenentzündung der Fall ist, verläuft das erste Stadium so schnell, dafs es der Arzt gar nicht bemerkt, so würde man durch antiphlogistische Behandlung die allgemeine Krankheit unmittelbar vermehren und die örtliche entzündliche Reaction im Auge bedeutend verlängern und hartnäckiger machen.

Noch haben die meisten specifischen Augenentzündungen das Eigne, dafs sie diesen oder jenen Theil, diese oder jene Membran u. s. w. des Auges, vorzüglich lieben, und demnach dieselben Gebilde gewöhnlich zu ihrem Sitz erwählen. — Wie die reine, so wird auch die specifische Entzündung den Namen *Iritis* u. s. w. erhalten, je nachdem sie von der *Iris* oder von einem andern Theile des Auges ausging.

So weit die reine und specifische Augenentzündung im Allgemeinen. Das Nähere der verschiedenen Arten beider Entzündungsgattungen wird am gehörigen Orte ausführlicher abgehandelt.

Das Auge ist ein Organ, welches mit dem ganzen Organismus innig zusammenhängt, dessen Krankheiten deswegen auch nie als dem übrigen Körper fremd betrachtet werden dürfen: denn die meisten Uebel der Augen gehen aus allgemeinen Krankheiten hervor, und selbst wo diese der flüchtig beobachtende Arzt nicht gegenwärtig wähnt, wird der erfahrene, ruhige und denkende Beobachter im Auge oft nur den Ausspruch einer allgemeinen Krankheit wieder finden. Wollen wir daher die meisten Krankheiten am Auge dauernd heilen, so müssen wir den eigentlichen Heerd des Uebels immer umsichtig aufzuspüren suchen. Deswegen sei der Augenarzt ganz denkender Arzt im Allgemeinen, und meide die Meinung, als seien es die örtlichen und

die sogenannten specifischen Mittel, die Augenwässer und Salben, welche ihn zum Heilkünstler des Sehorgans stempeln. Das ist ein falscher Wahn, dem noch viele zum Nachtheile der leidenden Menschheit huldigen, ein Wahn, der leider noch von den für die Kunst nur erst kürzlich vergangenen finstern Zeiten übrig geblieben.

Hinsichtlich augenärztlicher Klugheitsregeln gilt hier alles das, was jeden Arzt im Allgemeinen angeht und diesem bekannt sein wird; er hüte sich demnach vor einer gar zu sichern und unbedingten Prognose, und überlege bei jedem vorkommenden Krankheitsfalle wohl, was er versprechen kann und darf. Wohlüberlegte Sicherheit in der Prognose aber und eine Quantität Scharfsinn, sind dem unumgänglich nothwendig, welcher den delicatesten Zweig unseres Wissens betreiben und sich als Augenarzt dauernden Ruf verschaffen will. An einer umsichtigen Politik scheiterte schon Mancher, der mit Liebe und Lust die Augenheilkunde auszuüben anfing. Um in diesem Fache Ruf zu gewinnen, giebt es zwei sehr verschiedene Wege; der eine, edlen reellen Grundsätzen getreu: wenn man nach seinen besten Einsichten den geraden Weg ruhig fortgeht; dieser setzt allemal tiefe gediegene Kenntnisse und treue Erfahrungen in der Kunst voraus. Man verspricht nicht mehr als man halten zu können glaubt, und schreibt dem Kranken die Bedingungen vor, unter welchen sein Leiden am schnellsten und besten zu heben ist. Richtet sich der letztere nicht danach, schlägt er die Rathschläge des Arztes in den Wind, so erscheint dieser nicht mehr verantwortlich, und das ist die Hinterthür, welche sich jeder reelle Arzt öffnen kann und mufs. Der zweite Weg wird leider häufig auch betreten: es ist der, der Charlatanerie. Mücken werden hier zu Elephanten, Kleinigkeiten zu Meisterstücken erhoben, Kuren, wahr

oder unwahr, ausposaunt, Zeitungsblätter werden benutzt, Geheimmittel ausgegeben. Nur der egoistische Pinsel wird ihn betreten, der hohe und niedere Pöbel nur ihn hören und Heil von demselben erwarten. Bei Operationen ins besondere, bedenke der Arzt zuvor wohl, ob das Sehvermögen an dem zu operirenden Organe noch einigermafsen besteht, und jenes durch die Operation vielleicht völlig vernichtet werden könne, oder nicht; ob sich das Auge von dem vielleicht vorhergegangenen entzündlichen Uebel auch gänzlich erholt hat; ob überhaupt bei der vorzunehmenden Operation etwas, und wie viel oder wie wenig zu gewinnen sei. Zugleich vergesse man nie die Individualität des Subjekts und des Sehorgans *) zu berücksichtigen, welches leider nicht immer geschieht, und dann nicht selten einen Grund mehr zum Mifslingen der Operation darbietet. Dem Arzte, welchem kein eigenes oder öffentliches Institut zum Behufe seiner Operirten oder schweren Augenkranken überhaupt, zu Gebote steht, hat in den Privatwohnungen der

---

*) Manche Augen scheinen gegen jedes mechanische Eingreifen in ihre Substanz, auch ohne Gegenwart eines vulnerablen Hautorgans oder anderer dergleichen Unheil verkündigender Merkmale, äufserst empfindlich zu sein und entzündliche Procefse zu erregen, denen man es bald ansieht, dafs sie schnell destruirend auf das Sehorgan einwirken werden. Andere Augen hingegen, welche ziemlich heftige Verletzungen (z. B. der *Iris*) erleiden, scheinen kaum davon afficirt zu werden, so dafs man an der erfolgenden *Iritis*, durchaus jene heftigen Symptome vermifst, die unter der reinen Regenbogenhautentzündung angeführt werden. — Wie viel die *Iris* zu ertragen fähig ist, sahe ich an dem blauen Auge eines jungen Mannes, dessen Pupille in Folge einer syphilitischen *Iritis* verschlossen worden ist, bei welchem ein Pseudooperateur in Ermangelung anderer Instrumente mit einer lanzenförmigen Staarnadel binnen kurzer Zeit achtzehn Mal in's Auge drang und die *Iris* zerschnitt, weil er auf solche Art eine Pupille anzulegen gedachte, was ihm auch bei dem achtzehnten Versuche, wiewohl nur äufserst unvollkommen gelang.

Kranken, wo die letzteren sich besorgen lassen, oft mit tausend Hindernissen zu kämpfen, die dem clinischen Arzte kaum begegnen können. Recht gut ist es wenn man denen, welchen die Cataract weggenommen oder eine Pupille gebildet werden soll, die Operation als unbedeutend schildert, damit sie ohne Furcht an's Werk gehen; sind sie aber operirt, so thut man sehr wohl, den Anverwandten und den Operirten selbst, die gröfste und strengste Folgsamkeit hinsichtlich der Anordnungen des Arztes (die ihnen früher oft so drükkend erscheinen und doppelte Furcht vor der Operation erwecken) anzuempfehlen, und natürlich unter der Drohung, dafs man im Nichtfalle für gar nichts stehen könne und die Hoffnung, das Gesicht wieder zu erlangen, verlohren gehe.

Die Operationen sind es vorzüglich, die den Anfänger in der Kunst oft zurückscheuchen. Die Zartheit des Organs an welchem operirt wird, verlangt auch ungemeine Zartheit und Geschicklichkeit von Seiten des Künstlers. Die Beweglichkeit des Auges wird ein noch gröfserer Anstofs. Dazu kommt noch, dafs sich der Leidende selten zu einer Operation bequemen wird, wenn er nicht die stärkste Hoffnung erhält, wieder zu dem verlohrenen Sehvermögen zu gelangen. Weifs sich hier nun der Arzt nicht zu benehmen und ist der Erfolg der Operation nicht günstig, tritt wohl gar Eiterung ein, wird das Auge dadurch entstellt, dann wehe dem Rufe des angehenden Arztes, wehe ihm wenn er zu viel versprach, wenn er die Constitution des Subjekts aufser Augen liefs und die gesichtvernichtenden Einflüsse, welche im Subjekte selbst oder in dessen Lage sich entdecken liefsen, nicht mit Umsicht vorher beachtete. — Es scheint als wenn die Schwierigkeiten, welche die Ausübung der Augenheilkunde begleiten, früherhin es auch ganz vorzüglich waren, welche die Aerzte von dersel-

ben so abschreckten, dafs sie dieselbe lieber herumziehenden Afterärzten überliefsen; diese Zeiten sind, Gottlob! vorüber, es beschäftigt sich jetzt Alt und Jung mit der *Ophthalmologie*, was gewifs sehr erfreulich ist. Nur mögen die, welche zur operativen Heilkunde keinen Beruf in sich fühlen, sich hüthen, Augenoperateure sein zu wollen; es mangelt nicht an diesen, wohl aber an Augenärzten. Die anscheinende Leichtigkeit und Einfachheit mancher Operationen, der schmeichelnde Gedanke, einem Menschen das Gesicht wieder zu schenken, verleitet nur gar zu viele, die leichteste Seite aufzufassen, frisch weg zu keratonyxiren und einseitig zu handeln das Leben lang. Sind wir im Operiren überhaupt nicht geübt, sind solche zart manuelle Geschäfte weder unserer Hand noch unserm Charakter angemessen, dann überlassen wir Operationen doch ja solchen Männern, die Uebung, Sicherheit der rechten und linken Hand, mit festem Muthe und Kenntnissen vereinigen.

Von der reinen Augenentzündung im Allgemeinen.

Die Augenentzündung hat ein erstes und ein zweites Stadium, *) wovon das letztere jedoch nicht immer vorhanden ist; vielmehr kann die Entzündung mit dem ersten Zeitraume aufhören, ohne mehr als etwa eine krankhaft gesteigerte Sensibilitaet des Sehorgans zu hinterlassen.

So wie sich übrigens jede Entzündung durch Röthe, Hitze, Geschwulst und Schmerz charakterisirt, so auch die Augenentzündung; indessen ist bald das eine, bald das andere dieser Symptome hervorstechend, und bald fehlen eines oder mehrere fast ganz, welches sich meistens nach dem Sitz der Augenentzündung richtet, und sich nach diesem gar vielfältig modificirt.

Zeichen des ersten Zeitraumes. — Neben jenen allgemeinen Zeichen der Entzündung, bemerkt man eine Neigung, das Auge beständig zu schliefsen, und ein Thränen der Augen, welches aber bei heftigen Graden der Entzündung im *Acme* derselben ganz verschwindet und dafür eine lästige Trockenheit mit Unbeweglichkeit des *Bulbus* zurückläfst, dabei beobachtet man eine bald geringere bald stärkere Lichtscheu, die bei heftigen Graden des Leidens, — weil zuweilen Lähmung hinzukömmt — plötzlich nachläfst. Erreicht die Entzündung eine sehr hohe Stufe, so bleibt

*) Was Richter u. a. *acute* und chronische, was einige Aerzte *active* und *passive*, was *Scarpa* in seinem *Trattato delle principali malattie degli occhi, edizione quinta* 1816. *Vol. I. p.* 180. mit den arabischen Aerzten, heifse und kalte Augenentzündung nennen, — ist unter diesen beiden Stadien mit begriffen.

sie nicht örtlich, der ganze Organismus nimmt Theil an der Krankheit und es entsteht ein entzündliches Fieber.

Zeichen des zweiten Zeitraumes. *) — Nachdem vorher die Entzündung ihre Höhe erlangt hatte, so tritt jetzt, — bei mäfsig heftigen Augenentzündungen oft schon am 4 — 5 oder 6ten Tage — ein Erschlaffungszustand ein.

Schmerz und Hitze in den Augen lassen nach, die arterielle Röthe des ersten Zeitraumes verändert sich, und fällt mehr ins schmutzig blau oder braunrothe, zuweilen zeigen sich Blutaustretungen an verschiedenen Orten, der Kranke fängt an das Auge besser zu öffnen, er verträgt mehr Licht, ohne dafs die Thränen, wie früher, stärker fliefsen. Dabei kommen die Ab- und Aussonderungen, welche in dem ersten Zeitraume unterdrückt waren, wieder hervor; allein viel häufiger und anders gemischt als im normalen Zustande. Oefters schwellen auch die Umgebungen des Auges *oedematoes* an.

War das erste Stadium sehr heftig, und wurde die Entzündung vernachlässigt, oder erregte die veranlassende Ursache Substanzverlust, so tritt leicht auch Eiterung ein, wodurch die Natur die vielleicht verlohren gegangenen Theile zu ersetzen sucht; dieser Wiederersatz kann indessen nur dann geschehen, wenn der Eiter die hinreichend bekannten Eigenschaften eines guten Eiters hat. Ist er aber übelriechend, dünn,

---

*) Die angezeigten Zeiträume bei allen Entzündungszuständen der Augen, sind bei weiten nicht immer so genau und bestimmt zu unterscheiden, als sie in den Büchern angegeben werden. Es ist daher durchaus nöthig, nicht allein den Zustand des Auges, sondern auch den des ganzen Körpers bei der Heilung zu berücksichtigen. Die Lebensart, das Alter, die stärkere oder schwächere Körperconstitution, habituelle Congestionen des Bluts nach diesem oder jenem Organe etc. sind deswegen wohl zu beachten. Ueberhaupt giebt es hierin noch so Manches, was man nicht lehren kann; darum darf der practisch richtige Geist, der sogenannte Takt, ein Produkt des Genie's und der Erfahrung, dem Arzte nicht fehlen, wenn er im Heilen glücklich sein will.

grünlich oder bräunlich, wie man ihn öfters bei alten schwächlichen cachectischen Subjekten findet, so nennt man ihn Gauche, und diese taugt niemals zur Wiedererzeugung der durch die Entzündung destruirten Theile des Auges, vielmehr vergröfsert diese den Substanzverlust. Nicht selten kommt jetzt ein wirkliches Eiterungsfieber hinzu, welches aber bei weiten nicht jede Eiterung am Auge begleitet.

Die Ursachen, welche diese Krankheit hervorbringen, sind mannigfaltig. Folgende kommen am oftesten vor: Unreine Atmosphäre, *Trichiasis*, ins Auge kommende Körper, zu helles Licht, oder schneller Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit. Vorzüglich leicht entstehen Entzündungen der Augen, wenn diese dem unmittelbaren Lichtreflex von sehr weifsen Gegenständen, oft und lange ausgesetzt werden. Ebenso können allzugrofse Anstrengungen der Augen, Verwundungen mit schneidenden und stumpfen Werkzeugen, unnöthig oder unzweckmäfsig gebrauchte Brillen und unrichtiger Gebrauch mancher Augenmittel, vorzüglich der Augensalben, die oft ranzigt sind, schaden. Auch sind die jetzt Mode gewordenen *Kaleidoscope*, so wie das Einreiben von Brechweinsteinsalbe in zu grofser Nähe der Augen, als nicht seltenes ursächliches Moment einer reinen Augenentzündung beobachtet worden.

Congestionen nach dem Kopfe und besonders nach den Augen, durch Zusammenpressen des Unterleibes, durch Husten, lautes Schreien, durch zu fest angelegte Halsbinden und durch Gemüthsbewegung u. s. w. gehören ebenfalls zu den, jedoch mittelbar, auf das Auge einwirkenden Schädlichkeiten. Ebenso dürfen unterdrückte Blutflüsse, z. B. der goldnen Ader, unterdrückte Menstruation und Nasenbluten, als Ursachen einer reinen Augenentzündung nicht vergessen werden. Auch der Reitz hervorbrechender Zähne bei Kindern, so wie cariöse Zähne können eine reine Augenentzündung verursachen.

Die Voraussage des ersten und zweiten Zeitraumes im Allgemeinen, ist aufserordentlich verschieden,

und hängt theils von der Intensitaet der Entzündung, von der Verschiedenheit ihres Sitzes und ihrer Ursache, theils von der mehr oder weniger frühzeitigen ärztlichen Hülfe u. s. w. ab. Leichte äufsere reine Entzündungen können oft ohne Folgen zertheilt werden. Entzündungen der Augendeckel machen meistens einen weit langsamern Verlauf, als die der Augen selbst. Entzündungen der innern Gebilde der Augen hinterlassen viel leichter vollkommne oder unvollkommne Vernichtungen der Sehkraft, als äufsere oberflächliche Entzündungen, welche letztere hingegen öfter mittelbar durch organische Hindernisse, z. B. durch *Leukome*, *Staphylome* etc. das Sehen beschränken oder ganz verhindern. Entzündungen welche den ganzen Augapfel ergreifen, wie dies oft nach tiefen Verwundungen der Fall ist, gehen fast immer in Eiterung oder wohl gar in *Gangraen* über.

Uebrigens kann das zweite Stadium, bei sich ereignenden Gelegenheitsursachen, leicht in das erste Stadium zurückkehren.

Behandlung des ersten Zeitraumes. — Man räume die veranlassenden Ursachen hinweg. Deswegen entferne man fremde in's Auge gefallene Körper. Feiner Staub etc. der erst in's Auge gekommen ist, wird oft leicht aus dem Auge geschafft, wenn man eine Zeitlang durch einen Druck des Fingers unter dem innern Augenwinkel den Eingang der Thränen in den Thränensack verhindert; hier spühlen jene die fremden Theile oft leicht in den innern Augenwinkel, aus dem man sie dann ohne Mühe mit dem Finger entfernen kann. Gelingt dies nicht, so suche man den fremden Körper im Auge auf, und bemühe sich, denselben mittelst einer Sonde, welche an dem einen Ende mit angefeuchteter Charpie umwunden ist, oder mit der aufgerollten Ecke eines Taschentuches, *) oder eines Pinsels aus dem Auge zu wischen. Vermuthet man mehrere

---

*) Ware und Himly, des erstern chirurg. Beobachtungen über das Auge. Uebs. von Dr. Runde, mit Anmerk. vers. von Prof. Himly, B. 1, S. 21.

fremde Partikeln im Auge, so thut man wohl, wenn man das Auge mit Wasser ausspühlt, oder durch behutsames Einspritzen derselben Flüssigkeit reinigt.

Hat sich aber der fremde Körper in die *Conjunctiva palpebrarum* oder *scleroticae* oder *Corneae* fest eingedrückt, so wird man ihn mit einem feinen Spatel leicht heraus befördern können.

Sind jedoch harte spitzige Theile in die innere Fläche der Augenlieder, in die *Cornea* u. i. a. O. selbst eingedrungen, so mufs man sie behuthsam mittelst einer lanzenförmigen Nadel (*Tab. V. Fig.* 10.) oder Lanzette herausheben, oder vermöge einer feinen Pincette (*Tab. V. Fig.* 5.) herausziehen. Haben die fremden Körper die *Conjunctiva* verletzt, und sind sie von derselben zum Theil bedeckt, so dafs sie vermittelst einer Pincette nicht herausgezogen werden können, so ist es am besten, wenn man die verletzte Bindehaut mit einer feinen Pincette vorsichtig aufhebt, und sie rings um den fremden Körper ausschneidet; hierdurch wird der letztere nicht nur entfernt, sondern die gerifsne Wunde der Bindehaut auch in eine reine Schnittwunde umgewandelt. In seltenen Fällen kommt es zuweilen, dafs dergleichen in die *Cornea* gebrachte fremde Körper sich in dieser einverleiben, nachdem die Natur eine Art Sack um dieselben gefertigt hat. *)

Oefters entsteht, während der Bemühung den reitzenden Theil aus dem Auge zu entfernen, ein heftiger Krampf des Schliefsmuskels der Augenlieder, vorzüglich wenn das Auge mechanisch und chemisch zugleich gereitzt ist. Geschieht dies, so bringe man den Kranken in ein verdunkeltes Zimmer und lasse ihm Ruhe, mache sodann mäfsig warme Breiumschläge, aus, in Wasser oder Milch gekochten, Semmelkrumen und

Lau-

---

*) *James Wasdrop, Essays on the morbid anatomy of the human eye, pag* 68. Ph. Fr. Walther fand solche eingesackte fremde Körper in dem äufsern Augenwinkel. Siehe dessen Abhandlungen aus dem Gebiete der pract. Medicin 1810. 1. Bd. S. 403.

Laudan. liquid. Sydenh. bereitet. Hat aber die krampfhafte Verschliefsung der Augenlieder schon lange mit grofser Heftigkeit gedauert, ehe der Arzt gerufen worden ist, so setze man den Breiumschlägen noch einen Theil *Hb. hyosciam.* zu; nur gebe man sorgfältig darauf Achtung, dafs diese Breiumschläge niemals auf dem Auge erkalten, weil dann der Krampf nicht gehoben, vielmehr öfters noch vermehrt und verlängert wird.

Auch hat man gegen diese krampfhafte Verschliefsung eine Drachma der *℞ae stramonii c Aqu. destill.* ℥jjj als kühlen Umschlag empfohlen; indessen müssen hier die krampfhaften Affectionen weniger durch einen entzündlichen als vielmehr durch einen nervösen Reitz zu Stande gekommen sein.

Glimmende Asche, ungelöschten Kalk, gepülverten Höllenstein und Mörtel, holt man sorgfältig mit einem mit frischer ungesalzner Butter oder reinem Oel getränkten Pinsel aus dem Auge und hüthe sich dabei, vorzüglich die drei letztgenannten Substanzen, mit Wasser wegbringen zu wollen, weil dadurch der sich löschende Kalk, der sich jetzt mehr verbreitende Höllenstein, weit mehr Schaden anrichten würde.

Plattläuse, die zuweilen in der *Conjunctiva* des Augapfels nisten, beseitigt man vollkommen, wenn man die von Läusen besetzten Stellen mit einer Salbe aus *Ungt. hydr. ciner.* mit etwas *Ol. spicae* vermischt, bestreicht. Nachdem die Läuse in wenigen Stunden getödtet sind, lassen sie sich mit einem in Fett getauchten Pinsel gar leicht wegwischen.

Verwundungen des Auges und seiner Umgebungen, müssen nach den, unter den Krankheiten der einzelnen Gebilde angegebenen Regeln, behandelt werden. Nachdem man nun alle dergleichen äufsere Ursachen so viel als möglich beseitigt hat, so bestimmt lediglich die stärkere oder geringere Entzündung des Auges ein mehr oder weniger kräftiges antiphlogistisches Heilverfahren.

Ist demnach die Entzündung intensiv und extensiv sehr heftig, ist wohl gar ein aus derselben stammendes entzündliches Fieber vorhanden, so sind all-

gemeine Aderlässe, die nöthigenfalls wiederholt werden müssen, dringend angezeigt, und hier ist es, da es sich um die Existenz des edelsten Organes handelt, auch rathsam, das Aderlafs aus der Temporalarterie oder der *Ven. jugular. extern.* und hinreichend grofs, anzustellen. Bei weniger heftigen Augenentzündungen ohne Fieber, oder wo dasselbe durch den Reitz der *causa externa* erscheint, welches nachläfst sobald diese entfernt ist, sind Blutigel hinreichend, welche 3 — 5 — 10 und mehrere an der Zahl, an die Schläfe oder unter dem innern Augenwinkel und um das ganze Auge herum angelegt werden müssen; nur hüte man sich, sie zu nahe an die Augenlieder anzusetzen, weil man danach öfters bedeutende Anschwellungen und Blutunterlaufungen derselben beobachtet, welche den entzündlichen Zustand durch ihren Reitz sogar vermehren können. Auch Aderlässe aus der *vena angularis* von 8 bis 12 Unzen sind hier ebenfalls sehr zweckmäfsig und schaffen selbst bei sehr heftigen Augenentzündungen oft schnelle Erleichterung.

Wenn die *Conjunctiva palpebrarum* und *scleroticae* vorzüglich afficirt ist und wulstig anschwellt, so sind *Scarificationen* derselben von grofsem Nutzen. Indefs wird das Nähere hiervon noch bei der Entzündung dieser Theile abgehandelt werden.

Entstand die Augenentzündung nach Congestionen, die unterdrückte Menstruation, *) Haemorrhoiden oder Nasenbluten als veranlassende Ursach hatten; so wird die Blutentziehung am besten an dem Orte bewerkstelligt, von dem die Krankheit ausging; daher legt man Blutigel an die Schaamlefzen, um den Mastdarm oder an die Nasenflügel.

Bei Kindern zeigt sich zuweilen eine Augenent-

---

*) Von solchen Ursachen herkommende Augenentzündungen treten nicht selten periodisch auf. So sahen Reil, Walther, u. m. a. Frauen, welche allemal zur Zeit der Menstruation Augenentzündungen bekamen. Siehe *Memorabilia clinica Medico practica, Vol. I. Fascic.* 1. *p.* 53.

Walther, a. a. O. S. 395.

zündung als Folge des schweren Zahnens; hier soll das Zahnfleisch über dem durchbrechenden Zahn durch zwei Schnitte, die sich durchkreutzen, getrennt werden. Sichere Hülfe ist jedoch dadurch nicht oft zu erwarten. Auch an das Zahnfleisch des verdächtigen Zahnes gesetzte Blutigel, werden empfohlen.

Neben den allgemeinen und örtlichen Aderlässen müssen antiphlogistische Diät, antiphlogistische Mixturen aus Salpeter, laue Fufsbäder, Clystire und Ruhe des Auges durch Verdunklung des Krankenzimmers und Gebrauch eines grünen Augenschirmes nicht vernachlässigt werden.

Fomentationen von kaltem Wasser mittelst vier bis achtfachen Leinen-Compressen auf das Auge angewendet, mindern die grofse Hitze und den Schmerz, und befördern die Heilung beträchtlich.

Zuweilen ist eine reine Augenentzündung mit einem *Oedem* des obern Augenliedes verbunden, wodurch die genaue Untersuchung des Auges unmöglich gemacht wird; hier kann man mit Behutsamkeit ein paar Lanzettenstiche in die äufsere Haut der Augenlieder nahe am Rande derselben machen, worauf denn, nachdem ein blutiges Wasser abgeflossen, die Geschwulst abnimmt und die dienlichen Mittel besser angewendet werden können. *)

Ganz gelinde reine Augenentzündungen erfordern öfters keine Blutentziehungen; denn nachdem man die *Causa remota* entfernt hat, kann man kalte Wasser- oder *Oxycrat*umschläge oder schleimige, nicht reitzende Augenwässer **) anwenden lassen, wobei sie meistens in einigen Tagen verschwinden.

Nachdem durch obige Mittel die Entzündung zum Theil gebrochen, empfehlen die meisten Augenärzte das Cataplasmiren der Augen mit verschiedenen er-

---

*) James Ware, a. a. O. S. 37.

**) Z. B. nach Reil:

℞. *Muc. sem. psyll.*
— — *cydonior.* āā ʒj.
Aqu. rosar. ʒjj.

weichenden Mitteln, z. B. Semmel und Milch mit etwas Saffran gekocht, oder *flor. verbasc. c. croco orient.* oder für letzteren die *Capita papaver.* u. s. w. indessen mufs man wohl berücksichtigen, dafs es viele so sensible Subjecte giebt, deren entzündete Augen auch nicht den geringsten Druck vertragen können, und denen man deswegen anstatt jener Umschläge, mit gröfserm Vortheile, erweichende und schmerzlindernde, nicht zu heifse Dämpfe anwenden lassen kann. Dergleichen Umschläge und Dämpfe können übrigens am Tage öfters (alle 2 bis 3 Stunden) wiederholt werden.

So wie jene Umschläge sehr nützlich sind, wenn ihrer Anwendung hinreichende Blutentziehung vorausging, so auch die *Vesicatoria*, die aber, wenn die *Phlogosis* im Auge noch grofs oder wenn es sehr reitzbar ist, demselben nicht zu nahe, z. B. an die Schläfe u. s. w. aufgelegt werden dürfen, weil das *Vesicator* in diesem Falle nicht immer als Ableitung oder als Gegenreitz wirken würde, vielmehr den aufgeregten Zustand des Auges hier vermehrt; deswegen lege man das Zugpflaster, je nachdem die Sensibilitaet des Auges mehr oder weniger grofs ist, bald entfernter, z. B. auf den Arm, in den Nacken, bald näher, z. B. hinter die Ohren.

Behandlung des zweiten Zeitraumes. — Nachdem nun das erste Stadium vorüber und eine örtliche Schwäche der Gefäfse des Auges eingetreten ist, so darf man keinesweges mit den erweichenden Umschlägen fortfahren, sondern mufs zu andern, gleich anzugebenden Mitteln seine Zuflucht nehmen.

Die *Tinctura Thebaica* *) ist hier eines der vor-

---

*) Ware und Scarpa loben diejenige, welche nach der *Pharmacopoea Londinensis* vom Jahr 1746 verfertigt ist; die Formel ist folgende:

℞. *Opii colati, unciam unam*
Cinnamomi,
Caryophyllor. arom.
āā *drachmam semis*
Vini alb. hispan. Libram semis

züglichsten Mittel. Man gebraucht sie örtlich, indem man täglich ein bis zwei Mal einen Tropfen davon zwischen die Augenlieder fallen läfst; sie verstärkt dann anfänglich den Schmerz und das Thränen der Augen, vermehrt die Anzahl der Blutgefäfse auf denselben, wenn diese sichtbar sind, bringt aber bald nachher offenbare Besserung. Bei sehr heftigen Entzündungen der Augen und wenn noch keine Blutausleerungen voraus gegangen waren, wirkt dies Mittel schädlich und vermehrt die Entzündung.

Zusammenziehende Mittel finden ebenfalls nur dann erst ihre Anwendung, wenn hinlänglich antiphlogistisch verfahren worden und eine örtliche Schwäche der Blutgefäfse des Auges eingetreten ist. Sie sind entweder Augenwässer oder Salben.

Wird hier die Entzündung chronisch, so wirkt oft ein Weidenrindendecoct mit oder ohne einige Tropfen *Laud. liquid. Syd.* recht gut.

Die Entzündungen dieses Zeitraumes weichen oft auf den Gebrauch eines Augenwassers aus *Plumb. acetic. Aqu. destill. seu rosarum* mit einigen Tropfen *Spir. camphorat.* oder des *Aqu. ophthalmic. Conradi* *);

Macera per hebdomadam sine calore, deinde per chartam cola. Damit dies Mittel der Verderbnifs nicht zu leicht unterworfen ist, kann man etwas weniges (den zwanzigsten oder vierundzwanzigsten Theil) Weingeist hinzufügen.

Da es keinesweges gleich viel ist, welche Tinctur des Opiums man gegen Augenentzündungen örtlich anwendet und oben genannte so berühmte Augenärzte gerade diese Composition nützlich fanden, †) so wäre es sehr zu wünschen, auch diese Tinctur in jeder Apotheke vorzufinden.

†) Die *Tinct. opii spl.* fand Ware und mit ihm viele andere in denen Fällen schädlich oder unnütz, wo die *Tinct. thebaica* half, und Scarpa sagt a. a. O. p. 200. von dem *Laudan. liquid.*

Si ingannano assai quelli i quali in simili casi sostituiscono il Laudano liquido all'anzidetta tintura.

*) *Merc. subl. corr. grj.*
Laudan. liquid. Sydenh. ʒjjj.
Aquae rosarum ʒvj.
M. solvendo.

ebenso werden Solutionen von *Zinc. sulphuric. Alum. etc.* häufig angewendet.

Adstringentia in Salbenform werden bei reinen Entzündungen ebenfalls gebraucht, indefs vorzüglich dann, wenn die Entzündung sehr chronisch geworden ist.

Das Nähere über alle diese Mittel wird man unter den einzelnen Entzündungsformen finden.

Bei dem Gebrauch jener Medicamente wende man dem Auge die bisher entbehrten, sonst gewohnten Einflüsse, nach Maafsgabe seiner bestehenden Empfindlichkeit wieder zu; setze also das leidende Auge der Einwirkung freier, trockner und warmer Luft aus, und geht die Entzündung in Eiterung über, so gebe man dem Auge so viel Licht als es mit Wohlbehagen verträgt und beschäftige dasselbe mit Betrachtung lieblicher Gegenden, u. s. w. Dies wird viel zu einer guten Eiterung beitragen.

Greift die Eiterung weiter um sich, oder entsteht eine schlechte gauchigte Eiterung, so ist es höchst nothwendig, der Reproductionskraft auch von Seiten der Kunst zu Hülfe zu kommen, damit so schnell als möglich eine gute Eiterung zu Stande komme, oder die übermäfsige beschränkt werde. Dies geschieht: indem man sogleich kräftige, der Schwäche des Auges angemessene, vorzüglich flüchtige Mittel örtlich anwendet und allmählig ihren Gebrauch wieder abnehmen läfst, sobald sich die schlechte Eiterung in eine gute umgewandelt.

Man wende also trockne Wärme, im Nothfall mit Camphor, auch aromatische trockne Kräuterkissen mit Camphor an, ebenso nasse warme Umschläge aus Semmelkrumen und gewürzhaften Kräutern, Apfelbrei, welche feuchte Umschläge man aber ja nicht auf dem Auge erkalten lasse.

Finden sich am Augapfel selbst, kleine Geschwüre, so ist das Eintropfen und Waschen von einer lauwarmen Auflösung des *Lap. divin.* mit etwas *Laudan. liquid. Sydenh.* sehr wirksam. Wenn eine gauchigte schlechte Eiterung die umliegenden Theile mit zu ver-

nichten droht, so setze man dem *Lap. divin.* noch etwas Bleizucker zu. Schreitet die Eiterung dennoch weiter, so mufs man nach Maafsgabe der Gefahr, die eiternden Stellen ein oder zwei Mal des Tages mit *Laudan. liquid. Syd.* bestreichen. In den dringendsten Fällen kann man auch zu dem *Laudan. liquid.* etwas *Bals. vit. Hoffm.* Vitriolnaphta oder peruvianischen Balsam in kleinen Gaben zumengen; nur darf man nicht übertrieben mit diesen Mitteln fortfahren, weil sich sonst leicht schwammigte Fleischwucherungen zeigen, die, wenn sie schon entstanden, durch Höllenstein oder gebrannten Alaun entfernt werden. Alle übrigen im ersten Zeitraume entstandenen Fehler der Form behandle man, so lange die Eiterung dauert, niemals mit Aetzmitteln, und nur Abscesse, welche zu tief liegen als dafs man Hoffnung zum Selbstöffnen haben könnte, darf man in dieser Periode mit einer Lanzette am untersten Theile desselben öffnen.

Kommt ein Eiterungsfieber zu der vorhandenen Eiterung, so verordne man eine nahrhafte Diät, dabei flüchtig reitzende Mittel, z. B. *Calamus aromatic. Camphor, Naphta,* u. a. Man reiche *China* und leite durch, nicht weit vom Auge angebrachte, rothmachende Mittel, die krankhafte Tendenz vom leidenden Auge ab.

Von den Krankheiten derjenigen Theile, welche den Augapfel umgeben.

A. Von den Krankheiten der äufsern Umgebungen der Augen.

Von der reinen Augenliederentzündung.

Eintheilung derselben. Die Augenliederentzündung wird, je nachdem alle Gebilde der Au-

genlieder zugleich, oder einzelne Theile derselben vorzüglich entzündet sind, verschieden eingetheilt; denn sind alle Gebilde, welche zu den Augenliedern gerechnet werden, zugleich ergriffen, so wird sie unter der Aufschrift der reinen Augenliederentzündung überhaupt, *Blepharophthalmitis*, abgehandelt, sind hingegen nur die oberflächlichen Theile der Augendeckel entzündet, so nennt man sie *Blepharophthalmitis erysipelatosa*, oder leiden blos die oberflächlichen Theile welche über dem Thränensack liegen, so heifst sie *Anchylops erysipelatosa*, sind aber die Augenliederdrüsen die hervorstechend leidenden Theile, dann wird die Entzündung unter dem Namen Augenliederdrüsenentzündung aufgeführt, unter welche mit Recht auch die *Ophthalmia neonatorum* gebracht worden ist, und erhebt sich endlich nur eine kleine Stelle des Augenliedes in eine Entzündungsgeschwulst, so wird diese beschränkte Entzündung, Gerstenkorn, *Furunculus inflammatorius*, *Hordeolum*, genannt.

Die reine Augenliederentzündung überhaupt, *Blepharophthalmitis*, *Blepharitis*. (βλεφαρον, Augenlied, mit dem angehängten Worte *itis*, welches Entzündung bedeuten soll. *)

Unter einem Gefühl von Druck und Schwere in dem Augenliede, verbunden mit einer gewissen Steifheit in demselben und dem Unvermögen das Augenlied leicht zu öffnen, was theils von der anfangenden Entzündung des *muscul. orbicularis*, theils von der des *levat. palpebrae superioris* herrührt, erhebt sich vom Rande des Augenliedes her eine hochrothe, gespannte, sehr schmerzhafte, heifse, gegen jede Berührung äufserst empfindliche Geschwulst, welche sich allmählig über das ganze Augenlied verbreitet, am Rande der Augen-

*) Unrichtig ist es jenes *itis* lateinischen Wörtern anzufügen, z. B. *Conjunctivitis*.

grube aber bemerkbare Grenzen macht. Der Kranke und sogar der Arzt fühlt ein Klopfen im Augenliede, der Augapfel wird nebst der Nase auffallend trocken und das Augenlied kann nur noch mit dem schmerzenden Gefühl, als wenn fremde stechende Körper unter demselben lägen, bewegt werden; dabei hat der Kranke den Geruch nach Staub, der oft so stark wird, dafs er mehrmahls niesen mufs, welches immer mit einer beträchtlichen Vermehrung des Schmerzes, und Fortpflanzung desselben bis in das Auge und den Kopf und mit empfindlichen Lichtentwicklungen, *Photopsia*, im Auge verbunden ist.

Oft verbindet sich mit diesen Symptomen ein entzündliches Fieber und somit hat die Krankheit ihre gröfste Höhe erreicht.

Nach und nach nun nimmt die Röthe der Geschwulst zu und wird braunroth oder blaulichroth. Die Geschwulst vergröfsert sich, nimmt eine keglichte Gestalt an, wird weicher und weniger schmerzhaft. Der Schmerz wird unregelmäfsig, stechend, brennend, nur in der Tiefe noch klopfend. Die anfänglich gehinderten Ab - und Aussonderungen kommen wieder stark in Gang, wobei sich eine Kälte und Schwere in der Augengegend einfindet. Die Spitze der entstandenen Geschwulst wird blafsroth gelblich und weich, Eiter ist darinnen deutlich zu fühlen. Findet sich dagegen die Entzündung bei cachectischen dyscrasischen Subjecten, oder wird sie anfangs gänzlich vernachläfsigt oder mifshandelt, so geht sie leicht in Brand über, in welchem Falle sich dann auf der dunkelrothen Oberfläche des Augenliedes zuerst ein bleifarbner livider Fleck zeigt, welcher sich bei der Untersuchung weich, ja breiartig anfühlt, sich zuweilen schnell vergröfsert und bei Eröffnung desselben ein mehr oder weniger dünnes übelriechendes Wasser mit Blut gemischt von sich giebt. Hat der Brand schon mehr als die Oberfläche ergriffen, so sieht man nach Eröffnung des Fleckes einen bläulich braunrothen geschwürigen Grund. Je nachdem nun die Entzündung mehr oder weniger heftig war, und je nachdem das leidende Sub-

ject schwächlicher oder kräftiger ist, schreitet entweder der Brand vorwärts, oder er bleibt stehen, bekommt eiternde Grenzen und wird abgestofsen, worauf dann gutartige Eiterung eintritt. Geht aber der Brand weiter, so kann er alle Theile des Augenliedes ergreifen und gröfsere oder geringere Destructionen, z. B. *Ectropia, Lagophthalm. etc.* hinterlassen.

Als Ursach dieser allgemeinen Entzündung der Augenlieder, bemerkte Prof. Beer bis jetzt nur heftige Streifverletzungen derselben.

Die Prognose im ersten Stadio ist günstig, wenn sie gleich anfänglich gut behandelt wird; die Entzündung wird dann verschwinden, der Gebrauch des Augenliedes wiederkehren und das letztere niemals in Eiterung übergehen. Wird aber die Entzündung mifshandelt, kommt noch Fieber hinzu, so entsteht leicht Brand oder Eiterung. Ist der Brand schon eingetreten, dann kann sich der Kranke Glück wünschen, wenn er nur die äufsersten Gebilde des Augenliedes verliert, wo dann aber ein *Ectropium* oder ein Hasenauge zurückbleibt. Entsteht aber eine gute Eiterung, bahnt sich diese, vorzüglich im untern Augenliede, keine Gänge, so wird meistens nachher eine gute Vernarbung entstehen, die den Gebrauch des Augendeckels nicht hindert. Geht aber die Eiterung durch Vernachläfsigung in eine schlechte gauchigte Eiterung über, so bleibt leicht, nach verursachtem Substanzverlust, Verwachsung, Verengerung, oder völlige Vernichtung des Thränenröhrchens und dadurch erregtes Thränenträufeln, Vorfall des obern Augenliedes, Einstülpung des Augenliedrandes und Ausstülpung des Augenliedes zurück.

So lange als ein activ entzündlicher Zustand des Augenliedes vorhanden und derselbe noch örtlich ist, mache man Ueberschläge von kaltem Wasser oder *Oxycrat.* Ist aber schon entzündliches Fieber zugegen, so verfahre man dem Grade der Entzündung und der Constitution des Subjects gemäfs, allgemein und örtlich antiphlogistisch.

Sieht nun aber der Arzt, dafs Eiterung nicht mehr vermieden werden kann, so befördere er dieselbe und

befolge überhaupt die Grundsätze, welche unter dem Abschnitte der reinen Augenentzündung im Allgemeinen vorgetragen worden sind. Bildet sich ein Abscefs und befindet er sich im obern Augenliede, so wird er sich gewöhnlich ohne Nachtheil für die künftige Gestalt der *Palpebra* selbst öffnen. Bildet sich jener aber in den Augenwinkeln oder in dem untern Augenliede, so mufs man den ausgebildeten Abscefs mit einer Lanzette, dem Laufe der Fasern des Schliefsmuskels nach, öffnen. Wenn aber schon Fisteln in den Augenliedern vorhanden sind, so müssen, wie aus der Chirurgie schon hinreichend bekannt ist, bald Gegenöffnungen gemacht, bald dieselben durch das Messer, oder wo dieses nicht nöthig ist, durch Prefsschwamm erweitert werden. Einspritzungen und wo es angeht Druck auf die Wunden, müssen die übrige Heilung bewirken.

Sollte Gangraen der Augenlieder eingetreten sein, so lasse man eine nahrhafte, leicht verdauliche Nahrung genieſsen, und gebe flüchtig und permanent reitzend stärkende Medicamente, z. B. Calmus, alte Weine, China, u. s. w. Aeufserlich kann man Umschläge von Weidenrinden- oder Eichenrindendecoct, mit geistigen Flüssigkeiten verbunden, anwenden; ebenso die China, z. B. nach Le Febure ℞. *Cort. chin.* ℥j. *Salis ammoniac. depur.* ʒjj. *coq. c.* ▽ *fontan. ad Colatur.* ℥vjjj. *adde Camphorae* ʒjj. *Spir. vini rectssm.* ℥j. *M. S.* Zum Umschlag auf die Augenlieder mittelst leinener Compressen. Nachher kann man die Stelle mit *Bals. Arcaei* verbinden und die Augenlieder durch Heftpflasterstreifen stets geschlossen und somit ausgedehnt erhalten, damit die erfolgende Narbe so wenig als möglich die Parthien des Augenliedes zusammenzieht und Contracturen in demselben erregt, welche, wenn sie einigermaafsen bedeutend sind, nothwendig *Ectropia* verursachen müssen. In Folge der Eiterung wird nun der Substanzverlust durch Fleischgranulationen ersetzt, welche, wenn sie hinreichend vorhanden sind, mit einer Salbe aus *Laudan. liquid. S.* ʒj. und *Ungt. basilic.* ʒjjj. bis zur gänzlichen Heilung verbunden wer-

den können, damit eine möglichst gleichförmige Narbe zu Stande gebracht wird.

Die reine rosenartige Augenliederentzündung, *Blepharophthalmitis erysipelatosa, Oedema calidum palpebrarum.*

An beiden Augenliedern entsteht eine blasse, gelblichrothe, durchsichtig scheinende, glänzende Geschwulst, welche sich schnell ohne bestimmte Grenzen und weit, sowohl über die Augenbraunen nach aufwärts, als auch oft über die Hälfte des Gesichts nach unten ausbreitet. Die Röthe verschwindet beim Druck momentan. Nach und nach wird die Geschwulst an den Augenliedrändern sehr weich und wäfsrig. Der Schmerz ist unbedeutend, nicht klopfend, mehr brennend, spannend und bei Berührung lanzinirend. Die Hitze der Geschwulst ist nicht grofs. Die Aus- und Absonderungen des Auges, so wie auch die Schleimsecretion der Nase sind ansehnlich vermehrt.

Nur bei sehr schlechter Behandlung entsteht hier ein Allgemeinleiden. Ist dies aber eingetreten, so kann in Zukunft auch leicht Gangrän hinzukommen.

So weit gehen die Zeichen des ersten Zeitraumes.

Wenn aber, nachdem Röthe und Geschwulst zu- und Hitze und Schmerz abgenommen haben, eine Ausschwitzung schlüpfriger Lymphe entsteht, welche schnell an der Luft erhärtet und eine Art Kruste bildet, oder wenn sich auf den leidenden Theilen kleinere und gröfsere Lymphbläschen, welche bersten und eine gerinnbare Lymphe verbreiten, erscheinen, so ist der zweite Zeitraum eingetreten.

Alles das, was an andern Theilen eine rosenartige Entzündung hervorbringen kann, vermag es an den Augenliedern um so schneller. Plötzliche Einwirkung eines kalten Luftzuges, oder schnelle Unterdrückung des Schweifses ist eine Hauptursache. Ebenso auch Stiche der Bienen, Wespen und anderer Insecten, u. s. w.

Die Voraussage ist bei gesunden, starken Sub-

jecten sehr gut, denn das Leiden verschwindet meistens von selbst, ohne in den zweiten Zeitraum überzugehn.

Ist die Krankheit aber schon in das zweite Stadium übergegangen, so bleibt bei schwächlichen Individuen eine grofse Geneigtheit zu Recidiven zurück.

Waschen sich dergleichen Subjecte die entstandenen Krusten mit kaltem Wasser ab, so entsteht leicht ein *Oedema frigidum palpebrarum*, welches verschiedene Mifsformen des Augenliedes hervorbringen kann. Ist die erysipelatöse Augenliederentzündung blofs durch Vernachläfsigung in wahre *Blepharophthalmitis* übergegangen, so entsteht niemals ein ordentlicher Abscefs, sondern der Eiter bahnt sich schnell an mehreren Stellen einen Ausgang durch die, zum Theil schon desorganisirte, Haut und es entstehen gewöhnlich bösartige, langwierige Geschwüre, die mancherlei Nachkrankheiten zurücklassen können.

Bei rosenartigen Augenliederentzündungen, welche durch den Stich von Insecten entstanden und wo deren Stachel zurückgeblieben war, entsteht oft schnell Gangraen oder wohl gar *Sphacelus*.

Was die Heilung anbetrifft, so sind im ersten Zeitraume zuweilen Blutigel angezeigt, welche aber nie an die Augenlieder, sondern am besten hinter die Ohren anzusetzen sind. Oft ist ein Brechmittel, gleich anfangs gereicht, im Stande, das ganze Uebel zu beseitigen; wenn zu diesem indefs alle Indicationen fehlen, so ist es doch gut, ein *Laxans antiphlogisticum* nehmen zu lassen, z. B. ℞. *Magnes. sulphuric. Pulp. tamarindor. Syrup. rub. idaei* āā ℥j ß. *M. F. electuar. D. S.* Alle $1\frac{1}{2}$ Stunde 1 gehäuften Theelöffel voll zu nehmen. Bei mehr chronischem Verlauf des Uebels, oder bei Recidiven sind einige Dosen *Calomel* früh und Abends zu 1 bis 2 Gran oft vortrefflich. Alle örtliche Mittel sind im ersten Stadio zu verwerfen. Gut ist es, wenn der Kranke in einer reinen, trocknen und nicht bewegten Luft bleibt und eine zweckmäfsige antiphlogistische Diät beobachtet.

Ist aber das erste Stadium schon vorüber, so sind

trockne warme Luft, trockne warme Compressen, oder leichte Kräuterkissen, *) bei schwächlichen Individuen mit Campher, anzurathen. Bei solchen Subjecten wird die Heilung auch sehr befördert, wenn man diaphoretische Mittel, selbst Camphor giebt. Bei Vernachlässigung des Uebels geschieht es zuweilen, dafs sich in diesem Zeitraume auf den Augenliedern Bläschen bilden, welche bersten und durch die nun ausfliefsende verhärtende Lymphe Krusten erzeugen, unter welchen Geschwüre sich bilden, die bei grofser Unreinlichkeit um sich fressen und Hautverlust verursachen können. Um dieses zu verhüthen, oder zu heilen, wende man folgendes Augenwasser lauwarm an und behalte dabei die trocknen warmen Kräuterkissen: ℞. *Lapid. divini gr. j — jj. Aquae rosar.* ℥jjj — ℥v. *Muc. g. arab.* ʒjj. *Acet. saturn. gtt. v. — x. M.*

Geht aber die rosenartige Entzündung der Augenlieder in Eiterung über, welches ebenfalls nur bei Vernachlässigung des Uebels zu geschehen pflegt, so ist dies weit unangenehmer, denn obwohl solche Eiterungen immer nur oberflächlich sind, so entstehen sie doch oft an mehreren Stellen der Augenlieder zugleich, rauben somit eine Menge Haut, verursachen Infiltrationen des Eiters und hinterlassen, nachdem die endlich entstandene Narbe die äufsere Haut der *Palpebra* verkürzt hat, gar nicht selten dauernde *Ectropia.* Um alles dieses zu verhüthen, öffne man jeden entstandenen Eiterpunkt ohne Säumen, wende obiges Augenwasser mit Zusatz von einer Drachma *Laud. liquid. Syd.* als lauwarmen Umschlag öfter an und bedenke wohl, dafs die Augenlieder bis zur Vollendung der Kur im ausgedehnten Zustande erhalten werden müssen, damit die Entstehung einer Ausstülpung des Augenliedrandes durch Verkürzung der Oberhaut verhindert

---

*) Z. B. ℞. *Flor. chamomill.*
sambuc.
āā *part. j.*
Farin. fabar.
C. M. *part. jj.*

werde. Dieses geschieht am besten bei Verschliefsung der Augen durch starke Heftpflasterstreifen.

Entsteht Brand, der sich durch seine rasche Ausbreitung, so wie durch seinen, nur in der Oberhaut haftenden, Sitz vor dem nach *Blepharophthalmitis pura* entstehenden auszeichnet, so wird er ganz wie dieser behandelt.

Die reine Augenliederdrüsenentzündung, *Blepharophthalmitis glandulosa, Blepharoblennorrhoe,* [*βλεφαρον*, Augenlied und *βλεννορροια*, Schleimfluſs,] *Lippitudo,* [*λημη*, Augenschleim.] Eiterige Augenliederentzündung, Eitertriefen, u. s. w.

Man hat sie mit noch vielen andern Namen belegt, denn bald erschien sie bei alten Weibern, und dann beschrieb man sie unter dem Namen *Ophthalmia vetularum* *), bald benannte man sie nach einzelnen Symptomen, woraus denn eine *Ophthalmia serosa*, wenn die Augen in Thränen schwammen, oder eine *Ophthalmia sicca*, wenn der Grad der Entzündung die Thränensecretion hemmte, u. s. w. hervorgingen.

Zuweilen verwechselte man sie auch mit Ophthalmien, denen eine *causa specifica* zum Grunde liegt, z. B. mit der *Psorophthalmie*, **) mit scrofulösen Augenentzündungen und mit mehreren andern.

Hier soll nur die reine Augenliederdrüsenentzündung abgehandelt werden, die sich indessen, schon bei geringer Anlage, mit dyscrasischen Krankheiten complicirt, wo sie alsdann freilich nicht mehr reine, sondern nach dem Namen der dyscrasischen Krankheit, scrofulöse, u. s. w. Augenliederdrüsenentzündung genannt zu werden verdient.

---

*) Reil, (*Memorab. clinic. medico - pract. Vol. I. Fascicul. I. p.* 3.) und andere.

**) Wie Ware, Chirurgische Beobachtung über das Auge, übersetzt von Runde, mit Vorrede und Anmerkung. versehen von Himly. 1809. I. Bd. S. 79.

Die Krankheit äufsert sich folgendermaafsen: Unter einem Jucken in den Augenwinkeln, oder zugleich auch in den ganzen Augenliedrändern, welches zuweilen mit Brennen abwechselt, laufen die Augenliedränder zu einer hochrothen, härtlichen, empfindlichen Geschwulst, an. Die Thränensecretion ist zugleich mehr oder weniger vermehrt, die Thränen sind scharf, und röthen und excoriiren die Wangen. Wird nun nach und nach die Entzündung heftiger, und verbreitet sie sich auch über die Bindehaut des Augapfels, so hört die Thränensecretion auf und das Auge wird trocken; dabei glauben die Kranken Sand unter den Augenliedern zu fühlen und wagen nicht die letztern, aus Furcht vor den Schmerzen, zu bewegen.

So verläuft der erste Zeitraum; indefs sehr oft geht er so schnell vorüber, dafs ihn der Arzt gar nicht bemerkt.

Nach und nach mindert sich nun die Trockenheit und das Brennen und Jucken der Augen, die Meibomschen Drüsen fangen an Schleim abzusondern, von welchem die Augenlieder und Cilien zusammenkleben, die *Conjunctiva palpebrarum* schwillt an und ist dabei noch ziemlich stark geröthet, die Augenwinkel, und oft die ganzen Augenliedränder, excoriiren sich und geben der Entzündung zuweilen grofse Aehnlichkeit mit Psorophthalmie, und die Schleimsecretion nimmt immer mehr zu und wird dem Eiter ähnlicher; auch exacerbirt die Krankheit drei bis vier Stunden nach dem Mittags- und Abendessen, wenn die Chylification eingetreten ist.

Dabei sind die Augenliedränder jetzt oft wie aufgeätzt, wund, schmerzhaft und die Excoriationen verbreiten sich immer weiter, wenn die Kranken sich selbst überlassen bleiben.

Sobald erst Schleimabsonderung eingetreten ist, bemerken aufmerksame Kranke Abends wenn sie in die Kerzenflamme sehen, letztere mit einem Hofe umgeben, der zuweilen regenbogenfarbig erscheint und den Halbwissenden oft in die gröfste Angst setzt. Diese Erscheinung entsteht ganz allein aus dem die *Cornea* über-

überziehenden Schleime, wodurch eine vielfache Lichtstrahlenbrechung verursacht wird, gehört aber keinesweges den nervösen Gebilden des Auges an. Eine andere, bis jetzt noch ganz unerwähnt gebliebene Erscheinung des zweiten Zeitraumes dieser Entzündung, sind die Bäumchenartig verzweigten grauen Gestalten, welche der aufmerksame Kranke früh beim Aufwachen und beim schnellen Oeffnen der Augenlieder vor seinen Augen auf einige Momente bemerkt. Es entsteht dieser Zufall wiederum nur aus dem zwischen den Augenliedern und dem Augapfel früh Morgens vorhandenen zähen Schleime, welcher durch das schnelle Aufblicken in Bäumchenform gehäuft die Hornhaut überzieht, bald aber durch die Thränen weggespühlt wird. Man sieht dasselbe Phaenomen, wenn man zwei mit halbflüssiger Farbe oder mit dicklichem Schleime bedeckte Flächen zweier Glasplatten aufeinandergelegt hat und sie dann schnell von einander hebt. Diese Symptome, so unbedeutend sie an sich sind, ängstigen gebildete Kranke zuweilen sehr; um so mehr, da sie auch bei den, hernach zu erwähnenden, chronischen Formen dieser Entzündung mit geringen Graden von Doppelsichtigkeit vorkommen können und in so fern Symptome constituiren, welche den Halbwissenden eine Amaurose in der Perspective sehen lassen.

Jene chronische Ausschwitzung von eiterförmiger Flüssigkeit, hat man sonst unter dem Namen *Lippitudo* als eine eigene Krankheitsform aufgestellt. Wenn hingegen nur die Augenwinkel an dergleichem Ausfluſs litten, so nannte man ihn *Lippitudo angularis*, Augenwinkelunreinigkeit, *Lemositas*, und entstanden Excoriationen, welche in die Augenwinkel einfraſsen, so belegte man diesen Zustand mit den Namen *Peribrosis*, *Perivrasis*.

Oft, wenn durch günstige Umstände die eitrige Schleimsecretion nachläſst, somit auch die Excoriationen verschwinden, bleibt doch noch immer eine übermäſsige Absonderung von Meibomschen Schmeere zurück, welche leicht habituell werden kann. Wird aber diese Schmeerabsonderung durch Kunst oder durch

zufällige Einflüsse beseitigt, so endet das ganze Uebel mit einer ungewöhnlichen seroesen Secretion.

Diese Entzündung kann die verschiedensten Grade haben. Die gelindeste Art entsteht und vergeht oft binnen einigen Tagen; man bemerkt hier nur einen kleinen rothen Streifen an der innern Fläche des Augenliedrandes und allenfalls eine unbedeutende Vermehrung der Blutgefäfse der innern Augenliedfläche überhaupt. Bei solchem geringen Grade sondert sich auch nur wenig Schleim aus den Meibomschen Drüsen ab, welcher über Nacht keinesweges die Augenlieder verklebt, vielmehr des Morgens nur im innern Augenwinkel vorgefunden wird. Ueberhaupt sind hier das Jucken, das Gefühl von Sand in den Augen, so wie alle angegebenen Symptome sehr unbedeutend und gleichsam nur als Keime vorhanden, welche bei zweckmäfsiger Behandlung in einigen Tagen verschwinden, bei Vernachlässigung aber ebenso gut auch wachsen können und dann in die höhern und höchsten Grade der *Blepharophthalmitis glandulosa* übergehen.

Je heftiger die Entzündung war, um so gröfser ist die Quantität des sich nachher absondernden Schleimes, welcher übrigens hinsichtlich seiner Qualität sich in der Regel mehr dem Schleime als dem Eiter nähert. Die Schleimabsonderung wird zuweilen, und besonders bei schmutzigen *leucophlegmatischen* Subjecten, so copiös, dafs sich derselbe über die Wange ergiefst, wo dann eine wirkliche *Blennorrhoe* der Augenlieder anzunehmen ist. Der unbefangene Beobachter wird es nicht läugnen, dafs sowohl dieser Schleim als auch die Thränen während dieser Krankheit eine qualitative Veränderung erleiden, wodurch die eintretenden Excoriationen möglich werden, welche letztere sich zuweilen nicht blos auf die Augenliedränder, sondern auch auf die an diese Ränder grenzende Oberfläche der Augenlieder erstrecken; allein nur bei gänzlicher Vernachlässigung, Unreinlichkeit und bei längerer Dauer des Uebels können solche Excoriationen so weit gedeihen, dafs auf ihnen, besonders in den Augenwinkeln, gelbliche Pusteln entstehen, welche geschwürige Flä-

chen hinterlassen, wodurch die Augenlieder beim Oeffnen heftig schmerzen, ja oft bluten. Es giebt Fälle, in denen die ganze innere Oberfläche des Augenliedes mit solchen gelben Pusteln und geschwürigen Punkten so besetzt ist, dafs diese Parthie das Ansehn einer frisch aufgeschnittenen Feige erhält, weshalb man auch diesen Zustand *Sycosis* oder *palpebra ficosa* nannte; indefs kann derselbe nur bei der gröfsten Vernachlässigung entstehen, ja oft ist diese dazu nur hinreichend, wenn dyscrasische Proceſse hinzutreten und vorwalten, dann aber können auch Zerstöhrungen der Thränenwärzchen, welche ein unheilbares Thränenträufeln verursachen, *Ectropia sarcomatosa*, und wenn die Geschwürchen das Knorpelhäutchen des Tarsus zerstöhren, Verschrumpfung des letztern zurückbleiben. Ebenso entstehen zuweilen *Entropia*, indem das öftere krampfhafte Zusammenblinzeln der Augendeckel, die äufsere Augenliederhaut verlängert, und ich habe wohl schon öfter gesehen, dafs die *Blepharophthalmitis glandulosa*, wenn sie vernachläfsigt worden war, an dem einen Augenliede *Ectropium*, an dem andern desselben Subjects aber *Entropium* verursacht hatte.

Endlich kann auch dieses Leiden in eine eben so milde als chronische Form hinauslaufen, welche besonders gern bei Vernachlässigung, bei Bewohnern grofser Städte und besonders in schlaffen, sensiblen, blonden, mit feiner Oberhaut begabten Subjecten zurückbleibt. Sie spricht sich entweder durch eine leichte Röthe der innern Fläche des Augenliedrandes aus, welche nur in scharfer Luft oder Morgens früh, unmittelbar nach dem Aufwachen, sich mehr ausgebreitet hat und auch äufserlich mehr sichtbar wird, wobei dann in der Regel nur in dem innern Winkel der Augenlieder ein Körnchen vertrockneter Schleim vorgefunden wird, oder sie declarirt sich mehr als ein auf die Meibomschen Drüsen beschränkter Entzündungsproceſs, wo dann hauptsächlich nur der äufsere Rand der Augenlieder blafs zinnoberfarbig geröthet erscheint, und wobei man früh nach dem Aufwachen allein, oder auch zuweilen zu jeder andern Tageszeit, an der Einmündungs-

stelle eines jeden Augenliedhaares ein vertrocknetes Schleimkörnchen, in der Gröfse und Farbe eines grauen Sandkörnchens bemerkt. Ein hinzukommender Schnupfen, so wie jeder andere dem Auge mitgetheilte Reitz, verschlimmert in der Regel diese beiden chronischen Formen der *Blepharophthalmitis glandulosa*, und leicht dient die lange Gewohnheit der Augenlieder, geröthet zu sein, einer in den Körper eintretenden oder darin schon vorhandenen Dyscrasie zur Folie.

Die Krankheit entsteht vorzüglich bei Menschen, die sich in einer unreinen verdorbenen Luft aufhalten. Sie ergreift jedes Alter und Geschlecht; nur findet man sie bei dem weiblichen Geschlecht häufiger als bei dem männlichen. Ebenso sind übermäfsige Gesichtsarbeiten, besonders wenn sie bei Kerzenlichte geschehen, Gelegenheitsursach zur Entstehung dieses Uebels. Die häufigste Ursache bleibt aber stets die allgemein stattfindende Unreinigkeit der Atmosphäre, diese ist immer mehr oder weniger mit Staub und Unreinigkeiten geschwängert, besonders aber in grofsen Städten, daher findet man das Uebel hier auch am häufigsten und zwar bei denen Menschenklassen vorzugsweise, welche gezwungen sind sich täglich jenem ursächlichen Momente auszusetzen; daher kommt es dafs Gerber, Kutscher, Bäcker, Fleischer, Garten- und Strafsenarbeiter, Juden und Leute, welche in ihren engen Wohnstuben Sand zu streuen pflegen, die den ganzen Tag über im Tabacksrauche leben, am häufigsten von der Krankheit ergriffen werden. Ebenso können Fehler des Unterleibes Schuld an der Entstehung der Krankheit haben, daher bei Stuhlverstopfung, bei Hämorrhoidalbeschwerden, besonders in Verbindung mit Diätfehlern; denn wo Schweinefleisch, Wassergeflügel, salzige, saure und scharfe Speisen, Brandwein und Wein im Uebermaafs genossen werden, da finden sich auch Augenliederdrüsenentzündungen nicht selten ein. Immer aber pflegt man wahrzunehmen, dafs Personen mit zarter, weifser, feiner, gleichsam halbdurchsichtiger Haut, welche blond sind und an Sommersprofsen leiden, unter gleichen Verhältnissen leichter und hart-

näckigter von dem Uebel befallen werden, als braune, starke, muskulöse Personen.

Die Prognose ist gut, wenn die Entzündung noch im ersten Stadio angetroffen wird und nicht zu heftig ist. In Allgemeinleiden schreitet diese Entzündung, wenn sie rein ist, nicht über; es sei denn dafs sie durch schlechte Behandlung erst in *Blepharophthalmitis* überginge.

Ist schon ein eiterförmiger Schleimfluſs zugegen, dann kann leicht eine *Trichiasis*, und wenn zugleich bedeutende Excoriationen der Augenliedränder vorhanden sind, ein *Anchyloblepharon partiale* zu Stande kommen. Wenn die Excoriationen vorzüglich stark in den Augenwinkeln sind und dadurch die Commissuren der Augenlieder zerfressen werden, so entsteht häufig eine Ausstülpung des untern Augenliedes, welche, weil sie am häufigsten bei alten schlaffen Subjecten vorkommt, *Ectropium senile* genannt wird. Ist der Schleimfluſs der Augenlieder sehr stark und wird er mit zu kalten, zu sehr adstringirenden Augenwässern und Salben behandelt und dadurch vielleicht schnell unterdrückt, so kann selbst, vorzüglich bei sehr sensiblen Individuen, eine dauernde Gesichtsschwäche nachfolgen.

Trifft man die Krankheit noch in ihrem ersten Zeitraum an, so kann man sie oft, durch kalte Umschläge von Wasser oder einem schwachen *Oxycrat*, in der Geburt ersticken. Uebrigens entferne man natürlich nach Kräften die ursächlichen Schädlichkeiten.

Sobald aber sich Schleim abzusondern anfängt und also das 2te Stadium eingetreten ist, vermeide man es die äufserlichen Mittel kalt anzuwenden, vielmehr gebrauche man dieselben sämmtlich lauwarm. Bei einem gelinden Grade und im Anfange des 2ten Stadii kann man folgendes Augenwasser täglich 4 — 5 Mal anwenden:

℞. *Extract. opii aq. gr. j — jj*
Aquae rosar. ℥*jv*
Mucilag. gummi mimosae ℥*jjj*

M.

Oder wenn man schneller noch die Schleimsecretion zu hemmen gedenkt, kann man die Augen mit folgendem Wasser reinigen:

℞. *Acet. saturn. gtt. vjjj — xv*
Aquae opii puri ℥*j*
— rosar. ℥*jjj*
Mucil. gummi mimos. ℥*jj*

M. S. Täglich 4 Mal die Augen damit auszuwaschen. Bei sensiblen blonden Subjecten, in welchen grofse Geneigtheit zu Recidiven vorhanden ist, wo überhaupt die Entzündung leicht in ein sehr chronisches Stadium übergeht, thut man wohl, dem letztern Augenwasser 1 bis 2 Gran *Zincum sulphuricum* zuzusetzen; denn obgleich dieses ganz antichemisch ist, so wirkt dieses Wasser doch gar trefflich.

Bei bedeutenderen Graden des Uebels, kann man das Verhältnifs des Bleiessigs zu den übrigen Ingredienzien vergröfsern; oder man macht von folgendem Augenwasser Gebrauch:

℞. *Aerugin. depurat. gr. j.*
Aquae rosar. ℥*jv — v.*
Acet. saturn. gtt. x.
Laud. liquid. Syd. ℈*j*
Muc. gummi mimos. ℥*jj*

M.

Statt des gereinigten Grünspans kann man auch 2 Gran des *lapid. divin.* nehmen. Ebenso wird zuweilen eine schwache *Solut. alumin. crudi* mit Schleim vermischt trefflich vertragen. Dauerte das Uebel schon längere Zeit hindurch, ist Scrofeldiathesis mit im Spiele, dann wirken dünne Sublimatsolutionen mit *Laudanum liquid.* sehr gut, z. B.

℞. *Hydrarg. muriat. corr. gr.* ß.
Aquae rosar. ℥*jv*
Laud. liquid. Syd. ℈*j — jj*
Muc. g. arabic. ℥*j — jj*

M.

Bei wahrhafter *Blepharoblennorrhoe*, wo die innere Fläche der Augenlieder sammetartig angeschwollen zu sein pflegt, gebrauche man anfänglich und so lange

die Schleimsecretion noch copiös ist, ein einfaches Wasser aus *Laudan. liquid.* ʒj. *Aqu. rosar.* ʒjv — *v.* und *Muc. gummi mimosae* ʒjj; und erst später, nachdem die Anschwellung der *Conjunctiva palpebrarum*, so wie die übermäfsige Schleimabsonderung nachgelassen hat, gehe man zu den bereits angeführten styptischen Augenwässern über. Dabei ist das Bedecken der Augen mit trocknen erwärmten Compressen, an deren Statt man später trockne aromatische Kräuterkissen nehmen kann, nützlich.

Bei der gelinderen chronischen *Blepharophthalmitis glandulosa*, wo sich die Entzündung nur auf die Meibomschen Drüsen allein zu beschränken scheint und wo an den Einmündungsstellen der *Cilien*, Körnchen verhärteten Schmeeres zu bemerken sind, wird man wohlthun, folgende beide Salben anzuwenden, und zwar die erste davon so lange, bis die körnichten Partikelchen an den Augenliedrändern ganz, oder fast ganz zu erscheinen aufgehört haben, worauf dann erst die zweite gebraucht wird, um die rosen- oder zinnoberfarbne Röthe vollends zu beseitigen, was aber oft nur erst gelingt, wenn man die später anzugebenden allgemeinen Mittel zu Hülfe nimmt.

℞. *Hydrarg. oxyd. rubr.*
Extr. opii āā *gr.* jß
Axung. porc. ʒj
M. exactissime.

℞. *Hydrarg. oxyd. rubr.*
Extr. opii
Boli armen. āā *gr.* jß
Zinc. oxyd. alb. gr. jv
Axung. porc. ʒj
Terendo M. exactissime.

Von beiden Salben wird blos Abends beim Schlafengehen eine Stecknadelkopfgrofse Quantität auf die Augenliedränder gestrichen oder vielmehr gelinde eingerieben.

Sind schon Excoriationen vorhanden, oder ist das Uebel überhaupt mehr veraltet, so gebrauche man das *Ungt. Ophthalm. Janini*, welches aus *Axung. porcin.* ʒß

Tut. praepar. Bol. armen. āā ʒjj und *Merc. praec. alb.* ʒj besteht; nur ist wohl zu bemerken, dafs man hier zu individualisiren wissen müsse, denn befindet sich das Auge schon an sich in einem gereitzten Zustande, und hat man ein sensibles Subject zu behandeln, so wird man das Verhältnifs des Mercurs und der adstringirenden Substanzen zu dem Fett sehr vermindern müssen. Da man *) nun gefunden hat, dafs der weifse Bolus die geringste, der rothe Bolus eine stärkere und der armenische eine noch stärkere Contraction verursacht, so wird man neben der Verminderung des weifsen Praecipitats wohl thun, wenn man anfangs und bei jungen reitzbaren Subjecten und Kindern, für den armenischen, erst weifsen Bolus zusetzen läfst und täglich nur einmal einer Linse grofs von der Salbe auf das Augenlied streichen läfst. Bei solchen Subjecten ist eine Mischung aus *Axung. porc.* ʒß mit *Bol. alb.* ʒjv nebst *Merc. praec. alb.* ʒß hinreichend.

Alte, unempfindliche Subjecte hingegen vertragen das gewöhnliche Verhältnifs der Janinischen Salbe recht gut.

Indessen giebt es Individuen, die weder Quecksilber örtlich vertragen können, noch bei denen Salbenformen gut thun; in diesen Fällen nehme man zu dem göttlichen Stein des *Saint Yves* **) seine Zuflucht.

Auch bei Anwendung dieses Mittels, mufs man die Individualität des Subjects berücksichtigen. Je empfindlicher das Auge ist, je länger die Krankheit

---

*) Der unsterbliche Adam Schmidt hat alles dieses weitläuftiger und vortrefflich in der von dem verdienstvollen Himly und ihm herausgegebenen *Ophthalm. Biblioth.* 3. B. 1 St. Seite 63. abgehandelt.

**) Die Bereitungsart ist folgende:

℞. *Nitri depurati,*
Vitrioli caerulei
Aluminis crudi āā ʒvjjj.

Contrita et mixta fluant in crucibulo, quibus sub finem addatur

Camphorae tritae ʒß

rite agitata, refrigerentur.

gedauert hat, um so geringer mufs die Quantität sein, die man in einer bestimmten Menge Wasser auflösen läfst; anfangs sind 10 bis 15 Gran in 6 bis 8 bis 10 Unzen Wasser gelöst und mit 1 Quentchen geistiger Flüssigkeit gemischt, hinreichend, allmählig steigt man bis 30 Gran in 6 — 10 Unzen Wasser gelöst und *Spir. Camphorat.* zugesetzt, was man dann immer lauwarm gemacht, mittelst eines feinen Schwammes, einige Zeit so über das Auge hält, dafs die, auch in das Auge dringende Flüssigkeit einiges Brennen erregt. Dies wendet man täglich 3 bis 4 Mal an, bei Abnahme der Krankheit indefs seltener.

Werden bei alten Leuten die *Ligamenta interpalpebralia* zerfressen, so leistet eine Abkochung der Weidenrinde mit Rhabarber, in welche man Charpie tränkt und auflegt, gute Dienste; denn die aufgeätzten Stellen werden nach und nach rein, und heilen.

Uebrigens darf das Augenwasser nie kalt auf dem Auge werden.

Zuweilen, wenn sich die Excoriationen der Augenliedränder unter Fortdauer der verderblichsten Einflüsse und bei alten schlaffen unempfindlichen Subjecten immer weiter verbreiten und in gröfsere oder kleinere Geschwüre übergehen, welche hartnäckig allen obigen Mitteln widerstehen, mufs man zu dem Gebrauch des von James Ware *) gerühmten *Ungt. citrin. Pharmacop. Londin.* **) und in den äufsersten Fällen selbst zu dem schon von St. Yves empfohlenen örtlichen Gebrauch des *Lap. infernalis* übergehen, bei welchem letztern indefs Vorsicht nöthig ist. Gewöhnlich gehören jedoch solche hartnäckige Fälle

---

*) a. a. O. B. I. S. 87.

**) Es wird folgendermaafsen verfertigt:

℞. *Hydrargyri puri* ℥j
Spiritus nitr. ℥jj

Digere super arenam, ut fiat solutio, quae calidissima adhuc misceatur cum Axung. porcinae liquefactae et in coagulum denuo tendentis libra una, strenue agitando in mortario marmoreo, ut fiat unguentum. S. Täglich einmal am besten vor Schlafengehen die Augenliedränder damit einzureiben.

nicht unter die reine Augenliederdrüsenentzündung, weil sie meistens als Folge verschiedener dyscrasischer Krankheiten vorkommen.

Obgleich bei den leichteren Graden der *Blepharophthalmitis pura*, und wenn sonst keine Indicationen vorhanden sind, innere oder allgemeine Mittel entbehrt werden können, so sind diese doch bei den heftigeren Graden oder bei dyscrasischen Subjecten und wenn das Uebel sehr chronisch wird, höchst nützlich. Niemals sollte man bei bedeutender oder chronischer Schleimabsonderung an den Augenliedern, adstringirende Wasser oder Salben früher gebrauchen lassen, als bis man kräftige Ableitungen auf den Darmkanal gemacht hat; denn obgleich man oft bald jene Absonderung hemmet, so erfolgt doch in einzelnen Fällen hierauf eine wahre Gesichtsschwäche, welche nur im Anfange dadurch noch gehoben zu werden pflegt, dafs man einen kräftigen und dauernden Hautreitz zwischen den *process. mastoid.* und dem *angul. maxillae inferioris* applicirt. Zu jenen auf den Darmkanal wirkenden Ableitungen dienen besonders grofse Dosen *Calomel* in Verbindung mit Jalappenwurzel; von ersterm *pr. dosi* 5 bis 10 Gran, von letzterer ℈j — ʒß. In sehr hartnäckigen Fällen und bei *Blepharoblennorrhoe* kann man früh und Abends eine Dosis *Calomel* (etwa 1 bis 2 Gran) nehmen lassen. Ist der Schleimfluſs sehr bedeutend, das Subject schlaff und schlecht genährt, dann wird man wohlthun *radic. valerian. rad. calami ar.* u. dergl. nehmen zu lassen. — Uebrigens sind in den meisten Fällen die leichteren *Laxantia* sehr nützlich, z. B. *Magnes. sulphuric.* oder *Electuar. e senna*, u. s. w.

Wo irgend eine *Dyscrasie* das Uebel unterhält und dauernd macht, da sind auch Ableitungen durch Hautreitze ganz vortrefflich. Man hat sie hie und da getadelt und meint, sie hinterlieſsen nur eine desto gröſsere Geneigtheit zu Recidiven; ich kann dies indeſs nicht bestätigen.

Allgemeine lauwarme Bäder sind endlich nicht zu versäumen, besonders scheinen sie bei chronischer Röthe der Augenliedränder sehr zu nützen.

Die Augenentzündung der Neugebohrnen, *Ophthalmia neonatorum.*

Ophthalmia purulenta, Oculus purulentus, purulent Ophthalmia of infants nach Ware, *) Augenlied- und Augentripper, *Blepharoblennorrhoea, Ophthalmoblennorrhoea* nach Ad. Schmidt. Auch unter dem Namen *Ophthalmia puriformis, Lippitudo neonatorum,* Triefauge der Neugebohrnen **) bekannt.

Zeichen der Krankheit. — Am 3ten, 6ten, 8ten, 14ten Tage und noch längerer Zeit ***) nach der Geburt des Kindes, fängt diese, oft so schnell verheerende Entzündung mit Lichtscheu, mit einer leichten Röthe der *Conjunctiva palpebrarum,* vorzüglich im innern Augenwinkel ****) und mit einem Jucken der Augenlieder an, diese letztern bedecken sich mit einem leimigten Schleim, welcher verhärtet und die Augendeckel zusammen klebt; öffnet man sie jetzt, so stürzen Thränen aus den Augen. Dabei ist die Augenliederconjunctiva mehr oder weniger angeschwollen und die Geschwulst ist anfangs weich, etwas elastisch, glatt und leicht blutend.

Die Lichtscheu und die Schleimaussonderung wird jetzt immer gröfser, der Schleim bekommt mehr ein eiterartiges Ansehn, wird dickflüssiger und gelblich, die Geschwulst der Augenliedbindehaut, vorzüglich des obern Augenliedes, so wie die Röthe nehmen zu und geben derselben (um mit Saunders zu reden) das Ansehn eines fein injicirten Foetusmagen. Auch die Epidermis des obern Augenliedes bekömmt eine Röthe, die, wenn sich die Kinder dehnen, recken oder

---

*) Mit Recht bemerkt Saunders die Unrichtigkeit des Wortes *purulent,* und setzt dafür richtiger *puriform.*

**) Diese Entzündung wird hier als Abart der Augenliederdrüsenentzündung betrachtet, und kann eben so gut specifisch als rein sein.

***) Walther, a. a. O. S. 447. u. a.

****) Siehe *A treatise on some practical points relating to the diseases of the eye, by the late John Cunningham Saunders. London,* 1816. S. 37.

schreien, ins livide spielt, wobei zugleich die Augenmuskeln den Bulbus nach vorwärts treiben. Oeffnet man in dieser Periode das Auge, nachdem die verklebten Augenlieder mit lauem Wasser erweicht worden sind, so dringt, je nachdem die Krankheit heftiger oder milder ist, mehr oder weniger eines bald weifslichen, bald gelblichen, bald gelbgrünlichen, manchmal mit Blutstreifen oder, in bösen Fällen, mit Fleischwasser ähnlicher Gauche durchmischten Schleimes zwischen den Augenliedern hervor, welcher oft so copiös ist, dafs er die ganze Wange bedeckt. Der Augapfel ist jetzt öfters so mit Schleim überzogen, dafs man die äufsern Gebilde desselben nicht unterscheiden kann; reinigt man nun das Auge bestmöglichst von diesem Schleime, so findet man, wenn nur *Blepharoblennorrhoe* zugegen, die *Conjunctiva bulbi* nur sehr wenig geröthet, die Augenliedbindehaut hingegen sehr roth, angeschwollen und von Schleim triefend. War aber die Entzündung heftiger, ist *Ophthalmoblennorrhoe* zugleich vorhanden, so ist auch die Bindehaut des Augapfels stark geröthet und jetzt so angeschwollen, dafs sie die Hornhaut fast ganz bedeckt und man kaum noch das Centrum der letztern entdecken kann. Wenn während diesem Untersuchen des Auges die Neugebohrnen heftig schreien und die Augenlieder dabei zu schliefsen versuchen, so geschieht es nicht selten, dafs sich das stark geschwollene, jetzt sarcomatöse obere Augenlied umstülpt und ein dauerndes *Ectropium* hinterläfst, wenn es nicht sogleich auf die weiter unten angegebene Weise reponirt wird.

Nachdem nun nach und nach die eitrige Schleimaussonderung aufhört, tritt eine reine Schleimsecretion, wie im Anfange der Entzündung wieder ein, und endlich verschwindet die ganze Krankheit mit einem Thränenausfluss. Hatte der krankhafte Procefs weit um sich, aber nicht tief eingegriffen, so bleibt am Ende der Krankheit oft nur eine Trübung der *Cornea* zurück, welche in der Folge nicht selten von selbst verschwindet. War aber die Entzündung sehr heftig und die eiterartige Schleimaussonderung bedeutend, so blät-

tert sich die *Cornea* auf, verwandelt sich in einen Eiterstock, der endlich, entweder schnell unter heftigen Schmerzen, oder langsam und ohne Schmerzen, in seiner Mitte berstet, worauf, nachdem die wässrigte Feuchtigkeit nun ausgeflossen, die *Iris* sich in die Oeffnung legt. Gehen nun die Destructionen noch weiter, so kann auch endlich die Linse nebst einem gröfsern oder geringern Theile des Glaskörpers aus dem Auge fallen und völlige Colliquation des letztern erfolgen. Indefs dabei bleibt es nicht immer, denn öfters bleiben die Kinder, auch bei einem weniger zerstörenden Grade dieser Krankheit, in der Ernährung zurück und werden atrophisch.

Zeigen sich in der aufgelockerten *Cornea* mehrere Geschwüre, gehen diese immer tiefer, und zerstöhren sie an verschiedenen Orten auch die letzte Lamelle der Hornhaut, so drängt sich, nachdem der *Humor aqueus* ausgeflossen, die Regenbogenhaut in die Löcher der *Cornea* hinein und stellt ein Traubenstaphylom, *Staphyloma racemosum*, dar.

Ist anfangs nur ein Auge ergriffen, so folgt das andere bald nach.

Zuweilen erscheint früher, ehe noch die eiterförmige Schleimsecretion überhand nimmt, sowohl bei blofser *Blepharo-* als bei *Ophthalmoblennorrhoe*, eine ziemlich starke Blutung aus dem Auge, die oft zwei bis dreimal wiederkehrt, und welche dem Arzte erwünscht sein mufs: denn hat das Blut nur das normale Ansehn, so wird die eitrige Schleimaussonderung in der Folge weniger stark und zerstöhrend, und die Geschwulst der leidenden Theile nimmt schnell ab.

Aetiologie, — Junge, schwächliche, kaum ausgetragene Kinder, Zwillinge und Drillinge, Kinder in Findelhäusern, Gebärinstituten, und diejenigen, welche in schlechten feuchten Wohnungen leben müssen, werden am leichtesten von der Krankheit ergriffen. Kinder, welche bei der Geburt durch den weifsen Flufs ihrer Mütter verunreinigt wurden, erleiden ebenfalls diese Entzündung; war jener weifse Flufs syphilitischer Natur, so erreicht das Leiden meistens einen

aufserordentlich heftigen Grad, worin die Beobachtungen grofser Männer, z. B. eines Ph. Fr. Walther, Adam Schmidt, Scarpa, u. a. übereinstimmen. Eben so müssen Kinder, die unmittelbar nach der Geburt der Erkältung und Zugluft, oder der Einwirkung eines grellen Lichtes Preis gegeben und dabei kümmerlich ernährt werden, Kinder scrofulöser Art, welche die Masern oder Scharlach eben überstanden haben und der Erkältung ausgesetzt worden sind, nicht selten diese Krankheit ertragen.

Auch bei schwächlichen Erwachsenen beiderlei Geschlechts, welche in verdorbener Luft leben und schlechte Nahrung genieſsen, erscheint nicht gar selten eine *Blepharo-* und *Ophthalmoblennorrhoe*, welche aber nie so schnell und verheerend verläuft als bei Neugebohrnen und sich überhaupt nach den leidenden Subjecten gar sehr modificirt.

Prognose. — Wenn die Krankheit nur in einer *Blepharoblennorrhoe* bestand, so ist die Voraussage ziemlich günstig; denn wenn die Entzündung hier Folgen zurückläſst, so bestehen diese meistens nur in einer Trübung der Hornhaut, welche noch gehoben werden kann, oder gar von selbst verschwindet, und zuweilen in einer Ausstülpung des obern Augenliedes, *Ectropium.*

Wenn aber *Ophthalmoblennorrhoe* eingetreten und die Hornhaut auch nur in einem kleinen Punkte durchlöchert ist, so bleibt leicht eine partielle Verwachsung der *Iris* mit der *Cornea, Synechia anterior,* nebst einer mehr oder weniger verbreiteten Narbe zurück, die zuweilen das Gesicht ganz aufhebt. Bisweilen bemerkt man in solchen Fällen, und mit oder ohne Dasein der vorderen *Synechie,* eine *Cataracta centralis,* deren Genesis hier nicht leicht genügend zu erklären sein dürfte. — Ist während der Entzündung die Regenbogenhaut gröfstentheils oder in ihrem ganzen Umfange, ohne Durchlöcherung der Hornhaut, mit dieser verwachsen, so entsteht im ersten Falle ein partielles, im zweiten ein vollkommnes Hornhautstaphylom. — Ist jedoch *Colliquation* des ganzen *Bulbus* zugegen, so bleibt ein un-

förmlicher, kleiner weifslicher Klumpen, an der Stelle des Augapfels zurück, die Augenlieder fallen einwärts und die Augenliederspalte bleibt auf immer geschlossen.

Kur. — Wird man beim ersten Entstehen der Entzündung (was indefs selten der Fall sein wird) schon hinzugerufen, so mufs man immer antiphlogistisch verfahren, und zwar, nach dem Grade der Krankheit und nach der Constitution des Subjects, bald stärker bald aber weniger stark. Man setze demnach einen Blutigel im innern Augenwinkel über dem Thränensack an. Oft heilt man sie auch ohne diesen, wenn man nur sogleich Umschläge von kaltem Wasser anwendet. *)

Zugleich entferne man alle Causalmomente der Krankheit, und betrachte eine gute Muttermilch als die beste Nahrung für die Kleinen. Sind Unordnungen im Unterleibe, z. B. zurückgehaltenes *Meconium etc.* vorhanden, so verordne man ein leichtes Laxiermittel. **)

Nimmt nun die Schleimsecretion zu, und wird sie eiterartig, so reinige man das Auge von dem überflüssigen Schleim, durch öfteres Auswaschen oder vorsichtiges Einspritzen von einem warmen Augen-

---

*) Der verstorbene englische Augenarzt und einer der neuesten Schriftsteller über unsern Gegenstand, Saunders, war kühner in Anwendung der antiphlogistischen Kurart; er setzte Blutigel um das Auge und liefs sie so lange nachbluten, bis das Kind bleich wurde und der topische Aderlafs also zugleich auch als ein allgemeiner wirkte. Binnen 24 Stunden war die Gefahr für das Auge schon sehr gemindert, worauf er nach und nach zu der örtlichen Anwendung von gering adstringirenden Mitteln überging. Scarificationen der Conjunctiva, wie Ware und nach diesem Reil u. a. gerathen haben, verwirft er; weil das zarte Organ zu sehr dadurch beleidigt und zu wenig Blut ausgeleert wird.

**) Eine Mischung von Magnesia Rhabarber mit etwas Saft, wird hier von den meisten Aerzten gegeben. Beer u. a. empfehlen im Anfange der Krankheit ein starkes Purgiermittel aus Calomel und Jalappe; Saunders giebt, wenn er *Magn. c. rheo* zu schwach findet, den Rhabarber mit Calomel.

wasser *) mittelst der Anelschen Spritze, worauf denn das Auge mit einem warmen Tuche ganz abgetrocknet und endlich eine mit Camphor bestrichene Compresse oder ein leichtes Kräuterkissen aufgelegt werden soll.

Im sogenannten Eiterungsmomente, und wenn Geschwüre auf der *Cornea* sich zeigen, ist das täglich ein- oder zweimalige Einstreichen des *Sydenh. Laudan.* in das leidende Auge von wesentlichem Nutzen. **)

Ver-

---

*) Hierzu ist die von Saunders empfohlene Solution des *Zinc. sulphur. gr j in Aqu. dest. ℥j,* wozu auch etwas Quittenschleim gesetzt werden kann, passend. Eben so ist folgende von Adam Schmidt (*Ophthalmolog. Biblioth.* von Himly und Ad. Schmidt, 3 Bd. 2. St. S. 107.) angegebene Mischung mit Vortheil anzuwenden: ℞. *Aquae destill. ℥x. Vitriol. alb. ℈j. Extr. saturn. ʒß. Spir. camphorat. ʒjj. M. S.* Täglich 2 bis 4 Mal das Auge damit zu reinigen. Wenn die Schleimsecretion so häufig ist, dafs die Ausspühlung mit der Solution alle 2 — 3 Stunden vorgenommen werden mufs, so soll man das Verhältnifs der Ingredienzen zum Wasser wenigstens auf die Hälfte herabsetzen. Im Gegentheil mufs in der Stärke dieses Augenwassers gestiegen werden, wenn man ältere Kinder oder gar Erwachsene behandelt. Diesem Augenwasser pflege ich gewöhnlicher Weise keinen Camphorspiritus zuzusetzen; wenigstens nicht gleich im Anfange, weil er hier, wie ich mich überzeugt habe, nicht immer wohlthätig wirkt; nur erst wenn ich den Grad der Reitzempfänglichkeit des Auges kenne, setze ich davon vorsichtig etwas hinzu.

**) Statt des *Laudanum liquidum* wenden Ware, Schmidt, Reil, Scarpa und mehrere andere, den *Batèschen liquor* an, der stark adstringirend wirkt, den Schleimausfluſs bald beschränkt und aus folgendem besteht: ℞. *Vitriol. caerulei, Boli armenae.* āā *ʒjv. Camphorae ʒj. M. f. pulv.* S. Eine Unze davon wird mit vier Pfund kochendem Wasser übergossen, vom Feuer genommen, der Läuterung überlassen und beim Gebrauch ein Quentchen von dieser Flüssigkeit mit zwei Unzen Brunnenwasser vermischt. Beer will indessen von diesem Liquor keinen Nutzen gesehen haben, und Saunders gebrauchte nie stärker adstringirende Mittel bei der *Ophthalmia neonator.* als die oben angegebene Zinksolution, oder auch eine Auflösung von 2 bis 6 Gran *Alumen* auf eine Unze *Aqu. destill.* Mit diesen beiden örtlichen Mitteln reichte

Vermindert sich nun unter dieser Behandlung der eiterförmige Schleimausfluſs immer mehr, flieſst aber dessenungeachtet noch viel dünner weiſslicher Schleim aus dem Auge, oder hat die *Conjunctiva* ein gleichsam granulirtes Ansehn, so thun die bekannten Quecksilbersalben, *) mit und ohne stiptischen Mitteln, bei Weglassung aller Augenwässer während ihrer Anwendung, ihre Dienste, und heben das Uebel meistens binnen einigen Tagen. Nachbleibende leichte Trübungen der *Cornea* gehen, wie oben schon gesagt wurde, öfters von selbst hinweg; indessen kann man die Beseitigung derselben durch vorsichtige Anwendung der Janin'schen Salbe beschleunigen.

Um ein *Ectropium* zu verhüthen, muſs man das Auge so wenig als möglich, und nur mit der gröſsten Delicatesse öffnen; niemals darf es bei Kindern geschehen, wenn sie sich eben dehnen, gähnen oder schreien. Ist nun aber eine Augenliedausstülpung schon entstanden, so reponirt man die *Palpebra*, nach Schmidt, sogleich auf folgende Weise: Nachdem man die Spitzen der Zeigefinger und Daumen beider Hände mit frischer, nicht gesalzener Butter bestrichen hat, faſst man mit diesen Fingern den Tarsus am innern und äuſsern Augenwinkel, zieht ihn langsam ein wenig in die Höhe und dann schnell nach abwärts. Ist die Geschwulst der *Conjunctiva* groſs, fest und körnigt, so müssen die Daumen mehr in der Mitte des Augenliedes auf die Geschwulst gedrückt werden, wenn die Einstülpung gelingen soll. Gelingt auch dies nicht, so muſs man das Ende der Augenentzündung abwarten und das *Ectropium* als Nachkrankheit behandeln.

So weit von den topischen Mitteln.

---

reichte er immer aus und heilte die Krankheit meistens binnen 14 Tagen oder 3 Wochen.

Stärker adstringirende Mittel, sagt er, vermehren oft den Schleimausfluſs und erneuen die Entzündung. Siehe a. a. O. pag. 49.

*) Z. B. die Janin'sche Salbe, oder einfache Mischungen aus Fett und *Merc. praec. r. etc.*

Was die allgemeine Behandlung im blennorrhoischen Stadio der Krankheit betrifft, so muſs, wenn die eitrige Schleimabsonderung Kräfte erschöpfend zu werden droht, und gesteigerte Reproductionskraft in Anspruch zu nehmen ist, *Calam. aromat.* oder *China* mit *Naphten* und *Opium* gegeben werden. Mit groſsem Vortheil hat man bei Monat alten Kindern alle vier Stunden 6 Gran *Extr. chin.* unter den Kinderbrei gemischt, angewendet.

Ich selbst habe in den letzten 6 Jahren gegen 200 Kinder an dieser Krankheit behandelt und will hier in wenig Worten mein Verfahren angeben, bei welchem ich bis jetzt eine möglichst schnelle Hülfe wahrgenommen habe, indem die gröfste gegenwärtige Gefahr bereits nach längstens 8 Tagen entfernt wurde, wenn nicht die Hornhaut schon vereitert war, oder ein bedeutendes Geschwür auf derselben diese eben zu durchbohren im Begriffe stand. Bis zum letzten Erlöschen der Entzündung vergehen freilich in den meisten Fällen 3 bis 4 Wochen. Werde ich nähmlich gleich anfangs hinzugerufen, wenn das erste Stadium noch vorhanden ist, was indessen sehr selten geschieht, so lasse ich nur selten, selbst bei den kräftigern Kindern, einen Blutigel anlegen, wohl aber gebe ich ein Purganz aus 1 bis $1\frac{1}{2}$ Gran *Calomel* und *Rad. rhei*, *Magnes. carb.* und *Sachar.* von jedem 10 bis 12 Gran. Zugleich lasse ich äuſserlich anhaltend kaltes Wasser aufschlagen. Ich gestehe indeſs, daſs ich weder Blutigel noch Umschläge von kaltem Wasser häufig anzuwenden Gelegenheit gefunden habe, weil ich nur selten ein erstes Stadium vorfand. Immer aber habe ich den Anfang der Kur mit jenem Purganz gemacht. Sobald die Schleimsecretion bereits im Gange ist, aber weder Geschwüre auf dem Augapfel, noch andere daraus hervorgegangene Destructionen zugegen sind, wende ich folgendes Augenwasser lauwarm an:

℞. *Zinc. sulphuric. gr. jj — v.*
Aquae rosar. ℥*vj — vjjj.*
Muc. g. arab. ℥ß.

M.

BOSTON MEDICAL
JUL 19 1911
LIBRARY.

Es kommt jetzt alles darauf an, wie dieses Mittel gebraucht wird; ich lasse damit so verfahren: nachdem ich mittelst eines leinenen mit warmen Wasser genetzten feinen Läppchens vorsichtig die zusammengeklebten Lieder erweicht und geöffnet habe, suche ich allen zwischen den Augenliedern befindlichen und den Augapfel bedeckenden eiterförmigen Schleim abzutupfen. Auf dieses Manöuvre kann man nicht Zeit und Sorgfalt genug verwenden. Sobald der Schleim möglichst entfernt ist, bringe ich einige Tropfen des obigen Augenwassers zwischen die Augenlieder, bewege dieselben so, dafs sie sich bald öffnen bald schliefsen, worauf sich wiederum Schleim an der Augenliedspalte zeigt, welcher mit jenem feuchtwarmen leinenen Läppchen abgetupft werden mufs. Auf dieselbe Weise bringe ich noch mehrere Male einige Tropfen des Augenwassers zwischen die Lieder und entferne dadurch den angesammelten Schleim. Letzterer mufs durchaus beseitigt werden, weil er es ist, welcher caustisch auf den Organismus des Augapfels einwirkt und Geschwüre der Hornhaut veranlafst, welche dieselbe durchbohren und eben dadurch zur Vernichtung des Gesichts wesentlich beitragen. Die Angehörigen, welche dieses Manöuvre nun gelernt haben, wiederhohlen dasselbe nach Maafsgabe der Heftigkeit der *Blennorrhoe* 6 bis 8 bis 10 Mal am Tage und 2 bis 3 Mal des Nachts. Ist nun dadurch die Schleimsecretion vermindert worden, oder sind gleich anfangs Geschwüre auf der Hornhaut bemerkbar, so nehme ich sogleich zu folgendem Augenwasser meine Zuflucht:

℞. *Zinc. sulphuric. gr. jjj — vj.*
Aquae rosarum ℥*vj — vjjj.*
Muc. g. arabici ℥ß.
Acet. saturn. ℥ß — ℈*jj.*

M.

Wendet man dieses Wasser nun wie das vorige an, so ist schon nach einigen Tagen alle Gefahr verschwunden; die Schleimabsonderung mindert sich und schon nach 8 bis 10 Tagen verliert der Schleim die Dicke und milchartige Farbe, und wird dünner und durchsichti-

ger. Zugleich wende ich örtlich gleich anfangs trockne warme leinene Compressen an, welche ich später in trockne gewärmte aromatische Kräuterkissen umwandle und endlich Camphor hinzusetze, welcher letztere bei schwächlichen schlaffen Individuen schon früher angezeigt ist. Ist die *Blennorrhoe* äufserst heftig, und mindert sie sich nach 5 tägiger Anwendung dieser Mittel nicht bedeutend, so ist ein nochmaliges Purganz aus *Calomel* und Rhabarber an seinem Platze. Hat sich nun nach und nach die Schleimabsonderung vermindert, ist die gröfste Gefahr entfernt, erscheint aber die Bindehaut der Augenlieder noch bedeutend sammetartig angeschwollen, so setze ich obigem Augenwasser eine Drachma und mehr *Laudan. liquidum Sydenhami* zu. Ist das Kind sehr schwächlich und neigt es sich zur *Atrophie*, was gar nicht selten ist, so gebe ich nach Umständen gleich im Anfange des 2ten Stadii, oder erst später, folgende Mixtur:

℞. *Extr. chinae* ℈jj — ʒj
Aquae cinnamom.
Syr. cort. aurantior. āā ʒj
Rae rhei aq. ʒj

M. S. Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu geben: und setze dazu einige Tropfen *Spirit. nitrico aeth.* oder lasse diesen weg, wenn das Kind gar zu zart und sensibel zu sein scheint. Ueberhaupt mufs man auf die Constitution der Kleinen sehr Rücksicht nehmen, denn so z. B. ist bei den eingefallenen greisenartigen Gesichtern letzteres Mittel in Verbindung mit dem *Liq. terr. fol. tart.* ʒjj bis ʒjjj gleich anfangs angezeigt. Es ist bei diesem ganzen Verfahren durchaus nöthig, auch die äufsern Verhältnisse des Kindes zu berücksichtigen, vor allen aber sehe man dahin, dafs das Kind nicht parterre oder feucht wohne, bringe es vielmehr in eine reine, trockne und warme Wohnung, bade dasselbe täglich und bedenke, dafs man die Reinlichkeit überhaupt hier nicht zu weit treiben kann. Dafs auch die Mutter oder die Amme sorgfältig zu berücksichtigen ist, wenn das Kind die Brust erhält, versteht sich von selbst.

Ist nun die ganze Entzündung bis auf ein unbedeutendes Zusammenkleben der Lieder verschwunden, und entdecke ich Trübungen der Hornhaut oder geheilte Geschwüre, welche, weil sie immer eine nubekulöse Peripherie haben, die Durchsichtigkeit der Hornhaut mehr oder weniger beeinträchtigen, so lasse ich täglich zwei Mal von folgender Salbe einen Stecknadelkopf grofs zwischen die Augenlieder auf die *Cornea* bringen:

℞. *Hydr. oxyd. rubr. gr. jß — jj*
Boli armen.
Flor. zinci ää *gr. jjj.*
Axung. porcin. ʒj
M. exactissime.

Entdecke ich endlich noch saroomatöse Anwulstungen der *Conjunctiva*, so füge ich dieser Salbe ♈ß — ♈j. *Laudan. liquid. Syd.* hinzu.

Das reine Gerstenkorn. *Hordeolum, Crithe.* (*Κριθη.*)

Selten ist diese beschränkte, gewöhnlich in einer Meibomschen Drüse, oft aber auch nur im Zellgewebe ihren Sitz habende Entzündung, rein; denn meistens mischt sie sich mit dyscrasischen Krankheiten, vorzüglich mit Scrofeln.

Im ersten Zeitraume entwickelt sich unter Spannung und heftigem Jucken an einem Augenliedrande eine kleine beschränkte Entzündungsbeule, welche, bei Zunahme ihrer Gröfse, die Bewegung des Augenliedes hindert und gegen Ende des jetzigen Zeitraumes dunkelroth, hart und noch empfindlicher wird. Die Geschwulst ist mehr rund oder bohnenförmig und im letztern Falle am gröfsesten, aber immer gleichmäfsig erhoben und glänzend. Die Augenlieder verkleben über Nacht mehr oder weniger.

Im zweiten Zeitraume nimmt die Röthe der Beule schnell zu, wird braunroth; die Geschwulst wird unter dem Gefühle einer Schwere im Augenliede conisch, zeigt an der Spitze einen gelblich rothen, weichen

Punkt, welcher sich öffnet, Eiter heraus läfst und dann mit der ganzen Beule sogleich, oder nachdem dieselbe noch einige Tage geeitert hat, zusammensinkt, und unter Bildung einer guten Narbe heilt. Das Gerstenkorn verläuft zuweilen sehr schnell und acut, so dafs sich der Uebergang in Eiterung oft schon nach 24 Stunden zeigt, und dann ist der Eiter gelblich und dicklich, meistentheils aber bedarf diese Entzündung einer viel längeren Zeit um in Eiterung überzugehen; denn oft mufs man Wochenlang Breiumschläge anwenden, bevor durch eine Oeffnung Eiter austritt, und in diesem Falle ist die Eitermasse dick, steif und käseartig. Diese chronische Form des Gerstenkorns hat übrigens zu Rückfällen die gröfste Neigung.

Zu den Ursachen kann man aufser äufserlichen Verletzungen, besonders den gröbern Staub rechnen, defshalb findet man das Uebel nicht selten bei Strafsenarbeitern, Steinmetzgern und ähnlichen Leuten. Wirken solche Ursachen öfter auf das Augenlied ein, so entsteht eine Geneigtheit zu Recidiven, die endlich nicht mehr von solchen äufsern Schädlichkeiten, sondern von im Körper gegenwärtigen und nach den Augen gelockten Dyscrasien unterhalten wird.

Hr. Prof. Beer fand das Uebel immer nur bei schmutzigen Säufern von derben Constitutionen; jedoch ist ein auf solche Weise entstandenes Gerstenkorn nicht immer rein zu nennen.

Meidet der Kranke die veranlassenden Schädlichkeiten, so läfst sich die Krankheit meistens schon im ersten Zeitraume zertheilen.

Werden die Schädlichkeiten im zweiten Zeitraume nicht entfernt, so geräth die Eiterung leicht ins Stocken, und es bleibt eine harte, unempfindliche, ovale, kaum geröthete Geschwulst zurück, die Hagelkorn, *Chalazion, Grando, Lythyasis, Tophus, Porosis etc.* genannt wird.

Um die kleine Entzündung im ersten Zeitraume zu zertheilen, schlage man öfters, mit kaltem Wasser oder *Oxycrat* befeuchtete leinene Lappen auf das Auge, oder bediene sich der oft schnell helfenden Eisumschläge.

Im zweiten Zeitraume befördere man die Eiterung durch Breiumschläge von Semmelkrumen in Milch gekocht und mit vielem Safran gemischt; auch Umschläge aus gebratenen Aepfeln, u. s. w. sind zweckmäfsig. Der Abscefs wird sich bald von selbst öffnen und nachdem man hernach ein wenig *Empl. diachyl. comp.* aufgelegt hat, weicht das Uebel in kurzer Zeit. Uebrigens ist zu bemerken, dafs der Arzt, ehe er den Abscefs zuheilt, zuvor alle Härte, welche um die Geschwulst fühlbar war, schmelzen müsse, damit sich kein Hagelkorn ausbildet und die Neigung zu Rückfällen erlöscht, welche durch solche zurückbleibende Härte gar leicht bedingt wird. Um überhaupt die öftern Recidive zu verhüthen, empfiehlt Benedict (Handbuch der prakt. Augenheilkunde 1. Bd. pag. 227.) einige Tage hindurch den Gebrauch des *Calomel* in kleinen Dosen, oder statt dessen den *Aethiop. antimon.* welche beiden Mittel ich früher schon, besonders dann mit Erfolg angewendet habe, wenn scrofulöse Anlage oder ausgebildete Scrofelkrankheit im Körper vorhanden war. Aeufserlich empfiehlt derselbe den längern Gebrauch folgender Salbe ℞. *Hydr. oxyd. rubr. subt. trit. gr. vj, Plumb. acetic., Aerug. crystallisat.* āā *gr. jj, Boli albi gr. jv, Butyr. rec. ins.* ʒjjj. *M. exactissime f. ungt. S.* Eintäglich oder zweitäglich einmal anzuwenden.

Die reine rosenartige Nasenwinkelgeschwulst, *Anchylops erysipelatosa*, besser *Ancylops*, [*αγχυλη*, Winkel und *ωψ*, Gesicht, Auge.]

Nicht selten wird diese Krankheit mit einer Entzündung des Thränensackes verwechselt.

Symptome des ersten Zeitraumes. — Diese Entzündung hat alle an dieser Stelle möglichen charakteristischen Merkmale, welche die reine rosenartige Augenliederentzündung zeigt, und erstreckt sich selbst auch nicht selten, mehr oder weniger, über die Augenlieder. Da die Entzündung auch die Thränenwärzchen und

Thränenkanäle ergreift, so ist die Aufsaugung der Thränen zugleich aufgehoben und die Thränenwärzchen sind eingeschrumpft. So lange der Thränensack nicht mit leidet, ist die Geschwulst im Nasenwinkel nicht beträchtlich hart; leidet dieser aber, so fühlt man bei genauerer Untersuchung unter der rosenartigen Entzündung, eine bohnenförmige harte Erhabenheit, die sich zuweilen sogar durch eine hervorstechende Röthe auszeichnet, welches aber dennoch nur eine heftige Entzündung in der vordern Wand des Thränensackes ankündigt. Die Thränenpunkte sind dann gänzlich geschlossen, die Thränenwärzchen eingeschrumpft, die Nasenhälfte der leidenden Seite trokken und ungewöhnlich empfindlich; so dafs ein geringer Reitz heftiges Niesen erregt.

Symptome des zweiten Zeitraumes. — Auch hier treten die Haupterscheinungen des zweiten Zeitraumes der reinen erysipelatösen Augenliederentzündung ein. Die Thränen werden jetzt wieder aufgesogen und die Thränenkarunkel sondert vielen Schleim ab, von welchem sie ganz bedeckt erscheint. Auch im Thränensacke geht zuweilen eine Absonderung von Schleim vor sich, den man durch geringen Druck, sowohl durch die Thränenpunkte, als durch die Nase ausdrücken kann.

Hatte der Entzündungsproceſs sehr stark auf die Thränenwärzchen und Thränenkanälchen eingegriffen, so tritt im jetzigen Zeitraume keine Aufsaugung der Thränen ein, sondern es bleibt ein, durch Atonie dieser Gebilde bedingtes Thränenträufen, *Stillicidium lacrymarum*, oft noch lange zurück. War im erstern Zeitraume der Thränensack sehr entzündet, so stellt sich im zweiten Zeitraume, wenigstens eine sehr bedeutende Schleimansammlung in demselben ein; dieser Schleim läfst sich weder durch die Thränenpunkte noch durch den Nasenkanal ausleeren, sondern die äufsere Eiterung dringt immer tiefer, und durchlöchert endlich, vorzüglich bei Vernachlässigung der Krankheit, die vordere Wand des Thränensackes, und bildet einen Zustand, welchen Hr. Prof. Beer eine unächte

Thränensackfistel nennt, weil der Eiter nicht in dem Thränensack selbst erzeugt worden ist und sich aus demselben einen fistulösen Ausgang bahnte; sondern weil sich umgekehrt der Eiter von aufsen erst nach innen in den Thränensack ergossen hat. Abscesse, welche nicht in den Thränensack dringen, sondern nur in der Karunkel u. s. w. ihren Sitz haben, nennt Beer einfaches Nasenwinkelgeschwür, *Aegylops simplex*, und unterscheidet die unächte Thränensackfistel davon, theils durch die Sonde, theils durch den bei dem geringsten Druck herausfliessenden Schleim und Eiter, der bei der ebengenannten Fistel, meistens mit unvermischt beigemengten Thränen erscheint, theils auch durch die Menge des herausquellenden Fluidums, welche bei einem *Aegylops simplex* weit geringer ist.

Aetiologie. — Starkes Weinen bei vulnerablem Hautorgan *) und nachherige Aussetzung einer kalten Zugluft, ist öfters an Entstehung dieser Krankheitsform Schuld. Uebrigens sind die Ursachen einer erysipelatösen Augenliederentzündung, auch diejenigen unserer vorhabenden Krankheit.

Prognose im ersten Zeitraume. — Sobald die Krankheit einfach ist und nicht mifshandelt wird, so ist hier die Vorhersage sehr gut; denn es wird höchstens ein, durch Atonie der Thränenwärzchen verursachtes, vorübergehendes Thränenträufeln zurückbleiben, welches in der kalten Luft am fühlbarsten sein wird. Ist aber der Thränensack mit entzündet, so ist die Prognose weit ungünstiger; denn dann entsteht oft Durchbohrung der vordern Wand des Thränensackes, und bei einer unaufmerksamen Behandlung, kann leicht eine *Blennorrhoe* desselben zurückbleiben.

Prognose im zweiten Zeitraume. — So lange die

---

*) Menschen, vorzüglich blonde, welche eine feine, zartgespannte, röthlich glänzende Haut haben, bei denen die Wangen von feinen Blutgefäfsen strotzen, sind nach Ad. Schmidt mit einem vulnerablen Hautorgan begabt. Solche Subjecte werden leicht roth, sind zu *Erysipelas* geneigt und vertragen selten fette Salben.

Eiterung nur oberflächlich ist, bleibt die Vorhersage günstig; ungünstiger wird sie, wenn sich ein Abscefs bildet, und am ungünstigsten, wenn schon eine unächte Thränensackfistel erzeugt worden ist, denn dann können aufser dem Zurückbleiben einer hartnäckigen *Blennorrhoe* auch die Thränenkanälchen gänzlich vernichtet, und ein unheilbares Thränenträufeln erzeugt werden.

Im letztern Falle mufs man die Schleimhaut des Thränensackes zerstören und so zu sagen den ganzen Thränensack vernichten, um mit Gewifsheit einer andern Nachkrankheit des Thränensackes vorzubeugen, die man Thränensackwassersucht, *Hydrops sacci lacrymalis* nennt.

Heilung. — Im ersten Zeitraume sind Umschläge von kaltem Wasser und Genufs der kalten frischen Luft, die besten Heilmittel.

Im zweiten Zeitraume kommt die Heilung ganz mit der des zweiten Zeitraumes der rosenartigen Augenliederentzündung, überein; nur mufs, wenn der Thränensack mit leidet, auf diesen Rücksicht genommen werden. Bildet sich daher ein Abscefs, so mufs man ihn durch Breiumschläge schnell zur Reife bringen und dann nie auf Selbstöffnung warten, sondern ihn, sobald *Fluctuation* zu fühlen, sogleich öffnen, weil dadurch die Durchfressung des Thränensacks am besten verhüthet wird. Ist letzteres aber schon geschehen, so darf der Arzt so wenig als möglich sondiren; höchstens täglich einmal mit der Anellschen Spritze vermittelst lauwarmen Wassers mit etwas *Laudanum* den Abscefs reinigen, und nur im vordern Theile der Wunde etwas mit *Laudanum* getränkte Charpie behuthsam einschieben, damit die Oeffnung des Thränensackes im Zuheilen nicht gehindert werde.

Nicht immer aber ist der Heerd der Entzündung unmittelbar über dem Thränensacke, zuweilen vielmehr etwas oberhalb desselben; dessen ohngeachtet ist dieser Fall nicht minder wichtig und mufs im 2ten Stadio eben so vorsichtig behandelt werden, denn wird er vernachlässigt oder unrichtig behandelt, öffnet man den entstandenen Abscefs nicht bald, und erhält man die

gemachte Oeffnung bis zur gänzlichen Heilung nicht offen, so dringt der Eiter hier zwar nicht leicht durch die vordere Wand des Thränensackes, wohl aber oberhalb desselben in die Orbita hinein. Im schlimmsten Falle wird dann die Knochenhaut gleichsam durchfressen, und einer oder der andere, oder mehrere Knochen der Orbita werden cariös. Man entdeckt die cariöse Stelle theils mit der silbernen Sonde, theils aus dem Hervorsprofsen von rothen, leicht blutenden, bei der Berührung sehr schmerzhaften Fleischschwämmchen, welche sich zuweilen an der Oeffnung des Fistelkanals zeigen. Solche Fälle sind, obgleich nicht besonders gefährlich, doch in der Regel höchst langwierig und erfordern eine sehr sorgfältige Behandlung. Die tiefe Lage des Knochenfrafses, so wie die Nähe des Augapfels und die Enge des ganzen Fistelkanals, behindern den Arzt nicht selten, die nöthigen örtlichen Mittel anzuwenden. Ueberläfst man die Beseitigung der *Caries* der kärglichen Eiterung allein, so kann, wenn die cariöse Stelle zolltief liegt, der Abstofsungsprocefs 6 bis 10 Monate dauern.

Ist ein solch unangenehmer Zustand einmal vorhanden, so wird es vor allen nöthig, die äufsere Oeffnung nach Möglichkeit zu erweitern, den überflüssigen Eiter täglich einmal mittelst eines filtrirten *Infus. hbae ruthae* mit etwas *Laudanum liquidum* gemischt, sanft auszuspritzen und hierauf bis auf den Grund des Fistelkanals eine Wike einzuschieben, welche mit einem Gemisch von einem Theile *Ra asae foetidae* und zwei Theilen *Liquamen myrrhae* befeuchtet worden ist. Schneller noch stöfst sich die kleine cariöse Knochenparthie ab, wenn man im Stande ist von folgender Masse etwas auf den Grund des Fistelganges zu bringen:

℞. *Asae foetidae*
Gummi myrrhae
Terebinthinae venetae āā ℈j
Olei sabinae gtt. v — vjjj.
M.

Verengen Fleischwucherungen den Kanal, so kann man diese durch vorsichtige Anwendung des Höllen-

steins, oder des rothen Quecksilberpräcipitats, beseitigen; von letzterem können hier auch einige Grane jener Masse beigemischt werden. Sobald die *Caries* auf diese Weise entfernt worden, was mittelst der Sonde wahrgenommen wird, legt man noch eine Zeitlang mit *Laudanum liquid.* S. benetzte Wiken nicht tief ein, worauf dann gemeiniglich die Fistel von selbst heilt, indem sie nichts als eine kleine Vertiefung im innern Augenwinkel hinterläfst. Ich habe diesen Zufall so genau beschrieben, weil man bisher gar wenig davon gesagt hat.

Von den Wunden der Augengegend und der Augenlieder.

Diese müssen mit der gröfsten Aufmerksamkeit behandelt werden, weil sie sonst nicht nur unheilbare Fehler der Form der verletzten Theile hinterlassen können, sondern auch selbst die Function der *Retina* zu stöhren oder gar ganz aufzuheben im Stande sind.

Horizontale Hautwunden an der Stirn, wenn sie nicht sehr weit von den Augenbraunen entfernt, und von ansehnlicher Länge sind, müssen schnell auf das sorgfältigste vereinigt werden, wenn sich nicht die Haut der Augenbraunen senken, und nicht eine, wenigstens die Harmonie der Gesichtszüge sehr unangenehm stöhrende, Verlängerung der allgemeinen Decken des obern Augenliedes, oder wohl gar ein merklicher Vorfall desselben (*Blepharoptosis*) erfolgen soll. Ist die Wunde sehr grofs, hat der Verwundete die Gewohnheit, seine Stirn oft zu falten, und ist die Haut überhaupt schon etwas schlaff, so darf man sich auf die trockne Nath allein nicht verlassen, sondern mufs die Wunde sogleich, wenigstens mit ein Paar blutigen Heften, vereinigen; dabei aber zugleich auch trockne Hefte und einen zweckmäfsigen Verband anlegen.

Perpendiculaire Hautwunden der Stirn, erfordern nur die trockne Nath und eine vereinigende Binde.

Schiefe Hautschnittwunden der Stirn, erfordern

nach ihrer Richtung, bald nur die trockne, bald aber auch die blutige Nath.

Bei allen einfachen Hautwunden der Stirn mufs man Entzündung und Eiterung verhüthen, denn beides verzögert die Heilung; auch kann die vorher gute Eiterung gar leicht in eine gauchige übergehen, wodurch dann oft, nachdem Substanzverlust verursacht worden, ein *Ectropium* des obern Augenliedes, oder wohl gar ein Unvermögen, die Augenlieder völlig zu schliefsen, das heifst: eine Verkürzung des ganzen Augenliedes, ein Hasenauge, *Lagophthalmos*, herbeigeführt wird.

Wenn der Knochen zugleich verletzt und gesplittert wurde, so kann man die Wunde freilich nicht durch schnelle Vereinigung heilen; sind die Knochen aber nur durch einfache Hiebe verletzt worden, so ist diese wenigstens zu versuchen. — Einfache Quetschungen der Stirngegend erheischen bei ihrer Heilung dieselben Mittel, welche diese auch an andern Orten des Körpers nothwendig machen; daher anfangs Umschläge von kaltem Wasser mit etwas Bleiessig, später etwas Zusatz von Wein oder Weingeist. Sind aber solche Quetschungen so bedeutend, dafs die weichen Theile ganz zermalmt erscheinen, so wird es oft gut sein, die zermalmte Parthie gänzlich loszutrennen und die Wunde in eine einfache Schnittwunde zu verwandeln, wo dann diese als einfache Wunde mit Substanzverlust zu behandeln ist. Bei allen heftigen Quetschungen der Stirn, welche immer mit Gehirnerschütterung verbunden sind, ist es nach vorausgeschickter Blutentziehung nothwendig, längere Zeit hindurch gelind abführende antiphlogistische Mittel nehmen zu lassen und für täglich drei- bis viermalige Leibesöffnung zu sorgen.

Die Prognose jener Hautschnittwunden der Stirn, ist bei folgsamen, ruhigen Menschen günstig; wird aber um so ungünstiger, je mehr die Wunde vernachläfsigt wurde, und je unfolgsamer der Kranke ist, denn leicht kann der Stirnnerve verletzt sein und eine darauf erfolgende schlechte Eiterung, nach der Vernarbung, amaurotische Gesichtsschwäche, oder wohl gar völlige

Amaurosis hervorbringen, wobei dann die Pupille entweder ungewöhnlich erweitert oder verengert ist.

Prof. Beer schreibt solche amaurotische Gesichtsschwäche, oder *Amaurosis* selbst, der durch die schlechte Narbe verursachten Zerrung und Spannung der Verästlungen des Stirnnerven zu, und heilt sie durch kühne, bis zum Knochen dringende Einschnitte, in der Gegend des obern Augengrubenloches.

Diese Gattung der Amaurose kommt bei nicht bedeutenden Verwundungen oft erst dann vor, wenn die Wunde völlig vernarbt ist; bei beträchtlichern Verletzungen hingegen, kann sie sich auch gleich nach derselben einfinden, was nicht immer von einer Zerreifsung des Stirnnerven, sondern von einer Erschütterung der innern Gebilde des Auges, oder von einer Zerreifsung der *Retina* herzuleiten ist.

Dafs die amaurotische Blindheit einer, durch Erschütterung gesetzten, Schwäche des Auges zuzuschreiben sei, wird man erkennen, wenn in der Gegend der Verästlungen des Stirnnerven keine beträchtliche Quetschung und Zerreifsung statt findet, und wenn die *Iris* des halb oder ganz blinden Auges, vollkommen starr und in einem hohen Grade ausgedehnt, folglich die Pupille sehr verengert ist. — Findet man aber überdiefs ein Blutextravasat in den Augenkammern, oder auch ohne dasselbe blos einen tiefgreifenden, drückenden Schmerz im ganzen Auge, und einen solchen Grad von Empfindlichkeit, dafs der Augapfel nicht die leiseste Berührung erträgt, und ist zugleich das Sehvermögen selbst, bis auf die geringste Lichtempfindung vollkommen aufgehoben; so wird man sich nicht irren, wenn man eine wirkliche Zerreifsung der Markhaut angiebt, und eine unheilbare Blindheit prognosticirt. — Ganz anders verhält sich's mit den Erscheinungen im Auge, wenn nur eine Quetschung, Zerrung und unvollkommne Zerreifsung der gröfsern Verästlungen des Stirnnerven, die Amaurose augenblicklich erzeugt hat; denn wenn auch das Auge blind ist, so behält es, in einem solchen Falle, dennoch eine mehr oder weniger deutliche Lichtempfindung, und obgleich die Regenbo-

genhaut ebenfalls starr ist, so findet man doch die Pupille nicht nur ganz ungewöhnlich erweitert, sondern die *Iris* auch gegen die Winkel der Augenlieder zu, viel schmäler, als nach oben und unten, so zwar, dafs die Pupille jener der wiederkäuenden Thiere ähnlich sieht und der Pupillarrand der Regenbogenhaut nach rückwärts so umgelegt erscheint, dafs man nichts mehr von dem kleinen Ringe der Regenbogenhaut gewahr wird.

Ist die Amaurose das Produkt einer Quetschung und Zerreifsung des Stirnnerven zugleich, so werden sich auch die so eben aufgezählten charakteristischen Merkmale vereinigt vorfinden; nur wird die Regenbogenhaut beinahe, oder völlig verschwunden sein.

Aus dem Gesagten geht nun hervor, dafs die, nach Verletzungen der Augenbraunen entstehende Amaurose, sich auf vierfache Art bilden kann, nähmlich erstens: Durch eine gewaltsame Zerrung und Spannung der gröfsern Verästlungen des Stirnnerven, wo sie einzig und allein die Folge einer schlechten Narbenbildung ist: in diesem Falle entwickelt sich der schwarze Staar entweder schon während der Gestaltung der Narbe, oder erst nach vollendeter Vernarbung; — Zweitens durch blofse Erschütterung, oder wirkliche Zerreifsung der Markhaut, und durch Verrückung und Verschiebung mehrerer anderer innerer Gebilde des Augapfels. In beiden Arten zeigt sich die Blindheit auf der Stelle nach der Verwundung; nur in der erstern erscheint sie mehr als blofse amaurotische Gesichtsschwäche, in der zweiten aber immer als vollkommne Amaurose; — Drittens durch Quetschung und unvollkommne Zerreifsung der Verästlungen des Stirnnerven. Auch hier folgt amaurotische Gesichtsschwäche, seltener volle Amaurose auf dem Fufse nach, doch niemals so schnell, wie im vorhergegangenen Falle; — endlich Viertens: Durch heftige Erschütterung des Augapfels und seiner Umgebungen, und Quetschung und Zerreifsung des Stirnnerven zugleich; hier entsteht die amaurotische Blindheit schon im Momente der Verletzung.

Wunden der Schläfegegend sind dem Gesichte, den bisherigen Beobachtungen zufolge, nicht eben nachtheilig, und müssen nach den allgemeinen Regeln der Chirurgie behandelt werden.

Verwundungen der untern Augengegend können ebenfalls nicht nur amaurotische Amblyopie, sondern auch vollkommne Amaurose zurücklassen, wenn nähmlich der *nervus infraorbitalis* verletzt worden und die nachfolgende unförmliche Narbe die Verästlungen desselben drückt und zerrt. So führt unter andern Arnemann (dessen Magazin 1. B. 1. H. S. 98.) ein Beispiel davon an; indessen ereignen sich solche Fälle hier viel seltener als bei Verletzungen in der Supraorbitalgegend, und zwar wohl hauptsächlich defswegen, weil der Infraorbitalnerve vor äufsern Verletzungen weit mehr geschützt liegt.

Weit gefährlicher aber sind Wunden und darauf folgende Eiterungen in der Unteraugenhöhlengegend für die Form des untern Augenliedes, denn diese können durch die entstehende Zusammenziehung der Geschwürränder bei der folgenden Vernarbung leicht *Ectropia palpebrae inferioris* verursachen, weswegen es hier unerläfslich ist, durch gute Heftpflasterstreifen die Augenlieder zu schliefsen und das untere möglichst ausgedehnt zu erhalten, wodurch die Zusammenziehung der Geschwürränder noch am besten verhüthet wird.

Auch bildet sich bei Vernachlässigung dieser Wunden der untern Augengegend oft ein *Lagophthalmus* aus.

Die Vorhersage darf bei allen dergleichen Verwundungen nur mit der gröfsten Vorsicht gestellt werden, und so lange als die Gröfse der Wunde noch nicht völlig untersucht ist, mufs man sich aller Voraussage enthalten. Ist die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit der Wunde nun wirklich erkannt, so darf man auch dann nur mit der gröfsten Umsicht seine Prognose stellen.

Sehr heftige Verletzungen der obern Augengegend sind um so bedenklicher, je mehr die Verwundung auf den Stirnknochen selbst eingreift, und je gröfser die

damit

damit verbundene Erschütterung war; denn wirklich entwickeln sich zuweilen nach dergleichen Verwundungen solche Erscheinungen, die mehr für das Leben, als für das Auge des Beschädigten fürchten lassen. War die Verletzung mit sehr grofser Gewalt verbunden, so zeigt diese ihren nachtheiligen Einflufs gewöhnlich nicht allein auf das Auge der verletzten Seite, sondern auf beide Augen zugleich durch amaurotische Amblyopie, welche durch eine gewaltsame Erschütterung der vordern Gegend des Gehirns und einer Atonie der beiden Sehnerven gesetzt zu sein scheint.

Auch hier mufs man in der Vorhersage vorsichtig sein, weil oft die entstandene Blindheit zeitlebens bleibt. — Ist die Amaurose sehr schnell seit Verlezzung der Stirn entstanden, hat sie aber nach dieser Zeit weder merklich zu- noch abgenommen, klagt der Kranke niemals über Kopfschmerz in der Augenbraunengegend, ist das Auge dabei hell, klar und lebhaft, und hat keine der Geistesfähigkeiten gelitten, dann hat man gegründete Hoffnung, das Gesicht allmählich vollkommen wieder herzustellen. —

Nimmt aber die amaurotische Gesichtsschwäche immer zu; sind die Augen dabei gegen das Licht empfindlich; klagt der Kranke über heftigen dauernden Kopfschmerz in der Augenbraunengegend; haben seine Geistesfähigkeiten gelitten, so hüthe man sich wohl, eine günstige Prognose zu stellen, denn hier bildet sich oft nicht nur eine vollkommne Amaurose aus, sondern es erscheinen zuweilen wohl auch lebensgefährliche Folgen.

Die intensiv grofsen Verletzungen der Augenbraunen sind oft gefährlich, vorzüglich wenn der Supraorbitalnerve zerrissen und gezerrt worden, und wenn mit der Verwundung eine starke Hirnerschütterung verbunden war. Oft bleibt auch eine Atonie des Aufhebers des obern Augenliedes, *Atoniatonblepharon*, oder eine wirkliche Paralyse dieses Muskels, *Blepharoptosis paralytica*, *Blepharoplegia*, oder gar eine wirkliche Lähmung der Augapfelmuskeln, und ein davon bedingter

Vorfall des Augapfels, *Ophthalmoptosis paralytica*, oder *Ophthalmoplegia* zurück.

Da fast alle dergleichen sehr heftige Verletzungen mehr oder weniger mit Substanzverlust verbunden sind, und also selten *per primam intentionem* geheilt werden können, so mufs der Arzt die erfolgende Entzündung so leiten, dafs das Verlohrengegangene recht schnell durch eine gute Eiterung reproducirt werde; defswegen entferne er die etwa vorhandenen Knochensplitter und halte, wenn der Verwundete übrigens kräftiger Natur ist und keine Quetschungen und Blutunterlaufungen zugegen sind, durch warme erweichende leichte Umschläge, die schädlichen Aufsendinge von der Wunde ab. Sind hingegen Quetschungen und Blutextravasate mit der Wunde complicirt, ist der Kranke alt und fehlen ihm die Kräfte, welche zur guten Eiterproduction gehören, oder ist er zu den schlaffen schwächlichen Subjecten zu rechnen, so bediene sich der Arzt anstatt der erweichenden Umschläge, vielmehr warmer aromatischer weinigter Umschläge, wozu z. B., vorzüglich gleich nach geschehener Verletzung, folgende von *Le Febure* bei Sugillationen der Augenlieder empfohlene Mischung mit Vortheil anzuwenden ist: ℞. *Sal. ammoniac. depur.* ʒß. *Aquae destill.* ℥vjjj. *Spir. vin. rect.* ʒjj. *M. solvendo.*

Wenn eine amaurotische Gesichtsschwäche, von einer leichten Erschütterung des Auges entstanden ist, so wird diese, wenn sie nach den Regeln der Chirurgie gehörig behandelt worden, von selbst nach und nach verschwinden. War aber mit der Erschütterung des Auges eine, wenn auch nur geringe Zerreifsung der Markhaut, oder Verschiebung anderer innerer Gebilde des Auges verbunden, so wird, auch selbst bei der sorgfältigsten Behandlung der verletzten Stelle, die Amaurose nicht verschwinden. — Ist die Blindheit blos von einer Verletzung des Stirnnerven bedingt, so mufs man, gleich nach geschehener Verwundung, durch einen Einschnitt bis auf den Knochen, alle Aeste des Stirnnerven durchschneiden; denn nicht immer wird die Operation einen heilenden Erfolg haben, wenn man

sie erst nach Vernarbung der Wunde, und nach vermehrter und veralteter Amaurose anstellt. Auch mir half hier das bloſse Einschneiden bis auf den Knochen nichts, wohl aber kehrte in einem Falle das Gesicht fast gänzlich zurück, nachdem ich die vorhandene Narbe vollständig ausgeschnitten hatte.

Wenn eine bloſse Atonie der Retina den Grund der gegenwärtigen Amaurose ausmacht, so muſs die Krankheit als Localübel behandelt werden, was unter der Abtheilung des schwarzen Staares weitläuftiger auseinander gesetzt werden soll.

Sind nach bedeutenden Verletzungen der Augenbraunengegend, Miſsformen des obern Augenliedes zurückgeblieben, und ist die Wunde schon völlig und schlecht vernarbt, so sind gewöhnlich diese Fehler völlig unheilbar; nur wenn man einen solchen Fehler noch vor vollendeter Vernarbung voraussieht, kann man ihm öfters vorbeugen.

Was nun die Wunden und Quetschungen des innern Augenwinkels und des Thränensackes betrifft, so bemerke ich darüber folgendes: Sind die Thränenröhrchen durchschnitten, so können sie bei Vernachlässigung verwachsen oder doch fast ungangbar werden; bei Quetschungen dieser Theile geschieht dieses noch öfter. Zu den Quetschungen rechne ich auch das früher so häufig statt findende Eingehen mit Sonden in die Thränenröhrchen. Geschieht dieses öfter und mit einer rauhen Manier, so folgt nicht selten nicht nur ein unheilbares Thränenträufeln, sondern zuweilen auch eine halbe Lähmung des untern Augenliedes, worauf denn ein *Ectropium partiale palpebrae inferioris* entsteht. Schnittwunden in der Gegend des innern Augenwinkels sind meistens ohne blutige Nath zu heilen, wenn man sich nur recht sorgfältig der trocknen bedient, und das Auge selbst zugleich durch Heftpflaster verschlossen hält. Bei Quetschungen dieser Parthieen muſs man gleich anfangs kalte Umschläge von Wasser machen, stark antiphlogistisch verfahren und überhaupt alles in den ersten Tagen versuchen, um Eiterung zu verhüthen; sind aber Anzeichen zur Eite-

rung schon vorhanden, so befördere man diese schnell und suche der Wunde jede Ursache zur Langwierigkeit möglichst zu nehmen.

Wunden der Augenlieder können dieselben Krankheiten hervorbringen, welche die Verwundungen der Augenbraunen und Stirngegend verursachen; nur den amaurotischen Zustand des Auges können sie nicht erzeugen, sie müfsten denn gar sehr gemifshandelt worden sein.

Dergleichen Wunden sind entweder durchdringende oder nicht durchdringende. Die durchdringenden Verletzungen der Augenlieder lassen, wenn sie nicht vorsichtig behandelt werden, leicht eine Augenliedspalte, *Coloboma*, zurück. — Die Vorhersage ist hier sehr zweifelhaft, und zwar um so mehr, je mehr Substanzverlust damit verbunden ist, und je mehr das Auge selbst durch Druck u. s. w. gelitten hat. —

Um die nicht durchdringenden Wunden der Augenlieder zu heilen, hat man folgendes zu beobachten: Man entferne in der Wunde hängende Theile, z. B. vorliegende Stücke des Orbicularmuskels, vereinige dann die Wunde, (sie mag nun horizontal oder perpendiculär liegen) wenn sie über ein viertel Zoll lang, und am obern Augenliede ist, durch die blutige *) und trockne Nath, und pflege überhaupt den Leidenden sorgfältig, damit keine Ausstülpung, Vorfall, oder Einstülpung des Augenliedes, oder gar ein *Lagophthalmos* zurückbleibe. Man merke dabei übrigens, dafs wenn mehrere blutige Hefte anzulegen sind, man erst alle eingezogen haben mufs, bevor an das Zuknöpfen der doppelten seidenen und gewichsten Fäden zu denken ist. Die Fäden selbst müssen schon zwischen dem dritten und vierten Tag ausgezogen werden, wo dann

---

*) Selbst nur oberflächliche Hautschnittwunden des obern Augenliedes, sie mögen nun eine schiefe, horizontale, oder senkrechte Lage haben, müssen mit der Nadel geheftet werden, weil hier die gewaltsamen Bewegungen des Orbicularmuskels, die blos trockne Nath vernichten würden.

die trockne Nath bis zur gänzlichen Vernarbung der Wunde liegen bleibt.

Bei nicht durchdringenden Verletzungen des untern Augenliedes, ist die trockne Nath und ein gehöriger Verband hinreichend zur Vereinigung. Wenn nach Quetschungen des untern Augendeckels Eiterung erfolgt, so mufs derselbe während der ganzen Kur durch Heftpflaster ausgedehnt erhalten werden, wodurch noch am besten die Entstehung eines *Ectropii* verhüthet wird.

Die Behandlung der durchdringenden Wunden der Augenlieder stimmt mit derjenigen der nicht durchdringenden überein; nur wird man auch am untern Augenliede die blutige Nath öfters anlegen müssen. — *) Die Prognose ist hier sehr verschieden; günstig, wenn mit der Verwundung kein Substanzverlust verbunden ist, und der Kranke gleich Hülfe gesucht hat, denn hier wird nicht nur die Form, sondern auch der Gebrauch des Augenliedes wieder verschafft werden können; ungünstiger, wenn Substanzverlust zugegen ist, denn dann mufs sich der Kranke oft mit nur einigermaafsen hergestellter Form des Augenliedes begnügen; noch ungünstiger wird hingegen die Prognose sein, wenn der Augenliedspalt, *Coloboma*, vernachläfsigt ist, nicht gleich geheftet wurde, und die Ränder *calloes* geworden sind. Hier sieht man sich genöthigt, den calloesen Rand wegzuschneiden, um den Spalt zu vereinigen. Findet sich nun bei dergleichen Augenliedspalten noch Substanzverlust, so ist es gar nicht selten, dafs eine Vereinigung desselben nicht mehr zu Stande gebracht werden kann; dann geht das Gesicht und die Form des Auges, weil dieses vor den äufsern Einflüssen nicht mehr geschützt ist, und es nicht gehörig feucht erhalten wird, nach und nach verloren.

**) Wunden, welche die Commissuren der Augenlieder trennen und öfters ein *Ectropium* verursachen können, müssen, wo es angeht, mit einem blutigen Hefte, oder wenigstens mit einigen trocknen Heften vereinigt werden.

Palliativmittel, z. B. schleimige Augenwässer, können diese bösen Folgen nur auf kurze Zeit hindern.

Um die blutige Nath am Augenliede anzulegen und ein *Colobom* (was auch zuweilen als angebohrner Fehler beobachtet wird) zu heilen, hat man folgendes zu merken: Zuerst mufs ein Heft unmittelbar oberhalb des *Tarsus* angelegt werden, doch ohne den letztern oder die Augenliedconjunctiva zu durchstechen, *) dann erst legt man die übrigen nöthigen Hefte nach oben an. Nachdem nun trockne Hefte von englischem Pflaster, sauber zwischen die blutigen gelegt worden sind, befestigt man zuletzt die Fäden des untersten blutigen Heftes, mittelst eines Pflasters auf die Wange, diejenigen aber des obersten Heftes, auf gleiche Weise an die Stirn', damit das Augenlied durch Bewegungen die geschwinde Vereinigung so wenig als möglich verhindern könne.

Die Schwiele der Augenlieder, *Tylosis*, [*τυλόω*, ich mache Schwielen,] *Pachyblepharosis*, *Pacheablephara*, *Pachytes*.

Eine gleichförmige oder ungleichförmige, knotige, ziemlich unempfindliche, harte callöse Geschwulst der Augenliedränder, ist die Krankheit welche hier abgehandelt werden soll. Meistens kommt sie nach scrofulösen Augenliederentzündungen, die oft wiederkehren, oder mit Bleioxydhaltigen Augenwässern mifshandelt wurden, vor; indefs auch schlaffe, torpide und arthritische Subjecte sind zu dieser Krankheit geneigt. Nicht selten bemerkt man zugleich einen theilweisen oder

---

*) Dies wollen die meisten Aerzte, wie z. B. Richter, Beer, Callisens u. a. weil sie zurückbleibende Mifsstaltungen des Augenliedes fürchten; indefs hat man zuweilen (z. B. Prof. Dzondi) selbst eine feine Nadel durch den *Tarsus* geführt und auf diese Weise ohne unangenehme Folgen den Spalt, bis zur Oberfläche des *Tarsus* verheilt. Siehe dessen Geschichte des klinischen Institutes für Chirurgie und Augenheilkunde auf der Universität zu Halle. 1818. S. 157.

gänzlichen Verlust der Cilien, *Psilosis, Ptilosis*, den aber die Natur wieder ersetzen kann, weil meistens die Wurzeln der Augenliedhaare nicht gelitten haben. Sind die Augenliedränder sehr knotig und unegal, so nennen einige das Uebel auch *Trachôma*, von *Τραχοω*, ich mache uneben.

Die *Tylosis* ist in vielen Fällen sehr schwer zu heilen, vorzüglich wenn eine scrofulöse oder arthritische *Diathesis* noch nicht gehoben ist und die Krankheit bei alten Subjecten vorkommt. Werden solche Schwielen, besonders wenn sie höckricht sind, gänzlich vernachläfsigt, entzünden sie sich oft ohne sichtbare Veranlassung, und bleiben sie bis in's Alter, oder entstehen sie erst bei älteren cachectischen dyskrasischen Subjecten, welche im Schmutze und in Unreinlichkeit leben, so werden diese verhärteten Parthieen zuweilen bösartig, ja wahrhaft krebsartig, wovon ich mich durch mehrere Beispiele selbst überzeugt habe. Wenn auch die Thränenpunkte *calloes* unempfindlich, und zum Aufsaugen der Thränen unfähig geworden sind, was manchmal bei alten Leuten der Fall ist, so bleibt zuweilen, wenn auch die *Tylosis* gröfstentheils gehoben worden ist, ein Thränenträufeln, *Stillicidium lacrymarum*, zurück.

Nachdem man nun auf die Scrofeln oder *Arthritis*, oder überhaupt auf die vorhandenen Dyscrasieen, so viel als möglich Rücksicht genommen hat, so kann man, wenn kein *Oedem* der Augenlieder zugegen ist, nach Graefe *) folgenden lauwarmen Umschlag anwenden: ℞. *Pulv. hbae hyosciam. Pulv. hbae. cicutae, farin. sem. lini* āā *p. v. coq. c. suffic. q. Aquae ad consistentiam cataplasm.* — Beer **) lobt mit Recht warme Umschläge von *Cicuta*, *Saponaria* mit Camphor, welche er bei Knoten der Augenliedränder gebraucht, und so lange anwendet, bis sie röthlich und empfindlich

---

*) Repertorium augenärztlicher Heilformeln. Berlin, 1817. S. 55.

**) Lehre von den Augenkrankheiten. Wien, 1813 u. 1817. 2 Bd. S. 52.

werden. Späterhin ist die Anwendung von anfangs schwächern, nach und nach stärkern Salben mit rothem oder weifsen Praecipitat mit und ohne Camphor, (jedoch am besten ohne alle stiptische Mittel), von grofsem Nutzen, z. B.

℞. *Hydr. oxyd. rubr. subt. pulv. gr. jj.*
Extract. cicut. gr. x.
Axung. porcin. ℥j.
M. exactissime.

Man kann hierzu 2 bis 4 Gran Camphor hinzumischen lassen, wenn derselbe vertragen wird. Nach und nach mufs diese Salbe verstärkt werden.

Zeigen indefs diese Mittel keine gehörige Wirkung, so wird das *Ungt. citrinum Pharm. Edinburg.* (dessen Bereitung an einem andern Orte angegeben ist) gewifs die Heilung vollenden. Bei torpiden, unempfindlichen Subjecten, und wenn die oben angegebenen Umschläge kaum eine erhöhte Empfindlichkeit in der Schwiele hervorzubringen fähig waren, ist das Scarificiren des Augenliedrandes und gleichzeitiges Einreiben der angeführten Salben von Nutzen.

Man merke übrigens, dafs bei dieser Krankheit die anzuwendenden Salben nicht blos aufgestrichen, sondern auch sanft auf den Augenliedrand eingerieben werden müssen.

Das Hagelkorn, *Chalazion*, [*χαλαζαω, ich hagele,*] *Chalazosis, Grando, Lapis palpebrarum, Lythiasis, Tophus, Porosis.*

Ein verhärtetes, nicht in Eiterung übergegangenes Gerstenkorn, welches bald einzeln, bald mit mehreren andern verhärteten (oft auch neuen) Gerstenkörnern an den Augenliedrändern beobachtet wird und eine beschränkte runde oder bohnenförmige, bewegliche, unempfindliche und härtliche Geschwulst darstellt, nennt man *Grando, Chalazion*, und enthält diese Geschwulst eine sehr harte, feste, gleichsam steinigte Masse, so hat man sie unter den Namen *Lythiasis, Lapis palpebrarum* aufgeführt. Die Masse, aus welcher das *Cha-*

lazion besteht, ist nicht immer verhärteter Eiter, sondern zuweilen eine, mit den benachbarten Theilen organisch verbundene, knorpelartige Masse, welche man, ohne einen Fehler zu begehen, *Tylosis partialis* nennen könnte. Steinartige Massen auf der innern Fläche, besonders des untern, Augenliedes, die aber keineswegs Hagelkörner genannt zu werden verdienen, sind gar nicht selten; sie bestehen in der Regel aus kreideähnlichen, etwas festen Punkten, die dem Auge aber kaum einen Reitz zufügen, weil sie flach und von der Bindehaut bedeckt sind. Nur mechanische Mittel können sie entfernen.

Da alles was das *Hordeolum* hervorbringen und unterhalten kann, auch dem *Chalazion* günstig ist, so wird hier auch meistens scrofulöse Anlage, oder ausgebildete Scrofelkrankheit zugegen sein, welche die Prognose ungünstig macht, vorzüglich wenn mehrere Hagelkörner zugleich vorhanden, und diese mit Aetzmitteln behandelt worden sind; wo sie denn zuweilen in eine mehr oder weniger ausgebreitetere Verhärtung des Augenliedes, *Scirrhus palpebrae*, übergehen können. Auch die Hagelkörner, welche man bei alten cachectischen schmutzigen Säufern entstehen sieht, können sich bei Mifshandlung zuweilen in einen *Scirrhus palpebrae* umwandeln. *Chalazien*, mit einer ungleichen höckrigen Oberfläche, die bei Personen vorkommen, welche noch an bösartigen Drüsenverhärtungen leiden, vorzüglich bei alten Jungfern und nach dem Aufhören der *Menstruation*, können zuweilen, nachdem sie ein mifsfarbiges Ansehen bekommen haben und brennende stechende Schmerzen verursachen, in krebsartige Geschwüre übergehen.

Uebrigens ist die Vorhersage bei den *Chalazien* recht günstig, wenn nur die scrofulösen u. d. a. ursächliche Krankheitsanlagen beseitigt worden sind, und der Leidende geistige Getränke, besonders Brandwein, nicht liebt; oft ist letzterer fast allein Schuld, dafs gewöhnliche *Hordeola* in *Chalazia* übergehen. Veraltete, sehr harte, grofse und unempfindliche *Chalazia* werden seltener geheilt.

In Hinsicht der Heilung ist folgendes zu merken: Ist das Hagelkorn noch klein, liegt es unmittelbar unter den äufsern Bedeckungen, und schreitet es nicht schon in Augenliedverhärtung über, so kann man versuchen, dasselbe noch zu zertheilen. Dies geschieht entweder durch Reiben der kleinen Geschwulst zwischen den Fingern, oder durch topische Anwendung von *Bals. vitae Hoffm.* cöllnischem Wasser, Naphten mit *Opiumtinctur*, oder durch Salmiakgeist und *R. cantharid.* Nach jedesmaliger Einreibung bedeckt man das *Chalazion* mit einem Pflaster aus *Empl. diachyl. c. et Empl. cicut.* Auch ist folgende Salbe, von welcher man täglich einige Male etwas in die Geschwulst einreibt, oft sehr nützlich: ℞. *Ungt. hydrarg. cin. fort.* ʒj, *Camphorae tritae, Extr. conii macul.* āā *gr xjj M. exactssme.* Nachher wird der kranke Theil mit dem angegebenen Pflaster bedeckt. Hierauf zertheilt sich nun das Hagelkorn, oder es geht in Entzündung über, und wird dann zur Eiterung gebracht, oder es bleibt wie es war; in welchem Falle man dann, zur sichersten Hülfe, nämlich zur Operation schreiten mufs, die darin besteht, dafs, nachdem man durch einen Schnitt über die Geschwulst diese blofs gelegt hat, das *Chalazion* mit einem Häckchen faſst und ausschneidet.

Zur Heilung der bösartigen *Chalazien*, hat man früher Aetzmittel angewendet, die aber oft mehr schaden als nutzen; die Ausschneidung der Geschwulst beseitigt das Uebel zuweilen weit sicherer. Ist Brust- oder Mutterkrebs zugleich vorhanden, und hängt das Augenliedleiden offenbar mit jenen Krankheiten zusammen, so mufs das Uebel meistens als ein *Noli me tangere* betrachtet werden.

Die Verhärtung und der Krebs der Augenlieder, *Scirrhus et cancer palpebrae.*

Der *Scirrhus palpebrarum* besteht in einer umschriebenen, sehr harten, unbeweglichen, manchmal in der Farbe mit der übrigen Haut übereinkommenden, oft aber mit sichtbaren varicösen Gefäfsen verse-

henen Geschwulst des Augenliedes, die, so lange sie gutartig bleibt, völlig unschmerzhaft ist.

Gewöhnlich entstehen dergleichen Verhärtungen nach Quetschungen eines Augenliedes, nach häufigen Recidiven einer Augenliederentzündung, aus *Tylosis*, seltener aus Hagelkörnern.

Was die Heilung anbetrifft, so haben viele Augenärzte *Narcotica*, *Antimonialia*, *Mercurialia* und andere Mittel gebraucht; allein meistens ohne den geringsten Erfolg.

Beer *) betrachtet den wirklichen *Scirrhus* des Augenliedes, so lange als er gutartig ist, als ein wahres *Noli me tangere.*

Geben mechanische äufsere Ursachen Gelegenheit zu einer Entzündung der vorhandenen Augenliederverhärtung, oder entstehen auch ohne sichtbare Gelegenheitsursache bei cachectischen u. a. Subjecten, dauernde tiefgreifende lanzinirende Schmerzen in der Verhärtung, nimmt die Geschwulst zu, bilden sich immer mehr und mehr varicöse Blutgefäfse auf dem *Scirrhus* und dessen Umgebungen, wird die Haut mifsfarbig und zeigt sich endlich selbst in der *Conjunctiva bulbi* eine verdächtige varicöse livide Röthe, gesellt sich vielleicht noch Fieber dazu, so kann der Arzt die völlige Ausbildung eines verborgenen Krebses gar nicht bezweifeln.

Auch ohne vorhergegangenen *Scirrhus palpebrae* bildet sich zuweilen aus einem warzenähnlichen Auswuchs, oder aus einer harten, höckrigen, mit varicösen Gefäfsen umgebenen kleinen Geschwulst ein wirklicher Augenliedkrebs aus. Sehr häufig entsteht derselbe aus einer *Papula rebellis*, die sich auf irgend einer Stelle des Augenliedes zeigt; zuweilen sind deren gleich anfangs mehrere, vier bis sechs vorhanden, welche neben einander liegen und zu einem schnelleren Fortschreiten des Uebels beizutragen scheinen. Manchmal geht aus einer kleinen Verletzung, einem Stofs,

---

*) a. a. O. 2. Thl. 149.

Schlag oder Brandschorf die erste Veranlassung zu dem Uebel hervor, in welchem Falle es nicht immer auf einem Augenliede selbst, sondern auch mehr oder weniger entfernt von diesem, an der Stirnhaut, Schläfegegend u. s. w. anfangen kann, indem es sich erst von hier nach den Augenliedern, ja selbst nach der Wange und den übrigen Theilen der Gesichtshaut hinzuziehen im Stande ist. Uebrigens scheinen die meisten Augenliedkrebse im Anfange nur in der Haut und dem unterliegenden Zellgewebe fortzuschreiten. Allein später, wenn auf keine Art Hülfe, höchstens nur Linderung der Schmerzen geschafft werden kann, ergreift das mit harten, aufgeworfenen, halb calloesen, oft zakkenförmigen Rändern und im Grunde mit warzenförmigen Granulationen versehene Geschwür auch die tiefer gelegenen Gebilde. Der *Orbicularis*, der *Levator palpebrae superioris* verschwindet, das Fett der *Orbita* geht verlohren, die Backenmuskeln werden verzehrt, wodurch der Mundwinkel ganz schief und verzogen erscheint. Die *Maxilla superior*, die Nasenknochen, auch wohl ein Theil des Stirnbeins werden der Sonde zugängig und dem Auge sichtbar. Mittlerweile hat die *Cornea* ein cadaveröses Ansehn bekommen, und obgleich der *Bulbus* noch leidlich zu sehen vermag, so liegt er doch nicht selten schon wie ein kurz gestielter Pilz in der fettlosen Augenhöhle, bald aber schrumpft er zusammen, wird kleiner, zieht sich in den Hintergrund der Orbita zurück und endlich, nach jahrelangem, höchst schmerzhaftem Leiden, und nachdem die carcinomatösen Geschwüre nach dem Mund, nach der Schläfegegend und über die Nasenwurzel nach dem andern, bisher verschont gebliebenen Auge gekrochen sind, und fast die Hälfte der vorderen Fläche des Kopfes einem schlecht präparirten Schädel gleich geworden, macht der Tod diesen Qualen ein Ende.

Der Fortgang dieses Uebels würde viel rascher sein, wenn nicht zuweilen ein fast gänzlicher Stillstand der Krankheit einträte, welcher Wochen- und Monate lang dauern kann. Während solcher Perioden mindern sich die, besonders Abends, peinigenden,

brennenden, bohrenden oder reifsenden Schmerzen, ja, das später erst zur Krankheit kommende Fieber läfst nach.

Die Prognose ist hier natürlich sehr schlimm, und selbst die Kur, die nach den neueren Aerzten nur in der völligen Wegschneidung des verdächtigen carcinomatösen Theiles der *palpebra* besteht, ist mifslich.

Ist das Uebel noch nicht weit vorgeschritten, beschränkt es sich vielleicht nur auf einen kleinen Theil des untern Augenliedes, dann operire man nur ohne Säumen und ehe der Augapfel an der Krankheit participirt. Da das Uebel im Anfange noch in der Haut und dem unterliegenden Zellgewebe seinen Sitz hat, so ist die Operation nicht nur leicht zu verrichten, sondern hat auch einen erwünschten Erfolg. Ich habe in keinem Jahre so viele Augenliedkrebse behandelt, als im Jahre 1824. Es waren deren 11 an der Zahl, von denen bei drei Personen die Ausschneidung des Krebsartigen mit glücklichem Erfolg von mir unternommen wurde. In allen 3 Fällen befand sich das Uebel mehr oder weniger entfernt vom Augenliedrande, so dafs ich ohne Hindernifs rings um die krankhafte Parthie in gesunder Haut die Einschneidung verrichten konnte; ich faſste alsdann mittelst einer Pincette die Haut innerhalb des beschriebenen Kreisschnittes und trennte dieselbe mit dem Benedict'schen Messerchen, zur Eröffnung des Thränensackes, innerhalb des Kreises, in welchem das Krebshafte sich befand, hüthete mich aber wohl, die Schneide des Instruments unterhalb der desorganisirten Stelle zu gebrauchen, vielmehr suchte ich diese mit dem Messerstiele gleichsam abzuheben, was auch in diesen Fällen vollkommen gelang. Nachdem die Augenlieder durch Heftpflasterstreifen verschlossen worden waren, verband ich die Wunde mit Digestivsalbe, worauf nach geschehener Heilung nichts zurückblieb, als eine kleine vertiefte weifsliche Narbe. Eine Hauptsache bei Ausschneidung solcher krebshaften Geschwüre bleibt immer die gänzliche Entfernung aller verdächtigen Parthieen, sollte diefs auch auf Kosten der guten Form des Augenliedes geschehen müssen; nur

wird der vorsichtige Operateur dieses seinem Kranken vorher sagen. In allen Fällen, wo ich bisher operirt habe, liefs ich zuvor auf beiden Armen 2 bis 3 Erbsen fassende Fontanelle schneiden. Im Falle die krebshafte Geschwulst schon so grofs ist, dafs ein beträchtliches Stück des Augenliedes weggenommen werden müfste; sind die Aerzte im Handeln nicht einig: Maitre-Jean, nach ihm Boyer und mehrere andere wollen hier nur eine mildernde Behandlung einschlagen. Aus mehreren Gründen kann ich indefs keinesweges in diese Meinung eingehen, indem der Krebs oft unaufhaltsam fortschreitet, heftige Schmerzen verursacht, die Stirnhaut, so wie die Parthieen in der *Orbita* wegfrifst und fürchterliche Zerstöhrungen anrichtet. Freilich entsteht für das Auge kein kleines Uebel, wenn es vom Augenliede entblöfst worden; indefs ist es zuweilen noch möglich, das verloren Gegangene nach Dzondi einigermafsen zu ersetzen. In einem Falle, wo nicht blofs das untere Augenlied, sondern auch ein nicht geringer Theil der Wange bei einem Schmidt krebshaft entartet war, wendete ich das Cosmische Pulver vor etwa 7 Wochen an, worauf bei gleichzeitigem, sehr vorsichtigen innern Gebrauch des Arseniks, der gröfste Theil des Geschwüres ziemlich schnell heilte. Nur eine kleine Parthie am untern Augendeckel ist noch excoriirt, die sich indefs immer mehr verkleinert, ein sehr reines Ansehn hat und deren völlige Heilung ich gewifs erwarte. *)

Wo weder eine Operation thunlich ist, noch auf andere Weise Besserung zu erwarten steht, wo der Kranke einem gewissen, höchst schmerzhaften Tode entgegengeht; da sollten die Aerzte Alles versuchen, um vielleicht Mittel zu entdecken, welche jene gräfsli-

---

*) Leider habe ich mich hierin getäuscht, denn schon nach 5 Monaten vergröfserte sich die kleine nässende Stelle, die Augenlieder, die Wange, ein Theil der Stirnhaut wurden ergriffen, so dafs jetzt zwar der Leidende noch lebt, seiner Auflösung aber mit raschen Schritten entgegen geht.

che Krankheit zu heilen vermöchten. — Delarue,*) gestützt auf viele Erfahrungen, in welchen er fand, dafs der gereinigte Schwefel bei vielen fressenden Uebeln, welche sich der Natur des Krebses zu nähern schienen, ein treffliches Heilmittel ist, schlägt diesen vor und will: dafs er lange Zeit geduldig und ununterbrochen fortgebraucht werde. Er giebt anfangs im Tage eine halbe Drachme mit einem Drittheil Zucker in einem halben Glase einer Abkochung bitterer Kräuter und steigt nach und nach bis zu zwei Drachmen.

Unter denen Mitteln, welche nach meiner Erfahrung am meisten die Schmerzen bei diesem furchtbaren Leiden milderten, mufs ich das Opium obenan stellen, denn obgleich mehrere Aerzte in ihm bei dieser Krankheit kein beruhigendes Mittel finden konnten, so habe ich doch durch kein anderes in dem Grade die nächtlichen wüthenden Schmerzen beseitigt, als durch diesen. Auch äufserlich habe ich denselben mit Nutzen in einem *Infuso hbae cicutae* aufgelöst, als Umschlag angewendet. Bei leucophlegmatischen Subjecten, welche ein blasses gedunsenes Ansehn haben, werden solche nasse Umschläge nicht immer vertragen; bei diesen habe ich folgende Salbe als milderndes Mittel anwenden lassen. ℞. *Opii puri* ℈jj. *Axungiae porcin.* ℥ß. *Acet. saturn.* ℈j. *M.*

Der Karbunkel der Augenlieder, *Carbunculus palpebrarum.*

Diese, bei der niedrigsten, schmutzigsten Menschenklasse zuweilen vorkommende Krankheit, die sich gemeiniglich am obern Augenliede zeigt, besteht in nichts anderm, als in einem *Furunculus inflammatorius*, der in Brand übergeht und sich folgendermafsen zeigt: Nachdem sich unter heftigen, brennend stechenden Schmerzen, eine dunkelrothe Geschwulst ausgebildet hat, erscheinen aschfarbene Vesikeln auf derselben,

---

*) Cours complet des maladies des yeux. Paris, 1820.

welche bersten und die Geschwulst bald in eine, Gauche enthaltende, Grube verwandeln; öfters indessen entstehen auch keine Bläschen auf der Geschwulst, sondern diese geht wenige Tage nach ihrem Auftreten, oder noch früher, in Brand und in eine, gauchige Feuchtigkeit absondernde, Grube über.

Die Ursachen zu dem Karbunkel der Augenlieder liegen nicht selten in bösartigen Fiebern, dem Scorbut, der Pest, u. s. w. Doch scheint er in seltenen Fällen auch durch Verbindung mehrerer Dyscrasieen, besonders der Gicht, bei schmutzigen, in feuchten Wohnungen hausenden Säufern herbeigeführt zu werden.

Die Prognose ist diesem gemäfs, natürlich nicht günstig; denn erfolgt auch nicht der Tod in Folge des bösartigen Fiebers, so kann doch das Augenlied einen Substanzverlust erleiden, wodurch eine Verkürzung desselben, ein sogenannter *Lagophthalmos*, erzeugt wird.

Die Kur geschieht durch äufserliche, und, wegen der Wichtigkeit des leidenden Gebildes, auch durch innerliche Mittel. Defswegen mache man, so lange Schmerz und Spannung noch heftig sind, erweichende Breiumschläge, scarificire ganz leicht die brandigen Stellen, gebrauche Umschläge von einem Chinadecoct mit *Tinctura myrrh.* und Camphor, und lasse innerlich mineralische Säuren mit China nehmen. Leicht wird sich bei dieser Behandlung das verlohren gegangene Zellgewebe, durch erfolgende Fleischgranulation, ersetzen; damit indefs eine Verkürzung des Augenliedes verhüthet werde, sorge man dafür, dafs beide Augenlieder während der ganzen Eiterung durch starke Heftpflasterstreifen verschlossen und somit ausgedehnt erhalten werden.

Die Wassergeschwulst der Augenlieder, *Oedema palpebrarum*, *Leucophlegmatia palpebrarum*. Hautwassersucht der Augenlieder.

Wäfsrige Anschwellungen der Augendeckel, beobachtet man vorzüglich nach rosenartigen Augenlieder-

entzün-

entzündungen, nach scarlatinösen *Ophthalmien* und nach dem gar zu häufigen Gebrauche von erweichenden Bähungen und Breiumschlägen bei verschiedenen entzündlichen Affectionen der Augen; vorzüglich wenn man jene Breiumschläge unvorsichtiger Weise auf den Augen erkalten läfst. Sie erscheinen vorzüglich am obern Augenliede und charakterisiren sich durch eine unempfindliche, weiche, bleiche, teigige Ausdehnung, in welche der drückende Finger eine Grube zurückläfst.

Zur Heilung sind aromatische warme trockne Kräuterkissen, mit und ohne Camphor, oder gelindes Reiben mit Flanell, der mit Weihrauch, Mastix oder anderm aromatischen Harze durchräuchert worden ist, hinreichend.

Wenn eine Augenentzündung im activen Zeitraume von einer Wassergeschwulst der Augenlieder begleitet ist, so passen obige Mittel keinesweges; vielmehr wird, wenn hier die Entzündung gehörig behandelt worden ist, das *Oedem* oft mit dieser verschwinden.

Die Luftgeschwulst der Augenlieder, *Emphysêma palpebrarum.*

Anschwellungen der Augenlieder, welche von im Zellgewebe derselben vorhandener Luft entstehen, sind selten und zeichnen sich dadurch von den Wassergeschwülsten der Augenlieder aus, dafs sie nicht eine teigige, sondern eine elastische Geschwulst darstellen, welche beim Druck mit dem Finger ein knisterndes Geräusch hören läfst.

Sie entstehen gewöhnlich nach Quetschungen in der Gegend des innern Augenwinkels, wo, wenn dadurch irgend eine Stelle der Thränenkanälchen zerrissen wurde, in Folge eines heftigen Schneuzens Luft in das umliegende Zellgewebe getrieben wird. Aufserordentlich selten entstehen sie ohne Quetschungen jener Parthieen, doch habe ich kürzlich ein *Emphysêma palpebrae superioris* bei einem 25jährigen Weibe beobachtet, welches nach einem heftigen Niesen entstanden war.

Uebrigens ist das Uebel an und für sich ohne Nachtheil und verschwindet nach Auflegen trockner Kräutersäckchen in der Regel sehr bald.

Der Vorfall des obern Augenliedes, *Ptosis, Lapsus palpebrae superioris, Blepharoptosis,* [*βλεφαρον*, Augenlied, und *πιπτω*, ich falle.]

Diese Krankheit hat ihren Grund, erstens: in einer Erschlaffung und Ausdehnung der allgemeinen Bedeckungen des obern Augenliedes, und dadurch entstandener Hautfalte; wobei die Energie des Aufhebemuskels des obern Augendeckels wohl einigermafsen, aber nicht bedeutend gesunken ist. Der Kranke kann in diesem Fall, das über die *Cornea* herabhängende Augenlied zwar nicht (wenigstens nicht bedeutend) heben; allein man sieht doch die Bemühungen des Aufhebers, so bald der Kranke die Augenliedspalte nur ernstlich öffnen will. Kneift man die überflüssige Haut, welche die *Ptosis* verursacht, zwischen den Fingern zusammen, ohne jedoch daran zu ziehen, so kann der Leidende jetzt die Augenliedspalte öffnen, weil die Schwere der unnützen Hautfalte den *Levator palpebrae* nicht mehr hindert seine Kraft zu zeigen.

Die Ursachen, welche in diesem Falle den Vorfall erzeugen, sind vorzüglich horizontale Wunden der Stirn, Geschwülste welche die Haut des Augenliedes lange ausgedehnt erhalten haben; ebenso zu lange Anwendung erweichender und erschlaffender Mittel, vorzüglich bei scrofulösen *Ophthalmien* und bei torpiden Subjecten, u. s. w. — Zuweilen findet man eine *Ptosis palpebrae* angebohren.

Die Heilung geschieht hier am vortheilhaftesten durch die Operation, die in Wegschneidung der Hautfalte und Heften der Wunde besteht; indefs hat man auch das Cauterisiren mit Schwefelsäure, das heifse Eisen u. a. Mittel mit Erfolg angewendet.

Die Operation wird am besten folgendermaafsen gemacht:

Nachdem man mit einer bequemen, vorn breiten Zange *) die erschlaffte Haut des Augenliedes so gefafst hat, dafs der Kranke dasselbe bequem öffnen und völlig schliefsen kann, so schneidet man mittelst einer Knieschcere, mit einem Schnitt die überflüssige Haut weg. **) Hierauf lege man, nach gestillter Blutung die blutige Nath, mit trocknen Heften unterstützt, an, wozu selten mehr als zwei blutige Hefte nöthig sind, und heile so mit möglichster Sorgfalt die Wunde schnell zu. Die blutigen Hefte braucht man, nach Langenbeck, ***) nur 12 Stunden liegen zu lassen, worauf sie mit einer feinen Scheere durchschnitten und mit einer Pincette herausgezogen werden; denn in jener Zeit ist die adhäsive Vereinigung der Wundränder schon geschehen. Läfst man die Hefte länger liegen, so fangen die Stiche an zu eitern und die Augenlieder schwellen dann nicht selten. ****)

Eine zweite Art von *Blepharoptosis*, entsteht von einer Erschlaffung des Aufhebers des obern Augenliedes, ohne dafs damit ein organischer Fehler verbunden wäre, *Atoniatonblepharon*, *Atonia palpebrae*. Selten ist die Lähmung des *Levator palpebrae* vollkommen, wenn nicht zugleich die benachbarten Theile mehr oder weniger an derselben participiren.

Wenn beide Augenlieder über die *Cornea* herabhängen, ohne dafs der Kranke fähig ist, dieselben aufzuheben; so ist meistens auch der *Orbicularis palpebrarum* atonisch, paralytisirt. In diesem Falle ist der Leidende nicht wohl im Stande, beide Augenlieder gegen einander zu drücken. Mit dieser Lähmung des Au-

---

*) Siehe Tab. V. Fig I.

**) Uebrigens ist es gut, lieber etwas zu viel, als zu wenig Haut weg zu nehmen.

***) Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie, 1818. 1 Bd. 3 Hft. S. 427.

****) Meinen Erfahrungen zu Folge, ist es bei unruhigen Kranken indefs rathsamer, die Hefte 17 bis 18 Stunden länger liegen zu lassen, weil ich bei diesen nicht selten gefunden habe, dafs die Wundränder in 12 Stunden noch nicht gehörig vereinigt waren.

genliedes, *Blepharoplegia*, ist häufig ein Gefühl von Kälte über den Augenbraunen, mit Gefühl von pelziger Stumpfheit, Wüstigkeit des Kopfes der leidenden Seite, und nicht selten eine Spur von Lähmung und Schwäche in den benachbarten Theilen, verbunden. Das gelähmte Augenlied ist dabei kaum *oedematoes* angeschwollen und senkt sich beim Heraufziehen mit dem Finger, langsam wieder herab. Der Augapfel selbst hat übrigens meist ein mattes Ansehn, die *Iris* ist träge, die Pupille erweitert, und das Sehvermögen geschwächt oder gar ganz aufgehoben. Zuweilen scheinen selbst die Augenmuskeln, bei noch vorhandener Sehkraft, gelähmt zu sein, in welchem Fall dieselben den *Bulbus* aus der *Orbita* gleichsam vorfallen lassen, *Ophthalmoptosis paralytica*. Manchmal ist nur ein oder der andere Augapfelmuskel gelähmt, wo dann der *Bulbus* nach der Gegend hin schielt, in welcher seine Muskeln noch Thätigkeit zeigen können. Auch sieht der Kranke dann doppelt, wenn er das gelähmte Augenlied in die Höhe zieht und mit beiden Augen zugleich Gegenstände zu beobachten strebt. Damit verbundene Lähmungen der Zunge, der Gesichtsmuskeln u. s. w. deuten immer ein bedeutenderes und mehr verbreitetes Uebel an.

Die Ursachen, welche eine Atonie oder Lähmung der Augenlieder herbeiführen können, sind verschieden. Oft entstand sie nach zu lange fortgesetztem Gebrauch von erweichenden Umschlägen bei Augenentzündungen, oder durch anhaltendes festes Verbinden des Auges; oft ist sie Folge eines Schlagflusses, und ist dann gewöhnlich mit Lähmung anderer Theile verbunden; zuweilen kommt sie auch bei chlorotischen Mädchen und überhaupt bei schlaffen Subjecten ohne Begleitung von andern sichtbaren Ursachen vor. In seltenen Fällen hat man dergleichen Augenliedvorfälle auch periodisch wiederkehrend beobachtet.

Die Heilung der *Blepharoptosis* geschieht in leichtern Fällen oft durch angemessene Diät, trockne Luft, mäfsigen Genufs spirituöser Getränke und Reiben des Augenliedes mit erwärmtem Flanell. In hartnäckig-

tern Fällen gebrauche man Einreibungen von reitzenden Mitteln, z. B. von *Spir. serpilli*, *Liquor Ammon. caustic.* und *Aqu. calcar. ust.*, *Tinct. cantharid.* oder, nach Reil, von folgender Mischung: ℞. *Olei laur.* ʒjj, *Ol. Mac. expr.* ʒjß, *Ol. caryophyll.* ℈j, *Bals. peruvian* ʒjj. *M. D. S.* In die Schläfe und Augenlieder einzureiben; oder, nach Conradi, *) *Oleum foeniculi* mit *Spir. salis ammoniac.* vermischt. Auch Tropfbäder auf den Hinterkopf sind oft sehr wirksam.

In sehr hartnäckigten Fällen, kann man sich des *Galvanismus*, oder auch der von Adam Schmidt **) angegebenen Heilmethode bedienen. Er legte nähmlich zwischen dem Winkel des Unterkiefers und dem *Process. mastoideus*, ein Fensterpflaster, dessen Oeffnung den Durchmesser eines Zolles hatte, bedeckte dieselbe mit einem Brei aus *Lap. caust.* und Wasser, legte über diesen Aetzbrei ein Pflaster als Decke, und liefs diefs gehörig wirken, (wozu gewöhnlich 3 — 4 Stunden gehören). Die entstandene schwarze Borke verband er mit Digestivsalbe, worauf er, nachdem die Borke nach 6 — 8 Tagen abgefallen war, die dadurch gebildete Eiterung 14 Tage bis 4 Wochen, bei einem Verband mit obiger Salbe, oder, wenn dem Geschwüre ein Reitz fehlte, mit Zusatz von *Tinct. cantharid.* oder rothem Präcipitat, fortdauern liefs. Die Absicht bei dem ganzen Verfahren war, einige nahe beim *Proceſs. mastoid.* liegende Nervenäste vom dritten Hauptzweige des fünften Paares zu reitzen, welche bekanntlich auch an die Augenlieder, Zweige abgeben.

Ist die *Blepharoptosis* aus einer allgemeinen Krankheit hervorgegangen, so mufs letztere natürlich auch nach den gewöhnlichen Regeln behandelt werden; daher berücksichtige man die Ursachen besonders, welche

---

*) Arnemann, Magazin der Wundarzneiwissenschaft, 1. Bd. 1. St. S. 55.

**) Neue Heilung der Augenliedlähmung und des anhaltenden Augenliedkrampfes. In den Abhandlungen der K. K. Med. chir. Josephsakademie zu Wien, 2. Bd. S. 365. Auch in der ophthalmolog. Biblioth. v. Himly und Schmidt.

in vorhandenen Dyscrasieen gegründet sind. So erfordert Gicht z. B. den *Guajac.* ℞ *a seminum colchic. etc.* innerlich, so wie das *Oleum sabinae* äufserlich.

Ist das Uebel mehr consensuelle Folge einer *Apoplexia sanguinea*, und wird man gleich anfangs hinzu gerufen, so kann ein Aderlafs nützen, worauf später *Tartarus emeticus* in gebrochenen Dosen, *Ammonium carbonicum, Arnica, Camphor, Valeriana, Oleum animale aether. etc.* nothwendig werden.

Der Krampf der Augenlieder, *Spasmus palpebrarum, Blepharospasmus*, [βλεφαρον, Augenlied, und σπαω, ich zucke, ziehe.]

Ungeachtet diese Krankheit kaum besonders abgehandelt zu werden verdient, da sie fast immer nur als Symptom oder Zufall anderer Krankheiten erscheint, so will ich dieselbe doch kurz mit anführen, damit sie, rücksichtlich der *Diagnose*, in keinem Falle mit der *Ptosis palpebrae* verwechselt werde.

Blepharospasmus ist immer eine unwillkührliche, plötzlich entstehende, meist nur periodische, zuweilen mit Schmerzen verbundene Zusammenziehung beider Augenlieder, wobei die äufsere Haut des obern Augendeckels gerunzelt und die, das Auge umgebenden Muskeln verzerrt erscheinen. Er zeigt sich meistens bei sehr sensiblen Personen, mehr bei Kindern als bei Erwachsenen, mehr bei dem weiblichen als bei dem männlichen Geschlechte. Zuweilen gehen halbseitige Kopfschmerzen, schweres Gehör u. s. w. voraus. Beim Krampf der Augenlieder fällt es selbst dem Arzte schwer, das Auge zu öffnen. — Wenn ein solcher Augenliedkrampf anhaltend ist, so nennt man ihn *Blepharospasmus tonicus*, der oft sehr lange dauern kann; äufsert er sich aber durch ein beständiges krampfhaftes Schliefsen und Oeffnen der Augenliedspalte, ist er also clonisch, so nennt man dieses Phänomen, *Nictitatio palpebrarum*, Blinzeln der Augenlieder.

Die Ursachen des Krampfes liegen am oftesten in allgemeinen Krankheiten, weswegen man denn auch

den *Blepharospasmus* bei Hypochondrie, Hysterie, Veitstanz, Wurmkrankheiten, scrofulösen *Ophthalmien* u. s. w. findet. Bei Erwachsenen liegt dem Uebel oft Rheumatismus zum Grunde.

Die Behandlung richtet sich nach der Hauptkrankheit. Ist Rheumatismus die Ursach des Uebels, so nützen lauwarme allgemeine Bäder, verbunden mit kräftigem Frottiren des ganzen Körpers mit wollenen Tüchern während und nach dem Bade, ganz vorzüglich. Dasselbe Mittel ist fast bei allen krampfhaften Beschwerden der Augenlieder dienlich, nur bei dem *Blepharospasmus*, welcher scrofulöse Augenentzündungen begleitet, fand ich es bisher mehr schädlich als nützlich. Bei sehr lange anhaltendem Krampf der Augenlieder, ist die Schmidt'sche, unter *Blepharoptosis* angegebene Heilart, mittelst des Aetzmittels, von grofsem Nutzen. Ebenso leisten, in gröfserer oder geringerer Entfernung vom Auge applicirte Moxen oder Vesicatorien, zuweilen baldige Hülfe. In manchen Fällen, wo die ursächlichen Momente bereits entfernt worden und die krampfhaften Beschwerden gleichsam nur aus Gewohnheit fortdauern, leisten Einreibungen flüchtig reitzender Tincturen, bei sehr sensiblen Personen Einreibungen von Oehl mit Opium, gute Dienste, z. B. ℞. *Opii puri* ℈j—ʒß, *Olei amygdalarum* ʒjj, *Olei chammom. aeth.* ʒß. *M. exact. S.* Zum täglich 5 bis 6maligen Einreiben in die Augengegend, besonders über den Augenbraunen.

Verursachen fremde in das Auge gefallene Körper den Krampf, so befolgt man die bei der reinen Augenentzündung im Allgemeinen angegebenen Regeln.

Das Blinzeln ist oft angebohren, oft aber auch Folge des Verlustes der Augenbraunen und Cilien, u. s. w.

Das Unvermögen die Augenlieder zu schliefsen, *Lagophthalmus*, [λαγος, der Hase, und οφθαλμος, das Auge,] *Oculus leporinus*, Hasenauge.

Man versteht hierunter denjenigen abnormen Zustand der Augenlieder, in welchem meistens das obere, seltener das untere Augenlied, verkürzt erscheint und defswegen nicht im Stande ist, den Augapfel zu bedecken.

Als Ursache dieser Mifsstaltung läfst sich oft ein Krampf des Aufhebemuskels des obern Augenliedes, oft eine Erschlaffung des Augendeckels, oft aber auch schlecht vernarbte und mit Substanzverlust verbundene Wunden und Geschwüre der Decken des Auges angeben. — In seltenen Fällen ist ein zu kurzes Augenlied angebohren.

Die Prognose ist oft günstig, vorzüglich wenn keine organischen Fehler die Krankheit hervorbrachten. Wenn aber die Verkürzung nach Substanzverlust der *palpebra* entstand und erstere bedeutend ist, so kann, weil das Auge allen äufsern Schädlichkeiten freigestellt ist, Augenentzündung, Verdunkelung der Hornhaut, und Vertrocknung derselben erfolgen; ist die Verkürzung aber unbedeutend, so wird die Prognose, wenigstens in Hinsicht der Function des Auges, weit günstiger sein, weil der Augapfel hier nur zum Theil nicht gehörig bedeckt werden kann.

Was die Heilung betrifft, so mufs bald der Krampf durch antispasmodische Mittel, bald eine Erschlaffung, welche den *Lagophthalmos* verursachte, durch örtliche, reitzend stärkende Mittel gehoben werden; wobei man aber keinesweges allgemeine Krankheiten, aus denen der Krampf und die Erschlaffung hervorging, vernachläfsigen darf. —

Wo in Folge von Geschwüren und dergl. ganze Parthieen des untern Augenliedes verlohren gegangen sind, da kann man versuchen, nach Dzondi, ein künstliches Augenlied zu fertigen, wozu ein Stück der Gesichtshaut benutzt wird. Allerdings bleibt dieser Er-

satz immer ein unvollkommener und kann kaum zu etwas mehr dienen, als die vorige Verunstaltung grofsentheils zu heben. Es wird zu diesem Zwecke ein Stück der naheliegenden Gesichtshaut von zweckmäfsiger Gröfse und Form, dessen Begrenzungen man allenfalls mit Strichen von Dinte oder anderer Farbe vorzeichnen kann, auf drei Seiten vorsichtig von den angrenzenden Theilen und den unterliegenden Muskeln getrennt, so dafs es auf der vierten Seite durch eine breite Basis mit dem Lebenden noch in Verbindung bleibt. Nachdem dieſs geschehen, wird der gelöste Lappen nach aufwärts umgeworfen, und durch mehrere Hefte mit den beiden, zuvor zu frischen Wunden gemachten Seitenrändern, bis zu welchen das untere Augenlied verlohren gegangen war, mittelst kleiner gekrümmter Heftnadeln, passend geheftet. Nach geschehener vollständiger Verwachsung des Gesichtshautlappens mit jenen Rändern, wird dann die im Gesichte festsitzende breite Basis des ersteren mittelst der Scheere getrennt und für die passende Form dieses neuen Augenliedes möglichst Sorge getragen. Man berücksichtige hierbei nur, dafs der zu bildende Lappen der Gesichtshaut stets etwas gröfser als der Substanzverlust am Augenliede erfordert, ausfallen mufs, weil die neue Augendecke sonst leicht zu klein werden dürfte, indem sich dieser Lappen nach der Vereinigung immer etwas zurück- und zusammen zieht. Ueberhaupt erfordert diese Operation stets die gröfste Sorgfalt und Aufmerksamkeit, wenn sie einen möglichst glücklichen Erfolg haben soll.

Sind Narben der äufsern Haut der Augenlieder Schuld an dem Hasenauge, so hat man, wie bei dem Ectropium, das Einschneiden des Augenliedes und die mechanische Ausdehnung der Wunde bis zur Heilung empfohlen; allein daraus geht selten ein günstiges Resultat hervor. In den neuesten Zeiten hat Herr Prof. Dzondi *) ein Verfahren bekannt gemacht, nach wel-

*) Beiträge zur Vervollkommnung der Heilkunde 1816. S. 169.

chem er schon öfters die Verkürzung oder Ausstülpung des Augenliedes hob: Nachdem man nämlich die, wegen des kurzen unterliegenden Zellgewebes, oft unbewegliche Narbe, durch öfteres starkes Hin- und Herbewegen derselben binnen 4 bis 8 Wochen beweglicher gemacht hat, schneidet man sie horizontal und völlig durch, löst mit dem Messer das unterliegende Zellgewebe, damit der nunmehrigen Auseinanderziehung der Wunde nichts entgegen stehe, verbindet dann am Operationstage die Wunde trocken, hernach aber mit *Ungt. cantharid.* und *basilic.* gewöhnlich ää *pts.* damit durch diese reitzende Salbe eine starke Fleischwärzchenproduction hervorgerufen werde, fährt mit 24stündigem Verband wenigstens 4 Wochen und länger fort, und läfst die hervorgeschossenen Fleischwärzchen nicht früher heilen, als bis sie wenigstens eine Linie über die Wundränder hervorragen, und diese Wärzchen fest und derb genug sind, um auch nach der Vernarbung die vormalige Wunde ausgedehnt zu erhalten. In jedem Falle müssen die Augendeckel während der ganzen Kur verschlossen und durch gut klebende Heftpflaster in Ausdehnung erhalten werden. Das ganze Verfahren gehört übrigens ursprünglich dem *Celsus* an (*Lib. VII.* §. 9.) welcher sich nur kürzer fafste.

Die Einwärtswendung der Augenliedränder, *Entropium*, [ἐν, hinein, und τρεπω, ich wende, kehre,] *Introversio palpebrarum.*

Dieser Augenfehler besteht in einer solchen Umwendung der Augenliedränder des untern oder obern, oder auch beider Augendeckel, dafs die äufsere Kante des Augenliedrandes, welche im normalen Zustande von dem *Bulbus* absteht, hier den letzteren unmittelbar berührt, wobei zugleich die Cilien so nach dem Augapfel gerichtet sind, dafs sie dessen Oberfläche berühren, (*Trichiasis*) reitzen, beständiges Thränen der Augen hervorbringen, und wenn die Krankheit vernachläfsigt wird, leicht chronische verderbliche Augenentzündungen und pannusartige Trübungen der Horn-

haut herbeiführen. Meistens besteht die Einstülpung längst des ganzen Randes des obern oder des untern Augenliedes, oder beider Augenlieder zugleich, nur in seltenen Fällen bemerkt man *Entropia*, welche nur einen Theil eines Augenliedes einnehmen; wo diese mir vorkamen, fand ich sie stets in der Gegend des äufsern Augenwinkels.

Die vorzüglichsten Ursachen, welche *Entropia* hervorzubringen im Stande sein können, sind Erschlaffungen oder Verlängerungen der äufsern Haut der Augenlieder; ebenso Augenentzündungen verschiedener Art, welche den *Tarsus* angreifen, diesen verkrümmen, und in einem gleichsam verschrumpften Zustande zurücklassen. Die Verschrumpfung des *Tarsus* und das daraus folgende *Entropium*, entsteht meistens aus langwierigen und sehr vernachläfsigten *Psorophthalmien* und aus scrofulösen *Blepharophthalmien*, besonders wenn beide mit gröfsern Geschwüren an den Augenliedrändern verbunden und mit dicken Krusten bedeckt sind, welche tagelang ungestört liegen bleiben, ohne dafs der Leidende oder dessen nachläfsige Angehörige, daran denken, diese Krusten zu entfernen und die Augenlieder zu reinigen. Indem nun dadurch einem tieferen und weiteren Umsichgreifen der Geschwüre Vorschub geleistet und das Knorpelhäutchen des *Tarsus*, ja letzterer wohl gar selbst, theilweise zerstört oder angegriffen wird, erfolgen bei der endlichen Heilung und Vernarbung jener Geschwüre, Contracturen, welche das *Entropium* bedingen. Wir erkennen das *Entropium*, welches in Folge einer Verschrumpfung des *Tarsus* entstanden, daraus, dafs, sobald das Augenlied mit den Fingern nach auswärts gezogen wird, die fehlerhafte Richtung des Randes dennoch immer zurückbleibt. Die Haut auf der innern Fläche des Augenliedrandes, finden wir dabei callös, und insgemein an mehreren Stellen vertieft, welche Vertiefungen die vorhergegangenen Geschwüre verursachten. Die Wimpern fallen häufig theilweise aus, und zwar schon während der Entstehung des Uebels, werden auch wohl nach der Heilung und Vernarbung der Augenliedrän-

der, oder auch schon vorher, durch andere, dünnere und feinere ersetzt, welche dann meistens nicht in der gewöhnlichen Ordnung stehen. Auch ohne dafs der *Tarsus* angegriffen wird, können Augenentzündungen veranlassende Ursach eines *Entropium* werden, wenn nämlich die an der Entzündung leidenden Personen sich immerfort mit Betrachtung und Bearbeitung sehr kleiner, wohl gar glänzender Gegenstände beschäftigen, wobei sie sich öfters genöthigt sehen, den Schliefsmuskel der Augenlieder krampfhaft zusammen zu pressen. Auch Verkürzungen der innern Fläche der Augendeckel durch Narben und dergleichen, oder auch Geschwülste der Augenlieder, erzeugen nicht selten eine Einwärtswendung der Augenliedränder.

Wenn Erschlaffung und Verlängerung der äufsern Haut, oder Zusammenziehung der innern Haut der *Palpebra* allein Schuld an dem *Entropium* hat, *) und sich das Augenlied beim Zusammenkneifen und gelinden Abziehen der äufsern Haut in die gehörige Richtung bringen läfst, so thut man wohl, wenn man nach dem bei *Ptosis palpebrae* angegebenen operativen Verfahren, das überflüssige Stück Haut des Augenliedes wegschneidet und die Wunde *per primam intentionem* heilt; **) eine Methode, die schon Celsus ***) angiebt. Wenn die Einwärtsstülpung bei alten schlaffen Subjecten nur erst im Entstehen angetroffen wird und paralytischer Natur ist, so hilft zuweilen die örtliche

---

*) Im vorletzten Falle kommt das *Entropium* mit *Blepharoptosis* verbunden vor.

**) *Entropien*, welche durch geringe Erschlaffung der Haut, nach vorhergegangenen Oedemen des Zellgewebes entstanden sind, heilt Demours, (*Traité des Maladies des Yeux, avec des planches coloriées représentant ces maladies d'après nature. A Paris*, 1818. *Tome I. pag.* 106.) nach der schon längst bekannten Methode durch 2 bis 3 englische Heftpflaster, mit welchen man das *Entropium* gehörig einrichtet, und versichert, die Einstülpung zuweilen in 20 Tagen auf diese Art geheilt zu haben.

***) *Lib. VII.* §. 8.

Anwendung verschiedener Reitzmittel, z. B. der *Tinctura cantharid.* u. a.

Indefs giebt es noch mehrere Methoden das Uebel zu heben, von denen ich nur die wichtigsten noch angeben will. Hat das *Entropium,* wie oben, in einer Erschlaffung der äufsern Haut des Augenliedes, oder der Muskeln desselben seinen Grund, so ist die, in neuern Zeiten besonders von Helling*) gelobte Methode, mittelst concentrirter Schwefelsäure anwendbar. Obgleich sie nun bei weiten nicht unfehlbar ist, so haben sie doch mehrere Aerzte mit Glück gebraucht, z. B. Quadri in Neapel, welcher in seiner guten, nur etwas breiten, Schrift: *Annotazioni pratiche sulle malattie degli occhi.* 1819. *S.* 67. diese Methode erklärt und den guten Erfolg derselben durch Erzählung mehrerer Krankheitsgeschichten beweist. Er verfährt auf folgende Weise: Nachdem er ein Streifchen Heftpflaster so gelegt hat, dafs die Säure nicht in's Auge laufen kann, breitet er mittelst eines Holzstäbchens einen kleinen Tropfen concentrirte Schwefelsäure in einer ovalen Fläche und in einer etwas grössern Länge als die Cilien am Augenliede einwärts stehen, bei ohngefähr drei Linien Breite, auf die äufsere Haut des Augenliedes aus. Nachdem er nun das Mittel kaum 10 Secunden hat einwirken lassen, trocknet er sie vorsichtig ab, damit sie keine andere als die vorgesteckte Stelle treffen kann. Jetzt bringt er auf dieselbe Art wiederum ein Tröpfchen Säure auf das Augenlied und breitet sie allenfalls noch etwas mehr über den angegebenen Ort aus. Wenn sich nun darauf die Augenliedhaut zusammenzieht und dadurch die Cilien vom Augapfel abzustehen anfangen, und diesen nicht mehr berühren, dann reinigt er das Augenlied von der Säure; erfolgt jenes Abstehen der Cilien noch nicht, so wiederhohlt er die Application des Mittels noch ein oder zwei Mal. Auch bindet er, wenn die Haare schon etwas vom *Bulbus* abstehen, die Cilien in drei oder vier Bündel mit seidenen Fäden zu-

*) S. Hufeland's Journal, 40. Bd. 4. St. S. 98.

sammen und befestigt alle Fäden an der Stirn, um dadurch die Cilien noch mehr nach aufsen zu erhalten und das Augenlied in die Höhe zu bringen. Dieses letztere Manöuvre ist meinen Erfahrungen zu Folge *in praxi* selten ausführbar, weil sich die seidenen Faden bei den geringsten Blinzeln oft abstreifen.

Noch eine andere, alte, zuerst von Bartisch angegebene Methode, besteht darin, die überflüssige Haut des Augenliedes in eine Compressionsmaschine zu pressen, in welcher sie nach und nach abstirbt. Demours hat diese Methode in neueren Zeiten mit der Abänderung wieder angewendet, dafs er sich statt jener unförmlichen Presse, eines zusammengedrehten Drathes bedient. *)

Ein ähnlich wirkendes, nur weit gefährlicheres Mittel in der Nähe eines so zarten Organs, ist das heifse Eisen; man berührt damit das Augenlied, um eine Contraction und Vernarbung, und daher entstehende Verkürzung der äufsern Decke der *Palpebra* zu bewirken. J. Ware (Chirurgische Beobachtungen u. s. w. übers. von Dr. Runde, S. 208.) ging darin noch weiter, indem er in einem Falle, in welchem er die Ursache des *Entropii* in einer Erschlaffung des *Levatoris palpebrae* suchte, letztern entblöfste, ihn mit einem heissen Eisen berührte, Contraction desselben bewirkte und dadurch das Uebel heilte. Dafs dieses geschah, darf uns nicht wundern; hat doch selbst Scarpa's Methode, welcher ein Stück aus der Haut des Augendeckels schneidet und die Wunde ohne blutige Nath vernarben läfst, zuweilen einen glücklichen Erfolg. — Die Heilart des Wardrop, **) welcher zuweilen den äufsern Winkel der Augenlieder einschneidet und dadurch allein die normale Richtung der Ränder bewerkstelligt, möchte nur in wenigen passenden Fällen durch einen glücklichen Erfolg gekrönt werden.

---

*) A. a. O. *Tom. IV. Pl.* 62.

**) Siehe Himly's Bibliothek für *Ophthalmologie,* Kenntnifs und Behandlung der Sinne überhaupt, u. s w. Hannover, 1816. 1. Bd. 1. St. S. 57.

Entstand nun aber das *Entropium* nach öftern, vorzüglich scrofulösen, Augenliederdrüsenentzündungen, welche eine Verschrumpfung und Krümmung des *Tarsus* verursacht haben, wobei der verbildete, geröthete und aufgedunsene Rand des Augenliedes auf keine Art durch Anziehen und Aufheben der äufsern Haut in seine zweckmäfsige Richtung zu bringen ist, vielmehr immer gegen den Augapfel hin geneigt bleibt, so ist die Heilung sehr mifslich; selbst die berühmtesten Augenärzte rechnen diese Krankheit unter die unheilbarsten Uebel, und empfehlen, um den *Bulbus* nur einigermafsen zu schonen, die Ausreifsung der etwa vorhandenen einwärts gestülpten Cilien, weil diese den Augapfel reitzen, und eine Pannusbildung befördern. Für diesen Fall hat man in England vor Kurzen mit glücklichem Erfolge ein Verfahren angewendet, welches ich hier näher zu beschreiben, nicht unterlassen will.

Saunders *) nämlich, sich darauf stützend, dafs der *Levator palpebrae superioris* sich in die Bedeckungen und Bindehaut des Augenliedes inserire, machte auf folgende Weise die völlige Excision des verkrümmten und verschrumpften *Tarsus*. Nachdem er eine dünne, knöcherne oder silberne, nach dem Augenlied gebogene Platte zwischen das Augenlied und den *Bulbus* gebracht, und das erstere angespannt hat, macht er nach der Richtung des *Tarsus*, unmittelbar über den Wurzeln der Cilien, in die äufsern Bedeckungen und den *Orbicularis palpebrarum* einen Einschnitt, präparirt dann vorsichtig die äufsere Oberfläche des *Tarsus* los, bis der Orbitalrand des letztern freigelegt worden ist, und durchschneidet dann die *Conjunctiva* und die Seitentheile, wo der *Tarsus* noch abzutrennen ist; doch ohne den Thränenpunkt zu verletzen.

Die Integumente und *Conjunctiva* heilten in wenig Tagen; doch wuchs in allen Fällen welche Saunders operirte, ein Schwamm von beträchtlicher Gröfse aus der Schnittwunde hervor, der indefs durch Aetz-

*) A. a. O. pag. 85.

mittel, am besten aber mit dem Messer entfernt werden konnte.

Verursacht zuweilen eine kleine Narbe an der innern Fläche des *Tarsus* ein *Entropium partiale*, und reitzen die eingestülpten *Cilien* den *Bulbus* sehr; so schneidet Saunders *) äufserlich aus der Haut des fehlerhaft liegenden Stückes des Augenliedes, so viel heraus, dafs die Wurzeln der *Cilien* dieses Theiles auch entfernt werden.

Die Einwärtskehrung der Cilien, *Trichiasis*, *Trichosis*, [θριξ, das Haar, τριχιαω, ich leide an den Haaren,] und die Doppelreihe der Augenliederhaare, *Distichiasis*, *Phalangosis*, [nach Galen.]

Trichiasis wird derjenige Augenfehler genannt, welcher in einer mehr oder weniger unregelmäfsigen, gegen den *Bulbus* gekehrten, Richtung der Augenwimpern besteht. Dieser, am oftesten an dem untern Augenliede vorkommende, Mifsstand der Cilien, erstreckt sich entweder über alle Augenwimpern, *Trichiasis totalis*, (was indefs, aufser wenn *Trichiasis* Folge eines *Entropiums* ist, selten vorkommt) oder es sind nur einige Augenliederhaare gegen den Augapfel umgestülpt, *Trichiasis partialis*, in welchem Falle dann die Diagnose nicht immer leicht sein wird. Die Wirkung der Einstülpung der Cilien besteht in einem beständigen Reitze, den die letztern auf die vordere Fläche des *Bulbus* äufsern, woraus dann Thränen der Augen, Schmerzen mit Entzündung, Pannusbildungen, Flecke, und Exulcerationen der *Cornea* nicht selten resultiren.

Distichiasis, *Phalangosis*, nennt man den Zustand, wo aufser der normalen Cilienreihe, noch eine mehr oder weniger vollständige Reihe von *Pseudocilien* existiren, welche gegen den *Bulbus* gekehrt sind und diesen reitzen. Indessen hat man auch die Abirrung der normalen Augenliederhaare, bei welcher einige Cilien vorwärts, andere rückwärts gebogen sind, und so gleichsam

*) A. a. O. pag. 86.

sam eine doppelte Reihe bilden, mit obigen Nahmen belegt. Die erstere Art, oder die eigentliche *Distichiasis*, kommt zuweilen mit Haarbildungen in der *Conjunctiva bulbi* u. i. a. Gebilden des Auges *) zugleich vor, und ist selten, so dafs sie manche berühmte Augenärzte, z. B. Scarpa u. a. nie gesehen haben, und ihre Existenz bezweifeln; andere hingegen, z. B. Demours, sahen sie mehr als 20 mal, und Beer sah diesen Fehler jährlich wenigstens einige male. Selten stehen indefs die Haare so, dafs sie zwei ganz bestimmte Reihen bilden; vielmehr erscheinen zuweilen drei Reihen, *Tristichiasis*, ja in seltenen Fällen sogar vier, *Tetrastichiasis*, wovon Albin **) und Quadri ***) Beispiele angeführt haben. Doch sind solche Eintheilungen ziemlich unwesentlich. ****)

---

*) Solche merkwürdige Fälle von Haarproductionen an Stellen, wo gewöhnlicherweise nie Haare gesehen werden, haben mehrere Aerzte beschrieben. So fand De Gazelles, (*Journal de Medicine, Tom. XXIV.*) ein Haar, welches aus der *Cornea* hervorwuchs, und immer wieder kam nachdem es ausgerissen worden. Wardrop, (a. a. O. pag. 30) sahe aus Excrescenzen auf der *Cornea*, und Himly aus Excrescenzen auf der *Conjunctiva*, Haare hervorstehen. Albin (*Acad. Annot. Lib. III. Cap. VIII.*) und Morgagni, bemerkten dergleichen Haare in der *Caruncula lacrymalis*. Ebenso haben auch Demours (*Traité d. Malad. d. Yeux,*) und andere bald in der *Cornea, Sclerotica,* oder in andern Theilen des Auges, Haare wahrgenommen. Wardrop und Demours haben dergleichen Fälle bildlich dargestellt. — Manchmal hat selbst der Augenliedrand die Fähigkeit, abnorme Haare, welche die Oberfläche des *Bulbus* reitzen, zu produciren; so dafs sich die *Trichiasis* hinsichtlich der Haarzahl vermehren kann. Was auch Maitre-jean und Prof. Troja dagegen eingewendet haben, so überzeugt uns doch die Erfahrung von der Wahrheit des Gesagten.

**) *Acad. Annot. Lib. III. Cap. VII.*

***) a. a. Ort.

****) Ich habe den Zwei- und Dreiwuchs der Cilien öfter gesehen, aber in allen Fällen gefunden, dafs diejenigen Haare, welche dieses Uebel constituiren, immer dünner, zarter, weicher und blasser von Farbe sind, als die normalen Cilien; auch habe ich sie selten so bogenförmig gekrümmt gefunden, als letztere.

Aufser dem *Entropium*, welches immer von *Trichiasis* begleitet ist, hat letztere noch verschiedene andere ursächliche Momente. Vorzüglich oft bringen vernachläfsigte scrofulöse Augenliederdrüsenentzündungen, *Psorophthalmien* u. dergl., mit welchen Excoriationen und Geschwüre der Augenliedränder verbunden sind, die Krankheit hervor; hier werden die Augenliedränder *calloes*, vernarbt und oft gänzlich verbildet, die *Cilien* werden dadurch von ihrer gewöhnlichen Richtung entfernt, und so nicht selten zum Durchbruch in der Gegend der innern Kante der Augenliedränder genöthigt. Zuweilen sind aber die Wurzeln der Augenliedränder normal gewachsen, und die *Cilien* sind nur, so weit sie aus dem Augenliedrande hervorstehen, nach dem *Bulbus* gekrümmt; diefs kann nicht selten bei ganz reinen Augenliederdrüsenentzündungen, mit welchen keine Excoriationen, Geschwüre und Narben vereinigt sind, Statt finden, wenn sich die Leidenden mit den verklebten und verkrusteten *Cilien* immerfort auf das Gesicht legen.

Die Vorhersage ist bei der *Trichiasis* günstig, wenn ihr keine Verbildung des Augenliedrandes zum Grunde liegt; ist sie aber durch Verbildung jenes Randes bedingt, so wird eine gründliche Kur selten möglich sein. *)

---

*) Herr Dr. Jäger zu Wien hat neuerlichst folgende, von ihm schon einige mal mit ziemlich günstigem Erfolg gemachte Operation vorgeschlagen, um die durch Mifsbildung des Augenliedrandes bedingte vollkommene *Trichiasis* zu beseitigen, die ich nach Anderer und meiner eigenen Einsicht verbessert hier mittheilen will. Nachdem ein Gehülfe mit seinem rechten oder linken Zeige - und Mittelfinger das kranke Augenlied sanft angespannt und etwas nach oben gezogen, dasselbe auch der Operateur, vom äufsern Augenwinkel aus, gethan hat, trennt dieser mittelst eines Messerchen mit convexer Schneide, ungefähr eine halbe Linie oberhalb des Augenliedrandes, die allgemeine Decke, und zwar am rechten Auge vom äufsern, am linken vom inneren Augenwinkel her, nach der Richtung des Augenliedrandes. Sobald nun das Blut mittelst eines mit kaltem Wasser getränkten Schwammes entfernt worden, fafst der Operateur mit einer

Die Heilung geschieht durch allmähliges, *) öfteres Ausreifsen der fehlerhaft gewachsenen *Cilien* mittelst einer Haarzange, mit welcher man die Haare, so nahe am Augenliedrande als möglich, fafst, und sie in gerader Richtung schnell auszieht. War hier die Richtung der Augenliedhaarwurzeln normal (wie es meistens der Fall ist, wenn keine Verbildungen des Augenliedrandes durch Narben und dergl. vorhanden sind) so werden die nachwachsenden Wimpern auch ihre gehörige Form wieder bekommen. In allen übrigen Fällen ist das Ausziehen nur Palliativmittel; kann aber zuweilen zum Radicalmittel werden, wenn das Ausziehen jener Haare fleifsig fortgesetzt wird, wo dann Callisens, **) Rowley, ***) Beer u. a. sahen, dafs, vorzüglich bei jungen Subjecten, das Nachwachsen der *Cilien* und *Pseudocilien* aufhörte. Soll übrigens das Ausziehen der Cilien und Pseudocilien Besserung

---

gut gearbeiteten Pincette den untern Wundrand an einem zur Hand stehenden Winkel, trennt denselben in langsamen Messerzügen bis auf den *Tarsus*, mit Wegschneidung der Wimpern sammt ihren Wurzeln, und schont dabei natürlich die Thränenpunkte. Nachdem man die Wunde genau besichtigt und etwa vorhandene Cilienwurzeln, die unmittelbar über dem Knorpel liegen, ausgerottet hat, bedeckt man das Augenlied mit einer in *Aqua frigida* getauchten Compresse und heilt sie auf diese Weise.

Um während der ziemlich mühsamen Operation eine sichere Unterlage zu haben, ist es sehr anzurathen, ein hörnernes oder hölzernes, nach der Wölbung des Augapfels geformtes, löffelförmiges Instrument zwischen das Augenlied und den Augapfel zu schieben. Zang †) hat ein dergleichen abgebildet; Saunders bediente sich bei Ausschneidung des *Tarsus* (*S. Entropium*) eines ähnlichen. — Diese Operation sahe ich im Sommer 1817 in der Spitalklinik des Hrn. Prof. Beer durch Hrn. Dr. Rosza verrichten; konnte aber, wegen einer Reise nach dem Süden von Europa, den Erfolg derselben nicht abwarten.

†) Darstellung Blut. Heilk. Operationen. 2 Bd.

*) Um einen allzustarken Reitz zu verhüthen, darf man täglich nur 3 — 4 *Cilien* ausziehen.

**) Dessen chirurg. Handbuch.

***) *Disease of the Eyes.*

und endliche Heilung bewirken, so müssen dieselben nicht nur ihrem Insertionspunkte so nahe als möglich mit der durchaus nicht scharfen Haarzange gefafst, sondern auch nur durch einen ziemlich schnellen Zug mit derselben, und genau in derjenigen Richtung in welcher die Haare zu Tage gehen, ausgezogen werden. Im entgegengesetzten Falle darf man sich nicht wundern, wenn die Haare abreissen und die noch festsitzenden Stumpfe derselben den *Bulbus* mehr reitzen, als zuvor. — Die *Trichiasis*, welche das *Entropium* begleitet, kann nur durch Heilung des letztern beseitigt werden.

Das auswärts gewendete Augenlied, *Ectropium*, [ἐκ, aus, auswärts, und τρεπω, ich wende,] *Ectropion*, *Inversio palpebrarum*, das Plärrauge.

Diese, vorzüglich an dem untern Augenliede haftende, Krankheit besteht in einer Auswärtswendung der innern Fläche der Augenlieder *) welche, aufser dem grofsen Uebelstande selbst, bei *Ectropium* des untern Augenliedes meistens auch ein Thränenträufeln verursacht, weil die von diesem Augenliede gebildete Rinne fehlt, welche die Thränen zu dem untern Thränenpunkte hin leitet.

Die Ursache dieses Fehlers liegt oft in einer Verkürzung der äufsern Haut der Augenlieder durch Wunden, Geschwüre u. dergl., wo er alsdann gar nicht selten mit einem Unvermögen, den Augapfel völlig zu bedecken, *Lagophthalmus*, zugleich erscheint, oder er liegt in einer Verlängerung und Ausdehnung der innern Haut der Augendeckel durch Brei- und Fleischgeschwülste, oder durch allgemeine Fleischwucherungen der *Conjunctiva palpebrarum*, *Ectropium sarcomatosum vel luxurians*, welche oft in einem Augenliedtripper, in einer *Ophthalmia gonorrhoica* in scrofulösen

*) Siehe Taf. I. Fig. 1.

Augenentzündungen oder auch in reinen Augenentzündungen, die mit starker Anwulstung der *Conjunctiva* verbunden auftreten, gegründet sind. Zuweilen giebt eine *Blepharophthalmia glandulosa pura*, vorzüglich bei alten schlaffen Subjecten, bei welchen nach und nach die Commissuren der Augenlieder durchfressen werden, Gelegenheit zu einer Auswärtsstülpung des Augenliedes, welche man hier *Ectropium senile* genannt hat. Mit demselben Namen belegt man dasjenige *Ectropium*, welches ebenfalls bei alten Leuten vorkommt und in einer Lähmung des Schliefsmuskels seinen Grund hat.

Bei denen *Ectropien*, welche nach Narben und dadurch gesetzten Verkürzungen der äufsern Theile der Augenlieder entstanden sind, ist die Prognose sehr ungünstig; meistens ist hier die Mifsstaltung ganz unheilbar. Fast dasselbe gilt von dem *Ectropium senile*. Das *Ectropium sarcomatosum* hingegen läfst, vorzüglich wenn es erst jüngst entstanden ist, eine viel günstigere Vorhersage zu, und auch das veraltete kann meistens ohne grofse Mühe beseitigt werden.

Die Heilung ist, wenn Narben der Augenlieder Schuld an der Krankheit haben, wie schon aus der Prognose erhellt, sehr mifslich; man hat früher horizontale Einschneidungen in die Bedeckungen der Augenlieder, und Auseinanderziehen der Wunde empfohlen, damit diese letztere verlängert werde; indefs fand man darin kein grofses Heil. Mit mehr Nutzen hat man Stücke aus der *Conjunctiva* des *Ectropium's* geschnitten. Man hat auch die äufsern Narben ausgeschnitten, wo diefs anging, und die Wunde bei gehöriger Wiedereinrichtung des *Ectropium's* vernarben lassen.

Alle vorgeschlagene Mittel, um die Narben zu erweichen und auszudehnen, leisten gar nichts; wohl aber ist man durch Beharrlichkeit und Ausdauer zuweilen im Stande, die übrigen Parthieen des Augenliedes, aufserhalb der Grenzen der Narbe, durch geeignete Mittel zu erweichen und zu verlängern. Nur möchte, bei vollständiger Ausstülpung des ganzen Augenliedes,

auch dieses Verfahren nur selten einigen Erfolg haben. Um aber partielle, durch Narben entstandene *Ectropia* auf diese Art zu heilen, ist es nothwendig, dafs man etwa vorhandene sarcomatöse Wucherungen der Bindehaut des ausgestülpten Augenliedes nach den Regeln der Kunst zuvor entfernt und das *Ectropium partiale* reponirt; zugleich aber auch dasselbe in dieser normalen Lage durch Verschliefsung beider Augenlieder mit fest klebenden Heftpflastern erhält. Dabei wird dann die äufsere Fläche der reponirten Palpebra alle 3 bis 4 Stunden mit einem nicht trocknenden Oehle, z. B. mit *Oleum olivarum*, *Oleum amygdalarum*, oder mit einem Fette, wozu das gewöhnliche Schweinefett tauglich ist, eingerieben. Immer hat man hierbei darauf zu achten, dafs die Pflaster gleichförmig liegen bleiben und nur alle 2 Tage erneuert werden. Es wird übrigens kaum nöthig sein, zu bemerken, dafs zu dieser Kur, je nachdem das Uebel geringer oder bedeutender ist, viele Wochen, ja mehrere Monate gehören, und das ganze Verfahren in dieser Zeit keine Unterbrechung erleiden darf.

Dasjenige *Ectropium*, welches von einer Erschlaffung oder Lähmung des *Orbicularis* entstanden, meistens bei alten Leuten und immer nur am unteren Augenliede gefunden wird, zeichnet sich dadurch vor den übrigen *Ectropien* aus, dafs auch bei längerer Dauer des Uebels, wenig oder gar keine sarkomatösen Wucherungen auf dem *Ectropio* entstehen, obwohl dasselbe sehr geröthet ist und mehr Blutgefäfse zeigt, als die *pagina interna* eines gesunden Augenliedes. Es leidet diese Regel nur da eine Ausnahme, wo eine zufällig im Körper vorhandene Dyscrasie am Augendeckel Sitz genommen hat und dem Leidenden eine schmuzzige Lebensart und der übermäfsige Genufs geistiger Getränke eigen ist.

Die Heilung der Ausstülpungen von Lähmung des *Orbicularis*, ist nicht in allen Fällen möglich, immer aber sehr langwierig. Die zweckmäfsigsten Mittel sind Einreibungen in die äufsere Haut des Augenliedes von reitzenden, spirituösen und öhligen Medicamenten,

z. B. *Oleum animale Dippelii, Ol. foeniculi, Ol. cajeput. Liq. ammon. caust. Aether sulphuricus, Spirit. angelicae comp. Ra canthar. etc. etc.* Auch von der Electricität sahe ich zuweilen Nutzen. Immer ist es bei Anwendung dieser Mittel nothwendig, gleichzeitig die Reposition des ausgestülpten Augenliedes zu machen und dasselbe durch gut klebende Heftpflaster längere Zeit hindurch in der normalen Lage zu erhalten.

Ausstülpungen, welche von Wunden der Augenwinkel entstanden sind, müssen eingerichtet, und nach denen bei den Wunden der Augenlieder angegebenen Regeln behandelt werden.

Um das *Ectropium sarcomatosum* zu heilen, bestreiche man, wenn die Krankheit noch neu ist, die noch empfindlichen Wucherungen täglich mit *Tinct. opii simplex*, welcher man späterhin *Aether sulphuric.* zusetzt; gehe dann zu schwachen Salben mit *Mercur. praec. rbr.* über, vertausche diese darauf mit dem *Lap. infernal.* und endlich mit der Spiefsglanzbutter; wobei man die Theile vorher scarificiren mufs, wenn sie ganz unempfindlich sind. Ist die wuchernde Bindehaut hart, körnig, unempfindlich und sehr veraltet; so zieht man mittelst eines Hakens die Anwulstungen vom Augenliede möglichst ab, und schneidet die harte Geschwulst vom *Tarsus* so rein als möglich weg, jedoch ohne diesen zu verletzen. Das Augenlied fügt sich jetzt in seine normale Lage, entzündet sich etwas, und heilt dann in wenigen Tagen. In hartnäckigen Fällen, oder wenn die körnigen Wucherungen nicht ganz weggenommen wurden, wird es zuweilen nöthig, unmittelbar nach der kleinen Operation, oder bald nachher, den *Lap. infernal.* örtlich anzuwenden. Hausen dyscrasische Processe in dem Augenliede, so wird man auch diese *lege artis* wegzuschaffen suchen müssen, wenn man vor allen Rezidiven gesichert sein will.

Man findet zuweilen *Ectropia* des unteren Augenliedes, welche in Folge einer vernachläfsigten *Blepharophthalmia glandulosa* bei alten Subjecten entstanden sind, und die durch den steten Genufs piquanter Speisen und geistiger Getränke unterhalten und verschlim-

mert werden. Bleiben solche *Ectropia* 10 und mehrere Jahre lang ungeheilt, wie dieses zuweilen geschieht, so sehen wir nicht allein bedeutende sarkomatöse Wucherungen auf dem ausgestülpten Augenliede, sondern dieses und dessen Orbicularis befinden sich auch in einem erschlafften, an völlige Lähmung gränzenden Zustande, welcher durch die lange Unbrauchbarkeit desselben erzeugt zu sein scheint; damit hat sich aber zugleich eine wirkliche Verlängerung des Augenliedrandes vergesellschaftet, welche nicht etwa durch Zerstöhrung, sondern nur durch die Ausdehnung der *Ligamenta interpalpebralia* entstanden ist. Dadurch wird die Heilung nicht nur schwierig, sondern auch nach den bisher bekannten Methoden unmöglich; denn beseitigt man auch die, nach und nach hart, körnig, ja knorpelartig gewordenen sarcomatösen Wucherungen der Bindehaut, reponirt man auch das Augenlied, und erhält man es durch Verschliefsung beider Augendekkel durch Heftpflaster in dieser Lage, wendet man dabei auch reitzende Einreibungen in die äufsere Fläche des Augenliedes dauernd an, um die Erschlaffung zu heben, so kommt das *Ectropium* dennoch wieder, wenn auch der Leidende Geduld genug haben wollte, alle diese, zum Theil sehr langwierigen Proceduren auszuhalten, denn die wahre Verlängerung des Augenliedrandes hebt man dadurch auf keine Weise; selbst die bei alten Personen sehr schlaffe äufsere Haut, welche durch die lange Dauer dieses Uebels gleichsam faltenartig herabhängend geworden, wird man dadurch nicht leicht im Stande sein, gehörig zu beseitigen. Bei solchen, nicht ganz selten vorkommenden Fällen, deren Diagnose man aus der genauen Erforschung der *Anamnese* erfahren wird, habe ich folgendes Verfahren mit grofsem Glücke ausgeführt: ich habe nähmlich die harten, sarkomatösen Wucherungen der Bindehaut mit einem Haken, wie man ihn bei Ausschälung von Balggeschwülsten der Augenlieder braucht, gefafst, und darauf mit dem Benedict'schen Messerchen, zur Eröffnung des Thränensackes, nicht nur diese, so viel als möglich war, gänzlich entfernt, sondern auch in der

Mitte des Augenliedes den *Tarsus*, in einer Länge von ungefähr 2 Linien so abgetragen, dafs demungeachtet die äufsere Kante des Augenliedrandes unverletzt blieb. Nachdem dieses geschehen, habe ich das *Ectropium* reponirt, und durch gut klebende, täglich und vorsichtig erneuerte Heftpflaster bis zur gänzlichen Vernarbung in der normalen Lage erhalten. War es nothwendig, so habe ich das nicht nur über diese Zeit hinaus fortsetzen lassen, sondern auch die Einreibungen reitzender, spirituöser Flüssigkeiten nach geschehener Vernarbung nicht vernachläfsigt. In denen Fällen, bei welchen ich bisher dieses Verfahren in Anwendung brachte, wurde das *Ectropium* dauernd geheilt, und es blieb nichts zurück, als ein kleiner *Sulcus* an der Stelle des Augenliedrandes, wo der *Tarsus* ausgeschnitten worden war. Die Basis, worauf ich fufste, als ich diese Methode zum ersten Male ausführte, ist der Erfahrungssatz, dafs jede Wunde mit Substanzverlust, wenn sie nicht durch Contraction zerschnittener Muskeln erweitert wird, das Eigenthümliche hat, dafs sich deren Ränder während der Heilung einander nähern. Diefs geschieht nach gehöriger Reposition des *Ectropii* auch in unserem Falle, dadurch erhält der Augenliedrand seine normale Länge wieder, und schliefst sich nun gut an den Augapfel an. Man hat sich bisher viel zu sehr vor den künstlichen Verletzungen des *Tarsus* gefürchtet. Da mir hier der Ort nicht zu sein scheint, dieses operative Verfahren ausführlich abzuhandeln, so habe ich mir vorgenommen, dieses in einer periodisch von mir erscheinenden Schrift zu thun, welche den Titel führt: *Icones ophthalmologicae seu selecta circa morbos oculi humani*, deren erstes Heft eben unter der Presse ist.

Die Verwachsung der Augenliedränder unter einander, *Anchyloblepharon*, [*αγχυλη*, Verwachsung, und *βλεφαρον*, Augenlied] und die Verwachsung des Augapfels mit den Augenliedern, *Symblepharon*, *Prophysis*, *Enothes*.

Die Definition dieser beiden Fehler liegt schon in der Ueberschrift.

Man hat eine vollkommne und unvollkommne Verwachsung der Augenliedränder unter einander, *Anchyloblepharon perfectum et imperfectum.* *) Eben so giebt es eine Verwachsung der Augenlieder mit dem gröfsten Theile der *Conjunctiva bulbi*, *Symblepharon perfectum*, und eine nur an einzelnen Stellen derselben zu Stande gekommene, *Symblepharon imperfectum.* Beide Arten des *Symblepharon* kommen meistens nur am obern Augenliede vor.

Ein wichtigerer Unterschied findet nun noch Statt, wenn das *Anchyloblepharon* und *Symblepharon* unmittelbar oder mittelbar durch eine besondere Haut, bei ersterem zwischen den Rändern beider Augenlieder, bei letzterm zwischen dem Augenliede und dem *Bulbus*, bewirkt worden ist, indem diese Art der mittelbaren Verwachsung vielen Einfluſs auf die Prognose haben muſs.

---

*) Eine ganz eigne Art eines *Anchylob. partial.* hatte ich vor kurzem Gelegenheit zu beobachten und zu heilen, was seiner Seltenheit wegen aufgezeichnet zu werden verdient. In Folge des festen und lange Zeit dauernden Verbinden eines Auges, welches im innern Augenliedwinkel an einem über die obere und untere Augendecke verbreiteten Geschwüre gelitten hatte, waren nicht die gesunden Ränder, sondern die geschwürigen äuſsern Flächen beider Augenlieder so in Berührung gekommen, daſs sie hier zusammengewachsen waren, den Augapfel selbst dadurch fast zur Hälfte versteckten, einen äuſserst originellen Anblick verursachten und das Sehen dieses Auges nach der Nase hin völlig verhinderten. Das völlige Durchschneiden dieser Hautfalte mit einer geraden Augenscheere, und das möglichste Auseinanderhalten der Wundränder, hob, jedoch nur bei wiederholter Operation erst, die bedeutende Entstellung.

Der unwichtigste Unterschied, den man gemacht hat, findet sich zwischen *Anchyloblepharon spurium et verum*, wovon das letztere eine wirkliche Verwachsung, das erstere aber nur eine Zusammenklebung der Augenlieder unter sich, andeutet.

Die Ursachen, welche beide Krankheiten am oftesten hervorbringen, sind vorzüglich traumatischer Art, z. B. Verbrennungen durch Feuer, ungelöschten Kalk, oder concentrirte Mineralsäuren. Auch *Psoraphthalmien* mit *Excoriationen* hinterlassen zuweilen solche Verwachsungen. In seltenen Fällen ist der Fehler angebohren.

Die Vorhersage beruhet ganz auf der individuellen Form der Krankheit; denn je nachdem noch deutlicher Lichtschein vorhanden, die Verwachsungen nur partiell sind, oder je mehr jeder Lichtschein aufgehoben, je stärker die Verwachsungen, vorzüglich die unmittelbaren, mit dem *Bulbus* sind, u. s. w. desto mehr oder weniger wird hier von einer Operation, als dem einzigen Heilmittel, zu erwarten sein. Die Operation des *Anchyloblepharon* wird übrigens da vorzüglich ein günstiges Resultat gewähren, wo die Verwachsung nur in der Mitte der Augenlieder Statt findet, oder eine Zwischenhaut vorhanden ist; dagegen die partiellen Verwachsungen, welche sich nur in den Winkeln der Augenlieder, vorzüglich im äufsern Augenwinkel vorfinden, nach ihrer Trennung gar leicht wieder entstehen und daher eine besonders aufmerksame Nachbehandlung erfordern.

Operation des *Anchyloblepharon*. — Dafs die Verwachsung der Augenliedränder nicht mit *Symblepharon* vereinigt ist, entdeckt man, wenn man den obern Augendeckel mit dem Finger fafst, von dem Augapfel abzieht, und dann das Auge stark bewegen läfst; hier wird man nicht nur die kleinste Verwachsung mit den Augenliedern bemerken, sondern sogar ihren Umfang ziemlich bestimmt berechnen können. Auch durch eine feine fischbeinerne Sonde entdeckt man ein vorhandenes *Symblepharon* bald. Dafs die *Cornea* nicht mit der *Conjunctiva palpebrarum* vereinigt ist,

wird aus dem deutlichen Lichtschein, indem der Kranke feine Abstufungen des Lichtes durch die Augendeckel bemerkt, und durch die Sonde erkannt. Geht dem Kranken auch der geringste Lichtschein ab, so kann man von einer völligen Verwachsung der *Cornea* mit dem Augenliede überzeugt sein, und die Operation als unnütz unterlassen. Findet man beim Befühlen des *Bulbus*, durch die Augenlieder, dafs derselbe auf irgend eine Art desorganisirt ist, und ist die Lichtempfindung dabei unbedeutend, so läfst sich von der Operation ebenfalls nichts hoffen.

Um nun eine unmittelbare Verwachsung der Augenlieder zu trennen, bringt der Operateur, indem sein Gehülfe den obern Augendeckel mit dem Daumen und Zeigefinger in eine Querfalte fafst, und von dem Augapfel ab- und aufwärts, er selbst aber das untere Augenlied ebenfalls von dem Augapfel weg, und abwärts zieht, ein schmales, an der Spitze völlig stumpfes *Bistouri* in den innern Augenwinkel, zwischen dem Augapfel und den Augenliedern so ein, dafs die Schneide desselben, langsam nach dem äufsern Augenwinkel zu, durchgeführt werden kann, ohne das eine oder das andere Augenlied zu verletzen. — Findet sich eine mittelbare Verwachsung durch eine Membran, so mufs der Schnitt ganz am Rande des obern Augenliedes durchgeführt, und die am untern Augenliede ansitzende Haut, mit einer geraden Augenscheere abgeschnitten werden.

Damit die eben gelösten Augenlieder nicht wieder verwachsen, mufs der Kranke in der nächsten Nacht wo möglich wach erhalten, und die wunden Ränder mit *Aqu. rosarum* und *Acet. saturn.* gewaschen und mit einer Salbe aus Butter und *Tutia* öfters bestrichen werden.

Operation des *Symblepharon.* — Sobald der *Bulbus* unmittelbar mit dem Augenliede verwachsen ist, so werden die Augenlieder wie im vorigen Falle abgezogen und mit einem schmalen, an der Spitze abgerundeten, stumpfen und elastischen Leber'schen Scalpel, mehr durch gelinden Druck als Schnitt, von einander

getrennt. — Ist dagegen das *Symblepharon* durch häutige Balken gesetzt worden, so trenne man diese Balken zuerst von der *Conjunctiva palpebrae,* fasse darauf die jetzt noch an der *Conjunctiva bulbi* festsitzenden Balken mit einer Haarzange und trenne sie sauber davon ab. Auch hier müssen Augenwässer, mit *Acetum saturn.* vermischt, häufig und unmittelbar nach der Operation angewendet werden. Aufserdem hat mir, sowohl nach Beseitigung des *Anchyloblepharon* als auch nach der des *Symblepharon,* folgende Salbe wesentliche Dienste geleistet, wenn ich davon alle zwei Stunden einer Linse grofs zwischen die Augenlieder bringen liefs: ℞. *Flor. zinci, Tutiae praep.* āā *gr. xjj. Acet. saturn. gtt. xjj — xv. Axung. porc.* ʒ*jj. M. exactssme.*

Folgen Recidive der Krankheit, welche durch beständiges Bewegen des Auges verhüthet werden können, so mufs die Operation natürlich wiederholt werden.

Die Brei- Honig- und Specksackgeschwülste der Augenlieder und der Umgegend.

Der Kranke bemerkt anfangs eine sehr kleine, weiche, elastische, begränzte, mehr oder weniger bewegliche, unschmerzhafte Geschwulst in dem obern Augenliede, in der Nähe des äufsern Augenwinkels, in der Umgegend der Augenlieder, oder in selteneren Fällen an dem untern Augendeckel, die keinen Augenblick den Druck des Fingers behält, übrigens von der Haut, in Hinsicht der Farbe, sich gar nicht unterscheidet. Ihre Form ist bald rund, bald oval, bald platt gedrückt, bald vollkommen bauchigt.

Die Brei- und Honiggeschwülste wachsen oft bis zur Gröfse eines kleinen Hühnereies, — wo man dann auch Fluctuation fühlt, — und enthalten recht oft eine weifsliche Masse, die dem käsigten Theil der Milch sehr ähnlich sieht. Die Speckgeschwülste, die sich immer an der Umgegend der Augenlieder, nie aber an den letztern selbst, zu finden scheinen, erreichen hingegen höchstens nur die Gröfse einer Haselnufs, und

zeigen natürlich niemals Fluctuation. Zuweilen enthalten die Bälge eine Masse, welche weder breiartig zu nennen noch mit der der Speckgeschwülste zu vergleichen ist, indem dieselbe das Mittel hält zwischen Gallert und jungem Fleische, wobei sie eine, dem Fette ähnliche Structur zu haben pflegt; öffnet man dergleichen Bälge, so quellen gewöhnlich bläschenförmige Gallertklümpchen hervor, welche beim Fassen mit der Pincette nicht die geringste Festigkeit zeigen. Diejenigen Sackgeschwülste, welche auf dem *Tarsus* festsitzen, sind meistens nicht beweglich; doch zeigen sie zuweilen eine täuschende Beweglichkeit, wenn sie auch fest mit dem *Tarsus* verwachsen sind. Um sich von dieser Verwachsung vor der Operation gehörig zu überzeugen, mufs man es früher durch einige Tage öfters versuchen, sie in dem Zellgewebe allmählig weiter zu schieben, und endlich über den obern Augengrubenrand, bis gegen die Augenbraunenwulst zu bringen. Geht dieses keinesweges an, so ist es ein bestimmtes Zeichen, dafs der Sack mit dem Augenliedknorpel selbst verwachsen ist, oder dafs er wenigstens unter den Augenliedmuskeln, und nicht unmittelbar unter der Haut, seinen Sitz hat; wonach man sich dann bei der Operation richten mufs.

Die Ursachen sind in den meisten Fällen catarrhalischer Art. Ein unterdrückter Schnupfen, eine schnell unterdrückte catarrhalische Augenliederentzündung, u. s. w. sind häufig im Stande, die Entstehung von Balggeschwülsten in den Augendeckeln zu veranlassen. Seltener entstehen sie in Folge einer äufsern mechanischen Verletzung, z. B. einer Quetschung, u. s. w.

Die Prognose ist bei allen diesen Sackgeschwülsten günstig, und es bleibt nur eine wenig sichtbare Hautnarbe zurück, wenn zur rechten Zeit zweckmässige Hülfe geleistet wird. Sobald aber der Sack sehr ungeschickt ausgeschält, oder mit Aetzmitteln behandelt worden, können leicht *Ec-* und *Entropia*, *Lagophthalmos*, Verschrumpfung des *Tarsus*, und andere oft unheilbare Formkrankheiten zurückbleiben.

Die Ausschälung des Sackes und die Heilung der

Wunde durch die geschwinde Vereinigung, ist die gründlichste und schnellste Heilart aller jener Balggeschwülste. *) Sie mufs aber auf verschiedene Art verrichtet werden, was sich nach der Gröfse, und besonders nach der Lage des Uebels richtet.

Hat daher die Balggeschwulst unmittelbar auf dem Thränensacke, auf dem *Tarsus*, oder ganz unter dem *Ligamento interpalpebrali externo* ihren Sitz, so wird man meistens wohl thun, nur die vordere Hälfte des Sackes zu entfernen, und das zurückbleibende Stück entweder der Eiterung oder der Aufsaugung zu überlassen. Den erstern Weg pflegt man dann einzuschlagen, wenn man nicht im Stande war, die gröfsere Hälfte des Balges durch das Messer zu entfernen. In diesem Falle verbindet man die Wundhöhle mit Charpie, welche mit warmen Wasser getränkt war, legt ein Heftpflaster darüber und sieht zu, ob sich der Rest des Sackes durch Eiterung losstöfst. Sollte die Eiterung zu träge fortschreiten, so kann man statt des warmen Wassers, das *Laudanum liquidum Sydenhami*, oder das *Unguentum digestivum* wählen und damit die Wunde so lange verbinden, bis der Grund derselben ein reines, rothes Ansehn gewinnt, worauf man die Charpie entfernen mufs, damit die Wundfläche zuheilen kann. Der Aufsaugung kann man das zurückbleibende Stück dann mit Sicherheit überlassen, wenn dasselbe unbedeutend ist. In diesem Falle heilt man daher die Wunde durch schnelle Vereinigung. Auch dieser Weg wird selten hülflos lassen, und ist für Arzt und Kranken der bequemste. Wenn man bei der Operation einer Balggeschwulst in der Nähe des äufsern Augenwinkels, Gefahr läuft, das *Ligamentum interpalpebrale*

---

*) Nach einigen soll man indefs erst versuchen, die vielleicht unbedeutende Geschwulst zu zertheilen; so beseitigte Boyer (Abhandlung über die chirurgischen Krankheiten etc. Uebersetzt von Prof. Textor, Würzburg 1820. 5. Bd. S. 243.) durch häufige Anwendung einer *Solut. ammon. mur. dep.* und durch Auflegen eines Pflasters aus *Empl. saponat.* und *Empl. diachyl. c. gummi*, das Uebel schon manchmal.

zu zerschneiden, so ist stets anzurathen, den Hautschnitt in perpendiculärer Richtung zu machen.

Sitzt das Uebel nun aber weder auf dem Thränensacke, noch am Augenliedknorpel etc., so untersuche man, bevor operirt wird, genau, ob dasselbe über oder unter dem *Orbicularis* liegt. Hat die Balggeschwulst unmittelbar unter der Haut des oberen oder unteren Augenliedes ihren Sitz, so mache man in perpendiculärer Richtung eine Hautfalte über der Geschwulst, und durchschneide diese in horizontaler Richtung und parallel mit dem Augenliedrande, doch so, dafs der Hautschnitt etwas gröfser ausfällt als die Geschwulst ist. Diefs geschieht am besten mit einem kleinen *Scalpell* mit bauchigter Schneide. Nachdem nun die Blutung mit kaltem Wasser gestillt worden ist, wird man den Balg ohne grofse Mühe an seiner weifslichten, glänzenden Farbe erkennen; diesen fasse man nun fest, doch ohne denselben zu durchdringen, mit einem einfachen oder doppelten Haken, (Siehe *Tab. V. Fig.* 17. und 2.) ziehe darauf den Balg etwas nach aufsen, und suche denselben vermöge eines vorn abgerundeten, stumpfen, elastischen, kleinen und an den Seiten schneidenden Leber'schen Messers, theils von dem Zellgewebe und den Muskeln loszustreifen, theils, wenn diefs nicht möglich ist, mit dem scharfen Seitenrande des Messers loszuschneiden. Statt dieses Messers habe ich mich häufig einer im verjüngten Maafsstabe gefertigten Cooper'schen Scheere mit grofsem Nutzen bedient, weil sie schneller zum Zwecke führt. Man operirt übrigens bequemer, wenn der Sack einige Tage vor der Operation durch öfteres Hin- und Herschieben in der Haut, beweglich gemacht worden ist. Nachdem nun die Wunde aufgehört hat zu bluten, legt man ein, zwei bis drei blutige Hefte, mit dazwischengelegten trocknen Heften an, und behandelt das Ganze wie jede horizontale Verwundung des Augenliedes. Vor der zurückbleibenden kleinen Narbe hat man sich übrigens gar nicht zu fürchten, denn diese wird in der Regel kaum für den Kenner sichtbar.

Ist

Ist die äufsere Haut des Augenliedes mit der Balggeschwulst fest verwachsen, was besonders dann Statt findet, wenn lange Zeit hindurch vergebliche Versuche, die letztere zu zertheilen, gemacht wurden, so kann man freilich keine Hautfalte machen, vielmehr mufs man sich meistens begnügen, durch Haut und Balg zugleich einen Horizontalschnitt zu schneiden, das *Contentum* des Sackes zu entleeren, und dann die Vereiterung desselben auf die bereits angegebene Art oder durch sehr vorsichtig gebrauchte Aetzmittel zu befördern.

Befindet sich die Balggeschwulst hoch oben im oberen Augenliede und unter dem *Levator palpebrae*, so wird man gleichfalls genöthigt, äufserlich den Hautschnitt zu machen; denn obgleich die Operation etwas schwieriger ist und langsamer von Statten geht, so pflegt man jene doch nur auf diese Weise ganz heraus zu befördern.

Liegt nun aber die Geschwulst im unteren Augenliede, unter dem *Orbicularis*, oder im obern Augenliede gleich in der Nähe des Randes desselben, und gleichfalls unter dem *Orbicularis*, in welchem Falle der Ort des Sitzes meistens durch eine gröfsere Anhäufung von Blutgefäfsen auf der *pagina interna palpebrae* erkennbar wird, weil der Balg fast in allen Fällen mit der Bindehaut des Augenliedes verwachsen ist, so mufs man auch diesen Ort zur Operationsstelle wählen. Man verfährt dabei am besten folgendermaafsen: befindet sich das Uebel am unteren Augenliede, so läfst man den Kranken den *Bulbus* ganz nach oben richten, stülpt das Augenlied um, und läfst dasselbe in dieser Lage von dem Gehülfen nicht nur fixiren, sondern auch die Geschwulst durch einen gelinden und gleichförmigen Druck mehr hervorspringend machen. Dasselbe geschieht auch, wenn das Uebel am obern Augenliede haftet, nur mufs hier der Kranke den Augapfel nach unten wenden. Nun macht man mittelst eines kleinen Bistourie zwei halbmondförmige Schnitte, welche genau die hervorstehende Geschwulst umfassen, und hüthet sich den *Tarsus* zu verletzen. Nachdem die

Blutung durch kaltes Wasser gestillt worden ist, drückt der Gehülfe die Geschwulst noch mehr nach aufsen, welches leicht gelingt, weil durch jene beiden Schnitte die Banden des Balges gleichsam gesprengt worden sind. Jetzt fafst der Operateur, ohne den Sack von der inneren Haut des Augenliedes zu entblöfsen, die Geschwulst mit einem einfachen oder doppelten Haken und schneidet die bedeckende Haut sammt dem Balge mittelst jener schon erwähnten Cooper'schen Scheere aus. Nachdem die Blutung gestillt worden, läfst man in den ersten 36 Stunden fleifsig kaltes Wasser überschlagen, worauf man täglich 5 bis 6 Mal von folgendem Augenwasser einige Tropfen zwischen die Augenlieder bringen lassen kann: ℞. *Laud. liquid. S.* ʒj. *Aquae rosar.* ℥jj. *Macil. Gummi arabici* ʒjß. *M.* Sollte die Wunde zu langsam mit Fleischwärzchen ausgefüllt werden, dann ist der örtliche Gebrauch des *Laud. liquid.* am rechten Orte; wo aber die Fleischwärzchen zu üppig wuchern, da kann man einmal den *Lap. infernal.* anwenden.

Man hat sich vor der Ausschneidung eines kleinen Stückes der inneren Augenliedhaut bisher sehr gefürchtet, weil man die Meinung hegte, dafs darauf ein *Entropium* entstehen müsse; ich habe dieses indefs niemals darauf entstehen sehen, obgleich ich allein in den letzt vergangenen 3 Jahren mehr als 30 Balggeschwülste auf diese Art glücklich entfernte.

Ist man genöthigt, bei messerscheuen Patienten das Contentum der Sackgeschwülste durch einen grossen Hautschnitt, (ein blofser Lanzettenstich ist nicht hinreichend) zu entleeren, so sehe man anfänglich zu, ob der Sack sich nicht durch die folgende Eiterung von selbst ablöset, und entweder, mittelst der Pincette, auf einmal, oder stückweise herausgezogen werden kann. Sollte diefs, wegen Dicke und Festigkeit des Sackes aber nicht der Fall sein, so wende man die jetzt nöthigen Aetzmittel ja recht vorsichtig an; überhaupt beobachte man bei diesen Balggeschwülsten, was die Chirurgie von allen dergleichen Fehlern lehrt, und bedenke dabei immer, dafs man einen edeln, zar-

ten Theil, der gar leicht Schaden nehmen kann, in der Nähe habe.

Das Wasserbläschen, *Phlictenula*, [*φλυκταινα*, von *φλυω*, ich bin voll Wasser,] *Hydatis*, Schmeerbläschen oder Hirsekorn, *Milium*, die Warzen, die Condylome und die maulbeerartigen Auswüchse der Augenlieder. Eine Art der letzteren ist unter dem Nahmen *Angiectasia palpebrarum* bekannt, von *αγγειον*, ein Gefäfschen, von *εκ* und dem veralteten *ταω*, ich dehne, spanne (aus).

Wenn sich ein kleiner länglichter Theil der *Epidermis* eines Augenliedes in eine zarte, durchsichtige, mit Wasser gefüllte, schmerzlose Blase erhebt, so nennt man diese: *Phlictenula, Hydatis*. Sie wachsen bisweilen bis zur Gröfse einer Linse und dauern unberührt manchmal Jahre lang, *) verschwinden aber zuweilen schon nach 24 Stunden von selbst wieder.

Um diefs kleine Uebel zu beseitigen, schlitzt man die Blase der Länge nach auf, schneidet das Oberhäutchen selbst, am Augenliedrande mit einer bequemen Scheere weg, und wäscht die Stelle mit etwas *Aqua saturnina*, worunter man auch etwas *Laudanum* mischen lassen kann. Nach 24 Stunden wird das kleine Leiden verschwunden sein.

Oefter als jene Wasserbläschen, findet man an der äufsern Oberfläche der Augenlieder, kleine weifse, den Hirsekörnern ähnliche Knötchen, welche eine talgartige Materie enthalten. Das Oeffnen derselben mittelst einer Nadel und das gehörige Ausdrücken nach der Oeffnung, ist zur Heilung hinreichend.

Die Warzen, *verrucae*, welche an den Augenliedern, meistens bei bejahrten Leuten, **) jedoch nicht selten

---

*) Siehe Taf. I. Fig. 2.

**) Besonders häufig finden wir sie bei Frauen nach dem Aufhören ihrer Reinigung.

auch bei Kindern erscheinen, sind entweder mit einem Stiel versehen, oder sitzen fest mit einer breiten Fläche auf der Haut. Die erstern müssen mit ihrer Wurzel ausgeschnitten und mit *Ungt. basilic.* oder *Bals. Arcaei* verbunden — oder auch nur unterbunden werden; die letztern soll man, nach Beer, lieber unberührt lassen und nur dann exstirpiren, wenn sie durch Aetzmittel u. s. w. schmerzhaft geworden sind und bösartig zu werden drohen. Bei übrigens gesunden Subjecten, und wenn man behuthsam zu Werke geht, hat man indefs keinen Uebergang zum Bösartigen zu fürchten; vielmehr kann man hier die aufsitzenden Warzen ebenfalls gleich anfangs exstirpiren oder durch *Lapis infernal.*, rauchende Salpetersäure, u. s. w. nach und nach ohne Folgen wegbringen. Bei cachectischen und alten Leuten gehe man mit diesen Auswüchsen indefs vorsichtiger um; denn hier können Aetzmittel jene traurigen Erfahrungen vermehren, welche die Aerzte in vielen Schriften niedergelegt haben.

Bösartige, mit varicösen Blutgefäfsen umgebene, sehr schmerzhafte, schnell wachsende, und gewöhnlich in *Carcinom* übergehende Warzen, *Akrochordon*, die Hr. Prof. Beer immer mit Krebs oder *Scirrhus* der Brust, oder des *Uterus* vergesellschaftet fand, mufs man wo möglich fast immer auch vom Messer unberührt lassen. Nie soll man hier das Cosmische Pulver versuchen.

So wie an mehreren Theilen des Körpers, können auch, wiewohl selten, an den Augenliedern Feigwarzen erscheinen, die entweder aus inveterirter Lustseuche hervorgegangen, oder durch örtliche Berührung mit Venusgifte entstanden sind. Sie sind bald gröfser, bald kleiner, erscheinen gewöhnlich an den Rändern der Augenlieder, sind öfters hart, trocken, zuweilen aufgesprungen und schmerzhaft, zuweilen aber auch weich.

Die Prognose ist gut.

Um sie zu entfernen, schneidet man sie mit der Cooper'schen Scheere an ihrer Wurzel weg, giebt, wenn sie secundäre Leiden der allgemeinen *Syphilis* sind, auch schon einige Tage vor dem Wegschneiden

l. a. Mercurialia, und betupft die wunden Stellen alsdann mit *Lap. infernal.*, worauf die Heilung in der Regel schnell vor sich geht.

Aufserdem finden sich an den Augenliedern zuweilen noch andere Excrescenzen u. s. w., z. B. violette Muttermähler an der äufsern Fläche, und maulbeerartige Auswüchse an der innern Fläche, gegen welche man mancherlei Aetz- und andere Mittel empfohlen hat. Unter diesen ist der *Lapis infernal.* am vortheilhaftesten zu gebrauchen; man kann mit demselben diese Gewächse nicht nur entfernen, sondern auch oft bei jenen Muttermählern jede Spur ihrer vorigen Existenz verwischen. Auch mir leistete er in zwei Fällen baldige Hülfe. Die Fleischauswüchse an der innern Fläche der Augenlieder, *) *Carunculae conjunctivae*, deren man auch auf der Bindehaut des *Bulbus* nicht selten findet, werden, wenn sie grofs sind, am besten weggeschnitten und die Wundstellen mit *Lap. infern.* oder *Laudanum* öfters betupft.

Diejenige Art von Maulbeere, welche man mit dem Nahmen *Angiectasia palpebrarum* belegt hat, bestehet in blaurothen, violetten oder auch minder dunkelrothen Geschwülsten, welche sich in der Regel weich und schwammig anfühlen, einer Maulbeere ähnlich sind und meistens am oberen Augenliede vorkommen. Sie scheinen Conglomerate von Blutgefäfsen zu sein, welche eingeschnitten, ungemein stark bluten. Man findet sie angebohren und hielt sie bisher für Muttermähler. Sie unterscheiden sich aber von diesen dadurch, dafs sie noch nach der Geburt des Kindes bis auf einen gewissen Grad oft schnell wachsen, dann aber zuweilen gänzlich stehen bleiben. Das Uebel durch Aetzmittel wegschaffen zu wollen, ist mifslich, wenn dasselbe wirklich als *Angiectasie* zu betrachten ist, und scheint nur in denen Fällen von *Morum* zu gelingen, die nicht hierher zu rechnen sind. Soll und mufs es beseitigt werden, so geschieht diefs am besten

---

*) Siehe Taf. I. Fig. 3.

durch das Messer; nur müssen dabei folgende Regeln nicht aus der Acht gelassen werden: das Messer darf nie durch die *Angiectasie* selbst geführt werden, weil eine gewaltige Blutung die Operation dann völlig unterbricht, verlängert und schmerzhafter macht; hier würde man doch nur gezwungen sein, auch die letzte Spur des Uebels durch das Messer zu entfernen, weil die noch vorhandenen Ueberbleibsel wuchern, und zwar dann am bedeutendsten, wenn man sich einfallen läfst, Aetzmittel anzuwenden.

Man schneide also stets in der die Geschwulst umgebenden gesunden Haut, indem man am besten zwei halbe Bogenschnitte rings herum beschreibt, die Haut mit einer Pincette in die Höhe hebt und die ganze Geschwulst von den gesunden Theilen lostrennt. Am besten geschieht dieses freilich, wenn das Aftergebilde keine sich tief erstreckenden Wurzeln hat. Wo dieses indefs Statt findet, darf man nicht eher ruhen, als bis Alles herausgefördert worden ist. Dafs dieses wirklich geschehen, ersieht man besonders aus der geringen Blutung und dem rein und von braunvioletten Flecken frei sich zeigenden Wundgrunde. Es versteht sich übrigens, dafs bei der Operation der *Orbicularis*, der *Levator palpebrae* und der *Tarsus* geschont werden müfsen. Gut ist es, wenn man nicht bei gar zu kleinen Kindern und während dem Zahngeschäfte operirt, weil es wohl möglich wäre, dafs Krämpfe, ja der Tod kurz nach einer solchen Operation folgen könnten. Die Wunde kann man nachher mit einer milden Salbe, z. B. mit *Unguentum altheae* verbinden. Es ist übrigens nothwendig, dafs die Augenlieder bis zur gänzlichen Vernarbung der Wunde durch gut klebende englische Heftpflasterstreifen verschlossen und ausgedehnt erhalten werden, wodurch man die Entstehung eines *Ectropii* am leichtesten verhüthet.

Exostosen der Orbitalknochen

kommen nicht gar selten vor und werden, wenn sie an den äufsern knöchernen Umgebungen des Auges ihren

Sitz haben, ziemlich leicht erkannt; weit schwerer aber, wenn sie sich an den inneren Wänden der *Orbita* entspinnen; denn hier wird ihr Dasein selbst dann oft noch nicht unzweifelhaft klar, wenn sie schon den Augapfel aus seiner Höhle hervorzudrängen anfangen.

Rhachitische, scrofulöse, syphilitische und arthritische Subjecte sind denselben am meisten unterworfen, und in diesen Uebeln hat die Krankheit am oftesten ihren Grund; doch sind auch Contusionen nicht selten Ursach der Exostosen, die dann aber fast immer an den äufsern sichtbaren Parthieen zu finden sind.

Die Behandlung richtet sich natürlich nach der Ursache. Aeufserlich sind Mercurialeinreibungen und Pflaster von *Empl. mercur.* und *Empl. de cicuta*, besonders zu empfehlen. Sollten Entzündungen des *Periostei*, aus welchen jene Exostosen hervorzugehen pflegen, früh genug entdeckt werden, so leisten anfänglich Umschläge von sehr kaltem Wasser, Blutigel, dann Mercurialeinreibungen, bei Nichtvernachlässigung der nöthigen inneren *antidyscrasischen* Mittel, die trefflichsten Dienste und ersticken jene Producte zuweilen gänzlich.

Osteosarcome der Orbitalknochen

haben immer ihren Grund in einer vorhergegangenen Exostose, welche in eine speckartige, gleichförmige, weiche Masse ausartet; indefs kommen Osteosarcome sehr selten an den Knochen der *Orbita* vor.

Die Ausrottung dieser Geschwülste durch Messer und Glüheisen, neben Berücksichtigung der Ursachen aus welchen das Leiden entsprang, sind noch die sichersten Mittel, diesem langwierigen und oft in krebshafte Ausartungen übergehenden Uebel und dem daraus erfolgenden endlichen Tode, zuvorzukommen. — Zuweilen geht die Exostose in *Caries* über, indem *Suppuration* erfolgt, oder der Knochenfrafs entsteht auch ohne letztere. Die Mittel dagegen sind bekannt, und bei Beachtung des nahe liegenden zarten Organs, wie an anderen Theilen anzuwenden.

Auch an wahrer Necrose können die Knochen der *Orbita* leiden, welche hier indefs meistens nur nach heftigen Contusionen zu erfolgen pflegt und die bekannte Behandlung erfordert.

B. Von den Krankheiten der Organe, die zwischen der *Orbita* und dem *Bulbus* ihren Sitz haben.

Von der reinen Augenhöhlenentzündung überhaupt.

Gleichwie unter der Augenliederentzündung im Allgemeinen, ein phlogistischer Zustand aller Gebilde der Augenlieder verstanden wurde; eben so wird mit dem Nahmen Augenhöhlenentzündung überhaupt, nur diejenige entzündliche Affection belegt werden können, welche über alle Gebilde, die zwischen dem *Bulbus* und der *Orbita* liegen, verbreitet ist.

Symptome. Stumpfer, tiefgreifender, immer mehr zunehmender Schmerz in der ganzen Augengrubengegend, mit Unbeweglichkeit des Augapfels verbunden, schweres Aufheben und Bewegen des obern Augenliedes, und ein Gefühl, als wenn der Augapfel für die *Orbita* zu grofs wäre, sind die ersten *Symptome* dieser Entzündung. Nach und nach kommt nun der Augapfel aus seiner Augenhöhle hervor, *Exophthalmos*, besser *Exophthalmia*, das Sehvermögen wird immer mehr und mehr aufgehoben, und die vollkommenste amaurotische Blindheit, mit einer auffallenden Verengerung der Pupille, bei vollkommener Starrheit der *Iris*, und grofser Empfindlichkeit des Augapfels, treten oft, unter Entwicklung sehr schmerzhafter Lichterscheinungen, *Photopsia*, in wenigen Stunden ein. Jetzt endlich fängt sich erst die *Sclerotica*, und dann die *Conjunctiva* zu röthen an, die *Iris* wölbt sich, verändert ihre blaue oder graue Farbe in eine grünliche, die braune aber in eine dunkel-

rothe, die Pupille schliefst sich, und die vordere Augenkammer wird immer kleiner; dabei hat der Schmerz sein *Acme* erreicht, wobei der Kranke in eine Art Raserei, und durch die, sich auf die Gehirnhäute schnell verbreitende Entzündung, bei schon früher entwickeltem heftigen Entzündungsfieber, in Lebensgefahr geräth.

Mit dem Anfange des zweiten Zeitraumes tritt nun der Augapfel noch mehr aus der *Orbita* hervor, und die Lichterscheinungen vermehren sich; wenigstens spricht der Kranke im Delirium immer davon. Kommt er auf Augenblicke zur Besinnung, so klagt er über stumpfen, mit Gefühl von Kälte und grofser Schwere verbundenen Schmerz im Auge, und dabei fährt er oft von Frost geschüttelt zusammen. Endlich erhebt sich am äufsersten Umfange des Augapfels eine rothe, weiche Geschwulst, die bald an mehreren Orten bleiche Eiterpunkte, und Fluctuation zwischen Augapfel und Augengrube, zeigt: dabei werden die Augenlieder, besonders das untere, *oedematoes*, und es treten Merkmahle eines Eiterungsfiebers ein. Erscheint nur ein einzelner Eiterpunkt; so wird der Augapfel an dieser Stelle hervorgedrängt, und die Eitersammlung ergreift hier nicht den ganzen Umfang der Augengrube.

Diese, selten vorkommende Krankheit tritt, nach Beer, am oftesten bei scrofulöser, gichtischer oder syphilitischer Dyscrasie auf, und ist dann freilich nicht rein zu nennen. Indefs beobachtete ich vor kurzem einen Fall, bei einem eben menstruirenden gesunden Mädchen, wo die Entzündung sehr rein sich darstellte. Die Augenhöhle war hier durch eine kleine Verletzung in einen gereitzten Zustand versetzt worden; ein gleichzeitiger Schreck machte die Menstruation aufhören, wodurch sich ohne andere Ursache eine sehr heftige Entzündung in der ganzen Augenhöhle einstellte.

Die Vorhersage im ersten Zeitraume ist sehr ungünstig; vorzüglich wenn die Krankheit, aus Mangel an Erkenntnifs, anfänglich vernachläfsigt wurde. Hat sie sich schon ausgebildet, so geht sie in eine, für das Leben des Kranken mehr oder weniger gefährliche,

Eiterung über, und es handelt sich hier dann nicht mehr um das Sehvermögen, sondern blofs um Erhaltung des Lebens und des Auges.

Im zweiten Zeitraume kann auch nicht einmal die gute Form des Auges erhalten werden; nur auf Rettung des Lebens ist Rücksicht zu nehmen, denn wird jetzt nicht sehr zweckmäfsige Hülfe geleistet, so pflanzt sich die Eiterung in die Schädelhöhle fort, dringt auch wohl aus der *Orbita* durch eine Knochenöffnung in jene ein, oder die Knochen der *Orbita* vereitern langsam, und der Kranke stirbt über kurz oder lang.

Die Kur geschieht im ersten Zeitraume durch ein sehr starkes allgemeines und örtlich antiphlogistisches Verfahren.

Im zweiten Zeitraume, wenn die Hoffnung einer Zertheilung schon verschwunden ist, befördere man sowohl durch innere allgemeine Mittel, als durch Breiumschläge, die man nicht erkalten lassen darf, die Eiterung. Auf einen eben entstandenen Eiterpunkt legt man mit Nutzen *Empl. diachyl. comp.*, die Breiumschläge aber darüber, und setzt diefs so lange fort, bis die Fluctuation ganz deutlich ist, da dann sogleich dem Eiter ein freier Ausflufs durch eine grofse Oeffnung mit der Lanzette verschafft, und die Wunde durch eine mit *Laudanum* getränkte Wike offen erhalten werden mufs. Auf diese Weise wird die Heilung nach und nach zu Stande gebracht.

Dieses ist die Beschreibung und Heilmethode dieser Krankheit im allgemeinen. Es können aber auch Modificationen in der Form des Uebels eintreten, nach denen dann auch die Symptome, ja die Behandlungsweise abweichen müssen. So entsteht die allgemeine Augenhöhlenentzündung zuweilen aus einer *Ophthalmitis universalis*, und in diesem Falle sind hier die Zeichen, welche den Augapfel allein betreffen, die ersten, und nur erst später werden die *Symptome* des Ergriffenseins der übrigen Organe der Augenhöhle hinzutreten. Oder die Entzündung geht gleich anfangs von der Augenhöhle selbst aus, wo dann, wenn dieselbe nicht sehr heftig ist, und der Arzt das Uebel gleich

im Entstehen zu sehen bekommt und erkennt, das Gesicht oft ziemlich unbeschädigt erhalten werden kann. Ist bereits Eiterung eingetreten, und wird dem Eiter nicht zeitig ein Weg nach aufsen gebahnt, so zerstört er zuweilen hie und da die Knochenhaut der Orbitalknochen, worauf dann *Caries* der letzteren entsteht, die, je weiter sie nach hinten liegt und je weniger man im Stande ist, die äufsere Oeffnung zu erweiteren, desto längere Zeit zur Kur erfordert. Ja zuweilen scheint gleich anfangs die ganze Augenhöhlenentzündung ihren Hauptsitz in der Knochenhaut genommen zu haben, und dann ist immer die Entstehung der *Caries* zu fürchten, worauf besonders Demours mit Recht aufmerksam gemacht hat. Auch ich habe diese Art der Entzündung beobachtet, in welchem Falle sie rein arthritischer Natur war. Aufserdem giebt es Fälle, wo nur die Augapfelmuskeln an der Entzündung zu leiden scheinen. Sie kommen nicht selten vor, pflegen rheumatisch zu sein, gehen nicht in Eiterung über, entstehen meistens in Folge von Erkältungen der Augengegend und müssen daher auch wie *Rheumatismus acutus* behandelt werden. Dafs die Augenhöhlenentzündung, diesem gemäfs, verschiedene Grade und Symptome haben mufs, ist natürlich. Einen sehr geringen Grad derselben beobachtet man zuweilen bei scrofulösen Kindern, wo dieselbe nur einen sehr oberflächlichen Sitz hat, in Eiterung übergeht, und jene ominösen Symptome nicht darbietet, welche den heftigsten Grad bezeichnen. Fast keine dieser Modificationen einer Augenhöhlenentzündung ist übrigens rein zu nennen.

Von den Wunden der Augengrube.

Wenn die Wunden der Augengrube tief und überhaupt bedeutend sind, so wird die Prognose meist schlecht sein; denn oft folgt nicht nur Verlust des Sehvermögens und des Auges, sondern selbst der Tod. Indefs vermag die Natur hier oft mehr als der Arzt glaubte, wefswegen man auch die Vorhersage nicht zu schnell aussprechen darf. Oft hinterläfst die geheilte

Wunde eine Atonie, oder vollkommene Paralyse, Zerreifsung und unheilbare Unbrauchbarkeit eines Augapfelmuskels, und ein dadurch bedingtes Schiefstehen des Auges, *Luscitas;* oft vorübergehende oder beständige, durch Erschütterung des Auges oder Zerreifsung seiner einzelnen Gebilde bedingte, amaurotische Gesichtsschwäche oder völlige Amaurose; oft bleibenden Vorfall des Auges, *Ophthalmoptosis*, mit amaurotischer Blindheit, u. s. w. Alle diese Folgen entstehen entweder aus der unmittelbaren Verletzung und Zerstöhrung der dadurch gelähmten Theile, oder durch Verletzung derer Nerven, welche jene Theile versorgen. In einzelnen Fällen habe ich gefunden, dafs, obgleich Pfeifenstiele, dicke Holzäste etc. 14 Tage lang in der *Orbita* eingekeilt lagen, und dadurch der *Bulbus* gänzlich gelähmt wurde, dennoch der Kranke fast gar keine Schmerzen haben wollte, und kaum ahnete, dafs seine Augenhöhle dergleichen Balken enthalte. Diese merkwürdige Erscheinung kann wohl blos in Folge einer gänzlichen Lähmung der Nerventheile entstehen. Manchmal, und besonders wenn das verwundende Werkzeug in den oberen und äufsern Theil der *Orbita* eingedrungen, bleibt auch Verwachsung der meisten Ausführungsgänge der Thränendrüse, mit ungewöhnlicher Trockenheit des Auges, *Xeromicter*, zurück.

Die Kurregeln sind im Ganzen die, bei den heftigen Verletzungen der Augenbraunengegend angegebenen; es bleibt defswegen hier nichts übrig, als die modificirten Verhältnisse der hier verletzten Theile zu betrachten. Ist demnach ein Vorfall des Augapfels zugegen; so bringe man in der *Orbita* zurückgebliebene Theile des verletzenden Werkzeuges, heraus. Sind Blutaustretungen in dem Zellgewebe, zwischen der Augengrube und dem Augapfel entstanden, welche den letztern aus seiner Lage drängen; so erweitere man die Wunde, damit das Extravasat entfernt werde; der Augapfel wird dann ohne Hülfe der Kunst sogleich zurück treten. Wird der Arzt zu spät hinzugerufen, hat die, durch Entzündung entstandene, Geschwulst den Augapfel hervorgetrieben; so kann man an Reposition

des *Bulbus* sogleich nicht denken. Hier mufs man den Entzündungs- und Eiterungsprocefs abwarten; dann wird ebenfalls, wenn die Eiterung gehörig geleitet worden und die Muskeln des Augapfels anders nicht selbst vereitert sind, der letztere am Ende der Eiterung von selbst wieder zurücktreten. — Liegt die Ursache des Vorfalls in einer Verminderung des Zusammenhanges der Augapfelmuskeln; so wird sich das Auge nach der Seite hinrichten, auf welcher der bestehende Muskel noch am kräftigsten wirkt. Auch hier hilft alles künstliche Zurückbringen des Auges nichts, sondern man mufs die völlige Heilung der Wunde abwarten. *) Wird diese zweckmäfsig geleitet; so tritt der Augapfel während der Eiterung nicht selten gänzlich, oder gröfstentheils wieder in die Augengrube von selbst zurück. Bleibt er aber nach erfolgter Vernarbung der Wunde noch aufser der Augengrube; so mufs man örtliche Mittel, welche bei der *Blepharoplegie* empfohlen wurden, anwenden. Sollte jedoch die Verwundung so heftig gewesen sein, dafs der Augapfel völlig aufserhalb der Augengrube auf der Wange hängt, ist der Augapfel dabei selbst stark verletzt, sind die Augenkammern voller Blut, ist völlige Blindheit zugleich zugegen; so hilft auch hier das Zurückbringen desselben nichts, sondern man mufs, will man dem Patienten anders das Leben erhalten, den ganzen Augapfel, nebst daran hängendem zerrifsenen Zellgewebe, sogleich wegschneiden. Uebrigens kann der, durch die Hervordrängung aus der Grube erblindete Augapfel lange, bis 9 Wochen lang, aufserhalb derselben gelegen haben, und dennoch das verlohrne Sehvermögen restituirt werden; wenn nur der Augapfel selbst unbeschädigt geblieben war.

Geringere Folgen heftiger Verwundungen der Augengrube, sind im Gegentheil nicht immer heilbar, z. B.

---

*) Eine Art Suspensorium anzulegen, ist alles, was hier sogleich gethan werden kann; weil sonst die ohnehin halb gelähmten Augapfelmuskeln, durch die Schwere des herabhängenden Augapfels, in ihrer Cohaesion noch mehr leiden.

wenn ein Schiefstehen des Auges, *Luscitas*, von der Zerreifsung eines Augapfelmuskels herkam, oder wenn die, mit einer callösen Narbe umgebenen Ausführungsgänge der Thränendrüse verwachsen sind; doch erweitern sich im letztern Falle die übriggebliebenen, nicht verwachsenen Ausführungsgänge allmählig und machen die entstandene Trockenheit des Auges verschwinden. *)

Uebrigens brauche ich wohl kaum zu erinnern, dafs bei allen Verletzungen der Augenhöhle, und nachdem die verletzenden Werkzeuge herausbefördert worden sind, ein streng antiphlogistisches Verfahren eingeschlagen werden mufs; daher nach Umständen Aderlässe, Blutigel, kalte Umschläge, gelind laxirende antiphlogistische Mixturen, *Calomel* etc. Dafs ferner die Heilung *per primam intentionem* am vortheilhaftesten ist, diese aber da nicht versucht werden kann, wo kleine Partikel des verletzenden Instruments zurückgeblieben und nicht entfernt werden können; in solchen Fällen und überhaupt da, wo die Entzündung zur Eiterung überschreitet, sieht man sich genöthigt, letztere durch warme Breiumschläge zu befördern und eine Wike in die Wundöffnung zu schieben, damit der sich sammelnde Eiter ausfliefsen und die Wunde vom Grunde aus heilen kann. Wenn der Eiter sich in der Tiefe sackt und Gänge bahnt, mufs die äufsere Wunde erweitert und der Eiter täglich mit warmen Wasser ausgespritzt werden. Bei derlei veralteten und übel behandelten Wunden, welche fistulös und callös geworden sind, wird man zuweilen gezwungen, zum zweckmäfsigen Gebrauche des *Lap. infernalis* oder zum *Merc. praecip. rubr.* seine Zuflucht zu nehmen.

Bei grofsen Verletzungen der Orbitalknochen, ist vor allen die Lebensgefahr, in welcher der Verwun-

---

*) Herr Prof. Beer sahe nie nach solchen mechanischen Verwundungen eine bleibende bedeutende Trockenheit des Auges; wohl aber nach chemischen Verletzungen. Im letzten Falle vertrocknete und runzelte sich immer die Bindehaut des Augapfels, und die Form des Auges ging mit dem Sehvermögen verlohren.

dete schwebt, zu berücksichtigen. Daher erweitere man zuerst die äufsere Oeffnung und lasse das ausgetretene Blut heraus, worauf die antiphlogistische Heilmethode sogleich in ihrem ganzen Umfange angewendet werden mufs.

a. Von den Krankheiten der Thränendrüse.

Die Entzündung der Thränendrüse, *Dacryoadenitis*, [besser *Dacryadenitis*, von *δακρυ*, *δακρυον*, Thräne, und *αδην*, Drüse] mit ihren Ausgängen.

Diese, von Ad. Schmidt*) sehr oft, von Beer, Reil und vielen andern aber sehr selten beobachtete Entzündung, fängt immer in dem Zellgewebe, welches die Thränendrüse umkleidet, an, dringt endlich in den Zellstoff, welcher die *Acini glandulae lacrymalis* umgiebt, ein; ergreift aber nie den Kern der Drüse selbst. Aus der nahen Verbindung dieses Zellgewebes mit der *Dura mater*, mit der Beinhaut der *Orbita*, den vielen Nerven und der übrigen zarten und wichtigen Nachbarschaft der Thränendrüse, wird es erklärbar, warum diese Entzündung unter die gefährlichsten gerechnet wird.

Symptome. — Während einer immer mehr zunehmenden Trockenheit des Auges, befällt den Kranken plötzlich ein fixer, drückender, stechender Schmerz in der Schläfegegend, der sich auf den Augapfel, auf die Stirne bis in den Ober- und Unterkiefer, und in das Hinterhaupt verbreitet, und gleichsam hinter dem Auge gefühlt wird. Das obere Augenlied schwillt da, wo die Thränendrüse in der *Orbita* ihren Sitz hat, an, wird hart, dunkelroth, gespannt, glänzend und äufserst empfindlich. Dabei wird die *Conjunctiva* fast nur allein im äufsern Augenwinkel röthlich, und läuft etwas an; dennoch aber ist der Augapfel sehr hart, und gewaltig empfindlich. Zugleich treibt jetzt die sich vergröfsernde Thränendrüse den Augapfel in dem äufsern

---

*) Ueber die Krankheiten des Thränenorgans. Wien, 1803. Seite 134.

Augenwinkel aus der *Orbita* hervor; so dafs sich die *Cornea* offenbar nach der Nase hinstellt. Mit dem Hervortreten des Augapfels verringert sich das Sehvermögen immer mehr, die Pupille verkleinert sich, die Regenbogenhaut wird völlig starr, Lichterscheinungen stellen sich häufig ein, und die Beweglichkeit des Augapfels wird immer mehr beschränkt. Unter Zunahme des Schmerzes stellt sich jetzt ein synochisches Fieber, mit mehr oder weniger Irrereden, ein.

Nachdem nun die Entzündung ihr *Acme* erreicht hat, entwickelt sich, gewöhnlich in 3 — 6 Tagen, unter Zunahme der *Photopsie*, dem stärkern Herausdrängen des Augapfels nach der Nase hin, klopfendem Schmerz, Zunahme der Geschwulst des obern Augenliedes, unter lästigem Gefühl von Kälte und Schwere in dem Auge, und endlich unter beständigem Frösteln, ein gelblicher, deutlich fluctuirender Eiterpunkt in der Bindehaut des Augapfels, oder der äufsern Oberfläche des obern Augenliedes.

Die Ursachen der *Dacryadenitis* liegen noch ziemlich im Dunkeln. Schmidt sagt, dafs vorzüglich junge, übrigens gesunde Leute von 7 bis 19 Jahren, bei welchen früher scrofulöse *Dyscrasie* ausgesprochen war, davon ergriffen würden; immer war die Krankheit durch gähen Wechsel der Lufttemperatur oder durch Zugluft entstanden. Als ganz reine Entzündung scheint sie selten aufzutreten.

Was die Prognose in dem Entzündungsstadio betrifft, so ist sie, wenn die Krankheit recht erkannt und behandelt wird, nicht so ungünstig als die der allgemeinen Augenhöhlenentzündung; stimmt aber mit der Voraussage der letztern überein, wenn sie sich durch entgegengesetzte Behandlung, u. s. w. in der ganzen *Orbita* verbreitet. Wenn der *Bulbus* aus der Augenhöhle schon hervorgedrängt worden, so ist keine Zertheilung mehr möglich.

Die Vorhersage im Eiterungsstadio ist, wenn der entstandene Abscefs nur sogleich geöffnet und dem Eiter ein Ausgang verschafft wird, nicht sehr ungünstig; denn nach Ausleerung des Eiters tritt der Augapfel

apfel wieder in die Augenhöhle zurück, und oft kehrt sogar das Sehvermögen allmählig wieder, nur bleibt das Auge immer, kürzere oder längere Zeit, nach der Nase hingestellt, und läfst also ein Schiefstehen des Auges, *Luscitas*, zurück. Hat sich aber die Eiterung über alle Gebilde der Augengrube verbreitet; so ist die Prognose mit derjenigen der Augenhöhlenentzündung im zweiten Zeitraume übereinstimmend.

Das Heilverfahren in dem entzündlichen Zeitraume mufs allemal kräftig antiphlogistisch sein. Defswegen verordne man ein Aderlafs, und wenn diesem nicht recht bald Besserung folgt, so lege man noch 5 — 6 Blutigel, gebrauche übrigens kalte Umschläge und lasse eine dünne Diät führen; mache auch wohl Ableitungen auf den Darmkanal, wenn es nöthig ist, u. s. w. u. s. w.

Sobald die Entzündung in Eiterung übergehen will, so befördere man dieselbe durch warme Breiumschläge aus *flor. chammom. Hb. cicut.* mit andern erweichenden Mitteln vermischt, und bedecke die Geschwulst so lange mit einem Pflaster aus *Empl. diachyl. et cicut.* als noch eine Härte in der Tiefe bemerkt wird, und bevor der Augapfel noch nicht ganz in die *Orbita* zurück getreten ist. — Bei grofsem Schmerz und Unruhe gebe man *Opium* innerlich, und wenn der Abscefs vollkommen ausgebildet, und die *Fluctuation* fühlbar ist, so öffne man denselben mit der Lanzette. Nachdem der Eiter ausgeflossen, legt man ein mit *Tinct. opii cr., Ol. amygdal.* oder *Digestiv*salbe bestrichenes *Bourdonnet*, welches den Grund des Geschwüres erreicht und reitzt, in die Oeffnung. Nach und nach füllt sich die Oeffnung, vom Grunde anfangend, mit Fleisch aus und heilt bald völlig zu.

Nicht immer geht aber die Heilung so leicht von Statten; denn zuweilen verwandelt sich der ausfliessende Eiter in Gauche, wobei ein blafsrother, leicht blutender Schwamm aus der jetzt callösen Oeffnung sprofst und hier die wahrscheinliche Anwesenheit eines Fistelgeschwüres von *Caries* des *Orbital*fortsatzes des Stirnbeins ankündigt. Geht man jetzt mit der

Sonde in die Oeffnung, und stöfst man mit derselben auf eine rauhe und unebene Stelle des entblöfsten Knochens, so ist das Vorhandensein der *Caries* fast gewifs. In diesem Falle erweitere man mit dem Messer die ganze Oeffnung, lege *Bourdonnet's*, mit *Ungt. digest. c. pulv. Myrrh.* vermischt, tief ein, befördere dadurch die *Exfoliation* und heile darauf das Geschwür zu.

Aufser ebengenannter *Caries*, verursacht der Thränendrüsenabscefs noch eine andere Folge, die indefs selten vorkommt, nähmlich ein Fistelgeschwür ohne *Caries*, von einem verletzten Ausführungsgange der Thränendrüse entstanden. Hier fliefsen aus der Fistelöffnung Gauche mit Thränen, oder reine Thränen, *Fistula lacrymalis*, Thränenfistel, besser Thränendrüsenfistel. Zuletzt, wenn das Geschwür auch schon geheilt ist, bleibt zuweilen eine callöse Haaröffnung am obern Augenliede, nahe am Schläfewinkel zurück, aus welcher von Zeit zu Zeit den Tag über eine ganz klare Thränenfeuchtigkeit aussickert. Solche Thränendrüsenhaaröffnungen sind sehr schwer zu heilen; indefs hat man sie bis jetzt am besten dadurch zum verwachsen gebracht, dafs man den Grund der Oeffnung mit *Lapis infernal.* berührte, oder eine glühende Nadel bis zum Grunde der callösen Oeffnung vorsichtig einbrachte und in derselben einige Male umdrehte.

Der *Scirrhus* der Thränendrüse, *Scirrhus glandulae lacrymalis.*

Ein wirklicher *Scirrhus* der Thränendrüse (nicht etwa eine blofse, nach *Dacryoadenitis* zurückbleibende, vorübergehende Verhärtung) kommt meistens mit *Scirrhositaeten* der Nachbarschaft, und selbst mit *Scirrhus bulbi* vereint vor. Diese äufserst seltene Krankheit erkennt man aus folgenden Erscheinungen. Der Augapfel ist gegen den innern Augenwinkel, und gegen abwärts aus der Augengrube verdrängt, nicht schmerzhaft, wenig geröthet, dabei fast unbeweglich; kann aber vorzüglich nicht gegen die Thränendrüse hingerichtet werden. Neben diesen entdeckt man im Schlä-

fewinkel eine sehr festsitzende, harte, ungleiche, aber so lange der *Scirrhus* keine Neigung hat in *Carcinom* überzugehen, völlig unschmerzhafte Geschwulst, der Augapfel selbst ist sehr trocken, die Augenliedränder mit halbvertrocknetem meibomschen Schmeer incrustirt, die Hornhaut mehr oder weniger undurchsichtig, und hat die Krankheit schon länger gedauert, selbst cadaverös. Uebrigens ergiebt sich aus der Anamnese, dafs bestimmt eine Thränendrüsenentzündung dieser Verbildung unmittelbar vorausgegangen ist.

Scrofulöse Subjecte von phlegmatischer, unempfindlicher Art, sind nach Beer's Erfahrung am meisten diesem Uebel unterworfen.

Hinsichtlich der Prognose ist zu merken, dafs der Kranke diese Verbildung viele Jahre ohne Nachtheil seiner Gesundheit tragen kann. Nur wenn die Verhärtung in *Carcinom* überginge, würde die Vorhersage sehr schlimm sein.

Eine Heilung dieses Uebels durch Medicamente oder Operation, halten mehrere, z. B. Beer, für unthunlich, ja für unmöglich. Indefs hat man, besonders in Frankreich, äufserlich und innerlich, *Cicuta*, Opiatmittel, *Baryta muriatica etc.* angewendet.

Die Operation hat viele Schwierigkeiten. Man verfährt, um sie zu machen, folgendermaafsen: Nachdem den Kopf des Kranken, ein Gehülfe gegen seine Brust gestemmt, das obere Augenlied mit dem Zeige- und Mittelfinger der einen Hand in die Höhe gehoben und mit den gleichen Fingern der andern, das untere Augenlied herabgezogen hat, schneidet der Operateur mittelst eines, im Stiel festsitzenden Bistouri, über der Geschwulst und da, wo sich das obere Augenlied mit dem Augapfel vereinigt, vorsichtig und ohne den *Bulbus* zu verletzen, ein. Indem er sich nun bestmöglichst Zugang zur verhärteten Drüse bahnt, fafst er diese mit einem doppelten kleinen Haken und trennt sie von ihren umgebenden Parthieen heraus; doch so, dafs nichts Verhärtetes zurückbleibt. Die folgende Entzündung mufs bei leicht angelegtem Verbande gehörig geleitet werden.

Die abnorm vermehrte Thränensecretion der *glandul. lacrymal. Epiphora, Dacryorrhysis,* [von δακρυ Thräne, und ρυω, ich führe, fliefse,] der Thränenflufs.

Früher verstand man unter Thränenflufs, ein Ueberlaufen der Thränen aus den Augen; der Grund des Ausflusses mochte nun in einer vermehrten Thätigkeit der Thränendrüse, oder in verminderter oder aufgehobener Abführung, der, in normaler Quantität abgesonderten, Thränen liegen. Der berühmte Adam Schmidt*) unterschied zuerst beide Zustände gehörig, und nannte den erstern *Dacryorrhysis*, (*Epiphora*) den andern aber, wo Fehler der Thränen-abführenden Parthie des Thränenorgans zum Grunde lagen, *Dacryostagon, Stillicidium lacrymarum,* Thränenträufeln.

Die *Dacryorrhysis* ist verschieden und mufs verschieden behandelt werden; einmal ist sie Vorläufer und Mitsymptom fast aller einigermafsen bedeutenden reinen Augenentzündungen; diese Art geht meist mit dem Ablauf der Entzündung zugleich vorüber, und verdient defswegen hier keiner weitern Erwähnung. — Eine zweite *Dacryorrhysis* bleibt öfters nach Augenentzündungen, vorzüglich bei sehr sensiblen Subjecten zurück, kann chronisch werden, und verschlimmert sich meistens bei nassem, verbessert sich hingegen bei trocknem warmen Wetter. Die Heilung dieser *Epiphora,* geschieht durch gehörige Pflege des empfindlichen Auges, durch Auflegen warmer, trockner, leinener Compressen, und wenn die Sensibilität des Kranken allgemein verbreitet ist, zugleich durch innere Mittel, z. B. anfangs durch *Extr. hyosciami*, um die Empfindlichkeit gleichsam abzustumpfen, nachher durch stärkende Mittel, u. s. w. Aeufserlich kann man endlich Ableitungen durch *Vesicatoria* und *Fontanelle* machen, und örtlich Augenwasser mit etwas *Sublimat* und *Opium,* oder *Solut. lapid. divin. c. acet. saturn.* und *Tinct. opii croc. etc.* anwenden; nur mufs man sich bei dem Verhältnifs dieser Mittel, nach der bestehenden

*) A. a. O. S. 203.

Empfindlichkeit des Auges richten. — Eine dritte Art der *Epiphora* bemerkt man einmal als begleitendes *Phaenomen* der *Scarlatina*, der Masern und Pocken, wo sie meistens mit dem Ablauf dieser Ausschläge verschwindet und defswegen keine weitere Behandlung erfordert; bleibt der Thränenfluſs aber zurück, und wird er chronisch, so stimmt die Heilung mit der vorigen Art der *Dacryorrhysis* überein. Zweitens kommt diese dritte Modification des Thränenfluſses, als andauernder Zufall bei Syphilitischen, Krätzigen, Scrofulösen, Gichtischen und Scorbutischen vor, in welchen Fällen sich die genannten Krankheiten, neben ihren gewöhnlichen Symptomen, auch durch den Thränenfluſs offenbaren.

Die Heilung bei Syphilitischen und Krätzigen geschieht innerlich; bei den erstern durch Merkur, bei den letztern durch Schwefel, und äuſserlich bei beiden durch Augenwasser mit *Sublimat*, oder durch täglich zweimaliges Einstreichen von *Ungt. citrin.* in den innern Augenwinkel. — Die innere Behandlung bei der scrofulösen *Dacryorrhysis* wird hier nach den gewöhnlichen Regeln der Scrofelnkrankheit ausgeführt. Topisch darf man nach der Empfindlichkeit des Subjects und des Auges ins besondere, entweder nur trockne Wärme, oder wenn das Subject mehr torpider Natur ist, die schon angeführten styptischen Mittel oder rothe Präcipitatsalbe anwenden.

Die Kur der gichtischen *Dacryorrhysis* geschieht, wenn dem Arzte die Beseitigung der *Arthritis* nicht möglich ist, am besten durch lange unterhaltene, künstliche Geschwüre, wodurch der krankhaften Tendenz der Thränendrüse ein anderer Sitz angewiesen wird.

Der Thränenfluſs bei Scorbutischen, der nur bei der ärmsten Menschenklasse vorkommt und bei welchem die Thränen zuweilen wie Fleischwasser aussehen, oder gar mit deutlichem Blute vermengt sind (Blutweinen, *Dacryohaemarhysis*) wird am besten durch günstige Aenderung der Lebensart, der Wohnung, und durch gehörige Leibesbewegung in frischer, gesunder Luft geheilt. Aeuſserlich zeigen sich durchgehends styp-

tische Mittel, vorzüglich *Decoct. cort. querc.* mit Alaun wirksam.

Die abnorm veränderte Thränenfeuchtigkeit.

Die Thränen können nicht nur abnorm vermehrt, sondern auch abnorm verändert werden. Wir finden sie, unserm Gefühle und Geschmacke nach, oft reicher an salzigten Theilen, als gewöhnlich. In einer heftigen Gelbsucht, fand ich sie einmal offenbar gelblich tingirt, u. s. w. Wie weit die Chemie uns hier Aufschlufs geben könnte, wissen wir aus Mangel an guten Untersuchungen über diesen Gegenstand bis jetzt noch gar nicht.

Ich nehme indefs hier Gelegenheit, jenes merkwürdigen Zustandes der Thränen zu erwähnen, in welchem die Thränenfeuchtigkeit steinigte Concretionen (*Dacryolithen*) erzeugt, wovon man mehrere Beispiele aufgezeichnet hat; das instructivste, ausführlichste und merkwürdigste von allen aber ist das von Ph. v. Walther (Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, 1. B. 1. H. S. 163. etc.) welches ich hier auch mit wenig Worten erzählen will.

Das übrigens gesunde blühende Mädchen, bei welchem Herr v. Walther jene krankhafte Steinerzeugung beobachtete, litt zuerst an heftigen Zahnschmerzen, welche nach mehrmaligem Ausziehen von Zähnen nur kurze Zeit nachliefsen, etwas später an hartnäckigter Leibesverstopfung mit Kolikbeschwerden, welche durch Bähungen, Salben und Clystiere beseitigt wurden.

Ungefähr 4 Monate später klagte das Mädchen über Brennen und Stechen im linken Auge, das bei Bewegungen des *Bulbus* und bei starkem Sonnenlichte heftiger wurde. Bei genauerer Untersuchung zeigte sich auf der Falte der Bindehaut, zwischen dem Augapfel und dem unteren Augenliede, gegen den äufsern Winkel hin, ein weifses, eckigtes, erbsengrofses Steinchen, welches herausgenommen, zwischen den Fingern mit einem fettigen, sandigen Rückstande, leicht zerrieben

werden konnte. Schon nach einigen Tagen, wurde ein ähnliches Steinchen von der nähmlichen Stelle genommen.

Die Entzündung im Auge war indessen immer vorwärts geschritten, und die Lichtscheu und die Vermehrung der Thränensecretion standen damit im Verhältnifs. Herr v. Walther war genöthigt, in 4 Tagen zwei Aderlässe zu verordnen und antiphlogistisch zu verfahren.

Die Steinerzeugung in dem kranken Auge, ging dabei so rasch vor sich, dafs in kürzerer Zeit gröfsere Concretionen von derselben Beschaffenheit, täglich zweimal, und zuletzt täglich dreimal aus dem Auge genommen wurden.

Die Kranke erhielt innerlich folgende Mischung:

℞. *Kali carb. dep.* ʒjß.
Solv. in
Aquae cinnamom. simpl. ʒjv.
Add.
Syr. diacod. ʒß.

M. S. Täglich 4 Mal ½ Efslöffel voll zu nehmen.

Dabei trank sie einen Aufgufs der *Hb. jaceae.* Der Urin ward hierauf sehr trübe und die Steinerzeugung hörte nach und nach auf.

Allein nun stellten sich dieselben Zufälle auf dem anderen Auge ein, so dafs dieselben Mittel angewendet werden mufsten, welche hier ebenfalls einen günstigen Erfolg bewirkten. Die Dauer dieses ganzen, seltenen Krankheitszustandes, erstreckte sich bis in die zehnte Woche.

Einige Jahre nachher bekam die Kranke einen Rückfall desselben Uebels, nur war es dieses Mal weniger heftig und wich den angegebenen Mitteln schneller.

Die Verwachsung der Ausführungsgänge der Thränendrüse, *Atresia ductuum excretoriorum glandulae lacrymalis.*

Solche Verwachsungen entstehen öfters nach Verwundungen, oder nach Verbrennungen durch Feuer

oder Aetzmittel in der Gegend der Thränendrüse und sind meistens von der Beschaffenheit, dafs immer noch einige Thränendrüsengänge offen und gangbar sind. Man überzeugt sich von dieser *Atresie* durch das Klagen des Patienten über Trockenheit, *Xerophthalmos*, *Scheroma*, und Unbeweglichkeit des Auges mit dem Gefühl von Staub zwischen den Augenliedern, wobei man zugleich im obern äufsern Augenwinkel bei genauer Untersuchung eine Narbe entdeckt, die oft bis in die *Conjunctiva* reicht. Uebrigens ist jene Trockenheit des *Bulbus* dem Arzte selbst nicht sichtbar, denn das Auge hat ein helles, klares und feuchtes Ansehn.

Die Vorhersage ist hier günstig; denn nach und nach werden sich die gangbar gebliebenen Thränendrüsengänge erweitern, und das Auge hinreichend anfeuchten.

Zur Palliativkur, die hier nur unternommen werden kann, sind verschiedene reinschleimige Augenwasser, z. B. Salepwurzel- oder Altheewurzelschleim, Malvendecoct, Schleim aus *Gumm. mimos.* und ähnliche (womit das Auge öfters befeuchtet wird,) hinreichend.

Die Thränenzellgeschwulst, *Dacryops*, [von δακρυ, Thräne, und ωψ, das Auge, daher eigentlich Thränenauge.]

Symptome. Wenn diese, beim Weinen sich schnell vergröfsernde Sackgeschwulst, einigermafsen von bedeutendem Umfang ist, so zeigt sich am obern Augenliede, zunächst dem Schläfewinkel, eine elastische, unschmerzhafte, der Haut an Farbe vollkommen gleiche, begränzte Geschwulst, die sich dem Gefühl der Finger nach, tief in die *Orbita* erstrecken mufs, und bei einigermafsen starkem Druck auf dieselbe, eine drükkende Empfindung in dem *Bulbus* selbst und vorübergehendes Feuersehen erregt. Hebt man das obere Augenlied auf, indem man es zu gleicher Zeit von dem Augapfel abzieht und die Geschwulst von aufsen drückt; so drängt sich die Bindehaut in der Form eines vollgefüllten rundlichen Sackes hervor, in welchem man

die Fluctuation des enthaltenden Wassers ganz deutlich fühlt.

Die *Causa proxima* dieser Krankheit liegt, nach Schmidt, *) in der fehlerhaften Ausmündung eines Ausführungsganges der Thränendrüse in das Zellgewebe, unter der *Conjunctiva bulbi*, worin sich viele Thränen sammeln, die Zelle ausdehnen und so gleichsam einen Sack bilden. Schmidt und Beer, welche diese seltne Krankheit beschreiben, sahen sie immer bei Kindern, und letzterer beobachtete die Geschwulst in zwei Fällen als Folge einer Verletzung.

Obgleich diese Geschwulst für das Auge eben nicht nachtheilig ist, so läfst sich die Krankheit dennoch, wegen Mangel an Geduld des Patienten, und wegen Gefährlichkeit der Stelle, schwer gründlich heilen.

Die Heilung geschieht durch folgende Operation: Nachdem ein Gehülfe den obern Augendeckel aufgehoben, vom Augapfel zugleich abgezogen, und die Geschwulst von oben nach ab- und vorwärts gedrückt hat, durchschneidet man die *Conjunctiva*, welche die Geschwulst bedeckt, mit einem *Scalpell* bis auf den immer sehr dünnen Sack selbst, faſst den letztern mittelst einer gezähnten feinen Pincette und schält mit einem elastischen, vorn stumpfen und abgerundeten Messer, weniger durch den Schnitt, als vielmehr durch Druck, den Sack, so weit es geht, aus. Ist dieſs geschehen, so sticht man mittelst einer, mit einem dikken einfachen seidenen Faden versehenen krummen Heftnadel, in die gemachte Wunde eingehend, durch den etwa noch zurückgebliebenen Theil des Sackes, durch den Orbicularmuskel und durch die äufsern Bedeckungen des obern Augenliedes, so, daſs die Nadel ziemlich nahe am obern Augenliedrande und Schläfewinkel wieder zum Vorschein kommt, und somit ein wahres Haarseil darstellt, welches, wenn es bei öftern Hin- und Herziehen des Fadens, binnen 24 Stunden die Wunde nicht entzündet, mit, anfangs schwächern,

*) A. a. O. S. 68.

dann den stärksten Aetzmitteln, z. B. mit *Solut. lapid. infernal., lapid. caust.*, oder mit *Butyr. antimon.* bestrichen werden mufs. Entsteht auch dadurch keine hinreichende Entzündung, die den Sack verwachsen macht, oder denselben durch nachfolgende Eiterung vernichtet, so bleibt nichts übrig als folgende Palliativkur: Man bestreicht den oft hin und her zu ziehenden Faden mit *Solut. plumb. acetic.*, Tutiensalbe u. s. w. und macht die Oeffnung auf diese Art *calloes*, damit der Kranke in der Folge, nach herausgezogenem Faden, die immer wieder entstehende Thränengeschwulst (diese, mit einer Oeffnung versehene, Thränenzellgeschwulst nennt Schmidt *Dacryops fistulosus*) so oft als nöthig ist, ausdrücken kann.

Die Wasserblase der Thränendrüse, *Hydatis glandulae lacrymalis, Glandula lacrymalis hydatoidea.*

Diese sehr seltene, furchtbare Krankheit, besteht nach der Auslegung der Beobachter darin, dafs sich eine Zelle des, die einzelnen Thränendrüsenkörner (*Acini*) verbindenden Zellgewebes, durch Thränenfeuchtigkeit, die sich in die Zelle ergiefst und scharf wird, zu einer Blase ausdehnt, welche letztere sich endlich von dem übrigen an ihr haftenden Zellgewebe trennt, und so eine unangewachsene, zwischen den Thränendrüsenkörnern liegende *Hydatis* darstellt, welche bei sehr langsam vorschreitendem Wachsthum, den *Bulbus* entweder ohne Entzündung, *Exophthalmos*, oder bei schnellerer Zunahme, mit Entzündung des *Bulbus*, *Exophthalmie*, aus der *Orbita* so hervortreibt, dafs sich der Augapfel jedesmal nach der Nase hinstellt.

Wenn die Wasserblase langsam wächst, und also die Krankheit mit *Exophthalmos* auftritt, so wird sie aus folgenden Zeichen erkennbar: Der Kranke klagt über einen stumpfen, tiefen Schmerz in der Augengrube, mit dem Gefühl von Herausdrängen des *Bulbus* von hintenher, welches vorzüglich bei der Bewegung des Augapfels nach der Thränendrüse hin, deutlich wird. Nun tritt der sehr wenig geröthete *Bulbus* un-

ter spannendem Schmerz des Auges und der ganzen Hälfte des Kopfes in der beschriebenen Richtung aus der *Orbita* hervor, das Auge wird immer trockner, und kann nur unter bedeutenden Lichtentwicklungen, anfangs schwer endlich gar nicht mehr, bewegt werden. Bis jetzt ist noch Sehvermögen zugegen; nur sieht der Patient die Gegenstände zuweilen doppelt, verunstaltet, oder auch auf Augenblicke gar nicht. Endlich wird das Gesicht immer verworrener und hört zuletzt ganz auf, der ununterbrochene Kopfschmerz nimmt zu, der obere schiefe Augenmuskel ist nach Schmidt in einer beständigen krampfhaften Bewegung, (was aber Beer nie sah) das Auge bekommt ein schmutziges Aussehen, wird demjenigen eines Verstorbenen immer mehr ähnlich und dient als Zeichen des nahen Todes, wenn auch alle Lebensfunctionen noch gut vor sich gehen. Nun fühlt man auch im Schläfewinkel, zwischen dem Augapfel und dem äufsern Rande der Augengrube, deutlich eine widerstrebende Härte.

Wenn die Krankheit mit *Exophthalmie* auftritt, so äufsert sie sich durch folgende Erscheinungen: Unter ähnlichen, nur den Augapfel selbst mehr ergreifenden, Schmerzen im Hintergrunde der Augenhöhle, wird der entzündete, sich vergröfsernde *Bulbus* aus der *Orbita* hervorgedrängt, und schnell so sehr durch hinzukommende Eiterung zerstöhrt, dafs wenn er nicht bei Zeiten geöffnet wird, derselbe unter den heftigsten Schmerzen berstet, worauf dann eine, aus schlechtem Eiter und Blut bestehende Masse aus der Oeffnung fliefst. Der Augapfel sinkt darauf nicht zusammen, sondern bleibt in Gestalt einer unförmlichen Fleischmasse ausser der Augenhöhle. Auch jetzt dauert der Kopfschmerz fort; Schlaf und Efslust sind aufgehoben und die *Parotis* der leidenden Seite schwillt an. In der Gegend der Thränendrüse, fühlt man, wie im vorigen Falle, eine widerstrebende, fast fluctuirende Härte.

Die eigentliche Ursache der *Glandula lacrymalis hydatoidea* ist bis jetzt noch nicht ausgemittelt.

Die Vorhersage ist immer unsicher. Hat sich die Wasserblase schon bedeutend ausgebildet, so ist die

Prognose ungünstig. Sobald das aus der Augenhöhle verdrängte Auge, das Sehvermögen verlohren und ein todtenähnliches Ansehn bekommen hat, ohne dafs *Exophthalmie* vorhanden ist; so stirbt der Kranke bald unter soporösen, zuletzt apoplectischen Zufällen. Wenn aber *Exophthalmie* zugegen ist, so geht das Auge bei fortdauernder Vernachläfsigung der Krankheit, nicht nur verlohren, sondern die Knochen der *Orbita* werden auch nach und nach zerstöhrt, und der Tod erfolgt langsam.

Heilung. — Da die Krankheit in ihrem ersten Entstehen nicht bestimmt erkannt, und die Wasserblase wegen der nahe liegenden edeln Theile, z. B. des Augennervenknotens, der Thränendrüse, des äufsern geraden Augapfelmuskels, u. s. w. nicht ausgeschnitten werden kann, weil dann gewifs jene Gebilde verletzt werden würden; so mufs folgende Operation als Palliativmittel vorgenommen werden: Man steche unter dem obern Augenliede, nahe an der äufsern *Commissur*, eine schmale Lanzette gegen die Thränendrüse hingerichtet, tief ein, bis die Thränenfeuchtigkeit der Blase ausfliefst, und lege dann, ein aus Charpie verfertigtes, mit Bleiwasser oder Bleisalbe bestrichenes feines Bougie, oder eine Darmsaite in die Wunde, um aus dieser eine Fistelöffnung zu gestalten, durch welche die sich späterhin wieder ansammelnde Blutflüssigkeit öfters ausgeleert werden kann. Zuweilen gelingt es auch in der Folge, durch diese Oeffnung den losen Balg, mittelst einer Pincette auszuziehen. — Ist der Augapfel schon aus der *Orbita* verdrängt, das Sehvermögen aufgehoben und derselbe schmutzig, todtenähnlich, oder heftig entzündet und dadurch verbildet; so wird schwerlich auch dieses palliative Verfahren etwas helfen.

b. Von den Krankheiten des Thränensackes.

Die reine Entzündung des Thränensackes, *Dacryocystitis.*

Symptome. — Unter den Zeichen eines Schnupfens und Ausfluss von caustischem Schleim aus der Nase,

erhebt sich in der Gegend des Thränensackes, mit stumpfen, bis in die Nase und den Augapfel ausgedehnten Schmerzen, eine bohnenförmige, begränzte, harte, empfindliche Geschwulst, die sich endlich stark röthet und dann keine Berührung mehr verträgt; zugleich findet sich jetzt Thränenträufeln und Trockenheit in der Nase ein. Die Wangen und die übrigen nahe gelegenen Theile, werden nun nicht selten rosenartig entzündet, wozu sich endlich, vorzüglich bei zarten Personen, Uebelbefinden und Fieber gesellen. Hat die Entzündung eben keine grofse Intensität, so tritt ein, mit Thränen vermischter, weifsgelber Schleim in geringer Menge aus dem Thränensacke durch die Thränenpunkte hervor, wenn man auf ersteren mit dem Finger drückt. Ist nun aber die Entzündung im Thränensacke heftiger, so hört die Leitung der Thränen bald auf; die Nase wird immer trockner und das Auge thränt, eben weil die abgesonderten Thränen jetzt nicht durch die *puncta lacrymalia* eingehen können. In dieser Periode beginnt entweder erst die bohnenförmige Ausdehnung der vorderen Wand des Thränensackes, oder sie nimmt wenigstens jetzt rascher zu, weil die im Thränensacke sich fort und fort absondernden Feuchtigkeiten, weder oben noch unten einen Ausgang finden. Diese Ausdehnung aber bedingt nun wieder die Steigerung der vorhandenen Entzündung, so dafs nun eine wirkliche Eiterung gar nicht mehr verhüthet werden kann.

Jetzt, wo das zweite, oder blennorrhoische Stadium anfängt, wird in dem Thränensacke eine solche Menge Schleim abgesondert, dafs, weil der Nasenschlauch oft verschlossen ist, die nicht vom Knochen bedeckte vordere Wand des Thränensackes so aufschwellt, dafs man *Fluctuation* fühlt, ehe noch Eiterung eingetreten ist; auch die Schleimhaut der Nase und die der Thränencarunkel secernirt jetzt mehr Schleim als gewöhnlich. Hier steht die Krankheit auf dem Wendepunkte der Entscheidung; denn entweder läfst die Intensität der inflammatorischen Erscheinungen nach, die Durchgängigkeit des Nasenschlauches stellt sich wieder

her und das Product der Schleimsecretion wird dünner, und dauert wohl auch noch lange Zeit fort, oder es zeigt sich, nachdem die Geschwulst des Thränensackes immer mehr zugenommen, die Röthe dunkler und die Haut glänzender geworden, bei deutlicher *Fluctuation*, in der Mitte des Thränensackes ein gelblicher, weicher Eiterpunkt, der jetzt augenblicklich geöffnet werden muſs, um nicht eine wahre Thränensackfistel entstehen zu lassen. Läſst man die Geschwulst sich selbst öffnen, so geschieht dieſs immer mit einer äuſserlich sehr kleinen fistulösen Oeffnung, die den mehr consistenten Eiter nicht ausflieſsen läſst, weſshalb denn die Geschwulst auch nicht ganz verschwindet.

Endlich hört, bei zweckmäſsiger Behandlung, auch diese vermehrte Absonderung auf, und der Thränensack sondert den Schleim wieder in gehöriger Menge, und normaler Qualität ab. Die Oeffnung des Thränensackes heilt jetzt entweder von selbst, oder mit Hülfe der Kunst, aber meistens nur bis auf eine sehr enge Haaröffnung, deren Behandlung unten gezeigt wird, zu.

Geht dieser Entzündungs- und Eiterungsproceſs rasch vorwärts, und wird der Thränensack zeitig genug geöffnet, so ist in der Regel die Haut des Nasenganges nur erst angewulstet, und nur dadurch verengt, aber noch nicht verwachsen. Wird aber die Krankheit vernachläſsigt, wird die Geschwulst nicht zur rechten Zeit geöffnet, sondern die Eröffnung des Eiterpunktes der Natur überlassen, oder geht die Entzündung nur langsam und schleichend vorwärts, wie dieſs bei Mischung mit Dyscrasien, z. B. mit Scrofeln, und bei schwächlichen Subjecten, der Fall zu sein pflegt, kehren immer wieder Recidive der Entzündung zurück; so geschieht es nicht selten, daſs die Schleimhaut des Nasenganges lymphatischen, gerinnbaren Stoff absondert, und dadurch, oder durch unmittelbare Verwachsung der sich berührenden angewulsteten Haut des Nasenganges, diesen letzteren ungangbar macht. Noch ein anderer Nachtheil erwächst aus der Vernachläſsigung und der unterlassenen zeitigen Oeffnung des Ei-

terpunktes dadurch, dafs der Eiter die Haut des Thränensackes an einer Stelle gleichsam verzehrt, und *Caries* veranlafst, welche auch an dem Rande der *Orbita* entstehen kann, wenn der Eiter sich in dem Zellgewebe zwischen dem Augapfel und dem Thränensacke längere Zeit verhält, indem er sich erst später, durch Fistelgänge, Wege nach aufsen bahnt.

Contusionen unter dem innern Augenwinkel können, bei übrigens gesunden Subjecten, eine reine *Dacryocystitis* hervorbringen; *) indefs ist sie gar sehr selten, meistens treten entzündliche Affectionen des Thränensackes, mit Scrofeln, *Syphilis*, Gicht, Catarrh, Rheumatismus, u. s. w. gemischt auf.

Die Voraussage im entzündlichen Stadio ist günstig, wenn der Thränensack nicht sehr gequetscht oder gar zerrissen war. Kann aber die Entzündung nicht völlig zertheilt werden, so bleibt meistens eine krankhafte Schleimabsonderung und Ansammlung desselben im Thränensacke (nach Schmidt *Dacryops blennoideus*) zurück, die jedoch die Kunst bald heilt. War die Entzündung aber vorher sehr stark, und wird sie vernachläfsigt, so bleibt meistens eine partielle oder vollkommne Verwachsung des Nasenschlauches übrig; ebenso verwachsen zuweilen die Thränenkanälchen, wodurch dann ein beständiges, unheilbares Thränenträufeln verursacht wird.

Im zweiten Stadio ist die Prognose, in Hinsicht der abführenden Parthie des Thränenorgans, sehr zweifelhaft, günstiger im ersten Moment dieses Zeitraumes, wenn nur erst reiner Schleim im Thränensack secer-

---

*) In einem der Seltenheit wegen merkwürdigen Falle, entstand eine *Dacryocystitis chronica*, und in Folge derselben *Dacryops blennoideus*, durch einen Kirschenkern, welcher bei einer Schneidersfrau während dem Genufse dieser Früchte (vielleicht weil sie dabei lachte) ihr selbst unbewufst durch die Choanen in die Nase gekommen war und sich an den untern Theil des Thränenkanals fest gesetzt hatte. Nachdem er das Uebel $\frac{3}{4}$ Jahr unterhalten, entdeckte und entfernte ihn mein Freund, Herr Dr. Bartky; worauf alle Beschwerden von selbst verschwanden.

nirt wird; denn hier kann der Arzt noch einen glücklichen Eiterungsprocefs herbeiführen. Wenn die Eiterung aber schon zugegen, so ist es wieder besser, wenn sie noch nicht lange gedauert hat, schlechter, wenn der Thränensack im Begriff ist zu bersten, oder wenn schon eine fistulöse Oeffnung zugegen ist, in welchem letztern Falle dann eine andauernde Atonie der Thränenwärzchen und Thränenkanälchen, oder gar eine völlige Verwüstung derselben zurück bleiben kann. Heilt der Arzt unvorsichtiger Weise die fistulöse Oeffnung zu, ohne auf den verwachsenen Nasenschlauch und die Thränenröhrchen Rücksicht zu nehmen; so sammelt sich der Schleim, den der Thränensack immer secernirt, in demselben an, und es entsteht eine, der Haut an Farbe ganz ähnliche Geschwulst, welche Herr Prof. Beer Wassersucht des Thränensackes, *Hydrops sacci lacrymalis*, nennt.

Die Heilung im inflammatorischen Zeitraume, geschieht durch kalte Wasser- oder Oxycratumschläge und durch öfteres Einschnupfen von kaltem Wasser in die Nase. Nöthigenfalls mufs man auch Blutigel anlegen, und das Nachbluten unterhalten. Nachdem man nun dadurch die Entzündung gemindert hat, ist es gut, rings um die Gegend des Thränensackes *Unguentum hydrarg. ciner.* täglich einige Male vorsichtig einreiben zu lassen. Kann man die Entzündung nicht als eine reine betrachten, ist vielmehr Catarrh, Rheumatismus, Gicht, *Syphilis etc.* im Spiele, dann ist es besser, wenn man im ersten Zeitraume nicht kaltes, sondern lauwarmes Wasser in die Nase einschnupfen läfst.

Im zweiten Zeitraume, wenn keine Zertheilungsversuche mehr helfen, thut man am besten, die Eiterung im Thränensacke durch erweichende Mittel zu befördern, und sobald der Mittelpunkt der Geschwulst weich, und Fluctuation zu fühlen ist, dieselbe mit einem lanzettenförmigen Messer zu öffnen, und den vorhandenen Eiter und Schleim durch vorsichtiges Einspritzen von lauwarmen Rosenwasser, nach Umständen, mit oder ohne *Laud. liq. S.*, Bleiessig und Schleim, auszuleeren. Verschwindet nach Ausleerung des Eiters

und

und Schleimes noch nicht alle Härte, so erweiche man diese durch Umschläge von *Cicuta* mit Camphor, u. s. w. Zugleich wird ein wenig mit *Laudan. liq.* befeuchtete Charpie in die Wunde eingeschoben, und dieselbe dann mit *Empl. diachyl. comp.* bedeckt. Tritt nun die Eiterung zurück, und bleibt nur eine abnorme Schleimsecretion übrig; so gebrauche man *Solut. lapid. divini,* die man in den innern Augenwinkel eintröpfeln oder in die Wundöffnung einspritzen kann. Z. B. ℞. *Lap. divini gr. jj. Aquae rosar.* ℥*jv. Laud. liquid. S.* ℥ß. *Mucilag. Gummi arab.* ℥*jj. M.* Immer müssen solche Wässer lauwarm angewendet werden. Auch leistet hier das Conradi'sche Augenwasser gute Dienste, besonders wenn Scrofeldyscrasie zu den ursächlichen Momenten gehört. Sind Salben nöthig, so wird das *Bourdonnet*, täglich einmal damit bestrichen, in die Wunde gelegt. Ist die Schleimabsonderung wieder normal, so darf der Arzt erst jetzt daran denken, den gehinderten Durchgang der Thränen durch den Nasenschlauch wieder herzustellen, nachdem er sich vorher von der Durchgängigkeit der Thränenkanälchen, oder der möglichen Eröffnung derselben überzeugt hat. Bleibt daher die Nasenhälfte der leidenden Seite noch mehr trocken, und läfst die Sonde Anwulstungen der Schleimhaut des Thränensakkes und des Nasenganges vermuthen, dann wirken einfache, oder gemischte, schwache rothe Präcipitatsalben oft sehr heilsam, indem man etwas davon an das in die Wundöffnung zu schiebende *Bourdonnet* bringt; z. B. ℞. *Merc. praecip. rubr. gr. j — jj — jjj. Laud. liquid. Sydenh.* ℥*j. Axung. porc.* ℥*j. M.*; oder ℞. *Merc. praecip. rubr. gr. j — jjj. Zinc. oxyd. alb. gr. jv — vj. Axung. porc.* ℥*j.* Anstatt der Zinkblumen kann man auch oft mit Nutzen 10 bis 15 Tropfen *Acetum saturninum* zusetzen. Sind jene beiden Ausgänge wirklich wieder im brauchbaren Stande, so kann der Arzt jetzt die Wunde mit der Hoffnung zuheilen, die Krankheit dauernd beseitigt zu haben. Doch ist es durchaus nöthig, mit den äufserlich anzuwendenden Mitteln so lange fortzufahren, bis die Eiterabsonderung im Thränensacke sich gänzlich verlohren hat und an dem täg-

lich neu einzuschiebenden *Bourdonnet* nur noch eine sehr geringe Quantität puriformer Schleim zu bemerken ist, welcher ganz allein aus den Wänden der Wundöffnung secernirt wird. Sogar auch nach Heilung der äufsern Wunde, wird man wohl thun, wenn man noch eine Zeitlang jene Mittel fortsetzt, welche, nachdem sie in den innern Augenwinkel gebracht worden sind, von den Thränenwärzchen aufgesogen werden, und auf diese Art gleichfalls in den Thränensack und Nasenkanal gelangen. Hat man es mit einer Thränensackfistel zu thun, die eine callöse Hautöffnung hat; so mufs man letztere nach oben und unten zu erweitern, Charpie mit *Laudan liquid.* tief einlegen, *Diachylonpflaster* darüber heften, und hierauf so lange warme, aus Milch, *Cicuta, Saponaria,* mit Camphor vermischte Breiumschläge überschlagen, bis sich alle callöse Härte zertheilt hat.

Da das erste Stadium der *Dacryocystitis* durchaus nicht immer die Heftigkeit erreicht, um in Eiterung überzugehen, vielmehr nicht selten eine längere Zeit dauernde *Blennorrhoea sacci lacrymalis* verursacht, wobei denn die Schleimhaut des Thränensackes in einem subinflammatorischen Zustande begriffen ist, so glaube ich nicht unterlassen zu dürfen, daran mit wenigen Worten zu erinnern. Bei solchen subinflammatorischen, immer chronisch verlaufenden *Affectionen* des Thränensackes, fehlt der Schmerz oft ganz, so dafs nur dann eine lästige Spannung zu entstehen pflegt, wenn sich der Schleim im Sacke mehr angehäuft hat; ebenso fehlen nicht selten die Zeichen eines Schnupfens. Solche Zustände sind höchst selten als reine zu betrachten, vielmehr finden sie in den meisten Fällen in Scrofeln, Rheumatismus, Gicht etc. ihren Grund. Immer ist damit eine chronische Anwulstung der Schleimhaut des Thränensackes verbunden, welche bald zu- bald abnimmt, je nachdem die Witterung nafs und kalt, oder trocken und warm ist. Das Uebel kann in die acute Form der *Dacryocystitis* und dann auch in Eiterung übergehen, nicht selten aber auch eine Ausdehnung der vorderen Wand des Thränensackes veranlas-

sen, welche unmittelbar nach diesem Capitel unter dem Nahmen *Hernia sacci lacrymalis* abgehandelt werden wird.

Auch hier ist das Einreiben des *Ungt. hydr. cin.* gleich anfangs von Nutzen, und die Auflösungen von *Lapis divinus* mit *Laudanum*, sowie mit Zusatz von Bleiessig, Sublimatsolutionen u. dergl. sind, wenn sie täglich 3 bis 4 Mal in den innern Augenwinkel gebracht werden, nicht selten im Stande, die Anwulstung der innern Haut des Thränensackes, so wie die Schleimsecretion zu heilen; nur pflegt die Besserung sehr langsam von Statten zu gehen, und wird da wohl auch unmöglich, wo das Uebel schon sehr veraltet ist. In letzterem Falle ist das täglich mehrmalige Ausdrücken des Schleimes als Palliativmittel zu empfehlen, weil dadurch jene Spannung, so wie der Uebergang in immer wiederkehrende acute Entzündung des Thränensackes noch am besten verhüthet wird.

Dafs man ein Allgemeinleiden, welches oft die einzige Ursach zur Entstehung und Unterhaltung der Entzündungen des Thränensackes ist, stets berücksichtigen mufs, ist ganz natürlich. In Fällen, wo nicht specielle Indicationen besondere Mittel gebieten, sind die folgenden als Hauptmittel zu betrachten. *Calomel*, ich habe denselben in den gewöhnlichen Fällen gegen Ende des ersten Zeitraumes und zu Anfange des zweiten Zeitraumes mit besonderm Nutzen nehmen lassen, vorzüglich wenn ich denselben in Dosen gab, welche Durchfall erregen, z. B. früh und gegen Abend jedesmal $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{2}$ Gran. Kann man bereits vereinigende Lymphausschwitzungen im Nasenkanale vermuthen, so ist es freilich rathsamer, den *Calomel* in gebrochenen Dosen zu reichen, bis zu dem Ausbruche der Zeichen, welche ein Ergriffensein der speichelabsondernden Organe ankündigen. Dafs man demselben zuweilen und nach den Umständen andere Mittel, z. B. *Sulph. aurat. ant. etc.* hinzufügen mufs, ist natürlich. Bei chronischem und subinflammatorischem Zustande des Thränensackes, und wo Scrofeln im Spiele sind, habe ich von dem längere Zeit fortgesetzten Gebrauch von *Ae-*

thiop. antimon. in Verbindung mit Rhabarber, Guajakharz und tartarisirtem Weinstein, Nutzen gesehen. Ein Mittel, welches bei dyscrasischen Entzündungen des Thränensackes kaum durch ein anderes ersetzt werden kann, ist ein *Emplastrum tart. stibiat.*, welches man hinter dem Ohre der leidenden Seite bis zum Aufbruche der eiternden Pocken liegen lassen mufs. — Bei heftigem Grade der Entzündung, mit und ohne Fieber, wird man wohl thun, einige Tage hindurch *Laxantia antiphlogistica* zu reichen. Zuweilen sind Fufsbäder, häufig allgemeine warme Bäder und der Genufs einer reinen trocknen und warmen Luft zur Vollendung der Kur nothwendig.

Die Kur bei Undurchgängigkeit der Thränenkanälchen und des Nasenschlauchs, ist übrigens weiter hinten, bei der Thränensackfistel, zu ersehen. *)

---

*) Die *Dacryocystitis* ist hier zwar mehr als reine Entzündung abgehandelt worden, kommt indefs, wie ich schon gesagt habe, selten als solche vor. Die variolösen, morbillösen, scarlatinösen, psorischen, syphilitischen, scrofulösen u. a. sind viel häufiger anzutreffen; deswegen noch ein paar Worte in Hinsicht der Abweichungen dieser gemischten Thränensackentzündungen von der reinen.

Die von Masern, Scharlach und Pocken entstandene *Dacryocystitis*, wird nicht selten beobachtet, und mufs, so lange die *Phlogosis* praedominirt, sehr gelind antiphlogistisch behandelt werden, weil die Krankheit sich meist in sehr schwächlichen Subjecten ausbildet; zugleich sind Bäder und gelinde Wärme zuträglich. Auf diese Art kann man die Entzündung zwar nicht abschneiden, aber doch oft die Eiterung verhüthen. Die Entzündung wird hier einen oft langdauernden Thränenschleimfluss, *Dacryoblennorrhoea, Blennorrhoea sacci lacrymalis*, zurücklassen, der, wie oben schon bemerkt wurde, gleichsam die Gränze zwischen Zertheilung und Eiterung ausmacht, und zuweilen bei den Mädchen, wenn er früher nicht geheilt wird, beim ersten Ausbruch der Menstruation, oder in der ersten Schwangerschaft, von selbst verschwindet. Bei diesen *Blennorrhoen* mufs der Thränensack öfters ausgedrückt und das Auge gereinigt werden, damit die Ansammlung des Schleimes im Thränensacke keine *Hernia sacci lacrymalis* verursache.

Bei syphilitischer *Dacryocystitis* ist das Quecksilber angezeigt; äufserlich hat sich das *Ungt. hydrarg. cin.* sehr hülf-

Der Thränensackbruch, *Hernia sacci lacrymalis*, und die Thränensackwassersucht, *Hydrops sacci lacrymalis.*

Beide, oft wechselsweise aus einander hervorgehende Krankheiten, können füglich vereinigt vorgetragen werden.

Den Bruch des Thränensacks erkennt man an einer, der Haut an Farbe völlig gleichen, bohnenförmigen, und unschmerzhaften Geschwulst, gleich unter dem innern Augenwinkel, welche ohne Beschwerde beim Drucke des Fingers, entweder durch die Thränenpunkte, oder wenn man mit der Spitze des drükkenden Fingers die *Puncta lacrymal.* verschliefst, durch den Nasenschlauch, eine mit Thränen vermischte, schleimige Flüssigkeit ausfliefsen läfst, sich dadurch entleert, bald aber wieder heranwächst. Die Krankheit ist in einer Erschlaffung und Ausdehnung der vordern Wand des Thränensackes gegründet, und wird gewöhnlich als Folge einer *Dacryocystitis* beobachtet.

Die Vorhersage ist bei einer bloſsen *Hernia* sehr günstig. Wurde indefs das Uebel alt, und die angesammelte Feuchtigkeit nicht öfters ausgedrückt, dann giebt dieser verlängerte Aufenthalt der letztern Veranlassung zu ihrer Verderbnifs; dadurch wird die innere Wand des Sackes gereitzt, entzündet, die Entzündung theilt sich den umgebenden Parthieen mit, wird immer heftiger, besonders bei Personen mit vulnerablem Hautorgan, rothlaufartig, es erhebt sich die Geschwulst

---

reich bewiesen. Diese Thränensackentzündung hinterläfst leicht *Caries.*

Die psorische *Dacryocystitis* erfordert vorzüglich Berücksichtigung der Hautthätigkeit, und Schwefelbäder.

Die arthritischen Thränensackentzündungen, die oft plötzlich in Form eines Rothlaufes auftreten, und die scrofulösen, die viel chronischer verlaufen und schwerer zu heilen sind als erstere, zeigen sich am meisten bei Weibern und Mädchen, und lassen bei sehr schwachen kraftlosen Subjecten eine schlechte Prognose zu. Die Heilung der scrofulösen siehe unter *Ophthalmia scrofulosa.*

immer mehr, sie erweicht sich in der Mitte, bricht hier auf, und so kann denn endlich eine wahre Thränensackfistel entstehen. Der Uebergang einer *Hernia* in einen *Hydrops sacci lacrymalis*, ist noch leichter.

Die Heilung geschieht durch die Anwendung eines beständigen Druckes durch graduirte Compressen, und darüber gelegte lederne Pelotte, welche mittelst einer schmalen Vereinigungsbinde die bohnenförmige Geschwulst gehörig zusammendrückt; die Wirkung des Druckes kann man noch durch das Befeuchten der Compressen mit adstringirenden Mitteln verstärken. In denen Fällen, wo nur eine leichte Verstopfung des Nasenschlauches durch Schleim die Ursach des Uebels zu sein scheint, können selbst jene schwächern Mittel heilend wirken, welche Louis, Boyer *) und andere mit Erfolg gebrauchten: nähmlich die Dämpfe eines Aufgusses der *Flor. sambuc. meliloth.* und *chammomill.* durch einen Trichter in die Nase gelassen, und äufserlich Umschläge von Goulard'schem Wasser oder von einem Absude rother Rosen und ähnlicher Adstringentien.

Die sogenannte Wassersucht des Thränensackes erkennt man hingegen an einer bohnenförmigen Geschwulst im Nasenwinkel, die immer gröfser und endlich mifsfarbig wird, dabei elastisch und unschmerzhaft ist, ihr *Contentum* beim Druck des Fingers weder durch die Thränenpunkte noch den Nasenschlauch entleeren läfst, und nur dann erst einen fortdauernden Druck in der Nase, in der Augenbraunengegend und im Auge selbst verursacht, wenn die Geschwulst zu bersten droht; wo sie aber erst bis zur Gröfse eines Taubeneies anwachsen kann.

Dafs die Krankheit von Ungangbarkeit der Thränenkanälchen und des Nasenschlauchs entstanden ist, wird man schon aus den Symptomen erkannt haben. Da der unten und oben verstopfte Thränensack die Function Schleim abzusondern immer fortsetzt; so füllt

---

*) Abhandlung über die chirurg. Krankheiten. Uebersetzt von Textor. 1820. 5. Bd. S. 286.

sich der Sack nach und nach an, und zeigt, je nachdem die Krankheit vor längerer oder kürzerer Zeit entstanden, oder das *Contentum* des Sackes flüssiger oder fester ist, eine bald fluctuirende, bald feste, nicht schwappende Geschwulst.

Die Vorhersage ist hier immer sehr unsicher, denn obgleich die Geschwulst jedesmal durch die Operation gehoben werden kann; so weifs man doch noch nicht, ob die Thränenkanälchen und der Nasenschlauch hernach zu öffnen sind, und demnach in Zukunft die Thränen geleitet werden können, oder nicht.

Um die Geschwulst zu beseitigen, öffnet man sie mit einem lanzettenförmigen Messer, *) drückt den in derselben vorhandenen Schleim hervor und spritzt den Thränensack mittelst der Anel'schen Spritze **) mit warmem Wasser gut aus, damit kein Schleim zurück bleibt. Wenn aber jener Schleim eine sehr dicke, nicht fliefsbare Consistenz hat, so zieht man ihn mit einer feinen Augenpincette nach und nach heraus, lockert die im Grunde des Thränensackes noch festsitzende Masse mit einer fischbeinernen Sonde auf, und spühlt dieselbe mittelst der Spritze aus. Nun legt man eine feine, bis in den Thränensack vorgeschobene, mit lauem Wasser befeuchtete Wieke in die Wunde, befestigt dieselbe mit einem halbmondförmigen englischen Heftpflaster, und läfst diesen Verband bis zum folgenden Tage liegen.

Da das folgende Verfahren fast ganz mit demjenigen der wahren

Thränensackfistel, *Fistula sacci lacrymalis* ***)

(welche nichts anders ist, als ein, mit einer engen callösen Oeffnung versehenes Geschwür der Schleimhaut

---

*) Wozu auch Fig. 4. Tab. V. gebraucht werden kann.

**) Siehe Tab. V. Fig. 3.

***) Diese Krankheit ist vielfältig untersucht und mit grofser Aufmerksamkeit von den Aerzten abgehandelt worden. Dadurch wurden eine Menge Methoden sie zu heilen be-

des Thränensackes,) übereinkommt; so sei es mir erlaubt, die Behandlung des geöffneten Thränensackes bei *Hydrops sacci lacrymal.* mit dem Heilverfahren der wirklichen Thränensackfistel, hier zu vereinen.

Vor allen ist es nöthig, sorgfältig zu untersuchen, in welchem Zustande die Thränenpunkte, die Thränenkanälchen und die Oeffnung des Nasenschlauches sich befinden. Eine wahre Atresie der Thränenkanälchen, *) entdeckt man bei der Untersuchung derselben mittelst der Anel'schen Sonde, indem man diese senkrecht in den Thränenpunkt und Thränenkanal, schnell bis in dessen Winkel einbringt, **) dann am untern Augenliede in horizontaler, am obern in schiefer Richtung nach abwärts, bis in den Thränensack selbst fortschiebt, wobei das Thränenkanälchen durch einen mäfsigen Zug der Haut, der Länge nach straff ausgestreckt werden mufs, damit die Sonde kein unnöthiges Hindernifs findet. Kann man nun mit der vorgedrungenen Sonde die innere Wand des Thränensackes deutlich fühlen, so ist gewifs keine Verwachsung in den Thränenkanälchen zugegen; findet aber eine solche wirklich Statt, so kann man die Sonde wegen ei-

---

kannt, deren bald diese bald jene, fast jeder selbstdenkende Augenarzt nach seinen individuellen Einsichten abzuändern und zu verbessern suchte. Besonders geschah dieses durch Anel, Mejan, Laforest, Petit, Monro, Cabanis, Pallucci, Bianchi, Pouteau, Louis, Lecat, Pamard, Wathen, Desault, Richter, Jurine, Scarpa, Woolhouse, Schmidt, Beer u. a. deren Methoden ich des Raumes wegen zum Theil mit Stillschweigen übergehe und nur diejenigen anführen werde, welche nach meiner Einsicht die zweckdienlichsten sind und als solche auch von der Mehrzahl der Aerzte anerkannt werden. Wer sich von den übrigen Methoden unterrichten will, den verweise ich auf Boyer (a. a. O. 5. Bd.) und auf Richters Anfangsgründe der Wundarzneikunst.

*) Die Thränenwärzchen sind sehr selten verwachsen; verengert werden sie öfter gefunden, und sind dann dem Auge des forschenden Arztes kaum sichtbar.

**) Zuweilen schliefst sich hierbei der Thränenkanal krampfhaft und kräftig zu, wodurch das Vordringen der Sonde verhindert wird.

nes unüberwindlichen Hindernifses nicht von der Stelle bringen.

Sollte die Undurchgängigkeit der Thränenkanäle von Erschlaffung bedingt sein; so erkennt man diefs an einem ungewöhnlichen Klaffen der Thränenpunkte und gänzlichen Mangel an Contractionsvermögen, welches letztere sie im normalen Zustande immer zeigen, wenn man dieselben mit der Sonde berührt. Eine solche Erweiterung der Thränenpunkte und Kanälchen, welcher Morgagni, Petit u. a. eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben, ist wohl in den meisten Fällen nichts anders, als eine Lähmung dieser Theile, die nicht gar selten vorkommt; leider aber nicht oft, auch durch die zweckmäfsigsten Mittel, so gehoben wird, dafs die Thränen wieder normal abgeführt werden. Eine Verstopfung der Thränenkanälchen durch Schleim, oder eine Verengerung derselben durch Anwulstung der innern Haut, entdeckt ein zartfühlender Finger durch die Sonde. Hat man übrigens die Durchgängigkeit der Kanälchen wieder hergestellt, so überzeugt man sich von der eingetretenen gehörigen einsaugenden Thätigkeit derselben bald, wenn man dem Kranken ein paar Tropfen milder gefärbter Flüssigkeit in den innern Augenwinkel eintröpfelt, und diese hier verschwinden, dafür aber an der äufsern Oeffnung des Thränensackes bald deutlich zum Vorschein kommen.

Nachdem man sich nun von der Durchgängigkeit der Thränenkanälchen vollkommen überzeugt hat, schreitet man endlich auch zur Untersuchung des Nasenschlauches. Diefs geschieht auf folgende Weise: Man bringt eine ziemlich feine fischbeinerne Sonde horizontal in den geöffneten Thränensack, bis an die hintere Wand desselben, worauf man die horizontale Direction des Suchers in eine perpendiculäre umändert und so, indem man die Sonde immer zwischen den Fingern rollt, nach der Oeffnung des Nasenschlauches fortzuschieben sucht. Gelangt man mit dieser Sonde nicht in die Nase, finden sich vielleicht Verdickungen des Thränensackes, oder schwammigte, oder wohl gar körnigte Productionen in der Schleimhaut des Nasen-

schlauchs, welche die fischbeinerne Sonde nicht durchdringen lassen, *) so versuche man es mit der silbernen Mejean'schen Sonde; dringt auch diese nicht durch, findet man auch mit dieser Sonde ein beständiges elastisches Hindernifs, und klagt der Kranke beim Druck mit der Sonde auf jenen Widerstand, über keinen Schmerz, so kann man überzeugt sein, dafs wirklich eine *Atresie* des Nasenschlauchs zugegen ist. Geht hingegen die Sonde, wenn auch erst nach einigen Tagen und mit Beschwerden, durch, so wird es noch möglich sein, eine dauernde Durchgängigkeit zu bewirken.

Ist man mit einer Sonde so tief in den Nasenschlauch gedrungen, dafs dieselbe stecken bleibt, so läfst man sie bis zum nächsten Verbande liegen, nur bindet man sie auf der Stirn fest, und legt neben derselben eine Wieke in die Oeffnung des Thränensackes, welche man mit einem halbmondförmigen englischen Pflaster bedeckt. Täglich wird man nun tiefer, und endlich ganz durch den Nasenschlauch dringen können, worauf man, wenn letzterer offen, aber nicht hinreichend weit ist, anfangs eine, an der Spitze etwas gekaute, mit Mandelöhl bestrichene *E*Saite einer Violine, durch den Nasenschlauch so weit einlegt, bis wenigstens ein 6 Zoll langes Stück eingebracht worden ist, damit dasselbe nach einigen Stunden, wenn sich die Saite in der Nase erweicht hat, ohne Umstände aus dem Nasenloche hervorgeschnupft werden kann. Das obere, noch aufgerollte, Ende der Saite bindet man auf der Stirn des Kranken fest, bedient sich der Wieke und des halbmondförmigen Pflasters, wie kurz vorher bei Einlegung der Sonde beschrieben wurde, zum Verband, und befestigt das aus der Nase

---

*) Zuweilen geht die fischbeinerne Sonde nicht durch, obgleich sie äufserst dünn und fein gearbeitet ist, die Dicke derselben also gar kein Hindernifs sein konnte; hier erreichte ich in einigen Fällen weit schneller meinen Zweck, wenn ich eine vorn gespitzte *E*Saite einer Violine einbrachte. Diese sucht sich wegen ihrer gröfsern Flexibilität häufig den rechten Weg weit leichter als alle Sonden.

ragende Stück Saite, mit einem Pflaster über dem Nasenflügel.

Jeden Tag wird nun derselbe Verband erneuert, ein Theil der aufgerollten Saite durch den Nasenschlauch, von dem Kranken selbst, vorwärts geschoben, (indem er das Nasenende der Saite mehr herauszieht), und zugleich, wenn Cachexien u. s. w. entfernt, oder nicht vorhanden sind, eine Einspritzung gemacht, die der angeschwollenen oder wuchernden Schleimhaut des Nasenschlauchs angemessen ist. Sollte daher die Schleimhaut des letztern nur weich aufgeschwollen sein, (worüber die Sonde Auskunft giebt) so wird das Bestreichen der Saite mit *Laudan.* und Einspritzungen mit einer *Solut. lap. div.* oder *Laudanum* mit *Aqua saturnina* hinreichend sein.

Ist jedoch die innere Fläche des Thränensackes fest aufgeschwollen, aber nicht knotig; dann sind anfangs schwache, nach und nach stärkere rothe Präcipitatsalben, und endlich immer gesättigtere Auflösungen von *Sublimat* und *Laudan. liquid.*, letztere zum Einspritzen angezeigt.

Bei vorhandenen körnigten Anwulstungen des Thränensackes, mufs man zur Anwendung des *Ungt. citrin. Pharmac. Edinburgh.* *) und zu Einreibungen von *Ungt. hydr. ciner.* rings um die Oeffnung des Thränensackes, seine Zuflucht nehmen.

Neben dem Gebrauch dieser Mittel, schreitet man nach und nach von der *E*Saite zu der *A*, und endlich zu der *D*Saite, wobei man zuweilen *exploratorische* Einspritzungen unternimmt. Obgleich nun auf solche Weise der Nasenschlauch bis zu seinem Normaldurchmesser erweitert wird, so geschieht es doch zuweilen, dafs selbst nach Monate langem Gebrauch der Darmsaiten von neuen Verengerungen in denselben entstehen, wodurch denn die lange Kur ohne günstigen Erfolg angewendet worden ist. Diese Fälle lassen sich

---

*) Mehrere bedienen sich hier des *Lap. infernal.* theils als Pulver theils in Auflösung, welches erstere sie mittelst dazu geeigneter Instrumente einzubringen suchen.

vermuthen, wenn das Leiden schon sehr veraltet ist und öftere Recidive von Entzündungen des Thränensackes eingetreten sind. Bei Personen mit vulnerabelm Hautorgan, die zu catarrhalischen und rheumatischen Beschwerden grofse Neigung besitzen, mufs man jene Recidive immer befürchten. Hier ist es unzweckmäfsig, nach 2 bis 3 monatlichem Gebrauch der Darmsaiten die äufsere Wunde zuheilen zu lassen, selbst wenn der Erfolg der bisherigen Bemühungen ein günstiges Resultat zu versprechen scheint. Eigne Erfahrungen haben mir bewiesen, dafs dieses der Ort sei, wo das Einlegen eines Bleidrathes von der Dicke einer *D*Saite sehr heilsam wirkt; nur mufs man bei Anwendung desselben einige zur Vollendung der Kur nothwendige Bedingungen nicht übersehen. Vor allen mufs der Drath vom reinsten Blei gezogen worden und so dick sein, dafs er zwar den Nasenschlauch gut ausfüllt, doch aber auch bequem und ohne Verletzung der benachbarten Theile, eingelegt werden kann. Ferner darf der eingelegte Bleidrath nur so lang sein, dafs das in der Nase befindliche Ende desselben, eine halbe bis $\frac{3}{4}$ Linie von dem Boden der Nase entfernt steht. Dieses ist durchaus nothwendig, denn gelangt das Ende des Bleies bis auf den Boden der Nase unter dem unteren schwammigten Beine derselben, so stöfst dasselbe bei jedem Schneuzen und Lachen, ja selbst beim Fahren und Gehen, auf die berührte Stelle und erregt hier einen Entzündungszustand, der nicht nur sehr lange anhalten, sondern sich auch bis in den Nasenkanal verbreiten und diesen verengern kann, in welchem Falle natürlich der Bleidrath mehr schaden als nützen würde. Uebrigens ist es gut, den Drath mit etwas Mandelöhl zu bestreichen, bevor man ihn einlegt. Der am innern Augenwinkel hervorragende Theil des Drathes, wird mittelst einer Pincette umgebogen und der Thränensack von zwei zu zwei Tagen mit etwas lauwarmen Wasser ausgespritzt und gereinigt. Ein solcher Bleidrath kann so lange liegen bleiben, bis man überzeugt sein kann, dafs Recidive einer Entzündung und daraus entstehende Verengerung des Kanals nicht

wiederkehren werden. Gern lassen sich übrigens die Kranken diese Verlängerung der Kur gefallen, weil sie ihnen nur sehr wenig Unbequemlichkeiten verursacht.

Wenn Knochenfraſs bei einer Thränensackfistel zugegen ist, der sich durch livide, teigigte, beschränkte Flecken, durch schwammigte Auswüchse, schwarzkörnigte Gauche, am sichersten aber durch die Sonde zu erkennen giebt, indem man mit derselben eine rauhe entblöſste Knochenstelle fühlt; so ist dieſs miſslich, denn immer wird dadurch die Heilung sehr verzögert, wenn man sich vorgenommen hat, nicht nur die *Caries* zu entfernen, sondern auch dem Nasenkanal Durchgängigkeit zu verschaffen. Meistentheils geben zu derlei Knochenkrankheiten im Körper vorhandene Dyscrasien Veranlassung, nachdem immer wiederkehrende Entzündungen des Thränensackes, Eiterungen und Exulcerationen der Schleimhaut und der Knochenhaut erregen, diese zerstöhren und die knöchernen Wände der Höhle auf einem oder mehreren Punkten entblöſsen. Wo *Syphilis* Ursach der vorhandenen *Caries* ist, pflegt sie sich meistens von der Nase aus nach dem knöchernen Thränenkanale hin zu erstrecken; wo aber die *Caries* in Folge der Pocken, der Scrofelsucht u. s. w. entstanden, pflegt sie von dem obern Theile des Kanals auszugehen und erst später nach der Nase herabzusteigen. Durch genaue Untersuchung mit einer silbernen Sonde kann man ohne groſse Mühe entdecken: ob das krankhafte Ergriffensein des Knochens in *Nekrose* oder in *Caries* besteht; denn ist *Nekrose* zugegen, so findet man den Knochen nur entblöſst, aber man fühlt mit dem Sondenknopfe keine groſse Rauhigkeit desselben. Um solche *Nekrosen* wegzubringen, schlägt die Natur bei zweckmäſsiger Leitung nicht immer den Weg der Exfoliation ein, sondern producirt Fleischwärzchen, welche vom Rande der Knochenhaut ausgehen, den entblöſsten Knochen bedecken und denselben oft ziemlich schnell in guten Stand setzen. Bei der *Caries* aber, zeigt sich die Oberfläche des Knochens rauh, ausgefressen und erweicht; die zerstöhrte Fläche sondert eine Menge dünne, dunkelgefärbte und übel-

riechende Feuchtigkeit ab. Hier geht die Heilung viel langsamer von Statten, denn die Ränder der zerstöhrten Knochenhaut rings um die cariose Stelle, werden erst dann eine heilsame Decke über den Knochen ziehen können, wenn von letzterem alles krankhaft Veränderte losgestofsen und vereitert worden ist. Geht nun die *Caries* aus einer Dyscrasie hervor, so behandle man natürlich diese, weil ohnedem das Uebel nicht leicht weichen wird. Ist daher *Syphilis* die Ursache, so lasse man die Schmier- und Hungerkur gebrauchen, wobei der Gebrauch lauwarmer Bäder nicht zu vernachläfsigen ist. Oertlich ist eine Sublimatsolution mit Schleim oder eine Salbe mit *Hydrarg. oxyd. rubr.* und *Laudanum* neben der Anwendung der gewöhnlichen Erweiterungsmittel zweckmäfsig. Die Heilung geschieht hierauf entweder durch Exfoliation der verdorbenen Knochenparthien, oder durch den Uebergang der *Caries* in gutartige Granulation und Vernarbung der Geschwürfläche. Sind Scrofeln, Pocken oder unterdrückte Hautausschläge Ursache der *Caries*, dann tritt die antiscrofulöse Behandlung ein. Defswegen gebe man innerlich anfangs *Calomel*, später *Aethiops antimonialis, Dulcamara, Calamus aromaticus etc.* bei pastösen, leukophlegmatischen Subjecten, in Verbindung mit *Asa foetida.* Uebrigens sind hier warme Bäder mit Potasche oder Seesalz, und längere Zeit zu unterhaltende Ableitungen durch Hautreitze am rechten Orte. Oertlich sind Salben mit *Merc. praec. rubr. Myrrha*, Terpenthin, *Laudanum*, und wo die Exfoliation zu träge fortschreitet, mit Zusatz des *Ol. sabinae*, vortheilhaft.

Wo die ursächlichen Dyscrasien getilgt sind, oder wo die *Caries* überhaupt nur in Folge localer Ursachen entstand und unterhalten wird, da hat man in den frühesten und neuesten Zeiten die Anwendung des glühenden Eisens empfohlen, welches man durch Schutzröhren und Rinnen auf die kranke Stelle zu bringen gesucht hat. Ich bin nicht dafür, und empfehle lieber Ausdauer bei Anwendung der bereits angegebenen örtlichen Mittel, bei welcher man endlich auch zum Ziele gelangt, und noch den Vortheil hat, dafs

nach sorgfältigem Einlegen einer starken Bleisonde, der Kanal eine in Zukunft zur Leitung der Thränen taugbare Weite erhält, was aufserdem selten der Fall sein wird, vielmehr wird man froh sein müssen, wenn die *Caries* endlich gehoben und der Thränensack zur vollständigen Verwachsung gebracht worden ist. Ist der Knochenfrafs übrigens weit im Thränensacke verbreitet, so geht die Hoffnung der zukünftigen Brauchbarkeit desselben überhaupt verlohren, denn meist wird der *Saccus lacrymalis* gröfstentheils oder gänzlich verwachsen.

Ist nun die Anwulstung des Nasenschlauchs völlig und dauernd gehoben (wozu Monate Zeit gehören) läuft das in die Oeffnung des Thränensacks eingespritzte warme Wasser, in vollem Strome sogleich durch die Nase heraus, kommt mit Wegnahme der in die Oeffnung eingelegten Wieke kein Schleim mehr hervor; so darf man die äufsere Thränensacköffnung mit Sicherheit zuheilen. Man scarificire demnach die Wundlippen, und hefte sie mittelst englischen Pflasters zusammen, worauf die Wunde meistens bis auf eine kleine Haaröffnung verharrscht, die man durch Betupfen mit *Lap. infernal.* völlig aufheben mufs.

Dupuytren in Paris bedient sich zur in Standsetzung des Nasenschlauchs weder der Saiten noch der Sonden, vielmehr legt er ein gebogenes goldenes Röhrchen in den Kanal, welches wie das Richter'sche geformt, nur weniger gebogen ist. Er will diese Operation mehr als 600 Mal und fast immer mit Glück gemacht haben. Obgleich mehrere treffliche Aerzte Vieles und Wichtiges gegen dieses und ähnliche Verfahren gesagt haben, so möchte es doch gewifs eine gröfsere Aufmerksamkeit und nochmalige Sichtung auch der deutschen Aerzte verdienen. Defshalb, und weil diese Methode in Frankreich jetzt in hohem Rufe steht und vielfach ausgeübt wird, kann ich nicht unterlassen, dieselbe hier kurz zu erzählen: Herr Dupuytren bedient sich hierzu eines einfachen geraden Bistouri mit schmaler, aber etwas starker Klinge; eines goldenen 11 bis 12 Linien langen, ein wenig conisch zu-

laufenden, nach der Direction des Nasenkanals gebogenen Röhrchens, welches, nach dem Alter der zu operirenden Person, verschiedene Stärke hat, die indefs die Dicke einer kleinen Krähenfederspuhle nicht übertrifft, und welches am oberen Ende einen hervorspringenden Rand besitzt, am unteren aber schräg abgeschliffen erscheint. Dieses Röhrchen ist mit einem knieförmig gebogenen, stählernen, leicht beweglichen Dorn mit stumpfer Spitze armirt. Um dieses Röhrchen in den Nasenkanal einzubringen, fixirt ein Gehülfe den Kopf des sitzenden Kranken gegen seine Brust, und nachdem (wenn nicht schon eine weite Thränensacköffnung zugegen ist) der Thränensack mit dem Bistouri ausgiebig geöffnet worden, läfst der Operateur das troikarförmige Instrument mit der Kanüle in den Nasenkanal hineingleiten, indem er dann erst den stählernen Dorn zurückzieht, wenn sich der obere breite Rand des Röhrchens am Eingange des Nasenkanals befindet, worauf er die äufsere Wunde ohne Weiteres vernarben läfst. Man ist von der richtigen Lage der Kanüle versichert, wenn der Kranke im Stande ist, durch eigne Bemühung Luftbläschen aus der Thränensacköffnung zu stofsen; auch geht ein wenig Blut aus der Nase, wenn sich der Operirte schneutzt. Es pflegen sich nach Einlegung des Röhrchens nur dann heftige Schmerzen einzustellen, wenn dasselbe zu dick war, was indefs nach der Versicherung des Urhebers dieser Methode äufserst selten der Fall sein soll. Zuweilen geschieht es, dafs die Kanüle nach längerer Zeit locker wird und in die Nase herab und aus derselben herausfällt; doch soll auch dieses nicht immer die Wiederkehr der früheren Krankheit veranlassen. Ich glaube, nur der denkende Arzt wird diese Methode richtig würdigen, und bei Ausübung derselben das durch eigene Einsicht ausfüllen müssen, was ich hier der Kürze wegen nicht auseinander setzen kann.

Verwachsungen der Thränenkanälchen, so wie Atresien eines grofsen Theiles des Nasenschlauchs, können nicht gehoben werden; defshalb mufs man im ersten Fall den Thränensack durch künstlich erregte Entzün-

Entzündung vollständig verwachsen machen, im letztern Fall aber den Kranken zwischen einem öftern Ausdrücken des gefüllten Thränensackes, oder einer völligen Verwachsung des letztern, oder endlich zwischen der gleich zu beschreibenden Perforation des Thränenbeins wählen lassen. — Obgleich nähmlich die Durchbohrung des Thränenbeins von vielen Aerzten getadelt worden ist, so kann man doch nicht läugnen, dafs es Fälle giebt, wo sie mit Nutzen und mit glücklichemErfolg angewendet werden kann, und defshalb will ich das, nach meiner Einsicht, beste Verfahren dabei, hier mittheilen. Die Durchbohrung des Thränenbeins möchte besonders da anzuwenden sein, wo entweder eine bedeutende Verwachsung der Wände des Nasenkanals Statt findet, oder wo der knöcherne Theil des letzteren in Folge von vorausgegangener *Caries*, besonders durch *Syphilis*, verlohren gegangen ist. Die Operation selbst besteht in Folgendem: Nachdem nähmlich der Thränensack an seiner knochenfreien vorderen Wand, seiner ganzen Ausdehnung nach aufgeschlitzt worden ist, setzt man einen zweckmäfsigen, z. B. den Pott'schen, Troikar, jedoch ohne Röhre, auf das Thränenbein, richtet die Spitze desselben etwas nach hinten und abwärts, und macht, ohne grofse Gewalt anzuwenden, eine drehende, wenig drückende Bewegung, bis die Spitze durchdringt, was theils der Operateur bemerkt, theils von dem Kranken an dem in der Nase entstehenden Reitze, gefühlt wird. Niemals darf man zu tief eindringen, damit nicht Theile der Nasenknochen verletzt werden. Nachdem man auf diese Weise das Thränenbein ohne Zersplitterung desselben durchbohrt und den Troikar drehend zurükgezogen hat, legt man in die gemachte Oeffnung eine dünne *E* oder *A*Saite, welche die Länge einer kleinen Sonde haben kann, und befestigt das herausragende Stück derselben mit einer Binde auf der Stirn, worauf man den Thränensack leicht mit etwas Charpie ausfüllt. Jetzt wird jeden zweiten Tag das Saitenstück vorsichtig ausgezogen und an dessen Statt ein neues, nach und nach etwas dickeres, Stück dergleichen ein-

gelegt, womit man so lange fortfährt, bis der Reproductionsproceſs völlig beendigt worden ist.

Nun erst wird eine, von reinem Ducatengolde zweckmäſsig gefertigte, etwas gebogene Röhre, auf folgende Art in die Oeffnung des Thränenbeins eingelegt. Nachdem nähmlich die Darmsaite herausgenommen worden ist, legt man an deren Statt ein kleines Stück dünne *E*Saite ein, welches der einzulegenden goldenen Röhre nun zum Führer dienen soll; indem man jetzt auf dieser Darmsaite die Röhre ohne Mühe behuthsam in die Oeffnung des Thränenbeins einschiebt, legt man sie so tief ein, daſs sie mit ihrem oberen, mit einem Rande versehenen Ende, dicht am Thränenbeine an zu liegen kommt, bedeckt dann die vordere Oeffnung des Thränensackes auf einige Tage mit etwas Charpie, um den Erfolg des Manöuvres besser beobachten zu können, entfernt dann auch diese und sucht, nachdem alles gut befunden wurde, die völlige Heilung der äuſseren Oeffnung zu bewirken.

Wo nur eine geringe *Atresie* des Nasenschlauchs im untersten Theile desselben vorhanden ist, kann man diese Stelle allerdings mit der Hoffnung eines glücklichen Erfolgs, mittelst einer spitzigen Sonde, deren Spitze man mit einer kleinen Wachskugel bedeckt, damit man sie nirgends zu früh einsticht, durchbohren, (wobei meistens ein Paar Tropfen aus der Nase flieſsendes Blut, die wirkliche Durchbohrung angeben werden) und dann durch Sonden und Saiten, wie oben gezeigt worden, nach und nach, erweitern.

Daſs auch carcinomatöse Processe, von den Augenliedern ausgehend, sich nach dem Thränensacke hinziehen und Fisteln desselben erzeugen können, will ich hier bloſs erwähnen, denn ist dieses schreckliche Uebel nicht beschränkt genug, um es mit dem Messer vollständig ausrotten zu können, so wird an eine wahre Hülfe gar nicht zu denken sein.

c. Von den Krankheiten der Thränenkarunkel.

Die reine Entzündung der Thränenkarunkel, *Encanthis inflammatoria*, [εγκανθις, von εν, in, und κανθος, Winkel.]

Die *Valvula semilunaris* und die *Caruncula lacrymalis* schwellen hier an, werden roth und vorzüglich beim Schliefsen des Auges, sehr schmerzhaft; zugleich wird die Aufsaugung der Thränen in dem Thränensack verhindert, weil sich die Entzündung meistens über die Thränenpunkte und über die ganze *Conjunctiva* verbreitet.

Wenn jetzt die Entzündung sich zertheilt, so wird noch eine Zeit lang viel Schleim aus der Karunkel abgesondert, während welcher Absonderung dieselbe in ihren naturgemäfsen Zustand zurückkehrt. Entsteht aber Eiterung, so nimmt die Röthe und Geschwulst der Karunkel zu, wird dunkler und meist am untern Theile, zeigt sich ein weifsgelblicher Eiterpunkt, der sich bald öffnet und zuweilen den Anfang zu einer gänzlichen Verzehrung der Thränenkarunkel, *Rhyas*, ausmacht. Bei Vernachlässigung der Eiterung wachsen aus der Eiterfläche gar leicht schwammigte Excrescenzen, die oft sehr grofs werden können.

Die Ursachen dieser Entzündungen liegen vorzüglich in mechanischen Verletzungen der Karunkel. Holzsplitter und Aehrenspitzen erzeugen sie daher nicht selten; aber auch griesartige *Concremente*, welche sich in der Karunkel selbst bilden, veranlassen zuweilen solche Entzündungen ganz allein.

Die Prognose ist übrigens recht günstig, und nur die Eiterung läfst zuweilen dauernde Fehler zurück, z. B. ein Thränenträufeln, eine völlige Vereiterung der Karunkel, u. s. w.

Um das Uebel zu heilen, mufs man, so lange sich noch kein Uebergang in Eiterung zeigt, fleifsig kaltes Wasser umschlagen, nachdem man zuvor die vielleicht in der Karunkel steckenden fremden Körper, welche nach einer Verletzung zurückbleiben, beseitigt hat.

Schon vorhandene Eiterung behandelt man sorgfältig mit austrocknenden Mitteln, und bestreicht die leidende Stelle, vorzüglich wenn Neigung zu schwammigten Excrescenzen zugegen, mit *Laudan. liquid.* Sind die fungösen Wucherungen damit nicht zu beseitigen, was indefs sehr selten der Fall ist; so kann man folgendes Pulver zum Aufstreuen auf den Schwamm mit Nutzen gebrauchen: ℞. *Sach. alb.* ʒjj. *Alumin. usti gr. xv. Vitriol. alb. gr. jv. M.*

Wurde die Entzündung sehr vernachläfsigt, oder ist sie nicht rein, und kommt sie bei cachectischen Personen vor, so beobachtet man nicht selten eine an Gröfse (Purmann sah sie faustgrofs) immer zunehmende Geschwulst der Thränenkarunkel, welche ein weifslichtes aschfarbenes Ansehn bekommt und sich oft in Form eines Schwalbenschwanzes bis nach der *Cornea* hin erstreckt und dadurch das Sehen theilweise verhindert. Das beste Mittel, die oft ganz fungöse Geschwulst zu heilen, ist die *Exstirpation* derselben. Nachher gebrauchte kalte Wasserüberschläge werden die folgende Entzündung mindern, und die endliche Anwendung gelind adstringirender Mittel das Uebel dauernd heben.

Encanthiden nicht inflammatorischer Art, wo sich die Karunkel in Form einer Maulbeere zeigt, werden, wenn sie grofs sind, auf eben dieselbe Weise geheilt, oder können auch, wenn sie sich als Auswuchs der Thränenkarunkel zeigen, und eine schmale *Basis* haben, durch die Unterbindung weggebracht werden. Sind sie aber klein und unbedeutend, so kommt man öfters mit der örtlichen Anwendung austrocknender und zusammenziehender Mittel aus. Manchmal scheint sich nur die *Membrana semilunaris* vergröfsert zu haben, und in seltenen Fällen bemerkt man an dieser vergröfserten Haut eine schwanzförmige Fortsetzung, welche unter dem untern Augenliede bis zum äufsern Augenwinkel fortläuft. *)

---

*) Siehe Tab. I. Fig. IV.

Dauern nicht rein entzündliche Affectionen der Thränenkarunkel sehr lange, und werden sie vernachläfsigt, so entsteht, vorzüglich nach scrofulösen mit *Syphilis* verbundenen *Ophthalmien*, jedoch in sehr seltenen Fällen, ein

Scirrhus und *Carcinom* der Thränenkarunkel, *Encanthis scirrhosa et carcinomatosa* oder *maligna*,

wovon der erstere sich durch eine sehr harte, ungleiche, blafsrothe und unschmerzhafte Geschwulst, die ein fortwährendes *Stillicidium lacrymarum* bedingt, zu erkennen giebt. Beim herannahenden Krebs hingegen, findet man zwar auch ein lästiges Thränenträufeln, wobei die Thränenkarunkel hart ist; allein diese hat ein bläulichrothes Ansehn und ist äufserst schmerzhaft, auch ist wohl eine scirrhöse Beschaffenheit der Karunkel vorausgegangen. Bei offnem Krebs, findet man die geschwollene Thränenkarunkel von einem äufserst schmerzhaften, leicht blutenden, schwammigten, mit harten aufgeworfenen Rändern versehenen Geschwüre ergriffen, aus dem eine stinkende Gauche ausfliefst, welche schnell auf die Thränenwärzchen u. a. nahe Theile caustisch einwirkt, und leicht durch *Peribrosis* ein *Ectropium* des untern Augenliedes verursachen kann.

Die Prognose ist um so ungewisser, je weiter die Krankheit schon vorgerückt.

Den unschmerzhaften *Scirrhus* lasse man, am besten in Ruhe; den anfangenden Krebs rotte man so schnell als möglich aus und warte ja nicht, bis das Uebel sich über einen Theil des Augenliedes oder wohl gar über den Augapfel selbst verbreitet hat. Die Operation kann auf folgende Art unternommen werden: Man fafst die Geschwulst mit einem doppelten Häckchen *) oder zieht einen gewichsten seidenen Faden durch dieselbe, zieht sie mit den Enden etwas hervor und schneidet sie mit einem passenden *Bistouri* genau

---

*) Tab. V. Fig. 2.

an ihrer Basis und so weg, dafs auch die kleinsten Wurzeln und Anhänge der Geschwulst mit hinweg genommen werden. Sind dennoch einige verdächtige Härten zurückgeblieben, die man nicht gut entfernen kann, so schafft man diese, unter der nöthigen Vorsicht, durch Aetzmittel weg; eben so auch die unreinen Fleischgranulationen, welche während der Eiterung etwa aufkeimen könnten.

Von den Balggeschwülsten der Augengrube.

Es kommen in dem Zellgewebe, welches den *Bulbus* umgiebt, nicht nur Thränenzellgeschwülste und *Hydat. glandul. lacrym.* vor; sondern auch, wiewohl selten, wahre Sackgeschwülste, welche eine compacte, fettartige, oder eiterförmige Masse enthalten. *) Diese Balggeschwülste haben bald tiefer bald flächer in der *Orbita*, gewöhnlich aber unter dem *Bulbus*, **) selten seitwärts von demselben, ihren Sitz, und drängen dem gemäfs den Augapfel, bei fortschreitendem Wachsthum des Balges, so nach aufsen und oben, dafs das Auge einen ganz besondern Anblick gewährt; dabei laufen jetzt die Thränen beständig über die Wangen, und Lichtscheu mit Schmerz in dem Auge und im ganzen Kopfe, bei wiederkehrenden entzündlichen Affectionen des erstern, stellen sich ein.

Die Heilung dieses seltenen Uebels, kann nur durch *Exstirpation* des Balges geschehen. Man spannt defswegen das untere Augenlied an, durchschneidet mittelst eines *Bistouri* mit convexer Schneide, die Haut und den *Orbicularis* nach dem Laufe der Muskelfasern desselben, fafst darauf den Balg mit einem zweckmäfsigen Haken, ***) zieht den Sack so viel als mög-

---

*) Scarpa, a. a. O. Vol. II. pag. 202.

**) Dafs sie vorzüglich hier ihren Sitz haben, hat schon St. Yves in seinem Tractat von den Augenkrankh. bemerkt, 21. Cap. S. 146. Eben so erzählen mehrere Engländer Fälle, wo die bezeichnete Stelle, der Ort der Sackgeschwulst war.

***) Tab. V. Fig. 2. u. 17.

lich aus der *Orbita* hervor, und schält ihn vorsichtig aus.

Reponirt sich der *Bulbus*, nach *Exstirpation* der Balggeschwulst, nicht bald, so legt Scarpa *) graduirte Compressen mittelst einer Binde an, und hält so den *Bulbus* durch einen sanften Druck in seiner gehörigen Lage.

Von den Aneurismen in der *Orbita*.

Aus den wenigen Fällen, welche man bis jetzt beobachtet hat, und die Scarpa **) zum Theil anführt, geht folgendes hervor: Ehe sich Aneurismen in der *Orbita* völlig ausbilden, gehen fast immer Schmerzen in dem Auge und dem Kopfe vorher. Nach und nach entsteht eine immer fühlbarer werdende Pulsation, man hat beim Antasten des Auges gleichsam ein Gefühl von Brausen oder Trillern, (*una sensazione di fremito o trillo*). Dabei nehmen die Kopfschmerzen öfters zu, es stellt sich Ohrenbrausen ein, und das Auge selbst wird zuweilen ziemlich stark aus der *Orbita* hervor gedrängt. Alle gewöhnlichen Augenmittel helfen hier nichts; nur das Umschlagen des kalten Wassers bringt öfters Erleichterung. Die Compression der *Carotis* der leidenden Seite vermindert das Ohrensausen und das Gefühl von Pulsation in dem Auge. Uebrigens war bis jetzt die Unterbindung der *Carotis* der afficirten Seite, das beste Mittel die Heilung zu bewerkstelligen.

Auch Blutaderknoten kommen zuweilen in der Augenhöhle vor, wodurch der *Bulbus* hervorgetrieben werden kann. Ein Beispiel der Art liest man im Chiron, Zeitschrift für Chirurgie u. s. w. von J. B. v. Siebold. 3. Bd. 2. St. Sulzbach, 1814.

---

*) A. a. O. Vol. II. S. 211.

**) A. a. O. S. 215.

II. Von den Krankheiten des Augapfels.

Von den Wunden des Augapfels.

Im Allgemeinen erfordert jede einigermafsen beträchtliche Verletzung des *Bulbus* in Hinsicht der Heilung und Vorhersage sehr viel Umsicht; dabei ist indefs das anzuwendende Heilverfahren im Allgemeinen sehr einfach: denn sind die Verletzungen des Augapfels weder tief, grofs, noch in die edleren Gebilde desselben eingreifend gewesen, so ist die gelind antiphlogistische Methode, bei örtlicher Anwendung von kalten Wasserumschlägen und Verdunklung des Zimmers ausreichend. Sind aber die Verletzungen grofs, tief, und haben sie edlere Theile betroffen, so ist nach Maafsgabe des gröfseren oder geringeren Grades der Verwundung, ein stärkeres oder schwächeres antiphlogistisches Verfahren, nebst Verbinden beider Augen durch Heftpflasterstreifen angezeigt. Natürlich müssen zuvor die verletzenden Körper entfernt worden sein.

Rücksichtlich der einzelnen verwundeten Gebilde ist folgendes vorzüglich zu bemerken:

Wenn die *Conjunctiva* auf irgend eine Art zerrissen ist, so verwandle man die Rifswunde in eine geschnittene, entferne zugleich alle Rückbleibsel des verletzenden Instruments, wasche, wenn kein Blutextravasat unter der Bindehaut vorhanden ist, das Auge mit schleimigen lauwarmen, wenn aber Blutaustretungen zugegen sind, mit weinigten Augenwässern, *) nachdem man, wenn das *Extravasat* sehr stark sein sollte, das Blut durch einen Einschnitt so viel möglich entfernt hat. Oft kann man, um den Aufsaugungsprocefs zu befördern, den genannten Augenwässern caustischen

*) Z. B. nach gemäfsigter *Phlogosis*, eine Mischung aus Franzbrandtwein und *Aqu. menth. pip.*, die Dämpfe von in der Hand geriebenem Aether, u. s. w.

Salmiakgeist zumischen. Entstehen bei zurückgebliebenen Splittern, Afterorganisationen; so schneidet man diese mit der Scheere weg, entfernt die Splitter, und berührt die Stelle öfters mit *Laudan. liquid.*, um die etwa zurückgebliebenen Theile der wuchernden Substanz, vollends zu vertilgen.

Bei gerissenen Wunden der Hornhaut muſs man, wegen der damit verbundenen Erschütterung und Quetschung des Auges, sehr vorsichtig im Prognosticiren sein. Solche Wunden können übrigens bald durchdringend, bald nicht durchdringend gefunden werden. *) Wird bei dergleichen Verletzungen die Entzündung und Eiterung nicht verhüthet, oder entsteht eine dünne gauchigte Eiterung, so bleibt eine mehr oder weniger sichtbare Narbe zurück, die, sobald sie sich in der Mitte der *Cornea* befindet, das Sehen verhindert. Deſswegen muſs man den Kranken, wie nach einer Staarausziehung behandeln, und die Wunde durch geschwinde Vereinigung heilen. Auch wenn die Wunde schnell geheilt wird, bleibt öfters eine sichtbare Narbe zurück, die jedoch bei jugendlichen Subjecten und bei guter Reproductionskraft gar bald verschwindet. Bei alten Leuten, wo diese Kraft in weit schwächerm Grade vorhanden, muſs man dieselbe möglichst durch Mittel unterstützen, und dieſs geschieht hier vorzüglich durch Anwendung einer *Solut. lapid. divini* mit *Laudan. liquid. Sydenh.* — Reine Schnitt- und kleine Stichwunden heilen, bei ruhiger Lage des *Bulbus* und der

---

*) Es giebt Fälle, in welchen ein heftiger Schlag oder Fall auf den Augapfel, die Hornhaut so zerreiſst, daſs in ihrer Masse zwar ein Riſs entstanden, dennoch aber die, die *Cornea* bedeckende, Bindehaut noch in ihrer Integrität besteht und die Spalte der Hornhaut überzieht. Die wäſsrigte Feuchtigkeit drängt hier die *Conjunctiva* bedeutend vor, wodurch Gelegenheit zum völligen Verlust des Gesichts gegeben werden kann. Saint-Yves beobachtete einen solchen seltenen Fall, und heilte die Wunde, indem er auf das geschlossene Auge mit einer zweckmäſsigen Binde einen abgemessenen Druck anbrachte, wodurch sich die Spalte der Hornhaut gut heilend vereinigte.

Augendeckel, gewöhnlich binnen 48 Stunden zu, und oft läfst selbst das Durchstechen der Hornhaut mit einer gewöhnlichen Gabel, keinen Fleck zurück.

Die gewöhnlichste Art von Verletzung der *Cornea*, geschieht durch fremde, in das Auge fallende Körper; obgleich ich davon schon pag. 16. gesprochen, so bemerke ich hier doch noch Folgendes: Sind es Kinder, denen dergleichen fremde Körper in der *Cornea* haften, so wird man diese, wenn die Kleinen ungezogen sind, auf die gewöhnliche Weise nicht entfernen können; hier ist es nothwendig, den Richter'schen Silberdrathhaken unter das obere Augenlied zu schieben und dasselbe von einem Gehülfen fixiren zu lassen, denn nur dadurch, wird man im Stande sein, die *Cornea* zu übersehen und den festsitzenden fremden Theil mit Ruhe heraus zu befördern.

An der Stelle der Hornhaut, an welcher der fremde Körper seinen Sitz hatte, bemerkt man in der Regel eine kleine Vertiefung, die sich zwar bald ausfüllt, allein einen Nebelflecken hinterläfst; nachdem man indefs durch Umschläge von kaltem Wasser, die Entzündung gemäfsigt hat, verschwindet derselbe nach Anwendung des folgenden Augenwassers ziemlich schnell: ℞. *Lap. divini gr. jj. Aqu. rosar.* ℥*jjj. Laud. liquid. Syd. Muc. g. arab.* ää ℥*j.* Sollte eine fremde Partikel sehr lange Zeit im Auge geblieben, und dadurch ein bis auf die unterste Lamelle der *Cornea* dringendes Geschwür entstanden sein, so ist es zweckmäfsig, nach Entfernung des fremden Körpers, einen oder 2 Tage hindurch ein Augenwasser mit *Acet. saturnin.* *)

---

*) Ich habe den Gebrauch bleihaltiger Augenwässer, an vielen Orten dieser Schrift empfohlen; andere Aerzte haben diefs gleichfalls gethan, und allerdings sind jene Wässer von dem wesentlichsten Nutzen, wenn sie am rechten Orte und zu rechter Zeit angewendet werden. So z. B. sind sie bei tiefen Geschwüren der Hornhaut, bei denen man das Durchbrechen der innersten Lamelle derselben in jedem Falle verhüthen mufs, vortrefflich; doch rathe ich, sie nur so lange zu gebrauchen, als es die Gefahr selbst erfordert, wozu meistens 36 bis 48 Stunden hinreichen. Der Grund zu dieser

anwenden zu lassen. Bleibt nach Beseitigung aller Entzündungsphänomene ein Flecken zurück, so ist die eben angegebene *Solutio lapid. divin.*, oder wenn der Flecken bedeutender sein sollte, folgende Präzipitatsalbe im Stande, denselben nach und nach verschwinden zu machen, wenn nicht eine wahre und unheilbare Narbe zugegen ist. Die Salbe ist folgende: ℞. *Merc. praecip. rubr. gr. jß. Laudani liquidi Syd. ℥j. Axung. porcin. ʒj. M. exactssme f. ungt. D. S.* Täglich 1 bis 2 Mal 1 Stecknadelkopf grofs in das Auge zu bringen.

Noch mufs ich eines Zufalls erwähnen, der sich bei Verletzung der Hornhaut mit einem halbstumpfen, eine rauhe Oberfläche habenden Körper, z. B. mit einem Holzsplitter, ereignen kann. Es geschieht nähmlich zuweilen, dafs, obgleich die durchdringende Verletzung der *Cornea* mehr oder weniger unbedeutend war, dennoch ein gewisser Substanzverlust an der durch-

---

Vorsicht liegt in folgendem: Bleihaltige Wässer äufsern auf Geschwüre der Hornhaut, so wie auf Geschwüre überhaupt, eine doppelte Wirkung, sie beschränken nähmlich die Aussonderung des Eiters und trocknen die Oberfläche der Geschwüre aus, ohne die Reproductionskraft bedeutend zu vermehren. Allein sie haben auch die Eigenschaft, Geschwüre der *Cornea* mit einer dünneren oder dickeren weifslichen Decke zu überziehen, welche, wenn sie einigermaafsen dick ist, in Zukunft allen Mitteln fast gänzlich widersteht. Je mehr das Augenwasser *Acet. saturn.* enthält, und je längere Zeit hindurch es angewendet wird, desto ähnlicher wird jener weifsliche Ueberzug einem weifsen Email, und desto geringer ist die Hoffnung, denselben in Zukunft wieder wegzuschaffen. Ich halte diese Bemerkung für ungemein wichtig und der gröfsesten Beachtung der Aerzte werth. Nie sollte man daher bleihaltige Augenwässer bei flachen Geschwüren und oberflächlichen Erosionen der Hornhaut anwenden. Wer dergleichen mit blofsen Augen nicht erkennen kann, der nehme eine Lupe zu Hülfe. Niemals bleiben gröfsere Facetten an der Geschwürstelle der *Cornea* zurück, als nach Anwendung bleihaltiger Augenwässer. Aus diesem Grunde pflege ich denselben auch stets Mittel zuzusetzen, welche im Stande sind, die Reproductionskraft in der Geschwürfläche zu heben, z. B. das *Laudanum liquidum.*

bohrten Stelle entsteht, der auch nach Ablauf der sichtbaren Entzündungssymptome noch besteht und eine Oeffnung in der *Cornea* (Hornhautfistel) zurückläfst. Diese Oeffnung ist oft so unbedeutend, dafs man sie nur durch eine gute Lupe zu bemerken im Stande ist; der Arzt entdeckt indefs dieselbe schon dadurch ohne Mühe, dafs die vordere Augenkammer mehr oder weniger kleiner sich darstellt, als die des anderen Auges, wobei die *Iris* convex nach vorn gedrängt erscheint. Nur bei gröfseren dergleichen Oeffnungen in der Hornhaut, ist die *camera oculi anterior* gänzlich aufgehoben, wo denn die vordere Fläche der Regenbogenhaut unmittelbar an der hinteren Fläche der Hornhaut anliegt. Ich beobachtete diesen Zufall mehrere Male und habe denselben dadurch immer beseitigt, dafs ich, nachdem keine sichtbaren Entzündungszeichen mehr zugegen waren, auf die Hornhautöffnung früh und Abends von folgender Auflösung mittelst eines kleinen Pinsels etwas auftupfte: ℞. *Argenti nitrici fusi gr. j. Aquae rosarum* ℥jß. — ℥vj. *M.* Es entsteht dadurch ein beschränkter Entzündungs- und Reproductionsprocefs, vermöge dessen die Oeffnung sich schliefst.

Fremde Körper, welche durch die *Cornea* oder *Sclerotica* in das Auge dringen und stecken bleiben, müssen natürlich schnell ausgezogen werden, und nachdem dieses gelungen, mufs die antiphlogistische Methode in gröfserm Umfange, bei örtlicher Anwendung des kalten Wassers, welches späterhin mit etwas Bleiessig gemischt wird, gebraucht werden. Sind Splitter, Aehrenspitzen und dergl. auf solche Art in den *Bulbus* gedrungen und können, weil sie vielleicht abgebrochen sind, nicht mehr mit einer Pincette gefafst und ausgezogen werden, so ist dieses sehr schlimm; denn Eiterungen und Verwachsungen der innern Gebilde des Augapfels mit den äufseren, werden die Folge davon sein. Unter solchen mifslichen Umständen, mufs der Arzt unter zwei Uebeln das kleinste wählen, indem er auf der Stelle, an welcher der fremde Körper in den *Bulbus* gedrungen ist, vorsichtig und mit Berücksichti-

gung der Folgen, die Wunde erweitert und nun den Splitter etc. mit einer zweckmäfsigen, gut fassenden Pincette ergreift und langsam auszieht. Zuweilen ist dazu der Gebrauch des Richter'schen Silberdrathhakens zur Fixirung des oberen Augenliedes anzurathen.

Fällt, bei durchdringenden Wunden der Hornhaut, die *Iris* zwischen die Wundlippen vor, so schliefse man das Augenlied, reibe dasselbe mit dem Finger, und lasse sehr helles Licht plötzlich in das geöffnete Auge fallen. Wird die Regenbogenhaut nicht gleich auf diese Art zurück gebracht, so kann man, nach Ware, den *Humor aqueus* aus dem Auge fliefsen lassen, und nach Gibson soll man selbst das Säckchen öffnen, welches die *Iris* in der Hornhautöffnung bildet, damit die hinter der Regenbogenhaut befindliche wäfsrigte Feuchtigkeit, wodurch erstere nach der Hornhaut hin gedrückt wird, das Zurückspringen der *Iris* nicht verhindere, worauf dann, wie beide Augenärzte oftmals beobachteten, die *Iris* in ihre normale Lage zurück trat. *) Bleibt dennoch die *Iris* in der Hornhautwunde liegen, so verwachsen beide Häute und es entsteht ein *Staphyloma iridis*, ein dauernder Vorfall der Regenbogenhaut.

Ist mit der Hornhaut, zugleich auch die *Iris* verletzt worden; so geht die hier meist bedenkliche Wunde oft in Eiterung über, oder hinterläfst eine unvollkommne oder vollkommne Pupillensperre. Fällt ein Lappen der zerrissenen Regenbogenhaut in die Wunde der Hornhaut vor, dann mufs man solche vorliegende Lappen sogleich mit der Scheere wegschneiden; worauf sich meistens die Regenbogenhaut von selbst zurück ziehen, und eine Verwachsung derselben mit der Hornhaut, *Synechia anterior*, verhüthen wird.

Eine blofse, durch einen Stofs mit stumpfen Werkzeugen entstandene, Erschütterung des Auges ohne

---

*) Siehe Dr. Günthers Brief in der Biblioth. für Ophthalmologie, Kenntnifs und Behandlung der Sinne überhaupt in ihrem gesunden und kranken Zustande, von Himly, 1816. Erst. Bd. 1. St. Seit. 52.

Wunde, reifst öfters die *Iris* von ihrem Ciliarbande los, und bringt entweder eine doppelte Pupille *) hervor, oder die normale schliefst sich, und die neu entstandene bleibt. Bleiben beide Pupillen offen, so entsteht nicht selten ein Doppeltsehen, *Diplopia*. Indefs zerreifst die *Iris* nach stumpfen Stöfsen auf den Augapfel bei weiten nicht immer, vielmehr entsteht dadurch in den meisten Fällen ein ganz anderer Zustand, und zwar einmal: eine durch die Erschütterung gesetzte gröfsere oder geringere Lähmung der *Retina*, welche sich durch Schwäche der Sehkraft, durch Regenbogenfarbensehen, sowie durch Feuerfunken und Blitze manifestirt: zweitens aber eine gröfsere oder geringere Lähmung der *Iris*, welche sich auch nach gehobener Lähmung der *Retina*, durch eine erweiterte Pupille, die rund oder verzogen sein kann, äufsert. Solche Verletzungen sind sehr wichtig und müssen gleich in den ersten Tagen sehr sorgfältig behandelt werden; denn was in der ersten Zeit gewonnen werden kann, ist meistens alles was gewonnen wird. Anfangs und bei robusten blutreichen Personen, ist ein Aderlafs angezeigt, allein stets mufs diesem das Anlegen von einem Dutzend Blutigeln an die Schläfegegend, sogleich folgen. War die Verletzung weniger bedeutend und der Verletzte blutleer oder Kind, dann sind Blutigel allein hinreichend. Ferner sind eiskalte Wasserumschläge, welche in den ersten 36 Stunden unausgesetzt angewendet und späterhin mit etwas Bleiessig vermischt sein müssen, dringend nothwendig. Innerlich gebe man *Laxantia antiphlogistica*. In manchen Fällen sind auch Fufsbäder nützlich. Darauf pflegen das Regenbogenfarbensehen, die Blitze und die Schwachsichtigkeit bald zu verschwinden; indefs wenn auch die Lähmung der *Retina* nach einigen Tagen beseitigt wurde, so bleibt doch

---

*) Solche Losreifsungen der *Iris* von ihrem Ciliarbande und die dadurch entstandene dauernde Pupille, brachten Scarpa und Ad. Schmidt zuerst auf den Gedanken, auf künstliche Art solche Pupillen zu formen, und so kam die bekannte 3te Art der künstl. Pupillenbildung, nämlich die *Iritodialysis* zu Tage.

häufig die Lähmung der Ciliarnerven zurück, welche nun aber durch Auflegen eines *Emplastri canthar. perp.* auf die Supraorbitalnervengegend, und durch Einreibungen flüchtig reitzender Mittel in jene Gegend gänzlich oder fast gänzlich gehoben zu werden pflegt. Wenn nach Ablauf aller Entzündungssymptome, eine gewisse Schwäche der Sehkraft übrig bleibt, so kann man längere Zeit hindurch flüchtig reitzende Augendämpfe anwenden lassen.

Bei durchdringenden Verwundungen der *Sclerotica* und des Ciliarkörpers, entstehen sehr oft Blutaustretungen in den Augenkammern. Man mufs diese, sobald sie bedeutend sind, durch einen Einschnitt am untern Theile der Hornhaut, entfernen, und, vorzüglich bei zugleich vorhandenen heftigen Quetschungen, spirituöse Augenwässer vorsichtig anwenden, damit zugleich der Aufsaugungsprocefs unterstützt werde. Aus der Wunde hängende Lappen des Ciliarkörpers müssen mit der Scheere abgeschnitten werden.

Wenn die Verwundung bis in die Linse gedrungen, so ist die Prognose selten günstig; denn meistens entwickelt sich in derselben nach und nach ein cataractöser Zustand. *) Ist die Crystalllinse ausgiebig gespalten, oder überhaupt bedeutend verletzt, ohne dafs die dabei Statt gefundene Erschütterung des Augapfels auf die Netzhaut sehr eingewirkt hat, so wird die sich nach einigen Tagen bildende *Cataract*, aufgesogen und das Gesicht kehrt zurück; nur mäfsige man die Entzündung sorgfältig durch die gewöhnlichen antiphlogistischen Mittel, und tröpfle gleich darauf einige Tropfen

---

*) Nicht jede mechanische Verletzung der Linse mit ihrer Kapsel verursacht den grauen Staar; denn ist das verwundende Instrument sehr scharf, wirkte keine erschütternde, quetschende Gewalt auf den Augapfel und die Linse, wird diese dadurch nicht grofsentheils aus ihren organischen Verbindungen herausgerissen, so erfolgt nicht selten nur eine vorübergehende, kaum bemerkbare partielle Trübung der Kapsel, die mit Ablauf der entstandenen Entzündung verschwindet. Mir sind bereits mehrere Fälle vorgekommen, die mir das Argument sichern.

einer *Solut. extr. Belladonnae* in das Auge, wodurch eine, vielleicht in Folge einer *Iritis chronica* entstehende Verengerung der Pupille, und wo möglich Verwachsungen der *Capsula lentis* mit der *Uvea*, verhüthet werden, weil, wenn diese entstehen, die Wiederkehr des Gesichts durch die Kapsel auch dann gänzlich, oder zum Theil verhindert wird, wenn sich auch die Linsenmasse nach und nach verzehrt. Zuweilen bleibt eine *Cataracta capsulo-lenticularis arida siliquata* oder eine *Cataracta capsulo-lenticularis tremula* zurück. Sprang die Linse bei der Verletzung in die vordere Augenkammer, ist sie dabei hart, (hart ist sie gewöhnlich bei alten Leuten) so mufs sie als fremder Körper betrachtet, und durch einen Einschnitt in die *Cornea* sogleich herausgezogen werden, worauf die Entzündung schnell abnehmen wird.

Verletzungen mit Verlust der Glasfeuchtigkeit, sind gewöhnlich nicht so schlimm, wenn sie kunstmäfsig bei Staarextractionen geschahen, als wenn sie zufällig, z. B. durch den Stofs mit dem Horn eines Ochsen, u. s. w. entstanden sind, weil im letztern Falle meist die Gewalt, mit welcher die Verletzung geschieht, sehr grofs ist. Völlige Ausleerung der Glasfeuchtigkeit hat oft den Verlust des Auges zur Folge.

Wenn die *Retina* durch eine Wunde der *Sclerotica* und *Chorioidea* hervortritt; so folgt Verlust des Gesichts mit erweiterter Pupille. Ebenso kommt eine unheilbare amaurotische Blindheit zu Stande, wenn die *Retina* selbst verletzt ist. *) Bei solchen Verwundungen, wie auch bei denen der gröfsern Ciliarnerven, entsteht immer ein heftiges Erbrechen, welches, wenn es nicht gehoben wird, die Entzündung im Auge natürlich vermehren mufs. Es wird, wenn Unreinigkeiten im Darmkanale dasselbe unterhalten, durch ausleerende Mittel beseitigt; ist aber das Erbrechen rein nervös, so sind gelinde Opiate, entweder innerlich, oder wenn sie

*) Auch von dieser Regel giebt es indefs Ausnahmen, die mich mehrere sichere Erfahrungen kennen gelehrt haben.

sie innerlich nicht vertragen werden, äufserlich in Klystieren von Chamomillendecoct dienlich. Die Verlezzung der Ciliarnerven giebt sich aufserdem noch durch eine charakteristische Erscheinung zu erkennen: Die Regenbogenhaut zieht sich nämlich meistens (nicht immer) so nahe an den Rand der Hornhaut zurück, dafs man kaum mehr die Farbe der *Iris* unterscheiden kann.

So weit von den mechanischen Verletzungen des Auges.

Was chemische Verwundungen unseres Organs betrifft, so erfordern diese, rücksichtlich der Prognose und Heilung, zwar eine weit gröfsere Aufmerksamkeit als die mechanischen, weil erstere immer mehr oder weniger Substanzverlust mit sich bringen, sind aber dennoch, so lange sie klein sind, in Bezug auf Vorhersage und Heilung sehr günstig. Ruhe des Auges, nebst schleimigen lauwarmen Fomentationen oder Waschwässern, ist hier alles was zur Heilung erfordert wird. Haben solche chemische Verletzungen die Hornhaut selbst getroffen, z. B. durch Spritzen von siedheifsen Flüfsigkeiten; so entsteht eine immer weisser werdende Blase, diese berstet, oder verschwindet auch wieder ohne zu bersten, das Oberhäutchen runzelt sich, wird schneeweifs, stöfst sich, sobald eine neue *Epidermis* sich gebildet hat, ganz ab, und die Hornhaut erhält ihre vorige Durchsichtigkeit wieder. Der Arzt darf hier die Blase nicht öffnen und den Reproductionsprocefs nicht stöhren.

Sollten durch chemische Einwirkungen die Augen mehr extensiv gelitten haben, zugleich gröfsere Theile des Oberhäutchens ganz losgetrennt sein; so müssen diese Theile als todte Körper betrachtet, und ganz weggeschnitten werden. Wenn durch dergleichen Einflüsse, z. B. durch Verbrennungen, durch concentrirte Mineralsäuren, u. s. w. gleichzeitig die Bindehaut der Augenlieder ergriffen ist; so mufs man die Reproductionskraft schnell befördern, damit die desorganisirten Theile bald losgestofsen und die Wundflächen bald heil werden. Diefs geschieht durch gelind adstrin-

girende trocknende Mittel, z. B. eine Salbe aus Cacaobutter oder *Butyr.* mit *Tutia* oder Bleiglätte. Bei dergleichen Verletzungen der innern Haut der Augenlieder, mufs man dieselben öfters bewegen lassen, damit nicht durch anhaltendes Zusammenliegen der Augenlieder und des Augapfels, eine Verwachsung des letztern mit dem einen oder andern Augenliede, oder eine Verwachsung der Augenlieder unter sich, entstehe.

Sind ätzende *Kalien* (wie dieses bei Apothekern und den Arbeitern in chemischen Fabriken gar nicht selten der Fall ist) in die Augen gekommen; so wirkt anfangs nichts besser als der äufserliche Gebrauch säuerlicher kalter Molken, wenn man zuvor mit einem in Mandel-Mohn- oder Provenceröhl getauchten weichen Malerpinsel, die gröfsern Parthieen des Salzes vorsichtig entfernt hat. War der chemische schädliche Einflufs auf das Auge sehr stark, z. B. durch ungelöschten Kalk, Mineralsäuren, u. s. w. sind dadurch Vertiefungen in der *Cornea*, die man bemerkt wenn man das Auge in Profil betrachtet, entstanden; so bleibt gewöhnlich eine schneeweifse Narbe zurück. Hier, so wie auch bei weniger heftigen Eingreifungen in die Textur unseres Organs, beseitige man natürlich vor allen Dingen die verletzende Schädlichkeit, veranstalte das Eintröpfeln schleimigter Augenwässer und verhüthe jederzeit oben erwähnte Verwachsungen der Augenlieder.

Schlimmer noch als diese Verletzungen, sind diejenigen, welche durch das Anschlagen einer Flamme an das Auge, oder durch den Sonnenstich erzeugt werden; denn je schneller, und je mehrere Brandblasen sich auf der Bindehaut zeigen, je mehr der Augapfel überhaupt und die *Iris* ins besondere alle Beweglichkeit verliert, je mehr die Pupille sich verengert, je heftiger drückend der Schmerz im ganzen Augapfel und der Umgegend wird, desto schneller entwickelt sich eine allgemeine Entzündung des Auges. In diesem Falle mufs der Arzt alles thun, um die Entzündung zu vermindern, obgleich er oft aller Bemühung ungeachtet, kaum im Stande ist, die Form des Auges

zu erhalten, viel weniger das verlohrne Sehvermögen wieder herzustellen.

A. Von den Krankheiten der durchsichtigen Theile des *Bulbus*.

a. Von den Krankheiten der *Conjunctiva*.

Die reine Entzündung der *Conjunctiva, Sclerotícae* und *Corneae,* [fälschlich *Conjunctivitis* genannt.]

Die Entzündung der Bindehaut des Augapfels, fängt gemeiniglich in dem Theil derselben an, welchen man *Conjunctiva scleroticae* nennt. Es entsteht nämlich meistens sehr schnell ein dunkelrothes Gefäfsnetz in dieser Haut, dessen Gefäfse sich durch ihren bedeutenden Durchmesser sehr grell von den sehr feinen und tiefer liegenden Blutgefäfsen der entzündeten *Sclerotica* unterscheiden *) und sich bei Bewegungen der Augenlieder leicht nach allen Richtungen verschieben, bei Bewegungen des *Bulbus* selbst aber, ihre Stellung wenig verändern. Schreitet nun die Entzündung der *Conjunctiva scleroticae,* in die *Conjunctiva corneae* über; so trübt sich das Bindehautblättchen der Hornhaut, nach der Heftigkeit der Entzündung theilweise oder allgemein, erhebt sich ein klein wenig, wird grau weifslicht, wie matt geschliffenes Glas, und läfst endlich auch eine grau weifslichte Röthe erkennen, die bald

---

*) Zur genauern Unterscheidung einer Entzündung der *Sclerotica* — *Sclerotitis* — von einer Entzündung der *Conjunctiva,* ist aufser diesem noch folgendes zu bemerken: Bei *Sclerotitis* findet man immer intensivere Heftigkeit aller Krankheitserscheinungen, bei geringerer anscheinender Extensität derselben, als man diefs bei Entzündungen der *Conjunctiva* bemerkt; die Entzündungsgefäfse in der *Sclerotica* entstehen langsamer als in der *Conjunctiva,* und weichen auch, hinsichtlich ihres Laufes, von den Gefäfsen der letztern ab. Die Blutgefäfse der *Sclerotica* folgen endlich allen Bewegungen des *Bulbus,* nehmen aber an den isolirten Bewegungen der Bindehaut keinen Antheil.

in deutliche, rothe und fast ganz gerade laufende Gefäfse übergeht. *) Uebrigens ist diese Entzündung von wenigen Schmerzen begleitet.

Die Ursachen des Leidens, sind vorzüglich kleine, in das Auge gefallene Körper, u. s. w.

Die Heilung ist dieselbe welche bei der äufsern reinen Augapfelentzündung unter *Taraxis* angegeben worden ist.

Das dichte Augenfell, *Pannus.*

Diese Augenkrankheit besteht in einer Durchwebung der Bindehaut der *Sclerotica* und *Cornea* mit dünnen und dickern Blutgefäfsen, zwischen welchen auf der *Cornea* eine grau weifslicht röthliche Trübung bemerkt wird. **) Wenn der *Pannus* sehr ausgebildet ist, so erscheint das Blutgefäfsnetz hier so dicht, dafs man kaum die Gränze zwischen der *Sclerotica* und *Cornea*, viel weniger die *Iris* und Pupille erkennen kann.

Der Reitz, welchen eine gegenwärtige *Trichiasis* oder ein *Entropium* auf die Bindehaut macht, ist sehr oft die Ursach zur Entstehung dieses chronischen Blutgefäfsnetzes. Es ist dieses Uebel eigentlich ein Substanzwucher in der Bindehaut des Augapfels, besonders aber in der *Cornea*, vermöge dessen das *Parenchym* derselben dicker, aufgelockert und mit Gefäfsen durchwebt wird.

Man unterscheidet bei dieser Krankheit besonders zwei Grade, den geringeren nennt man *Pannus membranaceus* oder *tenuior*, und dieser charakterisirt sich durch einen mehr oder weniger dünnen, weifsgraulichten Nebel der Oberfläche der *Cornea*, in welchem sich viele Blutgefäfse verzweigen. Bei diesem Grade sieht man noch *Iris* und Pupille durch den Nebel durch, selbst zuweilen noch die Structur der ersteren. Den stärkeren Grad nennt man *Pannus carnosus* oder *Sarcoma conjunctivae.* Bei diesem Grade bemerkt man

---

*) Wardrop, a. a. O. pag. 7.

**) Siehe Taf. I. Fig. 5.

die Substanzwucherung der Bindehaut der *Cornea* deutlicher, die Zahl der Gefäfse in derselben sind oft so grofs, dafs man die einzelnen zu unterscheiden, nicht mehr im Stande ist. Hier sieht man, wie gesagt, oft kaum noch die Gränzen zwischen *Sclerotica* und *Cornea*, noch seltener aber die *Iris* und die Pupille. Die *Cornea* ist in solchen Fällen, hinsichtlich ihres Ansehens mit einem Stücke rothbraunen Tuche zu vergleichen, und nicht selten bemerkt man an einer oder an mehreren Stellen der Hornhaut eine geschwulstartige Anhäufung der Blutgefäfse, welche zuweilen ein fleisch- oder flechsenartiges Ansehen bekommen.

Der *Pannus* pflegt sich auf folgende Weise zu entwickeln: zuerst entsteht eine geringe Röthe in der *Conjunctiva scleroticae*, mit mehr oder weniger, oder ohne alle Lichtscheu; nach und nach bemerkt man an einer oder an mehreren Stellen des Randes der *Cornea*, einen kleinen Nebel, eine graulichte Trübung, welche anfangs so dünn sein kann, dafs sie kaum zu bemerken ist. Bald darauf erkennt man mit bewaffnetem Auge einige blutführende Gefäfschen, welche sich in diesen Nebel hineinerstrecken und darin verzweigen, und die deutlich auf der Oberfläche der *Cornea* liegen; endlich werden sie dem bloſsen Auge sichtbar, nehmen an Zahl und Durchmesser zu, wobei sich die Trübheit der *Cornea* immer mehr und mehr verbreitet, und zu bemerken ist, dafs in der Regel die getrübten Stellen der Hornhaut, von den diesen am nächsten liegenden Orten der *Conjunctiva scleroticae*, ihre Blutgefäfse erhalten. Nun wird oft die ganze *Cornea* gleichförmig oder ungleichförmig mit Blutgefäfsen übersponnen, indem der saturirten Röthe, die sie verursachen, die früher entstandene grau weifslichte Trübung dieser Haut immer mehr weicht und oft gänzlich dadurch unsichtbar wird. Die Oberfläche derselben erscheint jetzt aufgelockert, unegal, und das Gesicht des Leidenden ist bis auf einen gewissen Lichtschein aufgehoben. Zuweilen bemerkt man, besonders an den Gränzen der *Cornea*, kleine Geschwüre, die vorzüglich da auftreten, wo Scrofeln das Leiden veranlassen. Wäh-

rend der Entstehung und der Fortbildung dieses morbiden Processes, sind die Schmerzen im Auge gering, und es fehlen alle Zeichen, welche auf ein entzündliches Ergriffensein der *Iris* oder der übrigen im Augapfel gelegenen Gebilde hindeuten könnten.

Die Ursachen dieser Krankheit sind entweder rein local, indem sie von einem gegenwärtigen *Entropium*, *Trichiasis etc.* veranlafst wird, oder sie liegen in der Constitution des Individuums. Besonders scheinen *Catarrh*, *Scrofeln*, *Rheumatismus* und *Syphilis* dem Entstehen des Uebels günstig zu sein; insgemein aber werden wir bei genauer Erforschung der *Anamnese* finden, dafs irgend ein örtlicher Reitz, jene im Körper vorhandenen, vielleicht schlummernden Uebel, erst vermochte, im Auge aufzutreten. Eine Erkältung der Stirn, ein vernachläfsigter Schnupfen, sind meistens hinreichend, um einen *Pannus* hervorzubringen.

Wenn ich im Allgemeinen eine Definition von diesem Uebel und von dessen Wesen geben sollte, so würde mein Glaubensbekenntnifs in dieser Hinsicht ohngefähr folgendes sein: ich halte das Ganze für eine chronische, in Verhärtung übergehende Entzündung. Wir finden dieselben Symptome, mit Ausnahme derjenigen, welche dem Auge individuell angehören, an allen Theilen des menschlichen Körpers, wo eine Entzündung weder durch Zertheilung sich endigt, noch in Eiterung überschreitet, vielmehr den Uebergang zur Verhärtung wählt; dafs wir diese Zeichen nicht immer bemerken, liegt ganz besonders darin, dafs die entzündeten Parthieen mit Häuten etc. bedeckt und verhüllt sind. Warum nun aber gerade diese Entzündung der *Conjunctiva corneae* in Verhärtung übergehet, kann man ebenso wenig genügend und erschöpfend beantworten, als man erklären kann, warum chronische Leberentzündungen die meiste Neigung haben, verhärtete Lebern zu hinterlassen. Jeder Verhärtung geht ein entzündlicher Proceſs voraus. Jede Verhärtung bedingt Substanzzunahme, wenn auch gerade nicht immer *quoad spatium*. Jeder indurirte Theil, setzt ein Dichterwerden der Masse voraus, so auch bei dem *Pannus*. Selbst die varicösen Ge-

fäfse, die wir nach Ablauf der ursächlichen Entzündung beim *Pannus* vor Augen haben, bemerken wir auch an anderen verhärteten Organen, wenn wir uns die Mühe geben wollen, dieselben genauer zu untersuchen. So wie die durch *Pannus* indurirte Oberfläche der *Cornea* bei geringen Ursachen sich leicht von neuem entzündet, ebenso haben auch die Indurationen der übrigen Organe des Körpers bei vorfallenden Ursachen die gröfste Neigung, sich von neuem zu entzünden.

Nachdem wir nun alles dieses wohl erwogen haben, so wird uns auch die *Prognose* ziemlich klar werden. Im Allgemeinen ist dieselbe sehr verschieden. Das Uebel ist gänzlich zu entfernen: bei jungen, in einer günstigen Lage lebenden Subjecten, wenn man im Stande ist, die ursächlichen Momente aus dem Körper überhaupt, oder wenigstens aus dem Auge zu entfernen, und wenn die bereits in Verhärtung übergegangene Entzündung nicht die Structur der *Cornea* unheilbar desorganisirt hat. Unter solchen Bedingungen ist der zeitig hinzugerufene Arzt auch fast immer im Stande, das Fortschreiten des *Pannus* zu verhüthen. Nicht gänzlich zu entfernen ist pannöse Trübung der Hornhaut: bei allen schwächlichen Subjecten, die jahrelang von Recidiven einer pannösen Entzündung der heftigsten Art heimgesucht wurden, wodurch nicht nur die Structur der Bindehaut der *Cornea*, sondern auch die Lamellen der letzteren selbst, zu sehr desorganisirt worden sind. Meistens unheilbar ist das Uebel bei allen denen Subjecten, die unfolgsam sind, oder sich in einer Lage befinden, in welcher sie die Bedingungen zu einem umsichtigen Heilplane nicht erfüllen können, und die in sich und in ihrem Arzte nicht die Ausdauer finden, welche zur Heilung solcher Verhärtungen unbedingt in allen Fällen unumgänglich nöthig ist. Zu bemerken habe ich noch, dafs anfangs oft nur ein Auge von dem Uebel ergriffen wird, allein häufig beginnt im anderen Auge auch dann noch derselbe Procefs, wenn schon Monate lang die Krankheit im ersten Auge hauste; doch auch dieser Uebergang wird bei folgsamen Kranken meistens verhüthet.

Die Indicationen zur Heilung des Uebels sind *a*) Entfernung der Entzündung, *b*) Beseitigung des durch diese veranlafsten Productes, der Verhärtung, durch die geeigneten Mittel. Die ursächliche Entzündung ist bei dem *Pannus* fast niemals so heftig, als dafs sie ein strenges antiphlogistisches Verfahren erforderte; nur ist eine reitzlose Milde und sehr magere Diät bei Anwendung der bald anzugebenden Mittel nothwendig. Höchst selten wird das Anlegen von Blutigeln nöthig werden, und nie sollte man diese in die nahe Umgegend der Augen selbst anbringen, weil die Erfahrung lehrt, dafs sich dadurch die Entzündung selten mindert, das Fortschreiten der Trübung der *Cornea* aber oft schnell begünstigt wird. Sollten sie ja nöthig sein, so ist der Nacken und dessen Umgegend die geeigneteste Stelle dazu.

Aufser einigen Fällen, wo die Entzündung durch örtliche Reitze entstanden ist, und unterhalten wird, ist die pannöse Entzündung niemals als eine reine anzusehen. Man entferne daher vor allen die dyscrasische Ursache des Uebels. Da nun meistens Rheumatismus, Scrofeln, Catarrh und *Syphilis* Schuld an der Krankheit haben, so berücksichtige man auch diese von vorn herein. Das Mittel, welches vorzugsweise geeignet ist, solche entzündliche Procefse zu heben und dem Ausgange in Verhärtung zuvor zu kommen, oder wo sie bereits vorhanden, zu heilen, ist das Queckſilber. Nach meiner Erfahrung ist dieses Mittel kaum durch ein anderes zu ersetzen. Ich pflege auf folgende Weise zu verfahren und kann versichern, dafs ich bisher im Stande gewesen bin, das Uebel fast in allen Fällen zu heilen, wenn nicht die bereits oben angegebenen Umstände, Hindernisse in den Weg legten. Zuerst reiche ich eine grofse Dosis *Calomel*, mit Berücksichtigung des Alters und der Constitution des Individuums, z. B. zu 3 bis 6 Gran mit einem Scrupel bis einer halben Drachma *Rad. jalappae* und Zucker. Darauf gebe ich alle 3 Stunden $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Gran *Calomel* fort, nach Umständen mit oder ohne *Sulph. aurat. antim.* und *Hba cicutae*, bis die ersten Zeichen des Er-

griffenwerdens der Speicheldrüsen eintreten. Dabei lasse ich eine Mixtur aus gelind auflösenden, bei *Rheuma*, mit, die Thätigkeit der Haut steigernden Mitteln, gebrauchen. Nachdem der *Calomel* nicht ferner gegeben werden kann, reiche ich den *Aethiops antimonialis* zu 1 bis 2 Gran, alle 3 bis 4 Stunden, in Verbindung mit dem *Tartaro tartarisato* oder anderen den Verhältnissen anpassenden Mitteln. Da man indefs bei der Mehrzahl von Fällen, nicht im Stande ist, die ursächlichen, im Körper vorhandenen Dyscrasien schnell genug aufzuheben, dieses auch nicht selten bei der besten Ausdauer in Anwendung zweckmäfsiger Mittel, der Fall ist, so sorge ich gleich anfangs dafür, den im Auge waltenden specifischen Procefs von hier abzuleiten und demselben einen Ort anzuweisen, wo er wenigstens dem Auge unschädlich wird. Diesen Zweck pflege ich dadurch zu erreichen, dafs ich im Nacken, oder noch besser, hinter dem Ohre der leidenden Seite, ein Zweigroschenstückgrofses Pflaster lege, zu welchem folgende Mischung genommen wird: ℞. *Tart. stib. subtiliss. pulverat.* ʒj. *Emplastri adhaesiv.* ʒjj. *Malax. exactissim.* Dieses Pflaster bleibt so lange liegen, bis nicht nur Pocken entstanden, sondern diese auch in offne Eiterung übergegangen sind. Wo der Schmerz bald so heftig wird, dafs das nur örtlich wirken sollende Mittel, auch auf die Umgebungen einwirkt, da mufs es früher schon abgenommen werden. Nachdem nun zwei Tage hindurch die Wundstelle mit einer milden Salbe verbunden worden ist, lasse ich dieselbe täglich mit folgender Mischung verbinden, von welcher zu einem Verbande hinter dem Ohre, einer Erbse grofs, wo man aber den Nacken zu jenem Pflaster wählte, einer Bohne grofs, verbraucht wird. Die Salbe ist folgende: ℞. *Tart. emetic. Hydrarg. muriat. corr.* āā *gr. jv. — gr. vj. Ungt. cantharid. Ungt. basilic.* āā ʒjj. *M.* Die Wundstelle mufs übrigens Monate lang offen erhalten werden, wenn man vor Recidiven möglichst gesichert sein will. Wo schnell abgeheilte Hautausschläge, unterdrückte rheumatische Beschwerden und dergl. offenbar Schuld an der Entstehung des *Pannus*

hatten, da wähle ich die Stelle zum Auflegen meines Pflasters, welche das Uebel vorher eingenommen hatte; nur mache ich die Ableitung viel gröfser, wenn jener Ort, an, vom Kopfe entfernteren Theilen sich befindet.

So lange der dyscrasische Procefs im Auge noch haftet, und derselbe einigermaafsen heftig ist, hüthe man sich ja vor Anwendung aller örtlichen Mittel auf das kranke Organ, vorzüglich aber vor adstringirenden Augenwässern; diese sind niemals nützlich, vielmehr befördern sie den Uebergang der Entzündung in Verhärtung, und bedingen die nachkommenden Recidive. Von der anhaltenden Fortsetzung der nöthigen inneren Mittel und der zweckmäfsigen Diät, hängt zum grofsen Theile die Möglichkeit der Heilung einer indurirten *Cornea* ab: weil sie es sind, welche die Thätigkeit der absorbirenden Gefäfse, ebenso im Auge wie in allen übrigen Organen des Körpers, erhöhen und befördern. Nur dann erst, wenn man sicher sein kann, dafs auf das Auge örtlich angewendete Reitzmittel, nicht wohl ferner im Stande sind, das specifische entzündliche Leiden wieder dahin zu locken, gehe man zu dem Gebrauch solcher Medicamente über, von welchen bekannt ist, dafs sie die Resorptionskraft örtlich erhöhen und vermehren. Die vorzüglichsten, bisher am meisten empfohlenen sind: das *Laudanum liquid. Syd.*, von welchem täglich 2 bis 3 Mal 2 Tropfen in das Auge gebracht werden. Bei torpiden unempfindlichen Subjecten, kann man das *Laudanum* durch Zusatz von *Bals. vitae Hoffm.*, ja selbst durch Naphten verstärken, oder derlei Mittel auch ohne ersteres gebrauchen lassen. Wo dem *Pannus* Scrofeln zum Grunde liegen, wird eine Sublimatsolution mit *Laudanum* empfohlen; indefs wird dieselbe, nach meiner Erfahrung, auch in solchen Fällen nicht immer vertragen. Alle Augenwässer müssen übrigens lauwarm in das Auge gebracht werden. Obgleich fettige Mittel nicht wohl zu empfehlen sind, am wenigsten nach kaum im Auge getilgter Dyscrasie, weil sie oft zur stärkeren Wucherung des *Pannus* beigetragen haben, so werden doch später rothe Präcipitatsalben in vielen Fällen recht gut vertra-

gen und mit Nutzen angewendet. Wo man das Auge wenig reitzbar findet, können auch chemisch und mechanisch wirkende Pulver in dasselbe eingebracht werden; z. B. ℞. *Aluminis crudi part. j. Sachari albissimi part. vj. M. f. pulv. S.* Täglich 2 bis 3 Mal etwas davon in das Auge zu streichen. Aufserdem hat man *Borax, Os sepiae, Limatur. stanni etc.* gebraucht. Wo nach Ablauf der pannösen Entzündung Ueberbleibsel von oberflächlichen Wucherungen vorhanden sind, da kann man mittelst eines Pinsels etwas von folgender Auflösung auf die genannten Stellen bringen: ℞. *Lap. infernal. gr.* ß. — *gr. j. Aqu. destillat.* ℥ß. — ℥vj. *M.* Alle diese Mittel leisten auch da wesentliche Dienste, wo die Trübung nicht allein in den Bindehautblättchen der Hornhaut, sondern auch in der Substanz derselben selbst ihren Sitz hat; sie wirken endlich noch einmal so kräftig, wenn man dieselben öfter wechselt.

Wenn der specifisch-entzündliche Proceſs gänzlich aus dem Auge entfernt worden ist, dennoch aber sichtbare Blutgefäfschen aus der *Conjunctiva scleroticae* in die der *Cornea* hineinlaufen, welche offenbar die Wucherungen und Trübungen auf letzterer ernähren, oder wenigstens in ihrer Integrität erhalten, dann werden die eben angeführten örtlichen Mittel nur wenig fruchten. Hier, aber auch nur unter solchen Verhältnissen, leistet das von *Scarpa* empfohlene Ausschneiden eines linienbreiten Stückes der Bindehaut der *Sclerotica* rings um die *Cornea*, sehr oft wesentliche Hülfe, weil dadurch die Wurzeln der Wucherungen in den meisten Fällen beseitigt werden, und nun jene örtlichen Mittel erst ihre Wirkung zeigen können.

Anstatt der Application des oben angeführten *Empl. stibiat.* werden auch Haarseile, Fontanelle, Vesicatoria und die *Moxa*, als ableitende Mittel vielfach empfohlen.

Der *Pannus*, welcher von *Trichiasis* und *Entropium* entstanden, heilt meistens von selbst, wenn man jene Uebel beseitigt.

Das Flügelfell, *Pterygium*, [πτερυγιον, Flügelchen, *Diminut.* von πτερυξ, Flügel.]

Eine dreieckigte, verdickte, ohne Schmerz entstandene Falte der *Conjunctiva*, die mit ihrer *Basis* meistens vom Nasenwinkel des Auges ausgeht, und hier mit der *Membrana semilunaris* verbunden ist, sich dabei ohne Schmerz mit einer Pincette von der *Sclerotica* in die Höhe heben läfst, und immer mit ihrer Spitze nach der *Cornea* hinläuft, nennt man *Pterygium*.

Diese *Pterygia* sind entweder sehr dünn, halb durchsichtig, mehr graulich, mit wenigen Blutgefäfsen versehen, und stellen dann das sogenannte *Pterygium tenue* dar; oder sie sind dick, leder- oder muskelartig, *) selbst cartilaginös, dabei mit vielen Blutgefäfsen versehen, und heifsen dann dicke Flügelfelle, *Pterygia crassa*. **)

So richtig indefs obige charakteristische *Phaenomene* an sich sind, so passen sie doch nicht auf alle Flügelfelle; denn zuweilen geht die *Basis* derselben nicht vom innern, sondern vom äufsern Augenwinkel aus, ja, in seltenen Fällen kommen sogar Flügelfelle, von dem innern und äufsern Winkel, von oben und unten zugleich, streben alle mit ihren Spitzen nach dem *Centro* der *Cornea*, heben dadurch das Gesicht völlig auf, und stellen hier den Fall dar, von welchem Scarpa ***) glaubt, dafs diefs der *Pannus* der alten Aerzte wäre. Ebenso ist das Flügelfell nicht immer mit der *Membrana semilunar.* verbunden, und nicht in jedem Falle verbreitet es sich über den Rand der *Cornea*. Die Regelmäfsigkeit der dreieckigten pyramidalischen Form des Flügelfells, schreibt *Scarpa* dem festeren Anhängen der Bindehaut auf der Hornhaut zu, da die Adhärenz in dem Grade sich vermehrt, als die *Conjunctiva* dem *Centro* der Hornhaut sich nähert.

---

*) Zuweilen sind sie kleinen Muskeln gar nicht unähnlich, so dafs sie selbst sehnigte Anheftungen zeigen. Siehe Schmidt, in der *Ophthalm. Bibliothek.* 2. Bd. 1. St. S. 57.

**) Siehe Tab. I. Fig. 6.

***) A. a. O. Vol. I. pag. 299.

Die Ursachen, welche ein *Pterygium* hervorbringen können, sind zuweilen nicht leicht zu ergründen. Meistens giebt aber in das Auge gefallener Sand, Kalk- oder Steinstaub, Anlafs zur Krankheit; weswegen sie auch am häufigsten bei Personen welche schmutzige Handwerke treiben, vorkommt. Aeltere Leute sind dem Uebel mehr unterworfen als junge; indefs sieht man das *Pterygium* auch bei Kindern, und Wardrop *) sah es selbst einmal bei einem Kinde unmittelbar nach der Geburt. Als Nachkrankheiten der Augenentzündung, ist das Flügelfell nicht zu betrachten, wohl aber kann eine vorhergegangene Augenentzündung zuweilen eine Anlage zu dieser Krankheit hinterlassen.

Die Prognose ist immer günstig.

Die Heilung eines dünnen, erst entstandenen und noch nicht bis über die *Cornea* verbreiteten Flügelfelles, brachte Waare **) oft glücklich durch den äussern Gebrauch des beim *Pannus* angegebenen Pulvers, aus Zucker und Alaun, zu Stande. Durchschneidet man dabei zugleich auch öfters das, mit einer feinen Pincette aufgehobene Fell, nahe am Rande der Hornhaut, so befördert man das Verschwinden desselben beträchtlich.

Wenn nun aber das Flügelfell schon über die *Cornea* gedrungen, oder wenn dasselbe dick ist; so wird das Uebel auf die sicherste und schnellste Art durch das Messer entfernt. Um diese kleine Operation zu vollbringen, schneidet man das *Pterygium* (nachdem ein Gehülfe die Augenlieder so viel als möglich aus einander gezogen, und der Operateur mittelst einer kleinen Pincette, Tab. V. Fig. 5. das Flügelfell an der *Basis* gefafst und von der *Sclerotica* aufgehoben hat) an seiner Grundfläche mit einem scharfen *Scalpell* völlig durch, und löst mit einer Daviel'schen ***) oder Cooper'schen Scheere behutsam das ganze Fell

---

*) A. a. O. pag. 22.

**) A. a. O. pag. 67.

***) Siehe Tab. V. Fig. 14.

ab; so dafs so wenig als möglich davon in der *Conjunctiva*, vorzüglich in der *Conjunctiva Corneae*, zurück bleibt. Man hat zwar widerrathen, auch den Theil des *Pterygii* wegzuschneiden, welcher auf der Hornhaut sitzt, weil danach leicht Narben zurückbleiben können, welche das Gesicht beeinträchtigen. Indefs kann man wenigstens diejenigen Parthieen zu beseitigen suchen, welche sich mittelst der Pincette einigermaafsen von der Hornhaut erheben lassen; dieses ist oft, obschon in geringem Grade, wirklich der Fall, wo es dann bei gehöriger Vorsicht recht gut möglich wird, das trübende Häutchen zu entfernen, ohne die Substanz der Hornhaut zu verletzen. Ist die Blutung nun gestillt, so hängt man eine trockne leinene Compresse über das operirte Auge; kann jetzt auch, nach Scarpa, zuweilen das Auge mit Malvendecoct und ähnlichen Mitteln waschen. Den 5ten oder 6ten Tag ist die kleine Wunde mit eiterförmiger Masse bedeckt, und am 8ten bis 12ten Tage ist die Wunde heil. Bleiben nun aber grofse Stücke des Felles auf dem Auge zurück, so mufs man die Eiterung auf demselben, durch Einstreichen von *Laudan. liquid. Syd.* so lange unterhalten, bis sich jene Rückbleibsel abgestofsen haben.

Wenn endlich dennoch kleine Spuren des *Pterygiums* auf der *Cornea* nach der Eiterung zurück geblieben sind; so weichen diese ganz gewifs der stufenweisen Anwendung der gegen die Hornhautflecken empfohlenen Mittel, unter denen hier der *Lapis infernalis* eine vorzüglich wirksame Rolle spielt.

Das Fettfell, *Pinguecula.* *)

Eine kleine, unmittelbar unter der *Conjunctiva scleroticae* liegende, flache, schmutzig gelblichte Anwul-

---

*) Zu einer solchen Benennung hat die Aerzte wohl blos das oft fettartige äufsere Ansehn der kleinen Geschwulst veranlafst; denn ein mir unlängst vorgekommenes sogenanntes Fettfell, oder vielmehr 2 neben einander liegende Fettfelle, welche ich operirte und darauf einer chemischen Analyse unterwarf, liefsen mich nicht das geringste Fett entdecken, viel-

stung, welche meistens im äufsern Augenwinkel beobachtet wird, selten den Umfang einer kleinen Linse überschreitet, und niemals bei sehr jungen Personen vorkommt, nennt man Fettfell. *) Sehr selten verbreitet sich dieses Fell etwas in die *Cornea* hinein, und niemals kommt es so weit, dafs das Gesicht dadurch beschränkt würde.

Ursächliche Momente hat man, aufser der schlaffen *Constitution* der Kranken, bis jetzt nicht auffinden können; indefs habe ich das kleine Uebel bisher meistens nur bei Männern gefunden, welche geistige Getränke liebten und längere Zeit schon an Unterleibsübeln gelitten hatten.

Das Uebel kann Zeitlebens dauern, ohne sich zu vergröfsern, und hat überhaupt, den Uebelstand welchen es verursacht abgerechnet, nichts zu bedeuten. Defswegen hat der Arzt hier meistens gar nichts zu thun. Wird aber die Beseitigung der *Pinguecula* durchaus verlangt, so kann man versuchen, dasselbe nach Art der Hornhautflecke zu entfernen, indem man die Mittel noch durch *Scarificationen* der kleinen Geschwulst unterstützt. Das sicherste Heilmittel ist die behutsame Abtrennung mit dem Messer.

Die Fleisch- und Fettauswüchse und die *Papula* der *Conjunctiva*.

Fleischexcrescenzen auf der *Conjunctiva* von beträchtlichem Umfange, hat man zuweilen von der Geburt an beobachtet; indefs sind solche Fälle selten. Meistentheils zeigen sie sich bei scrofulösen oder syphilitischen Subjecten, sitzen zuweilen auf der Gränze zwischen *Cornea* und *Sclerotica*, und produciren, vorzüglich wenn die Geschwulst Fett enthält, in äufserst seltenen Fällen Haare **) von bedeutender Länge, was

---

mehr verhielt sich die Substanz, wie eine Mischung aus Eiweifs und Gallert.

*) Siehe Tab. I. Fig. 1.

**) Himly, a. a. O. 2. Bd. 1. St. S. 199. Gräfe und

man *Trichosis bulbi* genannt hat. In einem merkwürdigen Falle, beobachtete ich zwei Haare, welche ohne Fettunterlage unmittelbar aus der *Caruncula lacrymalis* hervorgewachsen waren. Sie kamen nach dem Ausziehen derselben zwei Mal wieder, und blieben darauf gänzlich weg.

Die behutsame Ausrottung mit dem Messer, und nachherige Anwendung adstringirender oder gelind ätzender Mittel, oder des *Laudan. liquid.* läfst hier die sicherste Heilung erwarten; nur mufs man natürlich die dyscrasischen Krankheiten, aus welchen das Uebel entstand, zugleich berücksichtigen. Treten solche Geschwülste oder Fleischwucherungen in der Form der sogenannten Fleischwärzchen, *Carunculae*, *Epanastemata*, auf, so kommt man auch ohne Hülfe des Messers aus.

Die Papula, welche fast immer zwischen der Bindehaut des untern Augenliedes und der halbmondförmigen Falte, nicht weit vom untern Thränenpunkte ihren Sitz hat, ist ein rundliches, ziemlich hartes, blafsrothes und juckendes Knötchen, von der Gröfse eines Stecknadelknopfes, welches Hr. Prof. Beer *) nur bei Mädchen fand, deren *Menstruation* entweder gar nicht, unordentlich, oder sparsam flofs. — Wird die *Menstruation* hier gehörig befördert, und kehrt sie wieder, so verschwindet das Knötchen. Reibt hingegen die Kranke dasselbe öfters, so wächst es gröfser, oft in Zeit von drei Tagen bis zur Gröfse einer Erbse, und mufs dann mit einem Häkchen gefafst und vermöge eines *Scalpells* ausgeschnitten werden. Wird die *Menstruation* jetzt noch nicht geregelt, so kann es wieder kommen; ja es kann selbst eine carcinomatöse *Exophthalmie* daraus entstehen, wenn es, (vorzüglich bei cachectischen Subjecten,) mit Aetzmitteln behandelt wird.

Es

Walther's Journal. B. IV. p. 136. — Wardrop, *Essays on the morb. anat.* pag. 86. Bei letzterm und bei Demours (a. a. O.) sind solche Fälle sehr schön bildlich dargestellt.

*) Lehre der Augenkr. 2. Bd. S. 679.

Es giebt noch einen Zufall, welcher aber höchst selten vorkommen mag, weil ihn die Schriftsteller ganz übersehen haben. Er besteht in einer wahren Balggeschwulst, welche sich zwischen der Bindehaut und der *Sclerotica* befindet; ich habe das Uebel nur ein einziges Mal bei einem Knaben von 8 Jahren beobachtet, und mittelst Haken und Scheere weggeschafft. Es hatte in diesem Falle seinen Sitz nach dem inneren Augenwinkel hin, hatte die Gröfse einer Zuckererbse, war hart und lederartig, und enthielt eine kleine Spur einer schleimigten Flüssigkeit.

b. Von den Krankheiten der *Cornea.*

Die reine Entzündung der *Cornea*, fälschlich *Corneitis*, besser *Keratitis*, [von κερας, Horn, Hornhaut, mit dem angehängten Worte *itis*. Siehe *Blepharophthalmitis pura*.]

Anfangs ist die *Cornea* etwas trübe und hat ein mattes, glanzloses Ansehn, nach und nach bekommt sie einen röthlichen Schimmer, der sich, wenn die Entzündung noch höher steigt, zu sichtbaren Blutgefäfsen ausbildet; zugleich sind gemeiniglich nicht unbedeutende Schmerzen des Auges vorhanden. Wenn die Entzündung von der *Sclerotica* ausging, so erscheinen die Blutgefäfse in der *Cornea* selten deutlich, meistens sind sie so fein, dafs man sie mit bloſsen Augen kaum unterscheiden kann; ging die Entzündung aber von der *Conjunctiva scleroticae* auf die Bindehaut der Hornhaut über, oder hat die *Keratitis* ursprünglich ihren Sitz in den Bindehautblättchen der Hornhaut, so haben die Gefäfse gemeiniglich einen weit gröfsern Durchmesser und laufen fast ganz gerade, indefs ist diese letztere Entzündungsart zur *Conjunctivitis* zu rechnen und auch dort schon abgehandelt.

Die Ursachen dieser Entzündung sind fast immer mechanische, und stimmen hierin, so wie auch in Hinsicht der Heilung, mit der reinen Entzündung der *Conjunctiva* überein.

Wardrop, (*Essays on the morbid Anatomy of the human Eye*, 2. *V. p.* 9.) welcher die *Keratitis* äufserst speciell abhandelt, unterscheidet noch eine Entzündung der innersten Lamelle der Hornhaut, der nach dem Entdecker Descemet genannten Descemetischen Haut, *Tunica humoris aquei*, welche nach diesem und nach Wardrop einen geschlossenen Sack bilden soll, indem sie die innere Fläche der Hornhaut, die vordere und hintere Fläche der *Iris* und die vordere Kapselwand der Crystalllinse überzieht. Diese Entzündung äufsert sich auf folgende Weise: die *Sclerotica* röthet sich ganz eigenthümlich, indem die Röthe einen Kreis, aus den feinsten Gefäfszweigen bestehend, bildet, welcher in der *Sclerotica* der Insertion der *Iris* entspricht, so dafs derselbe nicht völlig an die Hornhaut anstöfst, sondern von dieser durch einen blassen Ring der *Sclerotica* geschieden ist. Dabei entsteht ein Gefühl von Vollheit im Augapfel und ein drückender reifsender Schmerz in der Stirn. Die *Cornea* wird trübe, indem die Descemetische *Membran* von ihrer Durchsichtigkeit verliert, und scheint mehr als gewöhnlich hervorzuragen. In der Hornhaut entstehen einzelne Flecken, welche aber deutlich tief liegend erscheinen. Mit Zunahme dieser Trübheit, nimmt auch das Sehvermögen ab, so dafs der Kranke die Gegenstände, wie von einem dichten Rauche umgeben beobachtet. Beim Vorwärtsschreiten der Entzündung, scheint sich auch die wäfsrigte Feuchtigkeit zu trüben. Die Entzündung beschränkt sich nicht immer auf den Theil der Descemetischen Haut, welche die innere Fläche der *Cornea* umkleidet, sondern geht zuweilen auch auf den die *Iris* bedeckenden Theil derselben über, wodurch, nachdem die Regenbogenhaut ihre Farbe verändert hat, Trübungen und Verziehungen der Pupille entstehen können. Selbst über die Kapsel der Linse kann sich die Entzündung erstrecken, wo sie denn leicht eine Trübung derselben zurücklassen kann. Dieses entzündliche Leiden hat in der Regel einen chronischen Verlauf. Dennoch mufs die Behandlung streng antiphlogistisch sein und jede reitzende Potenz

vermieden werden. Als ein Hauptmittel gegen die Entzündung der *tunica humoris aquei*, hat Wardrop die Ausleerung der wäfsrigten Feuchtigkeit empfohlen, indem er von diesem einfachen Manöuvre die schnellste Hülfe sah. Meinen eigenen Erfahrungen zu Folge, kommt diese Entzündung viel öfter vor, als man bisher glaubte, und entsteht insgemein nach Erkältungen der Stirn und deren Umgegend.

Ueberhaupt wenden die Engländer das Ausleeren des *Humoris aquei* mittelst einer Nadel, jetzt sehr häufig bei Augenentzündungen an. — Es giebt hartnäckigte Augenentzündungen, welche mit Kopfschmerzen, Schwere in der Augenbraunengegend, Gefühl von Vollheit des *Bulbus*, zuweilen mit Trübheit der *Cornea* und des *humoris aquei* vergesellschaftet sind, wo die Hornhaut bei genauer Betrachtung mehr hervorzuragen scheint; Entzündungen, die bei Anwendung der zweckmäfsigsten Mittel nicht nachlassen. Hier dürften die Erfahrungen des Wardrop, bei gehöriger Vorsicht, wohl einen günstigen Erfolg zeigen, wenn nach ihm die Hornhaut mittelst einer Nadel oder eines Staarmessers angestochen und der *humor aqueus* heraus gelassen würde; denn dadurch läfst der Druck und die Spannung, welche durch die vermehrte Absonderung der wäfsrigten Feuchtigkeit verursacht wird, nach und die Circulation des Blutes wird freier. Das vortheilhafte Zeugnifs, welches Langenbeck (Neue Bibliothek, 1. Bd. 1. St. S. 177.) hierüber ablegt, ist besonders geeignet die Aerzte zu weitern Versuchen anzutreiben. Es ist nicht zu läugnen, dafs es auch Entzündungen an den Augen giebt, welche ihren Ausgang ebenso gut in übermäfsiger Production wäfsrigter Feuchtigkeiten nehmen können, als die Entzündung des Gehirns mit seinen Häuten, u. s. w. Wird die Ansammlung des Secreti so grofs, dafs die resorbirenden Gefäfse des Auges in einen unbrauchbaren, gleichsam paralytischen Zustand übergehen; so mag dieses wohl meistentheils die Wassersucht des Augapfels zur Folge haben. Sind jene Gefäfse aber noch allenfalls thätig, und halten sie der Quantität der gegenwärtigen wäfsrigten Feuchtigkeit

nur einigermaafsen das Gleichgewicht, was bei vielen Augenentzündungen wirklich der Fall sein mag; so kann man zwar keineswegs eine Wassersucht als vorhanden annehmen, aber dieser Zustand scheint es vorzüglich zu sein, welcher die kleine Operation, die nach den Beobachtungen jener Männer ohne grofsen Schmerz, ohne Eiterung der Wunde abläuft und sehr schnell heilt, mit einem günstigen Erfolge krönt.

Die Verdunklungen und Flecken der Hornhaut, *Obscurationes et maculae corneae.*

Unter Verdunklungen der Hornhaut, versteht man über die ganze, oder fast ganze Fläche der *Cornea* verbreitete Trübungen; unter Flecken dieser Haut versteht man aber nur partielle Verdunklungen derselben.

Von den Verdunklungen und Flecken, giebt es nun mehrere graduelle und ursächliche Unterschiede, die hier möglichst kurz, aber deutlich auseinander gesetzt werden sollen.

1) Einen rauchigten, graulichten, am Rande verwachsenen Flecken, oder eine Verdunklung, nennt man *Nephelium, Nebula, Nubecula, Obscuratio nubeculosa.*

2) Wenn der Fleck von mehr saturirter Weifse, gleichsam wolkenartig erscheint und sich die trübende Masse in der *Cornea* mehr angehäuft hat, so nennt man ihn *Achlys, Aegis.*

3) Zeigen sich die Flecken von noch mehr saturirter Weifse, haben die Lamellen der Hornhaut ihre normale Durchsichtigkeit verlohren, und sind sie von dem ursächlichen Moment (meistens der vorhergegangenen Entzündung) gleichsam in einen emailähnlichen Zustand umgeändert worden, und hat sich die trübende Masse zu einer *Pseudomembran* organisirt; so ist die krankhaft veränderte Stelle oft kreideweifs, oder gar perlenmutterartig glänzend, mehr oder weniger über die *Cornea* erhoben, beim Berühren hart, doch an dem weifsen Rande noch etwas verwaschen, und heifst dann *Leucoma.* Hiervon giebt es, dem Grade der Verdunklung nach, 3 Arten, nämlich 1) die blofs *leuco-*

matöse Verdunklung, *Obscuratio leucomatosa*, 2) *Albugo, Paralampsis*, oder *Leucoma cretaceum*, und 3) den Perlenfleck, *Macula margaritacea*, welcher letztere den höchsten Grad der *leucomatösen* Umwandlung darstellt.

4) Wenn das Zellgewebe zwischen den Hornhautschichten durch Geschwüre, u. s. w. verlohren gegangen und die Hornhautlamellen unter sich unmittelbar verwachsen, und *leucomatös* verdunkelt sind; so nennen dieses Schmidt und Beer: Narbe, *Cicatrix*, Taf. II. Fig. 1. welche viel Aehnlichkeit mit dem *Leucom* hat, aber am Rande wie abgeschnitten erscheint. Sie ist glänzend, sehr weifs, von verschiedener Form, kommt mit *Synechia anterior* oft verbunden vor und kann neben ihrem abgeschnittenen Rande oft einen getrübten, ja selbst zuweilen einen *leucomatösen* Umfang haben.

5) Manchmal kommen Flecke vor, welche in der That nichts anders sind als vertrocknete Hornhautabscefse; diese offenbaren sich durch ihre gelblichte Farbe, die durch graulich weifse Zwischenräume gleichsam in Inseln getheilt ist und durch eine Aufwölbung der *Cornea*, vorzüglich wenn der trockne Eiter zwischen der *Conjunctiva corneae* und der darunter liegenden Lamelle der Hornhaut, seinen Sitz hat. Nicht selten ist eine partielle vordere *Synechie* bei diesen Flecken vorhanden.

6) Eine Trübung, welche nur im Umfange der *Cornea* ihren Sitz hat, und ohne Spur einer Entzündung sehr langsam auftritt, hat man unter den Namen *Arcus senilis, Gerontoxon, Macula arcuata*, aufgeführt. Diese Trübheit kommt fast immer nur bei alten Leuten vor, und scheint hier das Product desselben Procefses zu sein, welcher die Arterien, Knorpel, u. s. w. bei alten Leuten in Knochenmaterie verwandelt; auch hat man bei Greisen zuweilen völlige Verknöcherungen der Hornhaut gefunden. Indefs findet man den sogenannten *Arcus senilis* nicht nur bei alten, sondern manchmal auch bei jungen Leuten. Mohrenheim*)

*) Dessen Beobachtungen, 1. Thl. S. 9.

sah ihn angebohren, Sybel *) fand ihn bei einem 32jährigen Mann, und Wardrop **) beobachtete ihn, so wie ich selbst, in mehreren Perioden des Lebens. Uebrigens schaden solche Trübungen weiter nicht; wenigstens haben davon die besten Aerzte fast nie einen schädlichen Einfluſs auf das Auge bemerkt.

7) Endlich hat man zuweilen Knochenstücke in der *Cornea* beobachtet, ***) die sich wohl unter den Flecken derselben, aber unter keine der vorgetragenen Arten abhandeln lassen, von denen ich nur anmerken will, daſs bei ihnen zuweilen (wenn sie die Mitte der *Cornea* einnehmen und unmittelbar unter der *Conjunctiva corneae* ihre Lage haben) jene Operation der Ausschälung ****) mit Glück anzuwenden wäre, welche früher von Callisen u. a. zu ausgedehnt bei andern Flecken empfohlen wurde.

Als Ursache der Flecke, kann man fast immer eine vorausgegangene Entzündung der *Cornea*, anklagen, sie mag nun von andern Gebilden des Auges ausgehen, oder ursprünglich (z. B. durch Eisensplitter, die in die Hornhaut kamen, u. s. w.) in der *Cornea* entstanden sein. Zertheilen sich nun solche *Ophthalmien* nicht gehörig, exsudiren die feinen Gefäſse eine undurchsichtige Lymphe, wozu entzündliche Affectionen der *Cornea* überhaupt immer Neigung haben, so bleiben jene Flecke und Verdunklungen leicht zurück. Daſs eine *Macula arcuata* angebohren sein kann, ist schon gesagt worden, daſs aber auch eine leucomatöse Verdunklung der ganzen Hornhaut bis auf ein rautenförmiges Stück in der Mitte derselben, welches ganz

---

*) *Dissert. inaugural. d. quibusd. materiae et formae oculi aberrationibus a statu normali. Halae* 1799. Auch in Reil's Archiv für die Physiologie, 5. Bd. 1. Heft.

**) *Essays on the morbid anat. of the h. eye, pag.* 86.

***) Wardrop, a. a. O. pag. 72. Auch Walter, anatom. Museum, 1. Bd. S. 139. u. a.

****) Welche Wardrop auch glücklich machte. a. a. O.

durchsichtig war, nicht nur angebohren, sondern auch erblich sein kann, beobachtete Kieser. *)

Die Prognose ist nach den verschiedenen Arten der Flecken verschieden. Sie ist günstig bei robusten jungen Subjecten, bei denen der Stoffwechsel noch schnell vor sich geht, wenn dabei nur eine leichte Verdunklung oder *Macula* zugegen ist, und diese sich auf der Oberfläche der Hornhaut befindet. **) Hier weicht die Krankheit bei einiger Beharrlichkeit in der Kur bald. Bei alten hectischen Subjecten hingegen, dauert die Kur oft sehr lange. Beharrlichkeit ist hier vor allen Dingen nöthig, denn oft, wenn auch nach Monate lang fortgesetztem Gebrauch der Mittel keine Verkleinerung des Fleckes beobachtet wurde, weicht letzterer den Medicamenten nach dieser Zeit endlich dennoch. — Die Voraussage bei einem *Leucom* ist weit unsicherer und böser; denn ist dasselbe schon alt, dringt es bis in die tiefsten Lamellen der Hornhaut, und ist es dabei sehr dick und der Kranke schon alt und schwach, so wird der Flecken jedem Kurversuch widerstehen. Bei einem, in jugendlichen kräftigen Subjecten, eben entstandenen *Leucom*, ist die Prognose günstiger; denn es giebt viele Beispiele von dergleigen geheilten *Leucomen*, nur dauert die Heilung oft sehr lange, ja Jahre lang. Ueberhaupt geht die Heilung aller Hornhautflecken, selbst in den besten Fällen, sehr langsam vorwärts und mit Recht bemerkt Fabini: (*Doctrina de morbis oculorum. Pesthini*, 1823. *pag.* 181. *et s.*) *Notandum tamen, in optatissimo quoque casu pelluciditatem corneae lente, et fere insensibiliter tantum restitui, ita, ut quandoque non per menses sed per annos curatio duret.*

Narben der Hornhaut lassen sich nicht heilen; ha-

---

*) Himly und Schm. Ophthal. B. 3. Bd. 3. St. S. 79.

**) Auf den tiefern oder oberflächlichern Sitz des Flekkens kommt aufserordentlich viel an; denn selbst eine ganz leichte *Macula*, die aber fast in der innersten Lamelle der Hornhaut liegt, weicht zuweilen einem sehr beharrlichen und kräftigen Verfahren nicht.

ben dieselben aber einen mehr oder weniger verdunkelten Umfang, so kann dieser beseitigt werden.

Vertrocknete Hornhautabscesse, wenn sie nur nicht gar zu viel vertrocknete Masse enthalten, lassen sich ziemlich leicht heilen.

Wenn bei den Flecken Varicositäten des Auges vorhanden sind, so ist die Prognose sehr ungünstig, denn hier darf man das Auge nicht anrühren; befinden sich aber varicöse Gefäfse allein in der *Conjunctiva bulbi*, wie wir diefs z. B. nach Ablauf pannöser Entzündungen bemerken, dann liegt darin kein Hinderniſs zur Anwendung zweckmäfsiger äufserer Mittel, besonders wenn man vorher Stücke jener Gefäfse ausschneidet.

Die Kur geschieht gewöhnlich allein durch örtliche Mittel; indessen giebt es nicht selten Fälle, wo auch innere Mittel nöthig werden. So mufs man zuweilen Cachexien, Anlage zu immer wiederkehrenden Augenentzündungen, u. s. w. zu bekämpfen suchen. Zuweilen mufs man den Stoffwechsel befördern, und zu diesem Zweck hat schon Boerhave den *Calomel* vorgeschlagen. Eben so rühmt man *Antimonialia*, *Arnica*, *Extr. pulsatill. nigricant.* u. a.

Immer bleibt jedoch die topische Behandlung am zweckmäfsigsten und laut der allgemeinen Erfahrung der Aerzte am hülfreichsten.

Es giebt fast keine Krankheit, gegen welche so viele äufserliche Mittel angepriesen worden sind, als gegen die Flecken der Hornhaut. Wahrscheinlich liegt der Grund davon nicht blofs in der öftern Hartnäckigkeit und Unheilbarkeit des Uebels, sondern auch in der zu geringen Beharrlichkeit des Kranken und des Arztes in Hinsicht des nöthigen Kurverfahrens; man geht von einem Mittel zu dem andern über, weil man das Zutrauen zu dem ersten Mittel verlohren hat, bei welchem das Uebel nicht schnell genug verschwinden will. Inzwischen ist der öftere Wechsel der Mittel und die stufenweise Erhöhung der *Dosis* auch sehr nützlich, und Mitbedingung zur Heilung; darum ist

es auch nöthig, dafs man eine grofse Masse von Mitteln kennt, und ihre zweckmäfsige Anwendung versteht.

Ich werde mich bemühn, die vorzüglich wirksamen Mittel hier anzuführen.

Die ganze Masse von Medicamenten, wird am besten in 2 Classen getheilt, wovon die erste, die erweichenden, auflösenden, die zweite, die reitzenden Mittel enthält. Diese Eintheilung ist wichtig, denn weil bei frischen weichen Flecken, gleich anfangs reitzende Mittel angezeigt sind, und bei harten, veralteten, ganz undurchsichtigen Verdunklungen und Flekken zuerst die Anwendung der auflösenden und dann erst der reitzenden Mittel nöthig ist, so greift die ganze Eintheilung in diese Modificationen der Flecken genau ein, und hat somit auf die Praxis selbst grofsen Einfluſs.

Auf die weiche Consistenz eines Fleckens schliefst man, wenn derselbe dunkelgrau, matt, nicht glänzend, am Rande verwaschen, und mit zu ihm hinlaufenden feinen Blutgefäfsen versehen ist. Finden sich diese Eigenschaften nicht, so ist der Flecken harter Consistenz und mufs dann anfangs mit erweichenden, und späterhin erst mit reitzenden Mitteln behandelt werden.

Vertrocknete Abscefse und Kreideflecken, welche bei wechselnder Anwendung auflösender Mittel ihr Ansehn und ihre Consistenz nicht verändern, mufs man seicht scarificiren und dann wieder den Gebrauch derselben Mittel fortsetzen.

Zu den erweichenden auflösenden Mitteln sind folgende zu rechnen: Das Vipernfett, *Axungia viperina, Oleum ovorum, Medull. ossium recens, Oleum nuc. jugland., Liquamen hepatis mustelae fluviatilis, Decoct. Malvae, fel tauri, Extr. cicutae, chelidon. maj. taraxaci. Aloes, Kali carbonicum,* *) *Natron carbonicum, Borax, etc.*

Zu der Classe der reitzenden Mittel zählt man:

---

*) Z. B. *Kali carbon. grjj. — vj.*
Aqu. destillat. ℥j.
M. solvendo.
S. Täglich 5 bis 6mal einige Tropfen in das Auge zu tröpfeln.

ranzigte Oehle, *Sal volatil. corn. c.*, *Alumen*, *Zincum sulphuricum*, *Kadmium sulphuricum*, *) *Baryt. muriat.*, *Natrum muriaticum.*, *Laudan. liquid. Syd.*, *Tart. stibiat.*, *Ammon. muriat. dep.*, *Liq. ammon. acet.*, *Mercur*, vorzüglich *Merc. praec. ruber* mit Fett zur Salbe gemischt, *Butyr. antimonii*, (welches aber, im Fall es verdünnt werden soll, nur mit *Acidum muriaticum* vermischt werden kann, indem jedes andere Verdünnungsmittel die Spiefsglanzbutter zersetzt,) *Lap. caust.*, *Lap. infernal.*, **) *Pulvis sachari*, *Vitr. subtssm. pulveris.*, *Limatur. stanni*, *Os sepiae*, *etc. etc. etc.*

Die erste Klasse von Mitteln wirkt vorzüglich erweichend, auflockernd auf die exsudirte trübende Masse, welche Flecken und Trübungen der Hornhaut constituirt. Die zweite Klasse derselben wirkt reitzend, erhöht die Thätigkeit der Resorptionskraft, indem sie einen, an Entzündung gränzenden Zustand hervorbringen, der wohl im Stande ist den Stoffwechsel kräftig zu befördern, nicht aber fähig ist, Producte zu liefern, die hier in jedem Falle, den Flecken eher vermehren als vermindern würden. Die eigentlichen Aetzmittel hingegen, welche nur bei hartnäckigten, veralteten und dicken Flecken vorsichtig angewendet werden dürfen, und zu denen vorzüglich der *Lap. infernal.*, *Liq. stib. mur.*, und *Kali caust.* zu rechnen sind, verursachen aufser der reitzenden Wirkung einen wahren Substanzverlust, der aber jedesmal nur sehr oberflächlich sein

---

*) Ein neues, von Rosenbaum (Himly's Bibliothek für *Ophthalmologie etc.* 1819. 1. Bd. 2. St. S. 408.) zuerst angewendetes und nach ihm ganz besonders wirksames Mittel. Graefe (Journal für Chirurgie u. s. w. 1820. 1. Bd. 3. St. S. 554.) fand es gleichfalls sehr wirk- und heilsam. Er tröpfelte täglich 1 — 2 — 3 Mal eine Auflösung davon in's Auge, anfangs von einem Gran auf die halbe Unze destillirten Wassers; später 2—4—6 Gran auf dieselbe Quantität Flüssigkeit. Mehrere Aerzte fanden es hingegen nicht heilsamer als andere ähnliche Mittel. Fernere Versuche mögen uns denn über die prädominirende Wirksamkeit dieses neuen Mittels Sicherheit geben.

**) Einen bis 2 Gran auf ein Loth Wasser; dasselbe Verhältnifs findet bei *Lap. caust.* statt.

darf, wenn man nicht mehr Schaden als Nutzen stiften will. Darum muſs man auch bei Anwendung dieser Mittel immer etwas lauwarmes Wasser oder warme Milch bereit halten, mit welchen man die Oberfläche des Auges nach dem Aetzen sogleich abwäscht, damit die Hornhaut ja nicht mehr als nöthig ist verletzt oder gar durchfressen werde. In dieser Hinsicht hat man sich vorzüglich vor dem *Lap. caust.* zu hüthen; dieser darf deſswegen auch niemals stärker gebraucht werden, als in einer Auflösung von 5 Granen in 3 Drachmen *Aqua destill.*

Erweichende Oehle können täglich mehrere Male (5 — 6 Mal) in das Auge gebracht werden, reitzende Mittel von mittlerer Stärke seltener, reitzende scharfe Salben dagegen, besonders diejenigen, welche viel *Merc. praec. rub.* enthalten, in 24 Stunden nur ein Mal und zwar Abends vor dem Schlafengehen; bei unempfindlichern Subjecten können letztere indeſs auch 2 Mal in dieser Zeit versucht werden. Niemals sollte das Verhältniſs des rothen Präcipitats zu dem Fette gröſser sein, als wie 1 Theil zu 4 Theilen.

Im Allgemeinen habe ich noch zu bemerken, daſs alle äuſsere Mittel, welche zur Wegschaffung der Hornhautflecken dienen sollen, verhältniſsmäſsig stärker sein müssen, als diejenigen, welche man gegen *Ophthalmien* anwendet.

So weit die einfachen Mittel. Von den vorzüglichsten und wirksamsten Compositionen, welche von älteren und neuern Aerzten angerühmt worden sind, will ich nur folgende ausheben:

℞. *Sal. vol. c. c. gr. v.*
fell. taur. insp. ʒj.
Extr. chelidon. ʒjj.

M. S. Mittelst eines Pinsels auf das Auge zu streichen.

℞. *Sal. corn. c. gr. xjj.*
fell. taur. ʒj.
Mell. despumat. ʒjjj.

M. S. Einige mal täglich den Flecken damit zu bestreichen. (Richter.)

℞. *fell. taur.*
Extr. cicut.
— cort. peruvian āā. ℈jj.
M.

Dieſs empfiehlt Reil vorzüglich bei Flecken nach scrofulösen *Ophthalmien.*

℞. *Tart. emetic. gr. jv. — x.*
Mellis despumati ℥j.
M.

℞. *Ammon. carb. pyro-oleos. gr. vjjj.*
Extr. conii mac. ʒj.
Ol. nuc. jugland. ʒjjj.
M.

℞. *Kali caust. gr. xjj.*
Ol. nuc. jugl. ℥ß.
M.

℞. *Salis volat. Corn. Cerv. gr. x.*
Ol. nuc. jugland. ℥ß.

M. f. linim. S. Mittelst eines Pinsels täglich einige Male etwas auf den Flecken zu bringen. (Maitre-Jean.)

℞. *Natri muriatici*
Conchae praeparatae āā. *pts.*

M. f. pulv. subtssm. S. Täglich ein bis zwei Mal etwas davon in's Auge zu streichen oder einzublasen.

Man kann nach und nach zwei Theile Küchensalz mit einem Theile *Conch. praep.* mischen lassen und anwenden.

℞. *Aloës succotr. gr. vj.*
Sach. albi ʒj.

M. f. pulv. subtiliss. S. Etwas davon in das Auge zu bringen. (Boerhave.)

℞. *Borac. venet.* ʒj.
Limat. stanni alcohol. ℈ß.
Sachar. albi ʒjj.
M. f. pulv. subtiliss.

℞. *Hydr. mur. mit.*
Aloës succotr. āā. *gr. jv.*
Sach. albiss. ʒ*jj.*
M. f. ♃ *subtiliss.*

℞. *Natri muriat.* ʒ*j.*
Lap. cancror. praep. ʒß.
M. f. pulv. subtiliss.

℞. *Alum. ust.*
Borac. venet.
Zinc. sulphuric. āā. ϑß.
Hydr. praec. rubr. gr. vj.
Sach. albiss. ϑ*j.*
M. f. pulv. subtiliss.

℞. *Alum. crud.*
Sach. albiss. āā. ʒ*jj.*
M. f. ♃ *subtiliss. S.* Mittelst eines feuchten Pinsels etwas auf die *Cornea* zu bringen. (Richter.)

℞. *Borac. venet.* ʒß.
Sach. albi ʒ*j.*
Aqu. rosar. ℥*j.*
M. (Plenck.)

Der Borax kann bis auf das Doppelte vermehrt werden.

℞. *Ammon. mur. dep.*
Sach. albi āā. ϑ*j.*
Aqu. rosar. ℥*j.*
M.

℞. *Ammon. mur. dep.* ʒß.
Aqu. rosar. ℥*jjj.*
M. S. Täglich mehrere Male einige Tropfen in das Auge zu bringen. (Richter.)

℞. *Baryt. muriat. gr. x.*
Aqu. Lauro cerasi ℥*jj.*
M. S. Alle 2 Stunden einen Tropfen in das Auge zu bringen. (Hargens.)

℞. *Vini stibiat.* ℥ß.
Laud. liquid. Syd. ʒj.
Rae aloës ʒß.

M. S. Täglich 3 Mal einen Tropfen auf den Flekken zu bringen. (Weller.)

℞. *Liqu. ammon. caustic. gtt x.*
Olei nuc. jugland. ℥ß.

M. S. Mit einem Pinsel auf die Flecke zu streichen. — Man soll mit dem *Liqu. amm. c.* in dem Verhältnifs als das Auge reitzloser wird, steigen. (Graefe.)

℞. *Aqu. rosar.* ℥jj.
Sachar. alb.
Boracis venet. āā ʒß.
Extr. aloës aquosi
— *opii* āā *gr. vj.*

M. exact. (Beer.)

℞. *Merc. sublim. corr. gr. j.*
Opii colati gr. vjjj.
solve in Aquae rosarum ℥jj.

D. (Beer.)

℞. *Liquam. hep. must. fluv.* ʒj.
Butyr. rec. insuls. ℥ß.
Merc. praec. rubr. gr. xv.
Vitriol alb. gr. vj.

M. exact. f. ungt. (Beer.)

℞. *Butyr. vaccini insuls.* ʒjj.
Merc. praec. rubr. gr. xv.
Tutiae praepar. gr. vj.

M. exactssm. f. ungt. S. Täglich einmal mittelst eines Pinsels etwas in's Auge zu tragen. (Beer.)

℞. *Merc. praec. rubr.* ℈ß.
Axung. porc. ℈v.
Olei cacao ℈j.
— *nuc. jugl.*
Laud. liq. S. āā ℈ß.

M. exactissime.

℞. *Tart. stib. gr. vj.*
solve in
Aqu. dest. q. s.
admisce
Adip. suillae rec. ℈*v.*
Ol. cacao ℈*j.*
M. exactissime.

℞. *Medullae ossis sepiae subt.* ♁ *erat.* ℈*j.*
Sachar. Canariens pulv. ʒß.
Fellis Lucii piscis recent. q. s.
ut f. unguent.
M. S. Gegen torpide Hornhautflecken, vermöge eines Pinsels vorsichtig auf dieselben zu bringen.

(Graefe.)

Aufser den bereits angegebenen Mitteln haben mir nach meiner Erfahrung folgende Compositionen vielen Nutzen gewährt.

℞. *Merc. praec. rubr. gr. jjj — v.*
Laud. liquid. Syd. ʒß.
Axung. porcin. ʒ*j.*
M. exactissime. S. Täglich 1 bis 2 Mal eines Stecknadelkopfes grofs auf die Hornhaut zu bringen.

℞. *Kali carbon. gr. x — xv.*
Axung. porc. ʒ*j.*
M. exactissime oder:

℞. *Kali carbon. gr. x — xjj.*
Laud. liquid. Syd. ʒß.
Axung. porc. ʒ*j.*
M. exactissime. S. Bei harten Flecken, täglich 3 Mal etwas zwischen die Augenlieder zu bringen.

℞. *Hydr. mur. corr. gr. j.*
Aqu. rosar. ℥*jj.*
Laud. liquid. ʒ*j*ß.
Muc. g. arab. ʒ*j.*
M. S. Gegen nicht veraltete Flecken, welche nach Ablauf scrofulöser Augenentzündungen zurückgeblieben sind; täglich 2 — 3 Mal etwas davon mittelst eines Pinsels auf die Hornhaut zu tragen.

Wenn ein Flecken durch Blutgefäfse ernährt wird, welche in diesem Falle oft in Bündeln nach demselben hinlaufen, so thut man wohl, wenn man diese Gefäfse etwas aufhebt und ganze Stücke davon ausschneidet; die Communication der Blutgefäfse mit der *Macula* wird dadurch unterbrochen, und der jetzt seiner Stütze beraubte Flecken, wird nun leichter den gewöhnlichen Mitteln weichen.

Bei inkurabeln *Leucomen* zog, früher schon Pellier, neuerlichst erst Delarue *) durch die Substanz der Hornhaut mittelst einer feinen, gebogenen und platten Nadel, ein Haarseil. Der Erfolg dieses rauh scheinenden Verfahrens war in mehreren Fällen günstig; denn die Flecken hellten sich nach und nach auf und das Gesicht wurde leidlich wieder hergestellt. Bei vertrockneten Hornhautabscessen dürfte dieses Mittel vielleicht besonders anwendbar sein. Ich würde nicht anstehen das Mittel zu versuchen, wenn bei einer, den gewöhnlichen Remedien völlig widerstehenden, leucomatösen Verdunklung beider Hornhäute, weder eine künstliche Pupille angelegt, noch die vielleicht bestehende nach Himly verzogen werden könnte. Hier möchte wohl der Hippocratische Ausspruch gelten: *Melius anceps quam nullum.*

Die kegelförmige Hervortreibung der Hornhaut. **)

Diese seltene und in der neueren Zeit erst mehr bekannt gewordene Krankheit der Hornhaut, besteht in

---

*) *Cours complet des Maladies des Yeux. Paris,* 1820. *pag.* 173.

**) Mit Unrecht hat man diesem Uebel den Nahmen *Staphyloma conicum* gegeben; denn darunter versteht man in Deutschland etwas ganz anderes. Ist es eine Wucherung der Substanz der Hornhaut in conischer Form, wie Adams will, dann könnte man die Krankheit nach Himly: *Hyperkeratosis* nennen. Bevor wir indefs das Wesen des Uebels nicht genauer kennen, wollen wir uns hier mit der einfachen Benen-

in einer sehr langsam vorschreitenden, ganz ohne Entzündung auftretenden, Zuckerhutförmigen Vortreibung dieser Haut, Taf. II. Fig. 2 u. 3. wobei die, gemeiniglich verdickte, zuweilen undurchsichtig werdende Spitze des Zuckerhutes, immer den Mittelpunkt der Hornhaut ausmacht. *) In diesem Zustande ähnelt sie, von der Seite gesehen, einem festen Krystall, von vorn aber erscheint sie funkelnd **) und verhindert dadurch das gehörige Erkennen der *Iris* und Pupille. Solche Veränderungen der Gestalt der *Cornea* bewirken nicht nur Kurzsichtigkeit, sondern auch eine so unregelmäfsige Brechung der Lichtstrahlen, dafs selbst nahe Objecte verwirrt und unvollkommen ***) erscheinen; ja zuletzt sind dem Kranken selbst grofse Gegenstände, in einer Entfernung von 3 bis 4 Fufs nicht mehr sichtbar. Man beobachtet dies Uebel gewöhnlich bei jungen Personen, doch werden auch ältere Menschen von der Krankheit ergriffen. Die conische Hervortreibung der Hornhaut, kann übrigens viele Jahre auf einer geringen Stufe der Ausbildung stehen bleiben, ohne an der Spitze undurchsichtig zu werden. Das Uebel kommt bald auf einem Auge allein, bald aber auf beiden ****) zugleich vor.

Ungeachtet die Krankheit sehr selten erscheint, so sahen sie doch viele Augenärzte mehrere Male, und beide Demours †) (Vater und Sohn,) können mehr als 100 beobachtete Fälle zählen.

Die ursächlichen Verhältnisse sind bis jetzt sehr

Benennung: conische Hornhaut, *cornea conica* begnügen, wodurch das Leiden wohl am deutlichsten bezeichnet werden möchte.

*) Adams sah indessen die Spitze des *Conus* in einigen Fällen auch zur Seite des Mittelpunktes der *Cornea* entstehen. Nach ihm soll die Krankheit am häufigsten bei Frauen vorkommen.

**) Wardrop, a. a. O. pag. 114.

***) Ware, a. a. O. pag. 61.

****) Scarpa, *Traité sur les Maladies des Yeux, trad. de l'Italien par Leveillé, T. II. p.* 179. u. a.

†) A. a. O. Tom. I. pag. 316.

wenig bekannt. In einem Falle *) entstand der Fehler bei einer Frau, während dem heftigen Geschrei in schweren Kindesnöthen.

Das Heilverfahren ist zur Zeit sehr unzureichend. Man hat den *Humor aqueus* ausgeleert, (Ware) und darauf die Compression versucht, aber ohne Erfolg; mit gröfserm Nutzen hat man *Infus. herbae nicotianae* tropfenweise des Tages einigemal in das Auge gegossen. Man hat endlich, um die grofse Kurzsichtigkeit zu heben, selbst die Linse, wie bei der gewöhnlichen Staaroperation und zwar mit glücklichem Erfolge niedergelegt; **) indefs ist auch dieses Verfahren sehr unsicher und in vielen Fällen gar nicht anwendbar.

Der geachtete Recensent der ersten Auflage (Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung No. 98. vom 9ten December 1819. pag. 314.) beobachtete das Uebel zwei Mal; einmal entstand es wie in Rowley's Falle, plötzlich, durch einen raschen Blick auf eine grell beleuchtete weifse Wand. Durch wiederhohlte Vesicantien, ableitende Mittel und ein adstringirendes Augenwasser, wurde dasselbe innerhalb drei Wochen bis auf ein Unmerkliches gehoben, ohne Zweifel, weil er, wie er sagt, zeitig dazu gerufen wurde. Er hält die Krankheit für die Folge eines Bersten der innern glasartig spröden Haut, *pro humore aqueo*, mit Hervortreibung der äufsern Hornhautlamellen durch eine gleichzeitig heftige sogenannte falsche oder sich widersprechende Contraction verschiedener Augenmuskeln.

Der Hornhautbruch, *Hernia corneae, Ceratocele.*

Wenn ein Geschwür der Hornhaut bis auf die innerste Lamelle derselben gedrungen ist, so geschieht es zuweilen, dafs bei noch anwesenden, oder auch

---

*) Rowley, a. a. O. S. 409.

**) W. Adams, in dem Archiv für medicinische Erfahrung, u. s. w. Herausgegeben von Prof. Horn, Nasse und Henke, 1817. B. 2. S. 191.

nach schon geheilten Geschwüren, diese innere Lamelle durch den Druck der wäfsrigten Feuchtigkeit in Gestalt eines graulichten halbdurchsichtigen Wasserbläschens, nach aufsen gedrängt wird, und einen sogenannten Hornhautbruch darstellt. Auch Wunden der *Cornea*, und selbst wirklich durchdringende Geschwüre, können, (wenn sich die innerste oder äufserste Lamelle der *Cornea* schneller als die übrigen regenerirt und nach aufsen gedrückt wird,) Hornhautbrüche verursachen.

Die Prognose ist verschieden: Wenn die *Ceratocele* klein ist, und wenn sich noch keine Oeffnung in derselben zeigt, so wird zwar, bald eine kleinere, bald eine gröfsere Narbe zurück bleiben, allein die Prognose ist hier dennoch sehr günstig; auch wird das Gesicht nach Heilung des Uebels nicht beeinträchtigt werden, wenn der Bruch von der Sehaxe entfernt gelegen ist. *Ceratocelen* aber, welche der Pupille gegenüberstehen und so grofs sind, als diese selbst, werden das Gesicht grofsentheils vernichten oder wenigstens sehr vermindern, denn die immer folgende Narbe bleibt unheilbar. Ausnahmen von dieser Regel, finden sich zuweilen bei *Ophthalmien* der Neugebornen, wo nach Heilung des Geschwüres, bei dauernder Anwendung zweckmäfsiger Mittel, besonders durch rothe Präzipitatsalben, zuweilen solche Narben ihre Undurchsichtigkeit nach und nach verliehren. Ich habe in dieser Hinsicht mehrere interessante Erfahrungen gemacht. In Fällen, wo das die *Ceratocele* verursachende Geschwür nicht Eiter, sondern durchsichtige Lymphe absonderte, bleibt zwar nach Heilung des letzteren die Stelle des Bruches bemerkbar, allein dieselbe ist nicht undurchsichtig, sondern nur mit einem ringförmigen Nebel umgeben, welcher häufig noch heilbar ist.

War aber der Bruch grofs, ist er wohl gar geborsten; so legt sich fast immer die *Iris* in die Oeffnung, die Pupille wird dadurch verzogen und verkleinert und das Sehvermögen gewaltig geschwächt.

Um das Uebel zu heilen, müssen adstringirende Mittel, z. B. eine starke *Solut. lapid. divini* ins Auge

gebracht werden, zugleich mufs man *Laudan. liquid.* allein, oder mit *Bals. vitae Hoffm.* vermischt, auf den Bruchsack streichen. Ebenso sind Aetzmittel, z. B. der *Lapis infernalis*, mit Glück angewendet worden. Auch soll man den *Lap. infernalis* gebrauchen, wenn sich die *Iris* in den Bruchsack gelegt hat, wodurch aber freilich die *Synechia anterior* nicht verhüthet, sondern noch mehr befördert wird. *) Auch ist manchmal der *Liq. stib. mur.*, rein oder mit *Acid. muriatic.* verdünnt, sehr nützlich, wenn man etwas davon, mittelst eines kleinen Pinsels, auf den Bruch bringt und die Stelle mit warmer Milch sogleich abwäscht. Wo man Hoffnung hat, das Geschwür durch eines der angegebenen Mittel vor dem Durchbruche der innersten Lamelle der *Cornea* zu bewahren und zu heilen, da sollte man niemals bleihaltige Augenwässer anwenden, denn obgleich sie hier häufig im Stande sind, den Durchbruch zu verhüthen, so verursachen sie doch stets einen weifsen narbigten Flecken, der dem Gesichte mehr schaden als nützen mufs. Dasselbe gilt von allen weiter verbreiteten Excoriationen, denen die Hornhaut zuweilen unterworfen ist und die bei Vernachlässigung allerdings auch Hornhautbrüche veranlassen können, welche zu der gröfseren Art gehören. Die angeführten Mittel, in Verbindung mit kräftigen Ableitungen auf Haut und Darmkanal, sind hier dem Gebrauche der Bleimittel gleichfalls weit vorzuziehen.

c. Von den Krankheiten der Linse.

Die Entzündung der Crystalllinse und ihrer Kapsel, *Lentitis, Capsulitis.*

Reine, vorzüglich von äufsern Ursachen entstandene *Lentitis*, ist, so viel die bis jetzt bekannten Be-

---

*) Wenn der Vorfall der Regenbogenhaut eben erst entstanden wäre, so kann man versuchen die *Iris*, durch die bei den Wunden der *Cornea* angegebenen Methoden, in ihre normale Lage wieder zurück zu bringen.

obachtungen lehren, immer mit Entzündungen anderer, der Linse nahe liegenden Gebilde vereinigt. Die *Iris* ist daher fast immer entzündlich afficirt, und die Pupille merklicher oder unmerklicher verzogen, oder verengert.

Die nicht reine *Lentitis*, welche die gewöhnlichste ist, entsteht langsam, verläuft meistentheils chronisch, und erscheint auch manchmal ohne *Iritis*. Sie kündigt sich mehrentheils durch einige Lichtscheu und geringe neblichte Trübheit des Gesichts an, wobei sich in der durch *Extr. Belladonnae* erweiterten Pupille, viele von Blut strotzende Gefäfse zeigen, von denen man die gröfsern mit bloſsen Augen unterscheidet. Unter einer ohngefähr sechsfach vergröfsernden *Lupe*, erblickt man in der vordern Linsenkapsel einen feinen Gefäfskranz, welcher mit der runden Pupille selbst concentrisch läuft; beobachtet man diesen genauer, so bemerkt man, dafs er aus mehreren Gefäfsbogen besteht, zu welchen strahlenförmig viele Gefäfse gehen, die von der Peripherie der vordern Kapselwand oder auch von der Traubenhaut und zwar so herkommen, dafs sie nicht vom Pupillarrande, sondern etwas entfernt von diesem entstehen. In der Linse selbst, zu welcher im normalen Zustande keine Blutgefäfse kommen, bemerkt man nicht selten einen ähnlichen Gefäfskranz, der oft von hinten her noch Gefäfse bekommt. Zwischen diesen Blutgefäfsen der Kapsel und Linse findet sich, wie bei *Keratitis*, ausgetretene coagulirte Lymphe, welche das Sehen noch mehr beschränkt. Die Blutgefäfse, welche man in der Linsensubstanz selbst entdeckt, scheinen durch Substanzwucher der Endspitzen der Blutgefäfse der Kapsel, zu ihr zu dringen; wir sehen dasselbe Phänomen auch bei Entzündungen anderer Theile des Körpers. Auch scheinen alle Entzündungen der Linsensubstanz erst in der Kapsel zu beginnen, bevor sie in erstere kommen. Die Schmerzen sind übrigens gering, und werden nicht in der Mitte des Auges, sondern mehr im Hintergrunde der *Orbita* und Supraorbitalgegend, bemerkt.

Die Pupille ist mehr oder weniger unbeweglich, hat sich nach oben und innen hin verzogen und daher eine eiförmige Gestalt angenommen. In einigen Fällen, in welchen die *Iris* ziemlich stark entzündet war, erschien diese nach der Mitte hin mehr vorgedrängt. Dunkelgefärbte Augen sah Walther (a. a. O. S. 55.) öfter von *Lentitis* ergriffen, als blaugraue. Die Entzündung des Krystalls, welche doch mit Trübung desselben verbunden sein mufs, setzt manchmal einen Staar, der für immer partiell und unvollkommen bleiben kann, wenn der entzündliche Proceſs rein abgelaufen ist; allein zuweilen wird auch nach geheilter Entzündung die Linse wieder hell und durchsichtig.

Es scheint, als wenn die Entzündung der Krystalllinse dieselben Ausgänge machen könne, welche wir bei Entzündungen anderer Organe beobachten. Wenzl *) erzählt einen merkwürdigen Fall von Linseneiterung. Günz, De la Faye, La Peyronie, u. m. a. fanden und beschrieben ebenfalls Eiterstaare; durch welchen anderen Proceſs könnten diese aber wohl veranlafst worden sein, als durch eine vorausgegangene Entzündung. Verhärtung der Linse und Ausschwitzung plastischer Lymphe sind gleichfalls nicht selten, daher auch jeder angewachsene Staar das Product einer vorhergegangenen Entzündung nicht blofs der umgebenden Parthieen, sondern wenigstens auch der Linsenkapsel sein mufs. Wo die Kapsel mit der Linse selbst verwachsen ist, da theilte die erstere die Entzündung mit der letztern. Jeder Ausgang der Linsenentzündung aber, wenn er nicht in gänzlicher Zertheilung derselben besteht, verursacht Trübung der Linse, mithin grauen Staar.

Ich habe mich durch vielfache Erfahrungen überzeugt, dafs die von Ph. v. Walther und nach ihm von anderen beschriebene Entzündung der Kapsel und der Linse, der stärkere, heftigere Grad derselben ist, welcher verhältnifsmäfsig selten vorkommt. Dagegen

---

*) Ueber den Zustand der Augenheilkunde in Frankreich etc. Nürnberg 1815. S. 83.

finden wir einen weit milderen Grad derselben viel häufiger, und dieser äufsert sich auf folgende Weise: Unter einem schwachen Gefühle von Druck im Auge und einem ziehenden Gefühle über den Augenbraunen, welche beide man kaum Schmerz nennen kann, und unter Thränen der Augen und zuweilen unter Mückensehen bemerkt der aufmerksame Kranke eine Schwäche des Gesichts des afficirten Auges, welche, wenn man genauer nachfragt, in einem feinen Nebel besteht, der sich zwischen dem Auge und dem zu sehenden Objecte vorfindet, und welcher insgemein stärker ist, wenn der Gegenstand im Schatten, das Auge selbst aber, in vollem Lichte steht, dagegen aber viel unbedeutender erscheint, wenn der Leidende mit dem Rücken gegen das Licht sich wendet, das zu sehende Object aber vom Lichte gut beleuchtet wird. Jetzt bemerkt der mit einem scharfen Auge begabte Arzt, eine äufserst geringe, rauchartige, unegale Trübung hinter der Pupille. Geht dieser gelinde Grad von *Capsulitis* nicht in den heftigern, bereits beschriebenen über, so bemerkt man weder eine besondere Trägheit oder Unbeweglichkeit der Pupille, noch veränderte Farbe der *Iris*, weder besondere Lichtscheu, noch blutführende Gefäfse in der Kapsel oder gar in der Linse selbst, vielmehr bleibt das einzige objective Zeichen, der feine, nur scharfen Augen bemerkbare Rauch hinter der Pupille, welcher nach und nach sichtbarer wird, meistens unregelmäfsig fleckigt erscheint und dessen Entstehen genau mit dem Auftreten jener schon erwähnten Gefühle im Auge und über der Augenbraune, zusammenfällt. Nur wenn man die Pupille durch *Solut. extract. Belladonnae* erweitert, erhält diese nur einen mittleren Durchmesser, ja wird zuweilen selbst etwas eckigt. Dieses rührt von den organischen Adhäsionen her, welche von der *Uvea* zur Kapsel gehen und die in Folge der Entzündung stärker und fester geworden sind. Dennoch bleibt die nicht erweiterte Pupille bei diesem Grade der Entzündung beweglich, weil die Adhäsionen nicht von dem *margine pupillari*,

sondern an entfernter von diesem gelegenen Stellen statt finden.

Die Ursachen dieses milderen Entzündungsgrades, sind besonders Erkältungen der Stirn und der Füfse; zuweilen mögen wohl im Körper befindliche Dyscrasien das Ihrige zur Entstehung des Uebels beitragen.

Die Prognose ist meistens ungünstig; selten wird der Arzt so zeitig hinzugerufen, um eine schnelle Zertheilung zu bewirken. Der Ausgang ist gewöhnlich dauernde Trübung der Kapsel, und wenn die entzündliche Trübung sehr umfassend, oder gar allgemein war, Verdunklung der Crystalllinse selbst. Zuweilen entsteht Verhärtung der Kapsel und der Linse, und dann sind auch beide Theile mit einander verwachsen; manchmal können auch wäfsrige Aussonderungen zwischen Kapsel und Linse erfolgen, wodurch die Linsenmasse nach und nach erweicht wird. Viele Kapsellinsenstaare mögen ihre weiche, schmierige oder wäfsrige Consistenz einzig und allein solchen vorausgegangenen Entzündungen zu verdanken haben.

Die Kur mufs sowohl bei dem stärkern als auch bei dem geringern Grade der *Capsulitis* antiphlogistisch begonnen werden. Nach Umständen Aderlässe, Blutigel, gelind abführende, antiphlogistische Mixturen, *Calomel*, Einreibungen von Mercurialsalbe über den Augenbraunen, Fufs- und Halbbäder, und ableitende kräftige Hautreitze. Wo unmittelbar vor Entstehung des Uebels, Erkältungen der Stirn vorausgegangen sind, dann neben jenen Mitteln gelinde *Sudorifica* und örtlich das Auflegen erwärmter Kräutersäckchen. Dyscrasien, welche zur Vermehrung der Entzündung beitragen, müssen immer berücksichtigt werden.

Ich habe die *Diagnose* der *Lentitis*, über welche der berühmte Ph. Walther*) zuerst mehr Licht verbreitete, gleichsam als Eingang zu der gleich abzuhandelnden *Cataract*, hier hingestellt, weil ich mit Mehreren glaube, dafs sich eine sehr grofse Anzahl

---

*) A. a. O.

grauer Staare von einer Entzündung der Linse und deren Kapsel herschreibe, und diese daher die Aufmerksamkeit der Aerzte vor allen Dingen jetzt verdienen mufs; ich glaube indefs mit dem Rezensenten der Benedict'schen Monographie des grauen Staares *) dafs man der Linsenentzündung nicht zu viel einräumen und ihr hinsichtlich der *Genesis* der *Cataract*, keine allgemeine Ausdehnung geben darf. Wichtig, auch für die Praxis wichtig ist die Entzündung der Linse allerdings. Die Lichtscheu, mit welcher manche Staare entstehen und die Beobachtung, dafs bei frisch entstandenen, besonders noch nicht vollkommen ausgebildeten *Cataracten*, die Neigung zur Entzündung gröfser sei nach operativen Eingriffen, was aufser Gleize mehrere bemerkten, ehe man von einer *Lentitis* deutliche Begriffe hatte, deuteten schon auf einen inflammatorischen Zustand der in Rede stehenden Gebilde hin.

Der graue Staar, *Cataracta, Hypochyma, Suffusio oculi.*

Jede Trübung der Linse, oder deren Kapsel, oder beider Gebilde zugleich, wodurch die Lichtstrahlen mehr oder weniger gehindert werden, bis zur Netzhaut zu dringen, nennt man grauen Staar.

Zuweilen wird ein anfangender grauer Staar, mit einem anfangenden schwarzen Staar verwechselt. Um diefs zu vermeiden ist es nothwendig, folgende Erscheinungen des grauen und des schwarzen Staares zu merken:

Die charakteristischen Phänomene, welche den allmählig sich ausbildenden grauen Staar gewöhnlich begleiten, sind folgende: Die Gegenstände erscheinen dem Kranken in Nebel gehüllt, schmutzig und staubig. — Die Abnahme des Gesichts steht in dem genauesten Verhältnifs mit der hinter der Pupille sichtbaren Trübung. — Meistens sieht man die Trübung im Mittelpunkte, seltener am Rande der Pupille zu-

*) Salzb. med. chirurg. Zeitung, 1816. 2. B. S. 255.

erst. — Bei der weitern Ausbildung des Staares, zeigt sich am Rande der Pupille, ein schwärzlichter Ring, welcher der Schlagschatten ist, den die *Iris* auf die jetzt sichtbar gewordene Linse macht *). — Wenn der graue Staar in der Mitte der Linse beginnt, so verbirgt er am ersten die, dem leidenden Auge gerade gegenüber stehenden Objecte, zur Seite hin, kann aber der Kranke die Gegenstände erkennen, daher es denn auch kömmt, dafs dergleichen Kranke im Halbdunkel, bei also erweiterter Pupille, besser sehen können, als am hellen Tage, wo die Pupille sehr contrahirt ist. Sobald aber die Krystalllinse völlig getrübt und der Staar ausgebildet ist, sieht der Leidende bei heller Beleuchtung noch etwas besser, als in der Dämmerung, also bei wenigem Lichte, und zwar defswegen, weil in diesem Falle zur Netzhaut doch die schwächeren Lichtstrahlen nicht gelangen können, wenn auch die Pupille erweitert ist, das helle Licht aber immer noch einigermaafsen durch die getrübte Linse, bis in den Hintergrund des Auges dringt.

So lange die Trübung der Linse noch unbedeutend ist, leisten gewölbte Brillen den Staarkandidaten die beste palliative Hülfe; denn diese vergröfsern ihnen, wie schon Wathen **) bemerkt, die Gegenstände und machen sie daher sichtbarer, und sie lesen vielleicht noch, wo sie ohne Brille kaum einzelne Buchstaben zu erkennen im Stande waren. Dennoch sind sie kurzsichtig, und der Nebel vor ihren Augen ist in der Ferne viel bedeutender, als in der Nähe, was sich leicht erklären läfst. Soll die Brille die bestmöglichste Erleichterung gewähren, so müssen die Gläser nicht nur stark convex sein (gewöhnlich zwischen 12 und 20 Zoll Brennweite) sondern sie mufs auch so eingerichtet werden, dafs die Augen gehörig beschattet werden;

---

*) Mit dem Schlagschatten der *Iris*, mufs man nicht den braunen Pupillarrand derselben verwechseln, welcher in Folge der weifslicht getrübten Linse, weil diese letztere eine grell abstechende Unterlage bildet, sichtbarer wird.

**) *Dissertat. on the Theory and Cure of the Cataract.*

dieses geschieht theils durch Seitenwände von grünem Taffet und einen kleinen Schirm von gleichem Stoffe, welche leicht an dem Brillengestelle anzubringen sind und die auch in der optischen Industrieanstalt des Herrn Pred. Dunker zu Rathenow unter dem Nahmen: Schirmbrillen fertig zu haben sind.

Kerzenflammen sieht der Kranke in weifslichen Nebel gehüllt, und ist der Staar schon weiter vorgerückt, so sieht er die Flamme selbst nicht mehr, sondern nur den sie umgebenden Schein. — Die *Iris* ist bei anfangendem grauen Staar beweglich. —

Die charakteristischen Erscheinungen, welche die Entwicklung des schwarzen Staares bezeichnen, sind folgende: Die Trübung ist viel tiefer im Auge, als dafs diese in der Linse ihren Sitz haben könnte, dabei ist diese Trübung, wie man bei genauer Untersuchung findet, mehr concav. — Die Farbe der Verdunklung fällt mehr in das Grünlichte oder Röthlichte, als in das Graulichte. — Der Leidende ist oft fast blind, bei unbedeutender Trübung. — Die Pupille ist erweitert, die *Iris* wenig oder gar nicht beweglich, und der Pupillarrand bald mehr, bald weniger winklicht; dabei ist die *Cornea* matt, und das Auge hat, wenn die Amaurose paralytischer Natur ist, den Blick verlohren. — Die wechselnde Zu- und Abnahme des Gesichts entsteht hier nicht von Erweiterung oder Verengerung der Pupille, sondern von, auf den ganzen *Organismus* wirkenden stärkenden oder schwächenden Einflüssen. — Der Umrifs der Lichtflamme erscheint bei schwarzen Staarkandidaten regenbogenfarbig. — Brillen verschaffen niemals Erleichterung im Sehen. Auch unterscheidet der Kranke die Gegenstände zur Seite eben so wenig, als diejenigen, welche seinem Auge gerade gegenüber stehen.

Dennoch ist es häufig noch leicht, einen angehenden schwarzen Staar, von einer *Cataracta incipiens* zu unterscheiden; weit schwerer aber wird es oft dem Arzte, die den grauen Staar begleitende *Amaurose* vorher zu erkennen, um so mehr, wenn er den *Casum* etwas oberflächlich untersuchte. Wie leicht kann er

hier seinen Kredit wo nicht verliehren doch wenigstens schmälern; denn man wird nicht der heillosen Natur der Krankheit, sondern seiner Handlungsweise den ungünstigen Erfolg beimessen. Auch ist nicht zu zweifeln, dafs es aufser der sogenannten *Cataracta glaucomatosa*, noch mehrere *Cataracte* giebt, die erst in Folge einer Amaurose auftreten, in welchen Fällen alsdann aber stets die letztere der ersteren vorangeht. Ebenso giebt es aber auch mit *Amaurosis* verbundene *Cataracte*, welche von gleichen Ursachen entstanden, auch gleichzeitig mit einander erscheinen. Wir müssen defswegen da, wo Muthmafsung einer anwesenden Amaurose vorhanden ist, alles wohl berücksichtigen und erwägen, und sollten in dergleichen Fällen nie unterlassen, die Belladonna oder den Hyoscyamus äufserlich als Auskundschafter zu gebrauchen. Oft ist die *Cataract* nicht blofs voluminös, sondern adhärirt auch an der hintern Fläche der *Iris*, wodurch denn der Leidende verhindert wird, Tag von Nacht zu unterscheiden. Solche Adhäsionen bestehen nicht immer unmittelbar zwischen der *Uvea* und der *Capsula lentis*, zeigen sich auch bei weitem nicht immer in Verbindung mit einer starren Regenbogenhaut und verengerten winklichten Pupille, vielmehr finden dieselben in der Mehrzahl von Fällen an, von dem Pupillarrande entfernteren Stellen der *Uvea* statt, so dafs der kleine Ring der *Iris* vollkommen beweglich sein kann. Dergleichen Adhäsionen bestehen oft in nichts anderm, als in Verfestigung und Vervielfältigung der Gefäfsverbindungen, welche im normalen Zustande zwischen der Ciliarkrone etc. und Linsenkapsel immer gegenwärtig sind. Die *Belladonna* verschafft uns hier leicht die gewünschte Auskunft und veranlafst uns, da mit Erfolg zu operiren, wo wir ohne sie vielleicht nichts unternommen haben würden.

Die Arten und Unterarten des grauen Staares.

Der Linsenstaar, *Cataracta lenticularis*, beginnt im Mittelpunkte der Linse mit einer gelblich grauen Farbe, die sich nach dem Rande zu verwäscht. Dabei zeigt sich der Schlagschatten des Pupillarran-

des in Form eines schwärzlichen Ringes, am Rande der Pupille, und letztere expandirt und contrahirt sich wie gewöhnlich. Dieser Staar hält sich gemeiniglich von der Traubenhaut bedeutend entfernt und zeigt niemals in der Trübung hellweifse wolkige Flecken (Taf. II. F. 4.) Reine Linsenstaare findet man am häufigsten bei älteren Personen. Meistens sind sie hart und nicht voluminös; daher kommt es auch, dafs die mit dieser Staarspecies behafteten Personen, oft dann noch feine Stereotypschrift lesen können, wenn die Trübung der Linse für den scharfsehenden Arzt schon von fern sichtbar ist. Indessen wird die Linse in solchen Fällen immer eine schmutzig gelbschwärzliche oder grau grünlichschwärzliche, niemals aber eine grauweifsliche Farbe besitzen. Wo letztere zugegen ist, da ist das noch bestehende Sehvermögen viel geringer.

Der Kapselstaar, *Cataracta capsularis v. membranacea*, bildet sich selten von der Mitte der Pupille aus, sondern meistens vom Rande her, in unbestimmter Form, bald in weifsen, wie Wallrath glänzenden Punkten, oder Streifen, bald in Flecken. Dieser Staar ist immer sehr helle gefärbt, aber niemals gleichmäfsig gesättigt. *) Dabei besteht er nie lange für sich allein, sondern geht meistens bald in Kapsellinsenstaar über.

Die Kapsel allein verdunkelt zu sehen, ohne dafs bald auch die Linse sich trübte, ist überhaupt selten und findet, wie Ph. v. Walther**) bemerkt, nur bei jungen Leuten, niemals bei Greisen Statt. Dafs eine Trübung allein in der Kapsel haftet, kann nur dann von dem Arzte erkannt werden, wenn erstere partiell ist. Ich glaube, dafs ein beschränkt bleibender Kap-

---

*) Die wie Wallrath glänzenden, nach dem Centro hinstrebenden weifsen Parthieen in der Pupille der 6ten Fig. auf Tab. II., wird man sogleich als die verdunkelte vordere Linsenkapsel erkennen.

**) Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Medicin etc. 1. B. 1810. S. 22.

selstaar immer das Product einer früher dagewesenen *Capsulitis* ist. Vielleicht sind fast alle Arten Kapsellinsen- und Kapselstaare Producte desselben Processes; fast möchte ich davon nur diejenigen Linsenstaare ausschliefsen, bei denen die Trübung langsam und allein in der Linse beginnt, und die sich längere Zeit hindurch als reine Linsenstaare manifestiren.

Von der *Cataracta capsularis* giebt es 3 Unterarten:

a) Der vordere Kapselstaar, wenn blofs die vordere Kapselhälfte verdunkelt ist, *Cataracta capsularis anterior.* Man sieht hier hellgraue, kreideweifse, perlenmutterartige Flecken und Streifen in der vorderen Kapsel, diese wird dicker, füllt die hintere Augenkammer zuweilen völlig aus, hemmt dadurch die Beweglichkeit der Regenbogenhaut, und bewirkt das Nichtvorhandensein des bekannten Schlagschattens. Das Sehvermögen ist dabei nicht blofs beeinträchtigt, sondern bis auf eine bestimmte Lichtempfindung wirklich aufgehoben, der Leidende mag sich im Hellen oder im Halbdunkel befinden. — Als Nebenunterart des vordern Kapselstaares, können wir noch den dendritenartigen, bäumchenförmigen Staar, *Cataracta dendritica, arborescens*, nach Richter (dessen Chirurg. 3. Bd. S. 174.) Aderhautstaar, *Cataracta chorioidalis*, betrachten. Mit diesem Namen nämlich belegt man bräunliche, bäumchenähnliche Formen, die sich auf der vordern, graulich verdunkelten oder noch durchsichtigen, Linsenkapsel zeigen. Hinsichtlich des Wesens dieser *Cataract* ist man noch nicht im Reinen. Einige ältere Augenärzte, z. B. Pellier, hielten die bräunlichen Verzweigungen für Verlängerungen der Aderhaut. Andere, und unter diesen Beer, halten sie für den Abdruck des Tapetums der Traubenhaut an der Linsenkapsel. Noch andere endlich glauben, dafs es dendritenartige Verdunklungen in der Substanz der Kapsel selbst sind, oder meinen, dafs man die Blutgefäfse der entzündeten Linsenkapsel unter dem Namen Baumstaar aufgeführt habe.

b) Der hintere Kapselstaar, *Cataracta capsu-*

laris posterior, wenn blofs die hintere Linsenkapselhälfte verdunkelt ist, wird an der, bei genauer Untersuchung, concaven, weifslicht grauen, ungleichen, aber niemals mit kreideweifsen Flecken und Streifen versehenen Trübung, an der, selbst wenn die Linse schon verdunkelt ist, noch bestehenden Beweglichkeit der *Iris*, und an der wenigen Beschränktheit des Gesichts, erkannt. Aehnliche oder vielmehr gleiche Erkennungszeichen soll der sogenannte Glashautstaar, *Cataracta hyaloidea*, haben, bei welchem angeblich jener Theil der Glashaut getrübt sein soll, der die Vertiefung des Glaskörpers umkleidet, in welcher die Crystalllinse ihren Sitz hat. Die Existenz dieser Staarart ist bis jetzt noch etwas problematisch.

c) Der vollkommene Kapselstaar, *Cataracta capsularis perfecta*, stimmt mit dem vordern Kapselstaar überein; nur dafs hier die hintere Augenkammer, wegen der Verdickung der Kapsel, ganz aufgehoben, die Pupille fast unbeweglich ist, ja selbst die Regenbogenhaut, zuweilen, wegen Andrängen des Staares gewölbt erscheint.

Der Morgagnische Staar, *Cataracta Morgagniana*, besteht in einer, durch plötzliche, vorzüglich chemische Einwirkungen auf das Auge (z. B. durch Anschlagen der Dämpfe concentrirter Mineralsäuren, u. s. w.) verursachten Trübung der Morgagnischen Feuchtigkeit, und gehört zu den seltensten cataractösen Erscheinungen. Solchen Trübungen folgt eine vollkommene Entmischung der Linse in eine milchähnliche Flüssigkeit, und nicht selten auch zugleich ein vollkommner Kapselstaar, auf dem Fufse nach; daher man diesen Staar auch selten für sich allein bestehend findet. *) Die Farbe desselben ist milchweifs, zart und dünn, die ganze Pupille erscheint wolkigt, aber diese Wolken ändern jedesmal ihre Form, sobald der Augapfel mit dem Finger gerieben, oder schnell und heftig bewegt wird; die hintere Augen-

*) Die Linse mufs hier jedesmal sehr bald cataractös werden, weil sie durch den *Liqu. Morgagn.* ernährt wird.

kammer ist beinahe, oder völlig aufgehoben und das Gesicht mehr oder weniger beschränkt. (Siehe Taf. II. F. 5.)

Der Kapsellinsenstaar, *Cataracta capsulo lenticularis*, gehört keinesweges zu den seltensten Arten. Seine Merkmale sind folgende: Die Farbe der fest an der Traubenhaut liegenden Verdunklung ist zum Theil kreideweifs, zum Theil perlenmutterartig, und man sieht an manchen Stellen diese beiden Farben ganz deutlich über einander geschichtet; so zwar, dafs die perlenmutterartige Schicht immer höher als die kreideweifse liegt. Die Regenbogenhaut ist fast unbeweglich, die Pupille aber rund. Dieser voluminöse Staar drängt die *Iris* nach der *Cornea* hin vor, weswegen die Lichtempfindung des Kranken auch sehr undeutlich ist. (Taf. II. F. 6.)

Von dem Kapsellinsenstaare giebt es folgende Unterarten:

a) Ein Kapsellinsenstaar der mit unbedeutenden Substanzwucherungen der vorderen Kapsel verbunden ist. Je nachdem die Wucherungen verschiedene Formen bilden, erhält der Staar verschiedene Namen; daher entsteht eine *Cataracta capsulo lenticularis marmoracea, fenestrata, stellata, centralis, punctata,* und *dimidiata.* Bei allen diesen Nebenunterarten und bei den meisten übrigen noch abzuhandelnden Unterarten des Kapsellinsenstaares, findet man die Linse bis zu ihrem Kern sulzig oder milchartig entmischt.

b) Der Balgstaar, *Cataracta capsulo lenticularis cystica*, charakterisirt sich durch seine schneeweifse Farbe, die der *Iris* bald näher bald weniger nahe liegt, was von der Richtung des Kopfes abhängt, indem er z. B. bei vorwärts geneigtem Kopfe an die Traubenhaut anstöfst und in die Pupille dringen zu wollen scheint. Manchmal erscheint diese Unterart des Kapsellinsenstaares, als ein Zitterstaar, *Cataracta capsulo lenticularis tremula*, oder wohl gar als eine schwimmende Kapsellinsencataract, *C. capsulo lenticularis natatilis.* Das Ursächliche dieser Erscheinung liegt in einem sehr geschwächten, oder wohl gar aufgehobenen

Zusam-

Zusammenhange der Linsenkapsel mit den zunächst gränzenden Gebilden.

c) Der kegelförmige Kapsellinsenstaar, *Cataracta c. lent. pyramidata*, ist immer Product einer heftigen Augenapfelentzündung, und unterscheidet sich von andern, besonders durch ein weifses, fast glänzendes, kegelförmiges, durch die Pupille vorragendes Aftergebilde, das aus der Mitte der vordern Linsenkapsel entsprungen ist, und wegen Verwachsung mit dem Pupillarrande, die Regenbogenhaut völlig unbeweglich, und die Pupille winklicht macht. Die Lichtempfindung ist dabei natürlich sehr schwach oder mangelt gänzlich.

d) Der trockenhülsige Kapsellinsenstaar. *Cat. c. lent. arida siliquata* kommt vorzüglich bei sehr jungen Kindern vor, die viel an Convulsionen, vorzüglich der Augenmuskeln, gelitten haben, wodurch die Linsenkapsel zum Theil von ihren Verbindungen losgerissen ist und nun sammt ihrer Linse wegen der mangelhaften Ernährung verschrumpfen mufs; diese *Cataract* besteht demnach in einer Vertrocknung des Linsenkerns, mit Vertrocknung und Verschrumpfung der Linsenkapsel. Bei Kindern giebt sich dieser Staar durch seine hellgraue, weifslichte Farbe, durch seinen kleinen Umfang, und seine bedeutende Entfernung von der Traubenhaut, und die freien Bewegungen der *Iris* (wenn er nicht etwa mit derselben in einigen Punkten verwachsen ist) und endlich durch das niemals völlig aufgehobene Gesicht, zu erkennen (Taf. II. F. 7.) Bei Erwachsenen sieht man dieselben *Phaenomene*; jedoch ist er jederzeit blendendweifs, nur hier und da schmutzigweifs, etwas ins gelblichte fallend, übrigens abgeplattet und das Gesicht gewöhnlich vollkommen bis auf die Lichtempfindung aufgehoben.

e) Eine fünfte sehr seltene Unterart des Kapsellinsenstaares ist die mit dem Eiterbalge, *Cataracta capsulo lenticularis cum bursa ichorem continente.* Er spricht sich durch eine citronengelbe aber doch dunkle Farbe, durch sehr träge Bewegungen der Regenbogenhaut, durch den leicht bemerkbaren Mangel

der hintern Augenkammer und die geringe Wölbung der *Iris*, durch eine sehr undeutliche Lichtperception, und endlich, durch offenbar schwächlichen cachectischen *Habitus* des ganzen Individuums aus. Der Eiterbeutel, welcher sich bei dieser *Cataract* fast immer zwischen der Linse und der hintern Linsenkapsel befindet, enthält zuweilen eine sehr stinkende Gauche.

f) Der Balkenstaar, *Cataracta capsulo lenticularis trabecularis, s. cum zona* wird aus folgenden Zeichen leicht erkannt: Man erblickt hinter der verengerten winklichten Pupille, ganz deutlich einen ausgebildeten vordern Kapsellinsenstaar, auf welchem, entweder mehr in perpendiculärer oder mehr in horizontaler Richtung ein kreideweifser, glänzender, oft ziemlich dicker Balken befestigt ist, der mit dem Pupillarrande der Traubenhaut an beiden Enden zusammenhängt und defshalb die Regenbogenhaut starr macht. Dabei ist die Lichtempfindung undeutlich oder mangelt vollkommen, und den Augapfel selbst findet man nicht selten atrophisch.

So weit von den Arten und Unterarten des grauen Staares; gehen wir jetzt zu den Verschiedenheiten in Hinsicht der Consistenz desselben über.

Die Consistenz des Staares hat nicht allein grofsen Einfluſs auf die Prognose, sondern auch auf die Wahl der Operationsmethode; defswegen ist folgende danach gemachte Eintheilung für den operirenden Arzt sehr wichtig. — Ein harter Staar besitzt folgende Merkmale: Er ist dunkel von Farbe *) und von der Pu-

*) Zuweilen findet man die cataractöse Linse aufserordentlich dunkel, so beschreibt z. B. Janin in seinen Beobachtungen über das Auge, übers. v. Selle, 2te Aufl. S. 243. zwei schwarze Linsenstaare, die gegen das Licht gehalten röthlich erschienen, sehr hart, dabei dennoch sehr grofs waren und bei alten Staaren und abgelebten Leuten vorkamen. Ganz schwarze *Cataracte*, welche man kaum von schwarzen Staaren unterscheiden konnte, hat auch Wenzel der Vater beobachtet. Pellier u. a. zogen röthliche Staare aus. Ich zog einen Staar aus, welcher in allen Farben schillerte, also wahrhaft opalisirte. Ueberhaupt hat man sie fast von allen Farben gesehen.

pille entfernt, das Gesicht ist nur beschränkt, nicht aufgehoben und der Kranke bemerkt, bei erweiterter Pupille, ziemlich deutlich die gröfsern Gegenstände; zugleich sind die Bewegungen der *Iris* sehr lebhaft. Solche harte Staare kommen meistens bei alten Leuten und nur allein in der Linse vor. — Zu den festen zähen Staaren gehören viele Kapselcataracte, z. B. der Balgstaar, der kegelförmige Kapsellinsenstaar, der trockenhülsige Kapsellinsenstaar, der Balkenstaar u. a. — Zuweilen ist der Staar weich, d. h. käsigt, sulzigt, entweder durchaus oder blofs auf seiner Oberfläche; diese Art hat immer eine sehr hellgraue, graulichtweifse, oder meergrüne ungleich vertheilte Farbe, wobei das Gesicht oft gänzlich aufgehoben, die hintere Augenkammer ausgefüllt und die Bewegung der *Iris* träge ist. — Auch giebt es selbst einen wirklich flüssigen Staar, der aber, wegen fast immer vorhandener Verdunkelung der Linsenkapsel, sehr schwer zu erkennen ist. Wenn die Kapsel bei diesem Staare nicht vollkommen, sondern nur an einzelnen Stellen undurchsichtig ist, so bemerkt man hier folgende Zeichen: Der Staar liegt an der Traubenhaut an, beugt der Kranke den Kopf vorwärts, so drückt die Linse die *Iris* nach der Hornhaut vor. Die Lichtempfindung ist deutlich. Wenn der Patient längere Zeit den Kopf ruhig hält, so zeigt die *Cataract* ganz deutlich einen dichtern Bodensatz und eine oben dünnere Schicht. Die sogenannten angebornen *Cataracte* sind häufig von weicher, flüssiger, ja milchartiger Consistenz. — Noch giebt es einen flüssig harten Staar, zu welchem die *Cataracta Morgagniana* und die *C. cum bursa ichorem continente*, zu rechnen sind.

Wichtig für die Clinik ist noch die Unterscheidung des Staares in einen sogenannten reifen und unreifen, *Cataracta matura et immatura.* Reif ist der graue Staar, sobald er keiner weitern Ausbildung als solcher mehr fähig ist, er mag übrigens das Gesicht völlig aufheben, oder nur beschränken, er mag die Pupille ausfüllen oder nicht; ein unreifer grauer Staar

heifst hingegen derjenige, der sich noch immer mehr ausbilden kann. *)

Einen unreifen Staar operirt man in der Regel nicht; in den meisten Fällen wäre ein operatives Eingreifen wenigstens sehr gefährlich und gegen die Politik des Arztes; denn ist die Trübung noch im Fortschreiten begriffen, so ist die Sehfähigkeit noch nicht ganz aufgehoben, oft sieht der Kranke in der Dämmerung, also bei erweiterter Pupille, noch recht leidlich, selbst bei wenigem Kerzenlichte bemerkt er noch die Umrisse gröfserer und kleinerer Gegenstände und sieht die Spielkarten, wenn er nur seine Augen durch einen Schirm vor der Lichtflamme schützt. Wollte man hier immer operiren, so würde der unglückliche Ausgang dem Kranken und dem Operateur doppelt unangenehm sein müssen, weil ersterer die völlige Beraubung seines, obgleich sehr unvollkommenen Gesichts, dem letztern auch dann beimessen würde, wenn derselbe, wie es immer nöthig ist, eine bedingungsweise Prognose gestellt hätte.

Noch eine sehr wichtige Classification unserer Krankheit, ist die, in einen rein örtlichen und in einen complicirten Staar, *Cataracta topica, pura. et cat. complicata*; wovon die erstere Art selten ist, die zweite aber wiederum in den örtlich complicirten, allgemein complicirten und vollkommen complicirten grauen Staar, getheilt wird.

Zu den örtlichen Cataracten gehört zuerst der an-

---

*) Noch wichtiger für die Clinik wäre diese Eintheilung, wenn man im engern Sinne, *Cataracta matura* denjenigen Zustand der Linse nennen wollte, wo eine *Lentitis* die *Cataract* gesetzt hätte, erstere aber völlig vorüber gegangen und keine Lichtscheu mehr vorhanden wäre; hier würde, so lange noch ein inflammatorischer Zustand der Linse gegenwärtig, wenn letztere auch schon völlig verdunkelt worden, der Staar zum Operiren wirklich unreif sein, denn wer möchte wohl eine noch entzündete Linse antasten wollen, ohne nicht eine folgende Entzündung der umgebenden Theile der Linse (die so verderblich für das Sehorgan werden kann) zu befürchten?!

gewachsene graue Staar, *Cataracta acreta*, dessen Diagnose schon aus dem vorhergehenden klar geworden ist. Nun kann ferner der Staar örtlich mit stehender Verengerung der Pupille ohne hintere *Synechie*, mit *Atrophie* und mit Augenwassersucht, mit *Cirsophthalmie*, mit Flecken und Narben der Hornhaut, mit dem Flügelfell und mit verschiedenen *Ophthalmien* complicirt sein. Wenn die *Cataracta* mit *Glaucom* complicirt ist, so hat sie fast immer eine grünlichte oft meergrüne Farbe, ist ungeheuer grofs, so, dafs sie sich aus der Pupille nach der Hornhaut vordrängt, die Farbe der Regenbogenhaut ist, wie nach einer *Iritis* alienirt, die Pupille erweitert, winklicht, das blinde Auge von Lichterscheinungen beängstigt und dabei mehr oder weniger varicös und hart (T. II. F. 8.) Ein dergleichen Staar bildet sich immer unter langwierigen Kopfschmerzen aus. — Sollte unsere Krankheit mit *Synchysis* complicirt erscheinen, so ist die Diagnose schwer: und unsicher, wenn die Auflösung des Glaskörpers noch nicht vollkommen ist, denn dann findet man aufser einer verdächtigen Weichheit des *Bulbus*, und einem geringen Schwanken der *Iris* bei starken Bewegungen, nichts, was eine Erkenntnifs der Krankheit sichern könnte. Ist die *Synchysis* aber völlig ausgebildet, so ist das Vor- und Rückwärtsschwanken der *Iris* deutlich, der Staar zittert, das Auge scheint atrophisch zu sein, fühlt sich zugleich völlig weich an, die *Sclerotica* ist rings um die *Cornea*, wie bei jungen Kindern, bläulich, und die Lichtempfindung ist unsicher. — Wenn der graue Staar mit *Amaurosis* örtlich complicirt ist, so wird die Diagnose bei vollkommner Amaurose leicht sein; denn dann findet man die Pupille ungewöhnlich grofs, die Regenbogenhaut starr und der Kranke kann weder Tag noch Nacht unterscheiden. Bei geringern Graden des schwarzen Staares aber, wird die Erkenntnifs oft äufserst schwer; die Entstehungsgeschichte der Krankheit, kann hier noch am besten Aufschlufs geben.

Die Aetiologie des grauen Staares. — Zu den vorzüglichsten Ursachen des grauen Staares gehört zuerst: das höhere Alter, denn in diesem verknöchern

und verschliefsen sich die Gefäfse und Knorpel, in diesem werden die Organe nur noch schlecht und unvollkommen ernährt, und in diesem findet man auch die *Cataract* am häufigsten. — Langwieriger Mifsbrauch der Augen, ungewohnter, plötzlicher und starker Lichtreitz, z. B. bei neugebohrnen zarten Kindern, starke und langwierige Einwirkungen der Sonnenstrahlen auf den Kopf und die Augen, Arbeiten bei starkem Feuer, örtliche Einwirkung von concentrirten Mineralsäuren und Naphten, übermäfsiger Genufs geistiger Getränke, Verletzungen des Auges und seiner Linse, miasmatische und cachectische Dyscrasien u. s. w., bringen mehr oder weniger häufig, einen grauen Staar hervor. *Dyscrasien,* wie *Syphilis,* Gicht etc. können den Krystall trüben, ohne gleichzeitig die Klarheit des Glaskörpers oder die Kräfte der Netzhaut aufzuheben. Sind dergleichen pathische Processe im Auge noch nicht abgelaufen, dann werden operative Eingriffe demselben oft doppelt unheilbringend. Ebenso mögen reine Entzündungen der Linsenkapsel und der Linse selbst, den grauen Staar nicht selten herbei führen. Ich bin mit Ph. Walther überzeugt, dafs ein grofser Theil *Cataracte* aus einer Entzündung der Linse und ihrer Kapsel, seinen Ursprung nimmt. Die Entzündungen der durchsichtigen Gebilde des Auges gehen fast immer in *Exsudation* lymphatischer Stoffe über, und verlieren ihre Durchsichtigkeit; zwar nehmen nicht alle Entzündungen solcher Theile, ihren Ausgang auf diese Weise, allein jeder Ausgang, wenn er nicht in schneller Resolution der Entzündung besteht, bringt Undurchsichtigkeit des in Rede stehenden Gebildes. *)

---

*) Es scheint zugleich, als wenn sich die durchsichtigen Theile des Auges, wenn sie verdunkelt werden, fast immer nach den todten Gesetzen der Chemie richten müfsten, denn so nimmt die Linse und die *Cornea*, wenn sie verdunkelt wird, fast beständig eine weifsgraulichte Farbe an, welches immer auf ein Geronnensein des in diesen Gebilden gegenwärtigen Eiweifsstoffes hindeutet; wird hingegen der Glaskörper, der nach meinen chemischen Untersuchungen (ungeachtet *Nicolas, Annales de Chemie, Tome LIII. S.* 312. Ei-

Oefters ist der graue Staar auch erblich oder angebohren, wovon unter andern die Engländer Wardrop und Adams Fälle aufgezeichnet haben; sehr merkwürdige dergleichen Beispiele erzählt Saunders (a. a. O. p. 158.) Wie die Erblichkeit des grauen Staares möglich wird, wie es kommt, dafs Menschen, welche im vorgerückten Alter an dieser Krankheit leiden, Kinder zeugen, welche in demselben Alter dasselbe Uebel bekommen? läfst sich vielleicht auf folgende Weise erklären. Die Erfahrung lehrt, dafs die Kinder den Aeltern nicht nur häufig dem Aeufsern nach ähnlich gebildet sind, sondern, dafs sich auch diese Aehnlichkeit, so weit als menschliche Beobachtungen zureichen, oft auch über die kleinsten somatischen, ja selbst dynamischen Verhältnisse des Körpers erstrecken. Die Mutter besitzt eine von der gewöhnlichen Richtung abweichend verlaufende *Arteria radilis* und genau dieselbe Richtung hat letztere bei der Tochter; die Mutter besitzt eine bedeutende Idiosyncrasie gegen Katzen, die Tochter fällt fast in Ohnmacht, wenn sie nur in die Nähe der letzteren gebracht wird. So ist oft das Kind bis in die kleinsten Details nach derselben Idee formirt, nach welcher die Aeltern gebildet wurden. Sollte sich dasselbe Verhältnifs nun nicht auch über den Organismus der Krystalllinse und deren Sphäre erstrecken? Sollten die ernährenden Gefäfse der Kapsel bei dem Kinde nicht eben so zart und eng construirt sein, als bei dem Vater, der dieser Construction die zeitige Obliteration derselben, in deren Folge die *Cataract* entstand, zu danken hat?!

Betrachten wir das, was ich in ätiologischer Hinsicht über den grauen Staar bereits gesagt habe, genauer, so drängt sich uns die *Genesis* dieser Krankheit fast von selbst auf. Ich glaube, man kann im Allgemeinen alle Arten des grauen Staares in genetischer

---

weifsstoff darin gefunden haben will) kein Eiweifs enthält, verdunkelt, so hat die Verdunklung fast nie die weifsgräulichte Farbe, welche so sehr auf Gerinnung des Eiweifsstoffes hinweiset.

Hinsicht in 2 Klassen theilen, die einander gerade entgegengesetzt sind. Die erste Klasse enthält diejenigen *Cataracte*, welche in Folge eines wahren Absterben der Linse entstehen, indem die organischen Potenzen, welche zu ihrer Ernährung und Erhaltung bestimmt sind, allmählig kleiner, schwächer, unvollkommner werden. Die Zahl der Gefäfschen, welche von dem Ciliarkörper und besonders von der Ciliarkrone nach der Kapsel gehen, wird immer kleiner, indem eines nach dem andern wahrhaft *anihilirt* wird, und obwohl durch die kleinste Quantität von ernährenden Kräften, die Kapsel allenfalls noch rein und klar erhalten wird, so verliert doch die Linse selbst, welche von letzterer erst ihre ernährenden Kräfte bezieht, also gleichsam durch die zweite Hand in ihrer Integrität erhalten wird, allmählig ihre Krystallhelle und stirbt gleichsam ab. Nur nach und nach verliert auch die Kapsel von ihrer Durchsichtigkeit, wird matt und getrübt. Diese *Cataract* finden wir am häufigsten bei alten Leuten; doch können solche Greiselinsen auch bei jüngern Individuen vorkommen. Diese Staarart kann auch erblich sein.

Die zweite Klasse enthält diejenigen *Cataracte*, welche durch einen inflammatorischen oder subinflammatorischen Zustand der Kapsel allein, oder der Kapsel und Linse zugleich entstehen. Die Kapsel allein wird dadurch nur getrübt werden, wenn die Entzündung nicht bedeutend genug war, um die Functionen zu unterdrücken, welche die Kapsel auf die Linse ausübt. In solchen Fällen bleibt die Kapseltrübung häufig partiell. Man bemerkt oft nichts, als einen kleinen weifsgraulichen Streifen, der mit oder ohne peripherischen Nebel dasteht und der nach Ablauf der *Capsulitis* fort und fort als solcher bleiben kann. Bei heftigeren Graden der Entzündung aber, bei denen die Kapsel allgemeiner getrübt erscheint, wird nach und nach auch die Linsenmasse trüb werden. Oft mögen *Rheuma*, Gicht, Scrofeln, *Syphilis etc.* Schuld an der Trübung haben. Nur durch einen inflammatorischen Procefs, können wir uns die *Genesis* der daraus entstehenden *Cataracte* klar denken. Es ist wahrschein-

lich, dafs jene dyscrasischen Proceſse, eigene Symptome haben, die wir aber freilich noch nicht kennen. Ich bin der Meinung, dafs diese zweite Klasse von grauen Staaren sehr zahlreich ist. Wir können das sehr häufige Vorkommen derselben defswegen nicht läugnen, weil uns nicht selten bei Erforschung der *Anamnese* die Zeichen von dagewesener Entzündung zu fehlen scheinen; denn wie leicht wird ein topischer subinflammatorischer Proceſs in einem so kleinen Theile des Körpers übersehen, und wie selten ist es, dafs die Entzündung der Kapsel sich durch eminente Symptome äufsert. Sind wir unter solchen Umständen nicht gezwungen, aus dem Producte auf die Ursache zu schliefsen? Darf uns das geringe quantitative Verhältnifs des Productes abhalten, das ursächliche Moment anzuerkennen? Ein kleiner Druck im Auge, etwas Thränen, einige gewöhnliche *Mouches volantes*, sind oft alles, was einen inflammatorischen Proceſs in der Linsenkapsel begleitet: Symptome, auf die bisher weder Arzt noch Kranker ein bedeutendes Gewicht legten, die aber wohl im Stande sind, Entzündung in einem Organe zu verkündigen, was auf einer niederen Stufe der Organisation steht; daher ist auch Eiterproduction in diesen Parthieen äufserst selten, und nur der möglichst heftige Entzündungsgrad kann sie hervorbringen.

Die Prognose des grauen Staares. — Eine Heilung der *Cataract* durch innere und äufsere Heilmittel ist bei dem jetzigen Stande unseres Wissens noch ziemlich selten möglich; indefs glaube ich, dafs kommenden Geschlechtern auch in diesem Zweige der Heilkunde manches gelingen wird, was uns unmöglich scheint. Für jetzt bleibt aber das einzige Mittel fast jedesmal die Operation; doch kann auch diese, sogar unter den günstigsten Umständen, nicht immer Hülfe schaffen.

Indefs ist der Erfolg der Staaroperation höchst wahrscheinlich günstig: wenn die *Cataract* wirklich ein reines Localübel ist. — Wenn die Organisation des Auges so beschaffen ist, dafs die angezeigte Operationsmethode ohne Schwierigkeit ausgeführt werden

kann. — Wenn der Blinde die Operation mit Ruhe machen läfst, und der Heilung nach derselben kein Hindernifs in den Weg legt. — Wenn der Operateur eine leichte sichere Hand, scharfes Gesicht und völlige Furchtlosigkeit, u. s. w. besitzt. — Wenn die Instrumente nicht complicirt und vollkommen zweckmäfsig sind. — Wenn endlich auch die häuslichen Verhältnifse des Kranken so beschaffen sind, dafs nach der Operation, Nachtheile für das Auge nicht erwartet werden können.

Kurzsichtige werden nach einer, unter den eben angeführten Umständen vorgenommenen Operation, am besten (und zwar ohne Brille) sehen lernen; Fernsichtige hingegen bedürfen einer Brille, um nur die gemeinsten Gegenstände deutlich in der Nähe zu erkennen, weil sie durch Wegnahme der Linse noch fernsichtiger geworden sind.

Der Erfolg der Staaroperation ist auf alle Fälle mehr oder weniger zweifelhaft: wenn der Staar complicirt ist. — Wenn das Auge und dessen Umgebungen nicht bequem zur Operation gebaut sind. — Wenn der Staarblinde dumm, furchtsam und schlecht genährt ist und dem Operateur die nöthigen Eigenschaften mangeln. — Wenn die häuslichen Verhältnisse des Patienten und die Instrumente schlecht sind. — Wenn der Staar unter wiederholten oder langwierigen Kopfschmerzen entstanden ist, sollten diese auch jetzt schon lange Zeit nicht wieder gekommen sein. — Wenn der Kranke Neigung zu catarrhalischen, rheumatischen und rothlaufartigen Beschwerden hat, oder mit einem vulnerabeln Hautorgan begabt ist. — Wenn er früher viel an Convulsionen oder epileptischen Anfällen gelitten hat, oder derselbe scrofulös, syphilitisch, arthritisch, u. s. w. ist. *) — Wenn das Auge, auch nur in

---

*) Auch bei vorhandenen alten Fufsgeschwüren, sollen Operationen an den Augen leichter mifslingen. Benedict widerspricht diesem, und ich selbst habe mehrere Male bei solchen Personen mit dem besten Erfolg operirt; nur mache

der Jugend, oft wiederkehrenden heftigen *Ophthalmien* unterworfen war, oder der Kranke einen cachectischen *Habitus* hat. — Wenn der Staarblinde die Abstufungen des Lichtes nicht bestimmt und deutlich angeben kann, ohne dafs man das Ursächliche davon sogleich im Auge bemerkt.

Der Erfolg der Operation ist sehr zweifelhaft: — bei allen nur einigermafsen hysterischen, hypochondrischen und heftigen Gemüthsbewegungen ergebenen Subjecten. — Wenn der Kranke die Instrumente beim Operiren noch sehen kann. — Wenn der Staar traumatischer Art ist. *) — Wenn sich der Leidende in den Jahren der *Pubertaet* befindet. — Wenn schon ein Auge vereitert war, oder wenn das eine Auge von geschickter Hand mit unglücklichem Erfolg operirt wurde.

Der Erfolg der Operation ist bestimmt mehr oder weniger ungünstig: wenn der Staarblinde ein kupfrigtes Gesicht (*Gutta rosacea*) hat, das nicht von dem Mifsbrauche geistiger Getränke entstanden ist, sondern als Zeuge einer innern Cachexie erscheint. — Wenn der Blinde Reconvalescent von irgend einer Krankheit ist. — Wenn der Staar in einem bedeutenden Umfange mit der Traubenhaut verwachsen, entzündliches Leiden der Augenlieder, oder *Ectropium* des untern

---

man vorher nie Versuche, das Geschwür zu heilen, sondern lasse es gänzlich unberührt.

*) Wenn nach äufserlichen Gewaltthätigkeiten ein Staar entsteht, oder wenn dieser auf eine andere Weise, aber ungewöhnlich plötzlich erscheint, mufs man nicht sogleich zur Operation schreiten, und zwar aus folgenden drei Gründen: 1) In der Regel ist kurz nach dem Auftreten einer solchen *Cataract* noch eine chronische Entzündung in der Linse zugegen und diese würde durch ein mechanisches Eingreifen nur allarmirt werden. 2) Hat man oft bemerkt, dafs auf obige Art schnell entstehende Trübheit in der Linsenkapsel, ganz allein ohne Operation verschwindet und 3) sind Staare, welche nach äufsern Gewaltthätigkeiten entstehen, oft so von ihren organischen Verbindungen mit dem Ciliar- und Glaskörper getrennt, dafs der Staar nach und nach von selbst aufgesogen wird.

Augenliedes, *) der Rest eines Pannus, Lichtscheu u. dergl. vorhanden ist. **)

Ganz mifslingen mufs die Operation, wenn *Amaurosis, Synchysis, Atrophie* und *Hydrops bulbi, Glaucom, Varicositas oculi* oder eine noch bestehende Augenentzündung mit dem grauen Staar verbunden ist.

Die Frage, zu welcher Jahreszeit man operiren solle, ist keinesweges überflüssig; doch auch nicht in allen Fällen mit der Aengstlichkeit zu berücksichtigen, wie Manche wohl zu thun pflegen. Indefs, obgleich man zu jeder Jahreszeit operiren kann, so ist doch die zweite Hälfte des Frühjahres, so wie die erste Hälfte des Sommers, dazu ganz besonders zu empfehlen. Zu dieser Zeit herrschen catarrhalische, rheumatische, gichtische und entzündliche Uebel in der Regel am wenigsten, und diese sind es gerade, welche dem operirten Auge oft so schädlich werden und das kaum erlangte Gesicht zerstöhren. Hat der Blinde nun zu jenen Krankheiten noch eine ganz besondere Anlage und Geneigtheit, so wird man aus doppelten Gründen auf das Gesagte Rücksicht zu nehmen haben.

Insgemein verdunkelt sich die Linse des andern Auges über kurz oder lang, wenn eine *Cataract* in dem einen ohne äufsere Ursache entstanden war; doch kenne ich einige Personen, welche zehn und mehrere Jahre nur in einem Auge den Staar tragen. Man hat beobachtet, dafs wenn die *Cataract* des einen Auges zeitig operirt worden, die Trübung der Linse des anderen Auges dadurch verhindert, und wo sie bereits begonnen, zum Stillstehen, ja zuweilen zum Rückgange

---

*) In der Regel darf man nicht früher operiren, als bis diese Fehler, oder gegenwärtige *Entropia* u. s. w. entfernt sind.

**) Es ist zwar richtig, dafs man bei entzündeten Augen nicht operiren darf; indefs giebt es entzündliche Affectionen, wodurch die Augenlieder und die *Conjunctiva* sehr geröthet erscheinen, die Ränder zusammenkleben, das Uebel aber ganz habituell geworden ist und hartnäckig den Heilmitteln widersteht. Hier haben mehrere Aerzte, z. B. *William Hey*, die nicht sehr verletzenden Staaroperationen, z. B. die Reclination, öfters mit dem glücklichsten Erfolg gemacht.

gebracht werde. John Stevenson bemerkte dieses in *Edinburgh medical and surgical Journal, No. L. XXVII. Octbr.* 1823. und Scarpa hat diese Erfahrung schon früher aufgestellt. Auch ich mufs diesem Erfahrungssatze beitreten, und bemerke nur, dafs derselbe nicht ohne Ausnahme angenommen werden darf.

Partielle Kapselstaare bleiben zuweilen zeitlebens partiell, so dafs sich die Trübung weder in der Kapsel vergröfsert, noch auf die Linse übergeht. Insgemein sind solche beschränkte Trübungen durch *Capsulitis* veranlafst wor en, welche nach Ablauf derselben dergleichen Trübungen hinterliefs. Auch die sogenannte *Cataracta centralis* pflegt immerfort unvergröfsert zu bleiben.

Uebrigens mufs ich der Prognose noch hinzufügen, dafs es sich wohl von selbst versteht, dafs am Staar Operirte, nie das vollkommene Gesicht erhalten, dessen sich ganz gesunde Augen erfreuen. Es ist das wichtig, weil, wenn man dieses den zu Operirenden nicht vorher bemerklich macht, sie selbst nach einer vortrefflich gelungenen Operation mit ihrem wiedererlangten Gesichte ewig unzufrieden sind.

Die Heilung des grauen Staares. — Eine Heilung des ausgebildeten grauen Staares durch Medicamente ist bis jetzt nicht möglich. Man will zwar auch vollkommene Staare blofs durch innere Mittel geheilt haben, indefs meint selbst Richter, dafs dieses doch wohl meistens nur Kapselstaare gewesen sein möchten. Wo einmal die Linse völlig und lange Zeit verdunkelt ist, da behaupte ich mit Wenzel u. v. a., dafs keine einzige sichere Beobachtung einer gänzlichen Heilung durch Medicamente vorhanden ist.

Anfangende *Cataract* aber will man in frühern und spätern Zeiten durch *Mercurialien, Antimonialien, Cicuta, Aconit, Arnica, Millepedes, Tart. stib.* als Emeticum und in *dos. refract. Digitalis, Belladonna* und durch *Pulsatilla* geheilt haben. In neuern Zeiten haben Graefe und Benedict die *Pulsatilla* in *Extract* oder Pulver der Blätter nützlich gefunden. Man hat Galvanismus, Electricität, selbst Magnetismus angewendet,

und bei Kapseltrübungen, hinsichtlich der beiden ersten Mittel auch nicht ohne Erfolg, wie Himly, Loder u. a. beobachtet haben.

Ich habe gefunden, dafs nur die grauen Staare der zweiten Klasse unter folgenden Umständen zuweilen ohne operatives Eingreifen heilbar sind: Wenn der ursächliche inflammatorische Procefs noch im Beginnen ist; wenn er nicht intensiv heftig ist und sich allein auf Theile der Kapsel beschränkt, und die entstandene Trübung nur hauchartig, nicht aber von mehr saturirter Weifse ist. Ob eine nach vor längerer Zeit statt gefundenen Ablauf der früher angeführten Symptome der *Capsulitis*, zurückgebliebene Trübung in der Kapsel der Krystalllinse noch durch innere Mittel heilbar sei? kann ich durch eigene Erfahrung nicht bezeugen; ich glaube aber, man kann die eben angegebenen Mittel versuchen, nur darf man die drastisch wirkenden nicht zu lange fortsetzen, um nicht ein gröfseres Uebel herbeizulocken. In einem vorzüglichen Grade gilt letzteres von dem *Calomel*; man mag ihn immerhin 4 bis 5 Tage in grofsen Dosen, früh und Abends zu 1 bis 2 Gran anwenden, allein nie sollte man denselben lange Zeit fortnehmen lassen, denn ruinirte man dadurch auch nicht immer die Constitution des Kranken, so könnte man doch häufig angehende *Synchysis* veranlassen.

Dafs jene kleinen beschränkten schleichenden entzündlichen Trübungen der Kapsel viel häufiger vorkommen, als man bisher glaubte, davon kann sich der viel beschäftigte Augenarzt bei genauer Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand, bald überzeugen; er wird dann auch die Muthmafsung nicht unterdrücken können, dafs viele derselben Aussprüche im Körper vorhandener Dyscrasien sind, die durch irgend einen Zufall, am häufigsten in Folge unterdrückter Hautthätigkeit in der Linsenkapsel auftreten.

Wie man hier handeln mufs, habe ich unter *Lentitis* schon gesagt und bemerke hier nur noch, dafs man folgende Mittel, äufserlich auf den *Bulbus* gebraucht, heilsam gefunden hat. *Tart. emetic.* in *Aqua lauro-*

ceras. aufgelöst, ebenso Sublimat in demselben Wasser aufgelöst; Salben mit *Merc. praec. rubr.* Benedict sah die Trübung während des Gebrauchs eines Augenwassers mit *Extract. hbae hyoscyami* und einigen Tropfen *Laudan. liquid. Syd.* verschwinden.

Uebrigens mufs man sich da aller Kurversuche enthalten, wo nur das hohe Alter die *Cataract* begründet, und hier gleichsam zur Individualität desselben gehört.

Die Operation bleibt indefs immer das einzige Mittel zur einigermafsen sichern Beseitigung des grauen Staares; man beunruhige den Kranken jedoch nicht durch langes Vorherankündigen der Operation. Sind Congestionen nach dem Kopfe vorhanden, so mache man eine Venäsection, oder sind Verstopfungen und daraus fliefsende Unterleibsbeschwerden zugegen, so hebe man diese vorher. Einige Tage vor der Operation empfehle man Mäfsigkeit und hüte den Kranken vor catarrhalischen Beschwerden. Das ist indefs noch nicht alles, was ein vorsichtiger Operateur berücksichtigen wird, vielmehr kommt noch manches in Betracht, was unbeachtet gelassen, den glücklichen Erfolg der Operation zuweilen vollkommen vereiteln kann. Allein vor nichts haben wir uns bei Operationen am Augapfel selbst mehr zu fürchten, als vor im Körper hausenden Dyscrasien; sie sind es oft, welche gleichsam nur auf einen Reitz lauern, um auf eine ominöse Weise ihre Existenz zu zeigen. Obgleich es nun zwar selten möglich ist, derlei Dyscrasien vor der Operation dauernd und gänzlich zu tilgen, so ist es doch höchst rathsam, denselben einen von dem Kopfe ableitenden Ort anzuweisen. Dieses geschieht meistens am besten durch kleine, mit folgender Salbe offen zu erhaltende Eiterflächen im Nacken, oder auf beiden Armen: ℞. *Hydr. mur. corr. gr. x., Ungt. cantharid., Ungt. basilic.* āā. *ʒjj — ʒjjj. M.* Man wird dabei wohl thun, einige Zeit vor der Operation gelind auflösende und abführende Mittel zu reichen. Niemals sollte man es wagen, Blinde in Wohnungen zu operiren, welche feucht sind, und welche das schon durch den in ihnen herrschenden dumpfigen Geruch verrathen. Bei Vernach-

läfsigung des Gesagten, darf man sich nicht wundern, wenn selbst nach der vortrefflich gelungenen Operation, Entzündungen auftreten, welche dem rein antiphlogistischen Verfahren nicht weichen und eben dadurch ihre dyscrasische Natur manifestiren. Vorbereitungen, wie man sie sonst überall und ohne Berücksichtigung der Individualität des Subjects, zu machen pflegte, sind nicht nöthig. *)

Die Staaroperation selbst wird auf verschiedene Art gemacht; denn entweder wird die Linse blofs niedergedrückt, oder zugleich auch umgelegt, (*Depressio, Reclinatio,*) oder sie wird aus dem Auge gänzlich entfernt, (*Extractio*) oder endlich mittelst einer Nadel durch den Hornhautstich zerstückelt (*Keratonyxis*). Von diesen drei Methoden ist bald die eine bald die andere angezeigt.

Bei jeder Staaroperation ist folgendes im Allgemeinen zu merken: Der Staarblinde mufs auf einem Stuhl ohne Rückenlehne und schief gegen ein Fenster sitzen, damit das Licht nur von der Seite auf beide Augen fällt, und kein dem Operateur hinderlicher Lichtreflex auf der Hornhaut erzeugt wird, auch der Gehülfe nicht gehindert ist, sich mit dem Kopfe des Blinden dem Operateur hinlänglich nähern zu können. Der hinter dem Kranken stehende Gehülfe, fafst mit der rechten Hand, wenn das linke Auge operirt werden soll, den Kopf desselben unter dem Kinn, drückt

---

*) Die Sorgfalt, welche man früher vor der Operation anwandte, wende man lieber nach derselben an und verhüthe das Ueberhandnehmen der mit Recht gefürchteten Entzündung, wobei man aber den Grad der nöthigen Nachbehandlung auf die Art der gemachten Operation und auf das operirte Individuum stützen mufs; oft möchte ein Fehler, wie William Rowley (a. a. O. S. 321.) erzählt, — wo der operirte Kranke aus Vernachläfsigung beinahe verhungert wäre, die Augen aber nicht den geringsten Schmerz u. s. w. auszustehen hatten, und der Erfolg der Operation vollkommner war, als ihn Rowley je gesehen hatte, — von grofsem Nutzen sein.

drückt ihn an seine Brust an, und nähert sich mit demselben dem, vor dem Blinden auf einem etwas höhern Stuhle sitzenden Operateur, nach Erfordernifs mehr oder weniger. Die linke Hand legt dann der Assistent flach auf die linke Seite der Stirn des Kranken, so dafs die Spitzen des Zeige- und Mittelfingers etwas unter dem Rande des obern Augenliedes zu liegen kommen, mit dem Zeigefinger hebt er dann zuerst den Augenliedrand, so viel möglich in die Höhe, und sogleich fährt er mit dem Mittelfinger nach, um den Augendeckel desto gewisser fest zu halten; die beiden Fingerspitzen müssen aber über dem Augenliedrand gegen den Augapfel so weit vorgelegt bleiben, dafs sie den *Bulbus* zwar keineswegs berühren, noch viel weniger drücken, sondern dafs nur das Auge mit seiner Hornhaut, als dem höchsten Punkte, leise an die Fingerspitze streift, wenn es sich etwa nach oben vor dem eindringenden Instrumente flüchten sollte, und es folglich von dieser, dem Operateur lästigen Verstellung, sogleich zurück gescheucht wird. Der Operateur selbst sitzt so vor dem Blinden, dafs dessen Kopf gerade seiner Brust gegenüber steht, damit er von oben her während der Operation alles sehr genau im Auge beobachten kann, und damit er die Arme nicht bedeutend aufzuheben gezwungen ist *); mit dem Zeigefinger der linken Hand, wenn das linke Auge operirt wird, zieht er den untern Augendeckel hinlänglich herab — aber die Spitze dieses Fingers mufs ebenso, wie die des Gehülfen, über dem Augenliedrand gegen den Augapfel vorstehen, — den Mittelfinger legt er auf ähnliche Art über die Thränenkarunkel, und in die rechte Hand nimmt er das zur Operation erforderliche Instrument wie eine Schreibfeder zwischen dem

---

*) Im Allgemeinen mufs der Operateur eine Stellung wählen, welche für ihn die bequemste ist. Was in dieser Hinsicht mich betrifft, so operire ich Blinde von grofser Statur am liebsten stehend, von kleiner Statur aber sitzend. Es versteht sich, dafs die individuelle Körpergröfse des Operateurs hierin Abänderungen nöthig macht.

Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Auf diese Weise wird der *Bulbus* während der Operation, ohne alle Feststellungsinstrumente, am besten festgehalten. — Uebrigens mufs der Staar am linken Auge mit der rechten, am rechten Auge mit der linken Hand operirt werden. Bei vollkommen ausgebildeter *Cataract* operiren Beer u. m. a. auch beide Augen zugleich. Soll in diesem Falle der Staar ausgezogen werden, so thut man wohl, erst an beiden Augen den Hornhautschnitt zu machen, dann ebenso die Kapsel zu öffnen, und endlich aus dem einen und dem andern Auge den Staar herauszufördern. Operirt man das eine Auge, wenn das andere noch etwas sehen kann, so thut man wohl, wenn man dieses verbindet. Es ist das Verbinden des nicht zu operirenden Auges aber auch dann vortheilhaft, wenn dasselbe gleichfalls erblindet ist, denn man hindert dadurch die consensuelle Bewegung des anderen Auges und findet defshalb ein leichtes Hülfsmittel, das zu operirende Auge einigermaafsen zu fixiren und ruhiger zu machen. Es ist dieses ein Verfahren, was selbst den geschicktesten und gröfsesten Operateur nicht schändet.

Was nun noch den Werth der verschiedenen Operationsmethoden zu einander betrifft, so ist darüber von jeher viel gestritten worden, so dafs die Aerzte auch bis heute noch in ihren Ansichten sehr differiren; die Einseitigkeit, die Vorurtheile und der Eigensinn mancher Aerzte, gaben dieser oder jener Methode vor allen andern unbedingt den Vorzug, und solche Mediker waren es eben, welche den sonst vielleicht schon längst beigelegten Streit immer von neuem anregten. Manche von ihnen haben ihre Meinung mehrere Male im Leben geändert, je nachdem sie bei dieser oder bei jener Methode die meisten gelungenen Fälle zählten; sie bedachten aber nicht, dafs oft der Zufall ihnen eine Reihe von Fällen vorführte, welche gerade für die eine Methode mehr geeignet waren als für die andere.

Ich will mich in den folgenden Zeilen bemühen, die Vor- und Nachtheile der Hauptmethoden, die *Cataract* zu operiren, hier unpartheiisch nach meiner ei-

genen Erfahrung, in wenig Worten zu berühren, und hoffe, dabei um so mehr vorurtheilsfrei zu schreiben, da ich alle Methoden häufig auszuüben Gelegenheit gehabt habe und keine der andern unbedingt vorziehe, sondern von jeder derselben mit Ueberzeugung behaupte, dafs die Modificationen der Krankheit selbst nicht gestatten, einer einzigen Methode vor allen andern den Vorzug zu geben, und dafs in gewissen Fällen eine jede einzelne durch die andere keineswegs vollkommen ersetzt werden kann.

Im Allgemeinen mufs ich zuvörderst bemerken, dafs in denen Fällen, wo mir die Extraction des Staares angezeigt schien, ich bis jetzt durch diese auch den besten Erfolg, das beste Gesicht, erzielte. Ein minder gutes Gesicht erfolgte im Allgemeinen nach Zerstücklungen des Staares durch die *Cornea*, wenn auch derselbe vollkommen absorbirt worden war. Das am wenigsten gute Gesicht, erhielten die Kranken in der Regel nach gelungener Reclination durch die *Sclerotica*. Das ist es, was ich im Allgemeinen von diesen drei Operationsmethoden rühmen kann. Es ist natürlich, dafs dieses alles manche Ausnahme erleidet.

Die Vortheile, welche die Nadeloperationen durch die vordere Augenkammer, gewähren, sind nicht unbedeutend, denn das Manöuvre ist einmal das leichteste von allen und kann bei kindlichen und kindischen Subjecten ohne Schwierigkeit vollzogen werden. Die Verletzung ist ferner bei gehöriger Vorsicht nicht grofs, vielmehr unbedeutend, wenn der Staar weich, breiartig und halb oder ganz flüfsig ist; daher wird man nach der *Keratonyxe* höchst selten *Ophthalmitis universalis* oder gar gänzliche Vereiterung des *Bulbus* beobachten. Der Kranke braucht nicht die strenge Diät zu befolgen, welche die Ausziehung des Staares gebietet; er darf, wenn man so sagen kann, etwas unfolgsam sein. Die Operation kann endlich mehrere Male wiederhohlt werden, wenn sie beim ersten Male keinen oder einen unvollkommenen Erfolg gehabt hat.

Die Nachtheile, welche die Zerstücklung der *Cataract per corneam* darbietet, bestehen ohngefähr in fol-

genden: Die Netzhaut wird mehr oder weniger erschüttert, wenn die Zerstücklung nur einigermaafsen kräftig vollführt wird, daher auch das Sehen von blauem Schwefellichte, während und zuweilen auch eine kurze Zeit nach dem Manöuvre. Der vordere Theil des Glaskörpers wird immer zerrüttet und zerstöhrt, ob und wie viele Nachtheile dieses bringen mag, wissen wir bis jetzt nicht, indefs ist es merkwürdig, dafs in denen Fällen, wo ich *keratonixirte,* das Gesicht selten so scharf wurde, als nach vollkommen gelungenen Extractionen des Staares. Die *Iris* wird, besonders bei härteren *Cataracten,* nicht selten so erschüttert, dafs sie zuweilen theilweise gelähmt bleibt, wodurch das nachkommende Gesicht einigermaafsen auch beeinträchtigt wird, obgleich während der Operation die *Iris* von der Nadel nicht unmittelbar berührt worden. Der Staar und dessen Kapsel wird meistens äufserst langsam verzehrt und kann, wenn nicht durch Wiederhohlung der Zerstücklung nachgeholfen wird, selbst jahrelang in der hinteren Augenkammer liegen bleiben. Es erfolgt ferner sehr häufig ein subacuter Entzündungsprocefs, nicht allein in der *Iris* und *Uvea,* sondern auch in denen, diesen nahe liegenden Gebilden, besonders in der *Capsula lentis,* wenn diese nicht allseitig aus ihren organischen Verbindungen herausgerissen wurde. Wird dieser Procefs nun auch bald geheilt, so bleiben doch häufig Verwachsungen zwischen den Kapselflocken und dem Pupillarrande, wodurch das Gesicht mehr oder weniger behindert wird. Die Instrumentalnachhülfen sind in diesem Falle meistens mühevoll, für die Regenbogenhaut beleidigend, und haben nicht selten einen unvollkommenen Erfolg, besonders wenn die Linsenmasse selbst bereits vollkommen absorbirt worden ist.

Die Vortheile nun, welche die *Reclinatio et Depressio per scleroticam* gewähren, sind ohngefähr folgende: Sie können gegen alle Arten *Cataracte* angewendet werden, wenigstens hat man Beispiele ihres glücklichen Erfolges bei allen Arten. Die Entzündungen, welche folgen können, sind in der Regel extensiv nicht so heftig, als hierzu nach Extractionen des

grauen Staares, die Möglichkeit gegeben ist. Sie kann, wenn sie ohne Erfolg bleibt, zum zweiten und zum dritten Male wiederhohlt werden. Sie ist leichter zu machen, als die Extraction.

Dagegen wird bei diesen Operationsmethoden die Netzhaut, obgleich nicht unmittelbar, doch mittelbar in allen Fällen erschüttert; daher das schwefelblaue Feuer, welches die Kranken während und einige Zeit nach dem Manöuvre bemerken. Wird die *Retina* heftiger gedrückt, so erfolgt *Amaurosis*. Der vordere Theil des Glaskörpers wird bei der Reclination destruirt. Das Durchstechen der *Sclerotica* und der unterliegenden Gebilde setzt viel leichter eine verderbliche Entzündung, als das Durchstechen oder Durchschneiden der *Cornea*. Auch können bei dem Einstich die Ciliarnerven ohne Schuld des Operateurs verletzt werden, wodurch heftige Schmerzen im Auge und im Kopfe, Uebelkeiten, Erbrechen, Herzklopfen und sogar Zuckungen erzeugt werden können, welche den glücklichen Erfolg der Operation zu schmälern oder gar zu vernichten im Stande sind. Man kann nicht zu allen Zeitmomenten der Operation das Instrument beobachten. Der niedergedrückte oder umgelegte Staar, kann ganz oder zum Theil wieder aufsteigen, und somit dem Lichte den Zutritt zur *Retina* versperren. Bei dem Manöuvre selbst, kann die Netzhaut äufserst leicht unmittelbar verletzt werden. Wenn auch nach allen diesen Möglichkeiten das Gesicht nicht völlig vernichtet wird, so kann doch dasselbe schwach bleiben und häufig eine subacute Entzündung der innern edeln Gebilde veranlafst werden, welche, je schleichender sie einhergeht, um so schwerer zu überwältigen ist, und die zuweilen unheilbare Destructionen im Innern des *Bulbus* hinterläfst.

Die Vortheile der Extraction des Staares gehen im Allgemeinen aus folgendem hervor: Der Staar wird gänzlich aus dem Auge entfernt, und nicht allein aus der Sehaxe; sie ist daher wirklich Radicaloperation. Kleine subacute Entzündungen der *Iris* und der anderen innern Gebilde, welche den guten Erfolg der übri-

gen Methoden so häufig vernichten, sind selten, und die heftigeren, welche eine gänzliche Verwachsung der Pupille veranlassen können und die insgemein in den ersten 5 bis 6 Tagen nach der Operation sich einstellen, weichen der streng antiphlogistischen Methode, wenn sie nicht durch Vorfälle der *Iris etc.* unterhalten werden. Der Glaskörper wird nicht verletzt, und behält seine Integrität, wenn vorsichtig und geschickt operirt wird und der Blinde während der Operation Ruhe hält. Ebenso wenig können die Netzhaut, sowie die übrigen innern Gebilde verletzt werden, woher es auch kommen mag, dafs wir nach dieser Methode die subacuten Entzündungen dieser Theile vermissen; überhaupt bleiben die edeln, zum Sehen am nothwendigsten Organe ungestöhrter, als bei allen übrigen Methoden. Die wäfsrigte Feuchtigkeit wird vollkommen ausgeleert, und sammelt sich auch nicht eher bleibend im Augapfel, bevor die Hornhautwunde nicht wenigstens zusammengeklebt ist, wodurch den kleinen Entzündungszuständen gewifs kräftig vorgebeugt wird; dagegen bei Nadeloperationen der *humor aqueus* oft schon nach einigen Stunden den Augapfel wieder füllt, dann nach Verschliefsung des Einstichspunktes, in Folge des durch die Operation verursachten Reitzzustandes, diesen damit überfüllt, und somit die hinzukommenden inflammatorischen Zufälle gewifs oft nährt. Der glückliche Erfolg der Ausziehung des Staares hängt mehr als bei allen übrigen Operationen von der Geschicklichkeit des Arztes ab.

Die vornehmsten Einwürfe, welche man gegen diese Operation gemacht hat, sind die angeblich gröfsere Verletzung des Auges, und allerdings ist diese extensiv gröfser, als bei allen übrigen Operationsmethoden des grauen Staares; der Zutritt des Lichtes auf die Netzhaut ist bedeutender, und kann besonders dann nachtheilig werden, wenn der ausgezogene Staar grofs, *Cataracta capsulo lenticularis* war und der Kranke schon vor langer Zeit erblindete. Die Luft tritt in das Innere des Augapfels, wenn der Hornhautlappen unvorsichtig gelüftet wird. Die Pupille wird beim Durch-

gehen des Staares mehr oder weniger ausgedehnt, und der untere Rand derselben gedrückt; doch scheint dieses nur dann nachtheilige Folgen zu haben, wenn der Hornhautschnitt zu klein gerathen war, indem hier der untere Theil des Pupillarrandes bei dem Austreten des Staares in die Hornhautwunde gleichsam eingequetscht wird. Der Glaskörper kann vorfallen, wenn der Kranke unruhig ist, oder wenn unvorsichtig operirt wird. Die Nachbehandlung mufs vorsichtiger, die Diät strenger, selbst die Lage des Kranken viel ruhiger sein, als bei den übrigen Methoden. Nach schlecht verrichteter oder nicht indicirter Extraction, bei Vernachläfsigung und Unfolgsamkeit der Operirten, können in den unglücklichsten Fällen die intensiv und extensiv heftigsten Entzündungen entstehen, welche zuweilen mit völliger Colliquation des *Bulbus* endigen. Die Ausziehung kann nicht repetirt werden. Sie ist überdem die schwerste aller Staaroperationsmethoden. Der glückliche Erfolg der geschickt gemachten Ausziehung des Staares, hängt viel mehr von dem nachherigen guten Verhalten des Operirten ab, als dieses bei den übrigen Methoden der Fall ist.

Dieses wären ohngefähr die Hauptpunkte, aus welchen der Werth der verschiedenen Methoden zu einander im Allgemeinen beurtheilt werden dürfte. Vergleichen wir dieselben mit einander, so müssen wir gestehen, dafs es ein Glück ist, wenn wir Staare zu operiren bekommen, welche die Extraction zu machen erlauben. Hier ist eine geschickt gemachte Ausziehung des Staares bei strenger Folgsamkeit des Operirten, nur eine leichte Verwundung, und der nothwendig folgende Entzündungsprocefs läuft, vom Kranken unbemerkt, vorüber. Sie ist daher im Allgemeinen die vorzüglichste, wenn gleich in manchen speciellen Fällen, nicht immer die beste, die zweckmäfsigste Methode. Denn wie in allen Zweigen der practischen Heilkunde, so mufs auch hier die genaue Sichtung der einzelnen Fälle, der passenden Auswahl der Operationsmethode vorausgehen, sobald man mit möglichst glücklichem Erfolg *Cataracte* zu heilen hoffen will. Da wo die Aus-

ziehung des grauen Staares angezeigt ist, kann sie allen übrigen Methoden vorgezogen werden. Dafs dieser Grundsatz von den Aerzten nicht immer befolgt wird, liegt oft, auch bei den denkenden, an einer gewissen Einseitigkeit und Gewohnheit im Handeln, die man Schlendrian nennen könnte; oft ist Furchtsamkeit, Mangel an Zutrauen zu sich selbst, unsichere Hand, Furcht vor der Möglichkeit des totalen Verlustes des *Bulbus*, u. s. w. Schuld daran. Aus ähnlichen Gründen wählt der Anfänger am liebsten die leichteste Methode. Zu Gunsten der Extraction kann ich noch hinzufügen, dafs, so oft ich selbst dieselbe verrichtete, und das ist sehr oft gewesen, (in den letztvergangenen drei Monaten, machte ich sie neun Mal) habe ich nach derselben noch keine solche Entzündung beobachtet, welche den glücklichen Erfolg derselben vereitelt und das Gesicht verwüstet hätte. Die fatalsten Zufälle, welche ich selbst erlebt habe, waren in drei Fällen ein Anlegen der *Iris*, an und in den innern Rand des Hornhautschnittes und partielle Verwachsung des Pupillarrandes mit letzterem, wodurch die Pupille verzogen erscheint, die Operirten aber mittelst Brille gut lesen und schreiben können, und vier Mal einen kleinen Vorfall des Glaskörpers, welcher gleichfalls jene Verwachsung zur Folge hatte, auf das erfolgte gute Gesicht aber, keinen sehr nachtheiligen Einflufs gehabt zu haben scheint. An diesen Zufällen war ich entweder selbst, oder die Unruhe und Unfolgsamkeit des Operirten Schuld. In den meisten Fällen aber, empfanden die Kranken nicht den geringsten Schmerz; in allen Fällen erhielten sie das Gesicht zurück; kein einziger ist darunter, welcher mittelst Brille nicht zu lesen und zu schreiben im Stande wäre. Könnte ich doch dasselbe von allen von mir gemachten Nadeloperationen rühmen. Eine Hauptsache, welche man beachten mufs, wenn die Extraction glücklich ablaufen soll, besteht in Vermeidung aller bedeutenden Nachhülfen unmittelbar nach der Operation, besonders des Herausfischens von Staarpartikeln, welche sich vielleicht von der sulzigen Oberfläche der Linse beim Her-

austreten abstreifen; man kann sicher darauf rechnen, dafs diese weichen, schmierigen Flocken, auch bei alten Leuten in kurzer Zeit absorbirt werden. Warum will man also durch dieses gerühmte Fischen mit dem Daviel'schen Löffel im Innern des Augapfels, diesen in Gefahr setzen; es sieht sich allerdings sehr gut zu, wenn es mit so geschickter Hand verrichtet wird, als Beer dieses that, allein auch diesem anerkannt geschickten Operateur, kamen in dergleichen Fällen die heftigsten Entzündungen gar nicht selten vor.

So weit von der Staaroperation im Allgemeinen.

Doch bevor ich zu den verschiedenen Operationsmethoden des grauen Staares selbst komme, sei es mir erlaubt, zum Nutzen der Anfänger einen geschichtlichen Abrifs derselben in wenig Worten voraus zu schicken:

In frühern Zeiten, wo man die Krystalllinse für das Organ hielt, welchem die Sehkraft angehöre, glaubte man, dafs der Staar ein in und hinter der Pupille flottirendes Häutchen sei und suchte den Sitz desselben keinesweges in der Linse selbst, obwohl einige frühere Aerzte schon dieses zu ahnen wagten.

Im Jahre 1604 bewies Kepler, dafs die Linse nur ein mittelbares Organ des Gesichts sei, und dafs sie die Lichtstrahlen nicht in sich behalte, sondern diese durch jene nur gebrochen und auf die Markhaut, als das die Sehkraft eigentlich enthaltende und leitende Gebilde, zusammengebracht würden. Franz Quarre und Remi machten Kepler's Ideen bekannt, und letzterer vertheidigte seine Streitschrift: Ob man die Heilung des Staares dadurch bewirken könne, wenn man eine Nadel in das Auge durch die Linse führe? Einige Jahre nachher, theilten Peter Borel, Theophilus Bonnet, Blegny, Lucas Tozzi, Geoffroi, Samuel Polisius und Bernhard Albinus ihre Beobachtungen mit, dafs der graue Staar fast immer in einer Farbenumänderung und Undurchsichtigkeit der Krystalllinse bestehe. Im Jahre 1664 erklärte sich Rolfink in seiner Dissertation: *De cataracta*, und im Jahre 1699 Schelhammer in seiner Disser-

tation: *De suffusione* für dieselbe Meinung. Im Jahre 1707, 1708 und 1709 ward sie von Maitre-Jean, Mery und Heister bestätigt. Bald darauf zeigten De la Peyronie und Morand bei der Pariser Akademie, Staare vor, welche in einer Verdunklung der vordern und hintern Wand der Linsenkapsel bestanden. (Langenbeck's Bibliothek etc. 1. B. S. 520.)

Die erste Operationsmethode war die *Depression*, welche schon Galenus kannte. Man bediente sich dazu Nadeln von verschiedener Gestalt. Einige hatten runde, andere lanzenförmige zweischneidige: unter welchen man letzteren den Vorzug gab. Man brachte die Nadel anderthalb Linien vom Rande der Hornhaut ein, schob sie in horizontaler Richtung fort, bis zur Mitte der Linse, senkte den Griff und hob dadurch die Spitze; zugleich ward dieselbe so gedreht, dafs die eine Fläche der Nadel aufwärts und die andere abwärts gerichtet auf die Linse kam. Nun ward die Linse langsam hinunter gedrückt. Im Jahre 1707 schlug Ferrein vor: Man solle am untern Rande der Linse erst mit dem einen schneidenden Rande der Nadel die Kapsel öffnen und dann die Linse niederdrücken. Man mochte die Operation nach der einen, oder der andern Methode verrichten, so fiel der Erfolg nicht nach Wunsche aus. Diejenigen Zufälle, welche man nach der *Depression* beobachtet haben will, waren heftige Schmerzen, Erbrechen, Entzündung, Fieber, Eiterung und Verdunklungen der Kapsel.

Im Jahre 1716 erklärte sich Hovius zuerst gegen die *Depression.* Rau hielt sie für eine der ungewissesten chirurgischen Operationen, und wollte sie nie wieder unternehmen. Heister erklärte sich ebenfalls dagegen. Unter allen Kranken, welche durch die *Depression* operirt worden waren, erlangten wenige ihr Gesicht wieder. Von allen, welche in den Jahren 1750, 1751 und 1752 operirt worden waren, hatte kaum Einer von Hundert sein Gesicht wieder erhalten. Fast alle Wundärzte thaten nun Verzicht auf diese Operation, die nun nur noch mit den Händen herumziehender Augenärzte geübt wurde.

Auf die *Extraction* der *Cataract* scheint man durch den Zufall geleitet worden zu sein, dafs ein Stück der Krystalllinse in die vordere Augenkammer gerieth und hier mit Erfolg ausgeschnitten wurde. Nicht Petit, nicht Daviel, auch nicht St. Yves, der schon 1707 einen Staar auszog *), scheinen sie zuerst gemacht zu haben; vielmehr war nicht blofs die Idee dazu früher schon vorhanden, sondern sie war auch verrichtet worden. Schon Albukasius schlug vor, eine hohle Nadel in das Auge zu stofsen und damit die flottirende Haut, worin seiner Meinung nach der Staar bestand, herauszuziehen. Zu Avizenna's Zeiten öffneten einige den untern Theil des Auges, um den Staar auf diesem Wege herauszubringen. Petit öffnete die Hornhaut, indem er eine Lanzette auf der Rinne einer Nadel unter der Pupille in die vordere Augenkammer führte, und brachte den Staar, welcher eine *cataracta crystallina* war (worüber man sich sehr wunderte, indem man nur eine Membran vermuthet hatte) mit einem kleinen Löffel heraus. Daviel erfand um das Jahr 1745 zur *Extraction* eigene Instrumente. Mit einer breiten lanzenförmigen Nadel öffnete er den mittleren und untern Theil der *Cornea*; dann brachte er eine längere, schmälere, vorn abgestumpfte, zweischneidige Nadel ein, um die Oeffnung in der Hornhaut damit zu erweitern. War die Oeffnung noch nicht grofs genug, so gebrauchte er eine Scheere. Den Austritt des Staares bewirkte er mit einem Löffel. Letztere beide Instrumente sind noch bis auf unsere Zeiten gekommen, und brauchbar befunden worden. Daviel führt an, dafs von 206 Personen, die von ihm operirt waren, 182 ihr Gesicht wieder erhalten hätten. Coqué in Rheims benachrichtigte, dafs von 34 Staarblinden, welche Daviel dort operirt hatte, 17 ihr Gesicht vollkommen wieder erhalten hätten; bei 8 Personen sei die Operation ziemlich gelungen und 9 hätten ihr Gesicht verlohren.

---

*) *Histoire de l'acad. Roy. des sciences de l'année.* 1707.

De la Faye erfand ein Messer, womit er die Hornhaut vom äufsern zum innern Winkel durchschnitt, dessen Klinge 20 bis 21 Linien lang war, vorn eine 2 Linien lange zweischneidige Spitze und einen stumpfen Haken hatte; die Loesung des Staares nahm er mit seinem *Cystitom* vor. Schon im Jahre 1752 schlug Palucci in seiner Abhandlung über die *Depression*, ein *Bistourie* vor, von welchem er sagt, dafs es eine Schneide habe, die in einiger Entfernung von der Spitze anfinge und gegen den Griff allmählig breiter würde. Zu der nähmlichen Zeit hatte auch Scharp ein Messer erfunden, welches auf dem Rücken convex und an der Schneide concav war. Im Jahre 1753 theilte Scharp den Erfolg seiner Methode mit, der aber nicht günstig lautete. Berenger wählte darauf ein Messer, welches die vorigen dadurch sehr übertraf, dafs es so geformt war, dafs der Schnitt in der Hornhaut durch das bloſse Fortschieben desselben, ohne es abwärts zu ziehen, bewirkt wurde. Er bediente sich eines Hakens, um das Augenlied in die Höhe zu ziehen, hob den Lappen der Hornhaut mit einer kleinen Pincette auf, und öffnete die Kapsel mit der kleinen lanzettenförmigen *Daviel'schen* Nadel. Diese letzteren Instrumente von Berenger, wurden nicht weiter gebraucht. Pamaart erfand einen Spiefs, womit der Augapfel befestigt ward, welchem Casaamata die Gestalt eines römischen *S* gab, und Rumpelt auf einen Fingerhut setzte. Wenzel verwarf Augenspiegel, Augenhaken und Augenspiefse, liefs das obere Augenlied von einem Gehülfen in die Höhe halten, und zog das untere selbst herunter. *) Sein Messer ist nach den nähmlichen Grundsätzen eingerichtet, als das des Berenger, nur hat es eine längere Spitze und vorn keine gewölbte Fläche. Barth operirte ohne Gehülfen, was bei hervorstehenden Augen oft gut geht. Wenzel vervollkommnete und ver-

*) Die Feststellungsinstrumente haben für uns nur in historischer Hinsicht Interesse, sie gehören in die Geschichte der Chirurgie.

einfachte die Extraction; wogegen Guerin sie complicirte, indem er seinen Augenschnepper erfand, um den Hornhautschnitt zu machen. Eckhold verbesserte diesen. In den neuesten Zeiten hat Hr. Prof. Dzondi einen solchen Schnepper wieder erfunden, nicht aber behufs der Extraction, sondern um zu versuchen, eine neue Hornhaut anzuheilen; in der That eine sehr kühne Idee! Im Jahre 1763 beschrieb Siegerist sein Staarnadelmesser, mit welchem er zugleich während und im Verlaufe der Anfertigung des Hornhautschnittes, auch die Linsenkapsel öffnete. Verletzungen der *Iris* und des Nasenwinkels sind beim Gebrauche dieses Messers nicht gut zu vermeiden. Nun erfand Barth, dann Richter sein Messer, und Beer modificirte das Barth'sche durch eine bessere lanzettenförmige Spitze und eine kürzere Gestalt desselben. Die nicht Beer'schen Messer, welche hie und da in Deutschland gebraucht werden, weichen doch nur wenig von letztern ab.

Die *Extraction* des Staares verdrängte fast gänzlich die früher allein herrschende *Depression*. In neueren Zeiten drohete die modificirte *Depression*, nähmlich die *Reclination*, die Ausziehung in sehr enge Gränzen zurückzuweisen. Besonders brachte sie Scarpa in bedeutenden Ruf, und Beer u. a. würdigten sie ihrer vorzüglichen Aufmerksamkeit, und suchten den Kreis ihrer Wirksamkeit auszumitteln und anzuweisen.

Obgleich schon früher vorhanden, trat doch erst in der neuesten Zeit eine Operationsart mehr an's Licht, welche den praktischen Ruf der bisher gebräuchlichen Methoden sehr zu schmälern drohte, nähmlich: die *Keratonyxis*, der Hornhautstich mit Zerstücklung der Linse. Schon Theod. M. Turquet (*Praxis medica, Lond.* 1690.) erzählt einen Fall ihrer Anwendung, wo ein Weib die Operation mittelst einer Nadel ausübte. Dann wird eines, obwohl von den bis jetzt erfundenen Verfahren mehr abweichenden, Falles gedacht in einer Dissertat. von Willars: *An oculi punctio cataractam praecaveat?* in *Haller. Disput. chirurg. Lausann.* 1755. *Tom. II. p.* 157. Noch frü-

her soll sie schon mein berühmter Vorgänger, der Dresdner Augenarzt Bartisch gemacht haben. Später Pott, dann Gleize, Conradi u. a. Doch alles dieses und mehreres noch, was mir nicht gleich beifällt, schienen die Aerzte vergessen zu haben; hatten es wenigstens fernerer Aufmerksamkeit nicht gewürdigt, bis Buchhorn (*De Keratonyxide nova cataractae aliisque ocul. morbis medendi methodo etc.* 1810.) und zugleich Langenbeck (Prüfung der *Keratonyxis*, Göttingen 1811. Mit 2 Kupfertafeln, und dessen Biblioth. für Chirurg. etc.) so kräftig und besonders letzterer mit so günstigen Operationsgeschichten an Lebenden auftraten, dafs sie nicht blofs das Interesse der deutschen, sondern auch der ausländischen Aerzte auf die *Keratonyxe* lenkten.

Der verdienstvolle Himly hatte in seinem Journale die Wirkung des *Hyoscyamus* bekannt gemacht, und das trug ganz besonders dazu bei, die neue Methode zu erleichtern und fast in allen Fällen ausübbar zu machen. Die Leichtigkeit des ganzen Verfahrens und die äufserst vortheilhaften Zeugnisse Langenbeck's hinsichtlich des gesichtwiederherstellenden Erfolgs, spornten nun eine Menge mündiger und unmündiger Aerzte an, die neue Methode zu versuchen und auszubreiten. Bald überschritt sie die Gränzen Deutschlands. Die reifern Aerzte des Auslandes bekamen zuerst Kenntnifs davon, übten sie, würdigten ihren Nutzen, ihre Vortheile; doch nicht mit dem Enthusiasmus und der Vorliebe für dieselbe, als Viele der Deutschen. Die Resultate ihrer Untersuchungen in Frankreich und Italien, lauteten weit weniger günstig, als die im nördlichen Deutschland. Geschworen zu ihrer Fahne der Extraction oder Reclination, abgeschreckt durch einige ungünstige Erfahrungen, haben sie grofsentheils das neue Operationsverfahren verlassen oder ihm doch engere Gränzen angewiesen als meine nördlichen Landsleute.

Ganz neuerlich scheint auch unser geschickter und verdienstvoller Langenbeck, der vorzüglichste Beförderer der *Keratonyxe* in Deutschland, die glückli-

chen Erfolge nicht mehr in dem Umfange zu finden, als früherhin. (Man sehe unten das Weitere.)

Gewifs, die *Keratonyxe* hat vieles Gute, doch wird sie schwerlich je die übrigen Operationsmethoden aufser Gebrauch bringen. Eine Universalmethode, den Staar zu operiren, giebt es nicht und kann es nicht geben! Die Individualität der Krankheit, erfordert hier, wie in andern Fällen, individuelle Berücksichtigungen, individuelle Heilmethoden. Die zweckmäfsigste Methode aufzufinden und diese richtig anzuwenden, das ist die Kunst, welche dem Heilkünstler seine Gröfse giebt.

Die Niederdrückung und Umlegung des Staares, *Depressio et Reclinatio cataractae.* — Beide Operationsmethoden haben drei Momente, von denen die zwei ersten, sowohl bei der *Depression* als bei der *Reclination*, ganz gleich sind; nur der dritte Moment unterscheidet beide Methoden.

I. *Moment.* — Man sticht mit einer lanzenförmigen Staarnadel, Taf. V. F. 10, in dem äufsern Augenwinkel, eine, höchstens $1\frac{1}{2}$ Linie von dem Rande der *Cornea* entfernt und ohngefähr eine starke Linie unter dem horizontalen Durchmesser des Augapfels, so in die *Sclerotica* ein, dafs eine Fläche der Nadel aufwärts, die andere abwärts und ihre Spitze gegen die Mitte des Augapfels gerichtet ist. *) Die Hand, mit

---

*) Man sticht defswegen eine und eine halbe Linie von dem Rande der *Cornea* in die *Sclerotica* ein, damit man weder das *Corpus ciliare* noch die *Retina* verletzt; wird das erstere verletzt, so erfolgen Uebelkeit, Erbrechen, zuweilen Herzklopfen, selbst Krämpfe, unregelmäfsige Erweiterung der Pupille und endlich alle Zeichen einer sehr heftigen *Iritis*: wird die letztere durchstochen, so erfolgen Feuer-Funken- und Farbensehen, totale Blindheit und fürchterliche periodisch wiederkehrende Schmerzen des Auges, der Stirn und des ganzen Kopfes; — man führt die Nadel so ein, dafs die eine Fläche nach oben die andere nach unten gerichtet ist, um Verwundungen der *Ciliar*gefäfse zu vermeiden, welche immer horizontal nach vorn laufen; — man sticht endlich unterhalb des horizontalen Durchmessers des *Bulbus* in die *Sclerotica*, weil gerade im *Diameter* die stärksten Gefäfse laufen und weil die Nadel wie ein Hebel wirken mufs.

welcher der Operateur die Staarnadel gefafst hat, mufs auf die Wange des Blinden mit ihrem kleinen Finger gestützt werden, damit die Nadel, wenn sie mit ihrem breitesten Durchmesser einmal durch die *Sclerotica* eingedrungen ist, nicht etwa mit ihrem Halse zu schnell und zu tief in das Auge dringt. II. *Moment.* — Jetzt wird das Instrument so um seine Axe gedreht, dafs sich das Heft desselben an die Schläfe zurückdrängt, und die Spitze eben daher parallel mit der Traubenhaut und gegen den innern Augenwinkel hin, die eine Fläche der Nadel aber nach vorwärts, die andere nach rückwärts, die eine Schneide nach aufwärts, die andere nach abwärts gerichtet ist; nun dringt der Operateur in die hintere Augenkammer, zwischen der Linse und Traubenhaut, langsam so weit vor, bis die äufserste Spitze der Nadel, etwas hinter dem innern Pupillarrande der *Iris* versteckt ist, und die hintere Oberfläche der Nadel auf der vordern Fläche des Staares liegt. III. *Moment* bei der *Depression.* — Nachdem man die Nadel sogleich auf dem obersten Theil des Staares so gelegt hat, dafs sie schief, mit der Spitze etwas nach rückwärts, und diejenige Fläche, welche vorher auf der vordern Oberfläche des Staares geruht hatte, jetzt nach dem obersten Rande des Staares gerichtet ist, drückt man ihn, nach den Gesetzen des Hebels, etwas schief nach unten und aufsen unter die Pupille so weit herab, dafs er nicht mehr bemerkbar ist, dann hebt man die Nadel leise noch einmal auf, um zu sehen ob die Linse wirklich liegen bleibt und endlich zieht man sie in derselben Richtung, in welcher sie eingeführt worden ist, wieder aus dem Auge. III. *Moment* der *Reclination.* — Hier bringt man die auf der vordern Fläche des Staares liegende Nadel, nicht mehr aus der Richtung des zweiten Momentes, *) sondern hebt blofs ihr Heft hebelartig in einer Diagonalrichtung, nach vorn auf, damit die kranke

*) Doch ist es gut, wenn man die Nadelfläche etwas mehr an der obern Hälfte der Linse auflegt.

ke Linse durch den Druck der Nadel, so zwischen dem untern und äufsern geraden Augapfelmuskel in dem Glaskörper zu liegen kommt, dafs ihre vordere Oberfläche jetzt die obere, ihre hintere die untere, ihr oberer Rand jetzt der hintere und ihr unterer Rand der vordere wird.

Zuweilen kommen bei der *Reclination* folgende Zufälle vor, die man durch besondere Kunstgriffe unschädlich zu machen suchen mufs. Manchmal zerreifst während des Reclinirens die Linsenkapsel, welche dann die Pupille verdunkeln kann; hier soll man die Kapsel in allen Richtungen mit der Nadel zerschneiden, und möglichst von der Pupille entfernen. Zerfällt die Linse während der Operation in einzelne Stücke, so mufs man die gröfsern davon recliniren, die kleinern aber, nach Scarpa, *) in die vordere Augenkammer schieben, wo sie schneller als in der hintern Kammer aufgesogen werden. — Hat man einen mit der Traubenhaut nur partiell verwachsenen Staar vor sich, so mufs man zuerst mit der Schneide der Nadel die verwachsenen Stellen, wie Werner zuerst empfahl, zu trennen suchen, bevor man die Linse umlegt. — Findet man einen Staar, der immer wieder aufsteigt, ohne dafs ihn der Operateur unvorsichtiger Weise mit der Nadel wieder in die Höhe zieht, ist vielmehr eine Verwachsung der hintern Linsenkapsel mit der Hyaloidea in der tellerförmigen Grube Schuld, so mufs der Operateur auch hier mit der Nadel die Verwachsung zuerst trennen; sollte aber ein Aufspiefsen der Linse an dem Wiederaufsteigen Schuld sein, so mufs man die Nadel zurückziehen, die Umlegung von neuem verrichten, oder — wenn der an der Nadel festsitzende Staar in dem Grunde des Auges mit derselben befindlich ist, — sie nicht wie-

---

*) A. a. O. Vol. II. pag. 53. Von diesem Manöver fürchten andere, (z. B. Himly in Ware's chirurg. Beobacht. II. Band, bei Wenzel's Abhandlungen über d. gr. Staar, S. 10.) Entzündung, als *Iritis* u. s. w., indefs versichert Scarpa das Gegentheil.

der aufheben, sondern ein paar Mal, ehe man sie herauszieht, um ihre Axe drehen. Auch ohne dergleichen Ursachen steigt der Staar, nach der *Reclination* zwar sehr selten, nach der *Depression* aber häufiger, wieder in die Höhe und hebt somit das kaum erlangte Gesicht wieder auf; man verhütet dieses Wiederaufsteigen am besten dadurch, dafs man die richtig niedergedrückte oder umgelegte Linse, mit der noch auf ihr ruhenden Nadelfläche in ihrer Lage etwas zurückhält, und nicht gleich wieder die Nadel aus dem *Bulbus* zurück zieht.

Die Behandlung nach der *Depression* und *Reclination* ist höchst einfach. Nachdem man, ohne Sehversuche zu machen (die hier leicht das Wiederaufsteigen der Linse bewirken) die Augenlieder durch einen senkrecht gelegten schmalen englischen Heftpflasterstreifen geschlossen hat, befestige man auf der Stirn eine leinene Compresse, die das Auge bedeckt, und empfehle dem Kranken einige Tage strenge Ruhe des Körpers und der Seele, verdunkle dabei das Zimmer mäfsig, lasse den Operirten sitzen *) oder liegen, leicht verdauliche Speisen genieſsen und sich vor alle dem hüten, was Entzündung des Auges verursachen könnte. Schon nach 3 bis 4 Tagen kann der Kranke den Verband mit einem grünen Schirm vertauschen; mufs jedoch noch lange Zeit alles vermeiden, was in dem operirten Auge ein unangenehmes Gefühl erregt.

Sollte etwa während des Einstichs durch die *Sclerotica* eine Blutgeschwulst unter der Bindehaut des Augapfels entstehen, so wird diese meistens ohne Hülfe

---

*) Man empfiehlt vorzugsweise eine sitzende Lage, welche wenigstens bis 24 Stunden nach der Operation beibehalten werden soll, weil man dadurch das Wiederaufsteigen der *Cataract* besser zu verhüten glaubt. Um diesen unangenehmen Zufall möglichst zu verhindern, ist auch eine vollkommene Ruhe des *Bulbus* sehr anzuempfehlen; denn wirken die Augapfelmuskeln in der Zeit schon, wo der Augapfel noch nicht wieder mit der wäfsrigten Feuchtigkeit erfüllt ist, so wird die reclinirte Linse gar leicht wieder ganz oder halb in die alte Lage gequetscht.

der Kunst wieder resorbirt. Schwammigte Auswüchse um den Einstich, bringt *Opiumtinctur* oder *Lap. infernal.* weg. Blutergiefsungen in die Augenkammern, werden, wenn sie unbedeutend sind, beim Waschen mit geistigen Augenwässern resorbirt; wenn sie aber zu grofs sind, durch eine Oeffnung in die *Cornea* ausgeleert. — Ein, durch Verletzung der Ciliarnerven oder der *Retina* entstandenes consensuelles Erbrechen, besänftigen *Valeriana, Moschus, Castoreum, Liq. corn. c. succ., Opium*, und wenn letzteres innerlich nicht vertragen wird, Chamomillenklystiere mit etwas *Opium* u. ähnl. M. Doch kann man von dergleichen Mitteln nur dann einen heilsamen Erfolg erwarten, wenn die Erscheinung entzündungslos auftritt und sich nur als reiner Nervenreitz äufsert. Wo dem Erbrechen Entzündungssymptome vorausgehen oder nachfolgen, da mufs antiphlogistisch verfahren und örtlich kaltes Wasser aufgeschlagen werden. Bleibt das Erbrechen auch nach gemäfsigter Entzündung, dann können jene Mittel in Verbindung mit Salpeter, *Calomel, Tart. depurat.* oder Brausepulver gereicht werden. — Entsteht eine mehr oder weniger beträchtliche Amblyopie, durch zu starkes und tiefes Herabdrücken des Staares nach der *Retina*, so hilft meistens nur das Wiederaufsteigen der Linse, welches durch starke Bewegungen des Kopfes bewirkt wird. In der Regel versichern die Operirten, dafs es ihnen sei, als sähen sie ein Schwefelfeuer, wenn man bei der *Reclination* der Linse, durch diese die *Retina* berührt und drückt. Jedoch ist dieses Zeichen nicht hinreichend sicher, weil es die Kranken in geringerm Grade fast bei jeder einigermaafsen schnell ausgeführten *Reclination* bemerken; denn oft mag es wohl nur der mittelst der Linse gedrückte Glaskörper sein, welcher jene Erscheinung im Auge hervorbringt. — Eine nach der Operation folgende Entzündung wird, wie bei der reinen *Iritis* vorgetragen werden soll, behandelt.

Die *Depression* und *Reclination* soll nach Beer nicht statt finden, wenn der Staar sehr hart ist, weil alsdann die Linse in Zukunft nicht aufgesogen würde.

Indefs ist eine sehr harte Linse nicht immer als Gegenanzeige zu betrachten; man reclinirt vielfältig auch sehr harte Linsen und zwar mit recht glücklichem Erfolg. — Ins besondere sind jene beiden Methoden angezeigt, wenn eine bedeutende *Synechia anterior*, oder eine zu flache Hornhaut, daher zu kleine vordere Augenkammer, oder ein *Arcus senilis* vorhanden ist; denn im letzten Falle würde (bei *Extraction*) der in den *Arcus* gemachte Hornhautschnitt nicht heilen, *) im erstern Falle aber würde bei der zu flachen Hornhaut der Schnitt leicht zu klein werden. Ebenso ist die *Reclination* und *Depression* vorzunehmen bei *Myosis*, bei sehr tief liegenden Augen und enge gespaltenen Augenliedern, bei unruhigen und kindlichen Patienten, und bei partiellen Verwachsungen der Traubenhaut mit dem Staare.

Uebrigens kann man kleine Staare, z. B. den trockenhülsigen Kapsellinsenstaar, den reinen Linsennachstaar, u. s. w. am besten deprimiren; hingegen harte Linsen- oder Kapsellinsenstaare, oder nur an einzelnen Stellen mit der Traubenhaut verwachsene Kapsellinsenstaare, am besten recliniren.

Die Staarausziehung, *Extractio cataractae*, kann, wie die beiden eben beschriebenen Methoden, in drei Momente getheilt werden. Der erste Moment besteht in dem Hornhautschnitt mittelst eines guten Staarmessers, der zweite, in Eröffnung der *Capsula lentis* und endlich der dritte, in der Herausbeförderung der kranken Linse.

I. *Moment.* — Nachdem der Operateur das (Beersche, Taf. V. F. 11.) Staarmesser wie eine Schreibfeder gefafst und den kleinen Finger seiner Hand am *Osse*

---

*) Ich habe mehrere Male Staare bei Personen ausgezogen, welche einen nicht unbedeutenden Greisenring in den Augen trugen und die völlige Vernarbung des Hornhautschnittes immer gefunden; nur bediente ich mich in derlei Fällen der Vorsicht, den Verband einige Tage länger als gewöhnlich liegen zu lassen. Das Gesagte bestätigt nur die Erfahrung, welche mehrere andere Aerzte in dieser Hinsicht bereits gemacht haben.

zygomatico des Blinden festgesetzt hat, dringt er, bei schief gegen die *Iris* gerichteter Spitze und abwärts gewendeter Schneide des Instrumentes, im äufsern Augenwinkel, eine Achtellinie von dem Rande der Hornhaut entfernt und eine Viertellinie oberhalb ihres Querdurchmessers, in die *Cornea* ein. Sagt ihm nun Gefühl und Gesicht, dafs die Spitze des Messers die Hornhaut durchdrungen habe; so nähert er das Messerheft der Schläfegegend des Kranken und schiebt das Instrument, bei immer etwas nach aufwärts gerichteter Spitze desselben, vorsichtig und genau parallel mit der *Iris*, weder zu schnell noch zu langsam, durch die vordere Augenkammer, und dringt, ebenfalls eine Achtellinie vom jenseitigen Rande der *Cornea* entfernt, mit der Spitze des Messers durch letztere hindurch, und vollendet, ohne die *Iris* berührt und die Hornhaut gelüftet zu haben, durch bloſses Vorwärtsschieben des Instruments, den völlig halbkreisförmigen Hornhautschnitt. *) Da bekanntlich die *Cornea* bei jungen Subjecten dicker und weicher ist, als bei alten Personen,

---

*) Ich pflege in den gewöhnlichen Fällen den Hornhautschnitt nicht ganz an der untern, sondern zugleich etwas mehr an der äufsern Hälfte der *Cornea* anzubringen. Diese Modification ist leicht auszuführen und gewährt mehrere wesentliche Vortheile; denn einmal läuft die wäfsrigte Feuchtigkeit nicht so schnell aus, mithin kann sich die *Iris* nicht so leicht unter die Schneide des Messers legen, kann auch später nach der Operation viel weniger leicht in die Wunde fallen, weil ein etwa entstehendes unwillkührliches Zucken des untern Augenliedes ein Klaffen des Hornhautschnittes gewifs seltener herbeiführen wird, da der Rand des unteren Augenliedes hier niemals parallel mit dem Hornhautlappen läuft, und diesen auch bei einiger Unruhe nicht stofsen kann; sollte endlich demohngeachtet der halb untere, halb äufsere Pupillarrand in die Wundränder der Hornhaut einheilen und eine breite Hornhautnarbe zurückbleiben, so wird die Pupille zwar verzogen erscheinen, allein weder dieses, noch die Narbe werden das gute Gesicht sehr beeinträchtigen, weil die Axe der *Cornea* frei davon bleibt, was bei den gewöhnlichen Hornhautschnitten an der untern Hälfte, seltener in dem Grade der Fall sein wird. Ich habe mich bei so modificirten Hornhautschnitten bisher sehr wohl befunden.

da ferner der Staar bei erstern gewöhnlich auch voluminöser gefunden wird, als bei alten Leuten, bei denen die Linse häufig klein und hart ist; so mache man den Hornhautschnitt bei jungen Subjecten ja nicht zu klein, lieber etwas gröfser als kleiner, vorzüglich da das Messer bei der gröfsern Dicke der *Cornea* sehr leicht zwischen den Lamellen derselben fortgleiten kann. Ein zu kleiner Hornhautschnitt ist überhaupt bei jeder *Extraction* ein grofser Fehler, denn die nachherige Vergröfserung des Schnittes, kann dem Auge oft sehr schädlich werden.

Während der Vollendung des Schnittes mufs man sich wohl hüten, die *Iris* zu verletzen, mufs zugleich das Messerheft immer gegen die Schläfe desto mehr zurück und abwärts drücken, je weiter die Spitze aus der vordern Augenkammer hervortritt, um eine Verletzung im innern Augenwinkel während des Austrittes der Messerspitze, zu vermeiden, und mufs endlich den Schnitt nur sehr langsam vollenden, weil sonst leicht die Linse und mit ihr ein Theil des Glaskörpers vorfällt, indem das Auge gegen das Messer gerade in diesem Augenblick am stärksten reagirt, und von seinen Muskeln am heftigsten gedrückt wird. In dem Augenblicke, als der Operateur den Hornhautschnitt vollendet, läfst der Assistent den obern Augendeckel herabsinken, und den Blinden durch einige Secunden sich von seinem Schreck erholen.

II. *Moment.* — Jetzt zieht der Gehülfe den obern Augendeckel in die Höhe, ohne die Fingerspitzen über dem Augenliedrande vorstehen zu lassen; der Operateur zieht mit dem Zeigefinger zwar das untere Augenlied herab, aber nicht von dem Augapfel ab, sondern drückt ihn vielmehr mittelst des dazwischen liegenden Augenliedes, sehr sanft an den untersten Theil des Auges an, damit er die lanzenförmige Staarnadel (F. 10.), oder die Beer'sche Staarlanze (Fig. 12.) desto leichter und schneller unter den Hornhautlappen bis zur Pupille bringen kann, und damit auch durch diesen gelinden Druck und durch das dadurch bewirkte Hervortreten des Staares, die Pupille merklich erweitert

werde, um die Linsenkapsel desto besser, und ohne den Pupillarrand zu verletzen, zerschneiden zu können. Nun schiebt der Operateur die Nadel mit einem ihrer schneidenden Ränder, die Spitze gegen den innern Augenwinkel gerichtet, zwischen die geöffnete Horn- und Regenbogenhaut so ein, dafs der Hornhautlappen so wenig als möglich gelüftet wird, und zerschneidet die Kapsel mit sich durchkreutzenden Schnitten, die aber weder zu flach, noch zu tief ausfallen dürfen. *) Zu-

---

*) Die Linsenkapsel ist, wie bekannt, eine äufserst zarte Membran, zu deren Durchschneidung leise Züge des Instrumentes vollkommen hinreichen; drückt man daher einigermaafsen tief in die Substanz der Linse, so kann es leicht geschehen, dafs dieselbe zerbröckelt, in welchem Falle man entweder genöthigt wäre, das für das Auge so gefahrbringende Herausziehen der Staarreste zu unternehmen, oder diese der Resorption zu überlassen, oder endlich späterhin eine zweckmäfsige Nadeloperation zu machen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, Einiges über das Verhalten der Linsenkapsel nach Ausziehung des Staares zu bemerken. Die Kapsel nähmlich bleibt entweder in ihren organischen Verbindungen, wird dann fortdauernd wie früher ernährt und bleibt somit auch durchsichtig und klar. So mag sie sich oft verhalten, nach sehr gut verrichteten Ausziehungen von reinen Linsenstaaren. Oder sie wird während der Operation theilweise, oder gänzlich aus ihren organischen Verbindungen gerissen, trübt sich dann und beeinträchtigt somit das Sehen mehr oder weniger; doch selten gänzlich, weil jene Kraft, welche die Kapsel von ihren Verbindungen trennen konnte, gemeiniglich auch mehrseitiges Bersten dieser zarten Haut verursacht. Es wird hierdurch ein Kapselnachstaar begründet, der in dem Falle nach und nach absorbirt werden kann, wo er gänzlich isolirt steht; welches zu erkennen uns bis jetzt aber ausreichende Symptome fehlen. Befinden sich aber ausgiebige Risse in denen Theilen des Kapselnachstaares, welche hinter der Pupille liegen, so kann man in den meisten Fällen sicher darauf rechnen, dafs sich dieselben nach und nach vergröfsern, wodurch das Gesicht verbessert wird. Insgemein ist es nicht die Resorptionskraft, welche dieses zuwege bringt, sondern vielmehr die *Contractilität* der Kapsel, durch welche sich die Grenzparthieen jener Risse in sich selbst aufrollen. Oder endlich, die Kapsel geht bei der *Extraction* mit der Linse gänzlich oder theilweise aus dem Auge; ein Fall der beson-

letzt führt man die Nadel ebenso wieder aus dem Auge, als man sie eingeführt hat. *)

III. *Moment.* — Ist nun der Hornhautschnitt hinreichend grofs und halbrund gerathen, so drängt sich der Staar meistens auf der Stelle durch die Pupille und aus dem Auge. Sollte die Linse aber, ungeachtet der gut gemachten Operation, wegen besonderer Trägheit des Auges nicht sogleich austreten; so mufs der Operateur den *Bulbus* einigemal schnell nach aufwärts bewegen lassen, wo zuweilen dann der Staar hervortritt, und bei seinem Durchgange durch die *Cornea*, (da-

---

ders bei Kapsellinsenstaaren statt findet, und viel häufiger vorkommt, als die Aerzte bisher glaubten. Man findet nähmlich, wenn man den eben ausgezogenen Staar in verdünnten Weingeist legt, denselben mit einem zarten zerrissenen und flottirenden Häutchen umgeben, welches sich schnell in dem Weingeiste weifslich trübt und sich sehr deutlich von denen Stellen der Linse unterscheidet, wo dieses Häutchen ausgerissen ist, und fehlt. Zuweilen hat die Linse eine von der Kapsel unterschiedene Farbe, und dann erkennt man die Letztere noch viel leichter. Wo die Linse ohne Kapsel aus dem Auge tritt, da überzieht sie der Weingeist gemeiniglich mit einem weifslichten Reife, welcher sich bei dem Bewegen des Glases durchaus nicht als häutiges Wesen gestaltet. Ich könnte das Gesagte durch die merkwürdigsten Belege beweisen, wenn mich dieses hier nicht zu weit führte: ich behalte mir es für einen andern schicklichern Ort vor.

*) Es ist ein nicht zu verachtender Vorschlag des Dr. Wenzl, (Ueber den Zustand der Augenheilkunde in Frankreich; nebst kritischen Bemerkungen über denselben in Deutschland, Nürnberg, 1815. S. 55. *et seq.*) das Licht während des Hornhautschnittes über die Nase in's Auge wie gewöhnlich zwar einfallen zu lassen: bei Oeffnung der Kapsel und beim Austritt des Staares aus dem Auge aber, den Kranken so zu setzen, dafs er dem Lichte den Rücken zukehrt, um kein starkes Licht in's Auge kommen zu lassen; denn so gut es beim ersten Momente ist, eine enge Pupille zu haben, eben so wünschenswerth ist beim zweiten und dritten Momente eine weite Pupille, weil dadurch sowohl die Oeffnung der Kapsel, als auch der Heraustritt des Staares durch das Sehloch, erleichtert wird. Freilich mufs der Operateur immer noch hinreichendes Licht zur genauen Ausübung seiner feinen Manöuvres behalten.

mit sich nichts von der auf der Oberfläche sulzigten Linse abstreife) mit dem Daviel'schen Löffel (Taf. V. Fig. 13.), am äufsern und untern Rande des Staares, und je nachdem es nöthig ist, bald innerhalb, bald aufserhalb der Hornhautwunde, empfangen und sein Austritt unterstützt werden mufs. Wenn nun aber der Staar nach vorher gemachten Bewegungen des *Bulbus* dennoch nicht austritt; so mufs der Operateur den Druck auf den untern Theil des letztern mit dem auf das untere Augenlied gesetzten Finger, sanft und allmählig vermehren, bis die Staarlinse mit ihrem gröfsten Durchmesser in die Pupille getreten ist, von welchem Augenblick an, zwar der Druck nicht aufhören darf, aber in eben dem Verhältnifs bis zum völligen Austritte der Linse, wieder vermindert werden mufs. Auch hier wird der Austritt der *Cataract* mit dem Daviel'schen Löffel unterstützt. Sobald der Staar aus dem Auge getreten ist, läfst der Gehülfe den obern Augendeckel fallen, der Operateur empfiehlt dem Operirten beide Augen geschlossen *) und sehr ruhig zu halten, und bedeckt dessen Kopf und Augen mit einem Tuche, damit das Licht nicht so heftig einwirkt. Nach einiger Ruhe setzt man den Operirten mit dem Rücken gegen das Fenster, lüftet das Tuch über den Augen, läfst das Auge sehr langsam öffnen, und indem das andere nicht operirte Auge wohl bedeckt wird, zeigt man ihm einige nicht glänzende **) Gegenstände; sieht er diese ganz deutlich, so legt man den Verband an.

---

*) Der Operirte mufs die Augen so sanft wie ein Schlafender schliefsen, weil, wenn er die Augenlieder zusammendrückt, oder gar krampfhaft zusammenprefst, leicht ein Theil des Glaskörpers vorfallen, und der folgenden Sehfähigkeit sehr nachtheilig sein kann. Von dem ruhigen Verhalten des Blinden während und nach der Operation, hängt überhaupt das Gelingen derselben zum Theil mit ab; derjenige Arzt wird defswegen eine leichte Operation haben, welcher dem verständigen Kranken, vor derselben das Verhalten dabei und die Gründe davon unverhohlen erklärt, dem unverständigen aber unbedingtes Vertrauen einzuflöfsen im Stande ist.

**) Ich habe öfters gesehen, dafs diese nützliche Regel nicht befolgt wird, und selbst berühmte Augenärzte pflegen

Nicht immer kann die *Extraction* auf diese Art verrichtet werden; man merke defswegen folgende Modificationen derselben: — Bei Glotzaugen mit zugleich enge gespaltenen Augenliedern, mufs der Hornhautschnitt schief nach aufsen gemacht werden, weil sonst der Rand des untern Augenliedes, die Hornhautwunde lange nicht zum heilen kommen läfst. — Der Balgstaar mufs, nach Beer, sammt der Kapsel mit dem kleinen Staarhaken (Taf. V. F. 15.) bei nach abwärts gekehrter Spitze, aus dem Auge gezogen werden; Ad. Schmidt aber *) reclinirt diesen Staar lieber, weil er nach der *Extraction* immer eine das Gesicht aufhebende *Iritis* folgen sah. Der trockenhülsige Kapsellinsenstaar kann ausgezogen werden. — Auch flüssige Staare extrahirt man mittelst des Hakens, reifst dieser aber aus, so fafst man mit der Pincette (Fig. 5.) behutsam den dichtesten zurückgebliebenen Flocken, und zieht ihn schnell nach der entgegengesetzten Seite heraus. — Beim Balkenstaare löst man erst mit der lanzenförmigen Staarnadel den Balken von der Traubenhaut, bringt ihn mittelst der Pincette heraus, und extrahirt dann die *Cataract*, wie den Balgstaar. **) —

---

dem Kranken Biergläser mit Wasser gefüllt zu zeigen, wo alsdann derselbe mit dem Finger darthun mufs, bis wie weit das Gefäfs mit Wasser gefüllt ist; da das Glas selbst aber glänzend ist, und das Betrachten solcher Gegenstände anstrengt, auch dem Operirten fast immer mehr oder weniger nachtheilig wird, vorzüglich wenn der Kranke lange staarblind war, so thut man besser, wenn man dem Patienten nur graue oder grüne, nicht glänzende Gegenstände vorhält, weil so gefärbte Objecte, der eben erst wieder hergestellten Sehfähigkeit am meisten zusagen.

*) Nachstaar und *Iritis* S. 21.

**) Dieses von Beer empfohlene Verfahren ist nicht leicht, und sehr beleidigend für das Auge. Ich rathe defswegen diese Staarspecies durch Zerstücklung zu operiren, von welcher um so mehr ein guter Erfolg zu hoffen ist, weil der Balkenstaar gemeiniglich bei jüngern Individuen gefunden wird. Ist man dadurch nicht im Stande, den vielleicht harten pergamentartigen Balken mit den gewöhnlichen Nadeln zu durchschneiden, so empfehle ich späterhin das Durch-

Beer zieht Staare von mittler Consistenz auch sammt der Kapsel aus, indem er die Linse mit seiner Staarlanze aufspiefst und durch Bewegungen die Gefäfse und Adhäsionen der hintern Kapsel mit der *Hyaloidea* in der tellerförmigen Grube, so wie die übrigen Anheftungen trennt, und den Austritt der *Cataract* auf die bekannte Art befördert.

Um nun nach irgend einer *Extraction* den Verband anzulegen, nehme man ja gehörig darauf Rücksicht, dafs das Auge nicht früher geschlossen wird, als bis der Hornhautlappen dicht anliegt, damit weder der untere Augenliedrand, noch dessen *Cilien*, ein Klaffen des Hornhautlappens verursachen, und somit die schnelle Vereinigung des halbzirkelförmigen Schnittes verhindern. Zwei schmale Streifen des englischen Heftpflasters, welche perpendiculär über die Augenlieder gelegt werden, und eine doppelte leinene Compresse, die das Auge bedeckt, und die man nur auf der Stirn befestigt, machen den ganzen Verband aus *). Nachdem nun auf solche Art beide Augen verbunden sind, bringt man den Kranken ins Bett, legt ihn auf den Rücken mit dem Kopfe ziemlich hoch, und ver-

---

schneiden desselben mittelst eines zweckmäfsigen Messers; ein Verfahren, welches ich der Kürze wegen übergehen mufs, welches ich aber in dem 2ten Hefte der *Select. circa morbos humani oculi* ausführlicher darzustellen gedenke.

*) Das Auflegen der Heftpflasterstreifen erfordert grofse Sorgfalt und wird am besten folgendermaafsen gemacht: nachdem man einen Pflasterstreifen vollkommen befeuchtet hat, legt man das eine Ende desselben einen Zoll über der Augenbraune an, geht so, das Pflaster sanft und mehrere Male mit dem Finger andrückend, nach unten, und verhütet sorgfältig, eine untere Parthie des Pflasters früher anzukleben, bevor die obere nicht bereits gut haftet. Befolgt man diese Regel nicht, legt man die Streifen gleichsam mit einem Schlage über das verschlossene Auge, so wird das Pflaster zwar an beiden Enden kleben, allein auf den Augenliedern liegt es schlecht, weil es in die Fugen, welche die Augenlieder darbieten, keinesweges pafst. Es giebt Fälle, wo durch das schlechte Anlegen der Pflasterstreifen, das Mifslingen der Operation veranlafst wird.

dunkelt sein Zimmer gleichmäfsig. Fast noch wichtiger als die Lage des Kranken, ist die Ruhe des Augapfels und der Augenlieder: diese kann man dem Operirten nicht genug empfehlen. Er mufs sorgfältig jedes Zusammenquetschen der Augenlieder, jedes Umherrollen des Augapfels vermeiden und darf niemals Bewegungen der Augenlieder wagen, als wolle er dieselben öffnen. Bei gutem Verband erfolgt die Vereinigung des Schnittes zuweilen in 24 Stunden, meist aber gehört dazu eine Zeit von 3 bis 4 Tagen. So lange die Vereinigung des Schnittes noch nicht geschehen ist, erfolgt immer ein Ausflufs des *humoris aquei*, der sich jederzeit durch kleine, empfindliche, wohl gar mit momentanen Lichterscheinungen verknüpfte Stiche zu erkennen giebt. Bevor dieser nicht 2 bis 3 Tage vollkommen aufgehört hat, (also selten vor dem fünften oder sechsten Tage) darf das Auge nicht geöffnet werden. Viele Augenärzte öffnen das Auge bald nach der Operation, um von neuem den Verband anzulegen; treten nicht Symptome ein, welche ein solches Nachsehen unumgänglich nothwendig machen, so sehe ich durchaus nicht ein, wozu diefs nöthig ist: es kann in allen übrigen Fällen nur Schaden bringen. Ich lasse den Verband bis zum 8ten, nach Umständen bis zum 10ten Tage nach der Operation unberührt, weiche dann die Heftpflaster und die durch Schleimaussonderung der Meibom'schen Drüsen jetzt verklebten Augenlieder, mit warmen Wasser sorgfältig und sanft auf, lege eine neue, leichte, nicht drückende Binde, mit zwei, die Augen deckenden, doppelten Läppchen auf die Stirn und verbiete dem Kranken in der stets finster bleibenden Stube, Sehversuche zu machen. Neben jener Bandage gebe ich jetzt dem Operirten einen Schirm, welcher aus mit grünem Taffet überzogenem Notenpapier besteht. Von der Zeit an, wo ich die Pflasterstreifen weggenommen, hatte ich bis jetzt nicht nöthig, dergleichen wieder von neuem aufzulegen. Nur nach und nach darf man das Zimmer durch, am besten, von oben herein fallendes Licht erhellen, um so jede grelle Abstufung des letzteren zu vermeiden. Endlich läfst

man ihn bei guter Witterung nach Sonnenuntergang seinen ersten Ausgang halten, um ihn an das reine Licht und die frische Luft wieder zu gewöhnen. In der Regel mufs der Operirte um so vorsichtiger an das Licht wieder gewöhnt werden, je längere Zeit er am Staar gelitten und blind gewesen ist. Fälle, wie Pellier einen von einem Manne erzählt, der nach der Operation gut sehen konnte, aber stockblind wurde, als er ohne Erlaubnifs des Operateur's die Binde abnahm und das Auge an einem hellen Orte öffnete, und einige Zeit offen liefs, können viele Aerzte aus eigener Erfahrung anführen. Eine heftige Entzündung, die sich gar nicht selten mit Eiterung und völligem Verlust des Auges endet, ist bei solchen Versehen gar nicht selten.

Die Diät während der ersten 8 Tage nach der Operation, ist natürlich ziemlich mager. Man gebe dem Patienten daher nur dünne Suppen und leichte Getränke, aber kein Fleisch. *)

---

*) Wassersuppe, in welcher das Brod zerquirlt sein mufs, weil der Operirte nicht kauen darf, sind zur Erhaltung des Leidenden hinreichend. Als Getränk ist Limonade, Brod- oder Zuckerwasser zweckmäfsig. Es giebt wenige Ausnahmen, wo man eine nahrhaftere Diät führen lassen mufs.

Verstopfung des Leibes darf nicht geduldet werden. Schon vor der Operation sehe man darauf, dafs täglich mehrere Male Stuhlgang erfolgt. Treten nach der Operation Obstructionen ein, so reiche man antiphlogistische Laxiermittel, und sorge ja dafür, dafs der Kranke nicht durch Erpressen den Austritt des Kothes befördere: dieses verursacht immer einen vermehrten Andrang des Blutes nach dem Kopfe und besonders nach den Augen, der sehr schädlich werden, selbst die Reunion der Hornhautwunde verspäten und Gelegenheit zum Einfallen der *Iris* in dieselbe geben kann. Ebenso müssen das Gähnen, Niesen, Husten, Lachen, starkes Reden und Gemüthsaffecte nach Möglichkeit verhütet werden. Niemals darf der Operirte Taback rauchen oder schnupfen.

Die Erscheinungen, welche nach glücklich vollendeter Operation, bei vollkommen zweckmäfsigem Verbande, aufser dem Thränen im Auge vorkommen, sind während der ersten zwei Tage höchstens ein zuweilen eintretendes gelindes Brennen, welches nach dem Auslaufen der Thränen und der

Die besonderen Zufälle, welche sich bei einer *Extraction* ereignen können, sind vielfach. — Oft legt sich während des Hornhautschnittes, die *Iris* vor die Schneide des Messers; hier bringt man, wie Wenzel *) zuerst lehrte, die Spitze des Mittelfingers auf die Hornhaut, worauf die *Iris* zurückweicht; geschieht dieses darauf noch nicht, so sucht man die Regenbogenhaut durch den Druck eines Fingers auf die untere Hälfte der Hornhaut nach abwärts und einwärts zu drängen, und vollendet den Hornhautschnitt während dieses fortdauernden Druckes. — Zuweilen entflieht das Auge dem Messer während des Einstiches und die wäfsrige Feuchtigkeit läuft aus; hier soll man, nach Beer, mit einem andern Staarmesser **) behutsam zwischen die Hornhaut und *Iris* wieder eindringen und den Hornhautschnitt zu vollenden suchen; andere berühmte Augenärzte aber lassen den unvollendeten Schnitt heilen und versparen die Operation bis zu einer gelegenern Zeit. — Ein zu klein gerathener Schnitt mufs mit einer Daviel'schen Scheere, (Fig. 14.) deren concave Fläche gegen den Operateur gerichtet ist, vergröfsert werden; wobei man indefs den *Bulbus* durchaus nicht roh behandeln, und die in der vordern Augenkammer befindliche Scheerenspitze gar nicht bewegen darf. Wo man versucht, den Staar gleichsam auszupressen, ohne den zu kleinen Schnitt zu vergröfsern, da streifen sich nicht nur leicht sulzigte Theile von

---

wäfsrigen Feuchtigkeit sogleich nachläfst; häufig aber klagen die Kranken auch nicht einmal darüber, fühlen vielmehr gar keine Beschwerden. Erst den dritten, vierten oder fünften Tag, empfinden aufmerksame Kranke ein höchst unbedeutendes, nicht schmerzhaftes Gefühl an der unteren Hälfte des Augapfels, welches den mäfsigen Entzündungsgrad andeutet, der zur Vereinigung der Hornhautwunde immer nöthig ist. Unaufmerksame Subjecte fühlen gewöhnlich gar nichts.

*) *Traité de la Cataracte etc. pag. 59.*

**) Wenzel und Beer widerrathen, dasselbe Messer bei der *Extraction* zwei Mal kurz hintereinander zu gebrauchen, weil das Messer bei dem zweiten Gebrauch nicht so gut zu schneiden pflegt, als ein anderes jetzt eben nicht gebrauchtes.

der Staarlinse ab, bleiben im Auge und trüben längere Zeit hindurch das Gesicht, sondern der untere Theil des Pupillarrandes wird dabei auch auf eine gewaltsame Weise gequetscht, in die Wunde gedrängt, und dann tritt die Linse zuweilen mit Flocken des schwarzen Pigmentes der *Uvea* aus dem Auge. Kommt in solchen Fällen auch keine gesichtverwüstende Entzündung, so bleibt die Pupille doch weit, und der untere Theil der Regenbogenhaut gelähmt. — Sollte sich etwa die *Iris* in den gemachten Hornhautschnitt legen; so mufs diese sogleich zurückgebracht, und die verzogene Pupille, durch Reiben des geschlossenen Auges, und durch plötzliches Oeffnen desselben bei hellem Lichte, bekanntermaafsen wieder zur Rundung gebracht werden. — Zurückgebliebene Linsenreste entferne man durch Reiben des geschlossenen Auges mit dem Finger, wodurch kleine, vorzüglich sulzigte Linsentheilchen nicht selten aus der Pupille und aus der Hornhautöffnung hervortreten; indessen werden solche Linsenreste oft auch sehr bald aufgesogen.

Kapselreste, welche die Pupille verdunkeln, werden auf schon beschriebene Art aus dem Auge gebracht. *) — Eine zurückgebliebene verdunkelte hintere Linsenkapsel und Glashaut, **) vernichtet Beer mit seinem sogenannten Staarnadelhaken ***) und zieht einen beträchtlichen Theil damit aus. — Fällt etwas von dem Glaskörper vor, und beträgt das Vorgefallene nur den achten oder vierten Theil, so lasse man das Auge sogleich sanft schliefsen und lege den Verband

---

*) War die Kapsel vorher ausgiebig und fensterförmig zerschnitten, so bedarf man das von Beer empfohlene Ausziehen derselben mittelst der Pincette nicht; denn in jedem Falle ziehen sich die Kapselreste nach und nach zurück, rollen sich gleichsam in sich selbst auf, und machen somit die Pupille zum guten Sehen hinlänglich frei. Das Einbringen einer Pincette ist für das Auge jedesmal sehr beleidigend.

**) Eine Verdunklung der Glashaut in der tellerförmigen Grube für sich allein, *Cataracta hyaloidea*, existirt wohl gar nicht; wenigstens ist sie sehr problematisch.

***) Dessen Leitf. 2. Bd. Inst. Taf. Fig. 25.

an, aufser diesem thut man am besten gar nichts, denn das Gesicht leidet dadurch in Zukunft nicht: doch wird die Pupille in solchen Fällen nach unten verzogen, welche Form für immer zu bleiben pflegt. Ging aber ein Drittheil und noch mehr von dem Glaskörper verlohren, so ist für das Gesicht zu fürchten, und oft schliefst sich sogar die Pupille, oder sinkt vielmehr zusammen, *Synizesis*, *Subsidentia pupillae*.

Ein höchst unangenehmer Zufall bei der *Extraction* ist das Vorfallen eines Theiles vom Glaskörper, bevor noch der Austritt der trüben Linse geschehen; denn findet diefs statt, so sinkt der Staar in die Tiefe des *Bulbus* zurück. Es kann dieser Zufall entweder dadurch verursacht werden, dafs der Hornhautschnitt zu klein gerathen und der Operateur einen unvorsichtig starken Druck auf den *Bulbus* anbringt, um den Herausgang des Staares zu befördern, oder dadurch, dafs die Linsenkapsel mit der Linse und mit der *Uvea* verwachsen ist; die Verwachsung mit der Traubenhaut kann man vor der Operation erkennen und mufs entweder das bereits angegebene Beer'sche Verfahren, die *Cataract* sammt der Kapsel auszuziehen, oder die *Reclination* durch die *Sclerotica* wählen. Wo aber jener fatale Zufall einmal eingetreten ist, da hat man das sogenannte *Accouchement* der Linse zu unternehmen, welches darin besteht, dafs man den Daviel'schen Löffel durch die Hornhautwunde und durch die Pupille in das Auge hineinschiebt, die Linse mit der Spitze und der hohlen Fläche desselben zu fassen sucht und aus dem Auge herausbefördert; ein gefährliches Unternehmen, welches Benedict fünf Mal ohne eine folgende arge Entzündung gemacht haben will, das aber gewifs selten immer gut ablaufen wird. Das *Accouchement* der Linse hat man auch empfohlen, wenn ein reclinirter aber wieder aufgestiegener Staar aus dem Auge entfernt werden soll; doch wählt man dazu nicht immer den Daviel'schen Löffel, sondern auch ein Häkchen oder eine Pincette. Einen Druck auf den Augapfel, um das Austreten des Staares zu befördern, darf man in keinem Falle anbringen, weil

der

der durch die *Reclination* bereits verletzte Glaskörper hervorstürzen und die *Cataract* in die Tiefe des *Bulbus* zurücktreten würde. In einem Falle, wo die Staarlinse zwei Mal reclinirt, aber wieder aufgestiegen war, und wo wegen Alter des Subjects und Härte des Staares von der Absorption nichts zu hoffen war, beförderte ich denselben von der hinteren Augenkammer aus, mittelst der Nadel in die vordere, was leicht gelang, und zog 12 Tage später die Linse durch einen kleinen Hornhautschnitt aus, worauf ein leidliches Gesicht erfolgte.

Nach der *Extraction* trifft es sich zuweilen, dafs das operirte Auge völlig verklebt, die Thränen sich ansammeln und grofse Schmerzen im Auge verursachen; nachdem man hier die verklebten Augenlieder, mittelst Schwamm und Milch, aufgeweicht hat, stürzt ein grofser Thränenstrom zwischen den Augenliedern hervor, worauf die Schmerzen verschwinden. — Versucht der Kranke nach der Operation das Auge öfters zu öffnen, wird es rauh behandelt; so drängt sich zuweilen die Regenbogenhaut zwischen die verschobenen Wundlippen der *Cornea*, verwächst mit diesen, worauf die jetzt angesammelte wäfsrige Feuchtigkeit, die vorgefallene *Iris* ausdehnt und oft ein sehr grofses Regenbogenhautstaphylom bildet. Entdeckt man diesen Zufall früh genug durch die lange Dauer des Abflusses der wäfsrigten Feuchtigkeit, und durch die Empfindung, als wenn ein grofser fremder Körper im Auge läge; so mufs man letzteres behutsam öffnen, dasselbe geschlossen mit dem Daumen reiben und plötzlich helles Licht in das Auge fallen lassen, worauf die *Iris* sich öfters zurück zieht, und das Staphylom noch verhütet wird. — Wenn die Wundlippen der Hornhaut nicht gehörig zusammenliegen und heilen, so entsteht oft ein Hornhautbruch, den man mit der Daviel'schen Scheere an seiner *Basis* wegschneiden und den Verband regelmäfsig erneuern mufs; worauf das Auge acht bis vierzehn Tage verschlossen bleibt. Eine sichtbare weifslichte Narbe behält der Operirte in diesem Falle jederzeit. — Eine entstehende traumatische

Entzündung, die fast immer nach zu weiter Lüftung des Hornhautlappens oder ungeschickter Handhabung der Instrumente folgt, wird nach den, bei der reinen *Iritis* angegebenen Regeln behandelt. *)

Wo *Myosis* vorhanden, hat man die Ausziehung widerrathen; ist sie nicht zu bedeutend, oder durch organische Fehler bedingt, so kann dieselbe wohl statt finden, wenn man 2 Stunden vor der Operation einige Tropfen *Solut. extr. hyoscyami* in das Auge tröpfelt. Letztere Auflösung in allen Fällen der *Extraction* anzuwenden, wie man empfohlen hat, rathe ich nicht, weil dadurch das leichte Hervorstürzen des Glaskörpers befördert werden kann. Hat sich auch die Pupille unmittelbar vor dem zweiten Momente der Operation etwas verengert, so schadet dieses nichts, denn der geringe und unschädliche Druck, welchen man jetzt auf den *Bulbus* anbringen mufs, erleichtert nicht nur die Ausführung dieses Theiles der Operation, sondern erweitert auch, durch das Andringen des Staares, die Pupille hinreichend.

Ich komme jetzt zu einer Operationsmethode, die in der neuesten Zeit so viel Aufsehen gemacht und so viel Anhänger bekommen hat und noch bekommt, dafs man mir es verzeihen möge, wenn ich mich weitläufiger über sie und ihr *Pro* und *Contra* verbreite, um den Anfängern das Urtheilen hierüber einigermafsen zu erleichtern.

Die Keratonyxis oder Zerstücklung des Staares durch den Hornhautstich. — Man beabsichtigt durch diese Operation den Staar aus seinen organischen Verbindungen zu bringen und dadurch, so wie

---

*) Diejenigen Subjecte, bei welchen die *Cataract* mit einer Lähmung des optischen Nerven verbunden ist, leiden in Folge der Staaroperationen am wenigsten, was wohl, wie auch Quadri (*Annotazioni pratiche sulle malattie degli occhi*, *Napoli*, 1819. *p.* 215.) bemerkte, von der geringern Empfindlichkeit solcher Augen herzuleiten ist. Entstanden jene Lähmungen in Folge dyscrasischer Processe, sind diese vielleicht gar noch im Auge vorhanden, dann gilt das eben Gesagte keineswegs.

auch durch die Zerschneidung der Linse in mehrere Stücke, der wäfsrigen Feuchtigkeit eine gröfsere Fläche darzubieten, damit sie desto leichter und schneller das Geschäft der Maceration und Auflösung der *Cataract* verrichten könne, worauf dann die resorbirenden Kräfte des Auges, die aufgelösten Theile wegzuschaffen fähig werden. *)

Dafs eine wirkliche Absorption der Linse statt finde, davon sind alle Augenärzte überzeugt; ja Scarpa u. a. haben selbst Resorptionen ganzer Linsen anatomisch nachgewiesen. Auch hat man mehrere Beispiele, dafs vorzüglich von Erschütterung des Auges entstandene *Cataracte*, wo also wahrscheinlich die organischen Adhäsionen der Kapsel getrennt waren, von selbst aufgesogen wurden, und das Gesicht sich wieder herstellte. Dergl. erzählen Ware **) u. a. Die Aufsaugung von Staaren, welche nach Schlägen, Stichen, u. s. w. entstanden, wird nach ihm ***) dadurch am besten befördert, dafs man *Naphtha vitrioli* verdünnt oder rein ins Auge tröpfelt. In sehr seltenen Fällen, werden selbst aus innern Ursachen entstandene Staare bei Gelegenheit ohne ärztliche Hülfe resorbirt. ****)

Nur Ungläubige und solche, die der Erfahrung gänzlich ermangeln, können daher an einer Resorption der Linse noch zweifeln. So gewifs es indefs auch ist, dafs Linsen und Linsentheile aufgesogen werden, so gewifs ist es auch, dafs der Staar nicht immer und

---

*) Buchhorn versteht unter *Keratonyxis* (von κερας, *Genit.* κερατος, Hornhaut, und νυσσω, *Futur.* νυξω, ich durchbohre, durchsteche) eigentlich die Durchstechung der Hornhaut mit einer Nadel, um an den innern Theilen des Auges eine Operation vorzunehmen.

**) Dessen Beobacht. 2. B. S. 119.

***) Dessen Untersuchungen der Ursachen, welche am häufigsten u. s. w. die Staarausziehung vereiteln. Uebers. v. Leune. S. 69.

****) Dergl. erzählt Albers in der Ophthal. B. v. Himly u. s. w., 2. B. 3. St. Seit. 167. und m. a.

in allen Fällen aufgesogen wird, wenn er *keratonyxirt* wurde. Woran mag dieſs wohl liegen? Hr. Hofrath Langenbeck beantwortet diese Frage, indem er in seiner Bibliothek für Chirurg. etc. 1. B. S. 554. sagt: „Es liegt theils in dem Verfahren bei der Operation selbst, dann auch in der Beschaffenheit der zurückgebliebenen Theile und endlich darin, wo die verdunkelten Staarreste liegen, ob sie in der hintern Augenkammer geblieben, oder ob sie in die vordere gefallen sind." Ich bin derselben Meinung und füge noch folgendes hinzu:

Jede *Cataract*, jede Partikel derselben, welche aufgesogen werden soll, muſs mit den sie umgebenden Gebilden nicht mehr in organischer Communication stehen: sie muſs aus einer Masse bestehen, welche von den Feuchtigkeiten des *Bulbus*, besonders von dem *humore aqueo*, durchdringbar und auflöslich ist. *Cataracte*, welche eine Dichtigkeit und Härte besitzen, oder aus einer Masse bestehen, welche die wäſsrigte Feuchtigkeit nicht durchdringen kann, sind für die absorbirenden Gefäſse, die wir, ohne sie im Auge nachweisen zu können, annehmen müssen, unaufsaugbar; sie können daher Jahre lang im Auge verweilen, ohne kleiner zu werden. In je kleinere Partikeln der durchdringbare Staar zerstückelt worden ist, je mehr Oberfläche er also der wäſsrigten Feuchtigkeit darbietet, und je reichlicher letztere jene Partikeln umgiebt, desto schneller wird er aufgesogen, und zwar so, daſs die sulzigsten, weichsten Theile zuerst verschwinden. Ich habe dieses in mehreren Fällen sehr genau, selbst mit bloſsen Augen, beobachtet. Ein Staarstück, welches wegen seiner länglichten und gebogenen Gestalt, halb in der hintern halb in der vordern Augenkammer lag, so daſs es auf dem Pupillarrande der *Iris* gleichsam balancirte, wurde binnen einigen Tagen so aufgesogen, daſs nur ein äuſserst zartes Skelett, welches nicht Kapsel war, beinahe eine ganze Woche noch sichtbar blieb, ehe es durch die wäſsrigte Feuchtigkeit aufgelöst und von den resorbirenden Gefäſsen fortgeführt wurde. Ist der *keratonyxirte* Staar von einer Consistenz,

welche bei jungen Subjecten eine baldige Aufsaugung hoffen läfst, so wird letztere bei alten Leuten bei gleicher Beschaffenheit der *Cataract* und bei gleich gut ausgeführter Operation, 5 bis 10 Mal länger dauern; ja sind es sehr kraftlose Greise, die den Greisenring (*Arcus senilis*) im Auge tragen, dann wird derselbe Staar fast todt im *Bulbus* liegen bleiben, denn obwohl hier vielleicht der *humor aqueus* dieselbe Lösungsfähigkeit, als der bei jugendlichen Subjecten, auf die *Cataract* auszuüben im Stande sein mag, so mangelt doch die Resorptionskraft, denn im hohen Alter werden nicht blofs der Feuchtigkeiten weniger, sondern selbst gröfsere Gefäfse annihilirt. Die der Augen erfahren dasselbe Geschick, und wenn die Linse, die *Cornea* an *Marasmus senilis* leidet, wenn die gröfseren sichtbaren, mit intensiverer Lebenskraft begabten Gefäfse ungangbar werden und verschwinden, wo sollen da noch viele der feinsten, dem menschlichen Auge unsichtbare, absorbirende Gefäfschen vorhanden sein und aufserordentliche Kräfte äufsern können?!

Aus dem Gesagten sehen wir nun auch, wenigstens zum Theil, ein, warum in die vordere Augenkammer gefallene Staarstücke, weit schneller aufgesogen werden, als in der hintern Augenkammer befindliche; doch mag die Resorptionskraft in der vordern Kammer auch überhaupt gröfser sein, als in der hintern. —

Uebrigens hat man die Fähigkeit des Auges, die getrennte Linse aufzusaugen, erst in den neuern Zeiten mehr kennen gelernt; denn obgleich man auch früher nicht selten beobachtete, dafs Staare, nachdem das Auge eine äufsere Gewalt getroffen hatte, verschwanden, so suchte man doch die Ursache davon entweder in einer Art durch die *Contusion* veranlafsten *Depression*, d. i. Niedersinkens derselben, oder man glaubte, die getrübte Linse sei wieder durchsichtig geworden.

Gehen wir jetzt zur Operation selbst über, um deren Vervollkommnung sich Buchhorn (a. a. O.) und

besonders Langenbeck ganz vorzüglich verdient gemacht haben.

Man gebraucht dazu gerade und krumme lanzenförmige Nadeln, wovon die letztern am zweckmäfsigsten befunden worden sind. Man macht die Operation folgendermafsen: Nachdem man etwa 2 Stunden vor derselben einige Tropfen einer *Solut. extr. belladonnae* oder *hyoscyami* in das zu operirende Auge gebracht und dadurch die Pupille möglichst erweitert hat, und nachdem nun der Gehülfe den Kopf, und das obere Augenlied insbesondere, wie bei der *Reclination*, und der Operateur mit dem Mittel- und Zeigefinger der linken Hand, ebenfalls wie bei der *Reclination*, das untere Augenlied gefafst hat; so nimmt der letztere die Langenbeck'sche Nadel (Taf. V. Fig. 8.) gerade so wie bei der *Depression* in die rechte Hand, richtet die concave Fläche der Krümmung des Instruments nach der Hornhaut und die convexe nach sich, hält den Stiel so stark zurück nach dem Ohre des Kranken hin, dafs die ausgehöhlte Fläche der Nadel, gleichsam auf die Wölbung des Auges am Rande der *Cornea* zu liegen kommt und die Spitze, bei dieser Krümmung der Nadel und bei diesem Zurückhalten des Stiels, eine Linie von der *Sclerotica*, der Mitte der erweiterten Pupille schräg gegenüber am äufsern Augenwinkel die Hornhaut berührt. — Wenn man die Nadel am untern Rande der Hornhaut ins Auge führt, so kann man das Auge bei unruhigen Kranken und bei Kindern, fester noch halten, als wenn man seitwärts einsticht. — In einer der beschriebenen Richtungen sticht man nun das Instrument in die *Cornea*, ohne jedoch dadurch den Augapfel zu verrücken oder zu verschieben, und ohne die Regenbogenhaut zu verletzen. Auf diese Weise geht man mit der Spitze der Nadel durch die Pupille und durch die vordere Kapselwand in den Staar. Einstechen der Nadel durch die Hornhaut und Fortschieben der erstern bis in die *Cataract*, mufs ein Act sein.

Jetzt wird die vordere Kapselwand mit dem Instrumente zerrifsen, die Linse durch einige Bewegun-

gen der Nadel zerstückelt und die gröfsern Staarstücke deprimirt. Zugleich sucht man einige Partikeln davon durch die Pupille in die vordere Augenkammer zu bringen, weil sie hier, wie ich schon erwähnt habe, weit schneller aufgesogen werden, als in der hintern; auch umspült dann die wäfsrigte Feuchtigkeit die in der hintern Kammer zurückgebliebenen Staarstückchen freier und durchdringt diese leichter. Man bewirkt diefs Uebergehen der Staarstücken in die vordere Augenkammer am besten dadurch, dafs man die Nadel öfters etwas zurückzieht, damit ein geringer Ausfluſs des *humoris aquei* entstehe, dessen Zuge nach aufsen die leichteren und bequem gelegenen cataractösen Fragmente folgen. Beim Einstich der Nadel in die Hornhaut hingegen, mufs jedes zu frühe Ausfliefsen der wäfsrigten Feuchtigkeit vermieden werden, weil sich dadurch selbst die sehr erweiterte Pupille leicht verengert, *) die Regenbogenhaut sich der *Cornea* nähert, woher dann Verletzungen der *Iris* und daraus resultirende gefährliche Entzündungen, bei Fortsetzung der unvollendeten Operation kaum zu vermeiden sind. Auf solche Art sucht man die Pupille möglichst frei und schwarz zu machen, geht mit dem Instrumente, dessen Krümmung zum bessern Einführen der kleinen Staarstücke durch die Pupille in geschickter Hand zugleich vieles beiträgt, wieder aus dem Auge, und überläfst das Uebrige der Resorption.

Um die Operation mit der gröfsten Sicherheit zu vollenden, mufs der Zeigefinger, welcher das untere Augenlied während der Operation mit herabzieht, der Nadel immer als Stütze und Auflage dienen, damit die Bewegungen derselben die Hornhautwunde nicht zerren, drücken und dehnen, wodurch besonders bei dyscrasischen Subjecten, selbst Geschwüre und stärkere Flecken am Orte des Einstiches zurückbleiben können.

Ist die Zerstücklung der Linse nicht angezeigt,

---

*) In einem solchen Falle ist es gut, einen Augenblick zu warten und das Auge mit der Hand zu beschatten, bis die Pupille sich wiederum erweitert.

will man vielmehr den Staar durch die Hornhaut nur recliniren; so legt man, nach Langenbeck, die convexe Fläche der Nadel gegen den obern Rand der *Cataract*, und drückt ihn tief in den Boden des Augapfels und nach innen.

Wird nach Ausübung der *Keratonyxe* ein angewachsenes Stück getrübter Kapsel, nicht aufgesogen; dann ist es nöthig, einen kleinen Hornhautschnitt zu machen und den Kapselrest mit einem feinen Häkchen oder mittelst der Bloemer'schen Pincette (siehe d. Instrumententafel) vorsichtig auszuziehen.

Da mit der Langenbeck'schen gekrümmten, wenig schneidenden Nadel, der Staar nicht immer hinreichend zerstückelt werden kann; so ist das schärfere Langenbeck'sche *Ceratom* *) (Taf. V. Fig. 9.) dieser oft vorzuziehen. Man zerschneidet die Linse damit einige Male von oben nach unten, von innen nach aufsen, und umgekehrt; auch kann man drehende Bewegungen des Instruments mit Vortheil unternehmen. Dadurch wird der Staar, wenn das *Ceratom* scharf genug ist, gänzlich zerstückelt und durch das manchmalige Zurückziehen desselben, indem wäfsrigte Feuchtigkeit ausläuft, der Eingang einiger Staarstücke in die vordere Augenkammer befördert.

So leicht und scheinbar wenig verletzend die *Keratonyxe* ist, so mufs man, wie überall, auch bei ihr das Sehorgan möglichst delicat behandeln und nie mit dem Instrumente zu weit umher fahren, damit man weder die *Iris* noch die *Retina* verletze. In einem noch höhern Grade ist dieses bei Augen zu beherzigen, welche schon an sich zu Entzündungen und Kränklichkeiten geneigt sind, und es ist stets besser, lieber weniger stark zu zerstückeln etc. und bald nachher wieder zu operiren, als umgekehrt. — Es giebt Augen, die an grofser Empfindlichkeit leiden, in welchen sich eine rheumatische, scrofulöse oder gichtische Krankheitsanlage ausspricht, wo die Linsenkapsel an mehreren Stellen an der *Uvea* adhärirt, und wo die Vorsicht

*) Dessen neue Bibliothek etc. S. 466.

die gänzliche Zerstücklung oder Umlegung der *Cataract*, als eine für ein solches Auge noch viel zu heftige Verwundung widerräth, indem hier nach der kräftig gemachten *Keratonyxe* eine gefährliche Entzündung immer zu befürchten steht und nicht selten auch erfolgt. Hier zerstückle ich allein die Mitte des Staares, in dem Umfange eines grofsen Stecknadelknopfes, oder einer mittleren Pupille, suche, indem ich blofs in diesem Bezirke mit dem Instrumente bleibe, den Staar in recht feine Partikel zu zertheilen und ziehe davon möglichst viele in die vordere Augenkammer.

In denen Fällen, wo ich unter jenen gefährlichen Anzeichen die Operation verrichtete, gelang sie mir bis jetzt jedesmal, ohne heftige Zufälle zu veranlassen. Auf beigefügtem Bilde (Taf. I. Fig. 7.) sieht man die Fortschritte der Resorption bei einem höchst empfindlichen, zu steten Entzündungen geneigten Auge, welches ich auf die angegebene Weise operirte.

Der Verband nach der Operation ist wie nach der Reclination. Obgleich man den Eindruck des Lichts hier weniger zu fürchten hat, als bei der *Extraction*, so ist es doch in der That gut, gar keine Sehversuche zu machen. Auch mangelt hier vieles an dem, was Sehversuche nach der Ausziehung des Staares, für den Operateur eclatantes haben mögen. Manche Augenärzte haben nach dem Hornhautstiche nicht einmal das Auge durch einen englischen Heftpflasterstreifen verschlossen, weil sie die Operation einmal für zu unbedeutend halten, um diese Sorgfalt anzuwenden, zweitens aber, weil sie ungenirter kalte Wasserumschläge anwenden zu können glauben, die da, wo keine arthritische, rheumatische Beschwerden zu fürchten sind, allerdings in den ersten Tagen nach der Operation sehr nützlich werden können. Ich selbst bediene mich nach jeder Nadeloperation der angeführten Pflasterstreifen zum Verbinden des Auges, weil dadurch die Ruhe desselben ungemein befördert wird. Wo indefs eine hinzukommende traumatische Entzündung kalte Wasserumschläge nothwendig macht, da incommodiren jene Pflaster niemals; denn sie werden,

nachdem sie erweicht worden, abgenommen, und dagegen nach Beendigung der Umschläge, neue aufgeklebt. Wo man den Staar durch die *Cornea* oder *Sclerotica* reclinirt hat, können kalte Umschläge, theils durch den Druck, welchen sie auf das Auge machen, theils durch die Contractionen der Augapfelmuskeln, welche sie erregen, in so fern schädlich werden, als sie dadurch das Wiederaufsteigen der *Cataract* befördern. Zuweilen ist es vor der Operation nöthig, Fontanelle, Blasenpflaster zu legen, oder Abführungsmittel zu geben. Manchmal wird nach der Operation ein Aderlafs nöthig; ja, wenn das Subject sehr blutreich und zu Kopfcongestionen geneigt ist, selbst dann, wenn noch keine Zeichen einer heftigen Entzündung im Auge zugegen sind. Letztere Regel ist jedoch vorzüglich nach *Extractionen* des Staares zu berücksichtigen.

Man thut übrigens wohl, nach der Operation täglich auf offnen Leib zu halten, sehr magere Diät vorzuschreiben, und alle erhitzende und nährende Speisen und Getränke zu vermeiden.

Man *keratonyxirt* mit dem meisten Erfolg Staare von flüssiger, weicher oder mittlerer Consistenz, durch Zerstücklung. Doch auch härtere werden nicht selten aufgesogen, wenn die Subjecte nur nicht zu alt sind. Die Zeit, in welcher die Aufsaugung vollendet wird, ist gar sehr verschieden, und richtet sich sowohl nach der Consistenz der *Cataract*, als auch nach der mehr oder weniger vollkommen und kräftig gemachten Operation und dem Orte, wo die Staarstücke liegen. Verschwindet der Staar zwischen der dritten und achten Woche, so hat man einen sehr glücklichen Erfolg; oft dauert es halbe, ja ganze Jahre, bevor Alles resorbirt worden, wenn man der Aufsaugungskraft durch Wiederhohlung der Operation, nicht zu Hülfe kommt.

Hat man den Staar tüchtig zerstückelt, haben sich aber die Stücke desselben wieder hinter die Pupille gelegt, und wird er, wenigstens in der hintern Augenkammer, fast gar nicht oder nur sehr langsam aufgesogen; so kann ich, aufser einer nochmaligen Operation, kein besseres Mittel empfehlen, als Erweiterung

der Pupille durch *Solut. extr. belladonnae* *) und einer völlig horizontalen Lage auf dem Bauche, bei etwas niederhängendem Kopfe. Verbindet man mit der angegebenen Lage Erschütterungen des Körpers und des Kopfes ins besondere; so senken sich nach und nach immer mehrere Staarstücke, wenn sie anders nicht gar zu sehr an einander halten, in die vordere Augenkammer, wo sie dann sehr bald zu verschwinden pflegen. In drei Fällen habe ich dieses Manöuvre mit recht glücklichem Erfolg angewendet. Zur grofsen Beförderung der Absorption der Staarstücken, dient die von Dr. Werneck empfohlene Entleerung des *Humor aqueus* mittelst eines kleinen Einschnittes in die *Cornea*; ein Mittel, dessen Nützlichkeit die Erfahrung bereits bewiesen hat. Die mit macerirten Staarpartikeln überfüllte wäfsrige Feuchtigkeit, wird dadurch nicht nur weggeschafft, sondern auch der ganze Organismus des Auges in eine sehr vermehrte Thätigkeit gesetzt, die zum baldigen Verschwinden der vorhandenen Staarstücken ungemein viel beiträgt.

Aehnlich diesem kleinen operativen Eingreifen, wirken alle Mittel, welche das Hervordringen der wäfsrigen Feuchtigkeit durch die *Cornea*, so wie die Production dieser Flüssigkeit überhaupt befördern. Diejenigen, welche ich bisher mit offenbar günstigem Erfolg gebraucht habe, sind *Liq. ammon. caust.*, *Ol. cajeput.*, *Ol. foeniculi*, *Ol. caryophyllor.*, u. a. als Augendämpfe; dann ferner zum Eintröpfeln auf den Augapfel selbst, schwache Auflösungen von *Tart. stibiat.* und Sublimat, mit einigen Tropfen spirituöser Flüssigkeit gemischt, welche ich aber stets lauwarm zu gebrauchen empfehle. Niemals darf man dergleichen Mittel anwenden, wenn noch entzündungsartige Zufälle im Auge herrschen.

Bei Ausübung des Hornhautstiches thun wir sehr wohl, die Pupille durch Hyoscyamus oder Belladonna vorher möglichst zu erweitern, was wir durch wieder-

---

*) ℞. *Extr. belladonnae gr. v.*
Aqua destillat. comm. ℥j.
M. solvendo.

hohltes Einstreichen dieser Narcotica, 2 Stunden vor der Operation, am besten bewirken können. Wir bekommen dadurch einen gröfsern Spielraum und sind der Gefahr, die *Iris* zu verletzen, weniger ausgesetzt. Hätten wir die Wirkung dieser Mittel auf die Regenbogenhaut nicht kennen gelernt, wir würden den Aufsaugungsprocefs der Linse zur Zeit eben so wenig benutzt haben, als im vergangenen Seculo. *)

---

*) Diese Narcotica, als die Pupille erweiternde Mittel in jüngern Zeiten erst bekannt geworden, können in der Augenheilkunde ziemlich häufig, bald mit vorübergehendem, bald mit dauerndem Nutzen angewendet werden. Das Bereich ihres Gebrauchs, bis jetzt noch eingeschränkt, wird in Zukunft gewifs noch sehr erweitert werden.

Die Fälle, in denen man die Belladonna und den Hyoscyamus bisher in der Augenheilkunde vorzüglich angewendet hat, sind folgende: Die *Extracte* derselben dienen, in Auflösung auf's Auge gebracht, dazu, den Zustand der hintern Augapfelhöhlenhälfte besser zu überschauen. Besonders ist dieses vor Staaroperationen nöthig und nützlich, und defswegen sind sie auch bei Anwendung der *Keratonyxe* nicht zu entbehren. Hier bewirkt die Erweiterung der Pupille nicht nur eine mühelose, leichte Zerstücklung oder Umlegung ohne Verletzung der *Iris*, sondern auch ein leichteres Uebergehen der Staarstücken in die vordere Augenkammer. Selbst dann, wenn eine *Synechia posterior* mit der *Cataract* verbunden ist, wird die Operation durch die Erweiterung möglich, und ganz besonders erleichtert, wenn die feinen fadenförmigen Adhäsionen in Folge dieser Erweiterung zerreifsen; und ist jene *Synechie* nur bei partiellem Kapselstaar vorhanden, so wird das Gesicht durch Eintröpfeln einer Belladonnaextractsolution nicht selten ziemlich verbessert. Staarreste, welche unaufgesogen in der hintern Augenkammer liegen bleiben, gehen nach der Pupillenerweiterung, wie ich oben sagte, zuweilen leicht in die vordere über. Bei dynamischer Myose leistet sie, äufserlich allein, oder zugleich auch innerlich gebraucht, manchmal wesentlichen und dauernden Nutzen. Bei Centralleucomen erleichtert sie palliative die Erweiterung des Sehsterns, den Eintritt der Lichtstrahlen in das Innere des Auges, und verbessert mithin das Sehen. Wenn durch ein Geschwür in der *Cornea*, oder durch eine Wunde derselben, die *Iris* eben vorgefallen ist; so kann man sie durch Anwendung jener Mittel und durch gleichzeitiges Schliefsen der Augenlieder, oftmals wieder zurückbringen. Ja Baratta

Von der *Keratonyxis* rühmt man besonders folgende Vortheile, welche sie vor der *Extraction* und vor der *Reclination* durch die *Sclerotica* voraus hat.

Es werden nicht die wichtigsten Gebilde des Auges, die *Sclerotica*, die *Chorioidea*, das *Corpus ciliare* und die *Retina* verletzt; sondern nur die Hornhaut. *) — Die Verletzung der *Cornea* ist so unbedeutend, dafs keinesweges jene unangenehme Erscheinungen hervorzugehen pflegen, die so oft nach der *Extraction* des Staares erfolgen, z. B. Entzündungen, völlige Verdunklung der Hornhaut, Vorfall der *Iris* und sichtbare Narbe in der *Cornea*. — Hat man die Pupille durch Hyoscyamus oder Belladonna hinreichend erweitert; dann sind Verletzungen der Regenbogenhaut weniger möglich, als wenn man die gewöhnliche *Depressions*- oder *Reclinations*methode ausübt, weil man die Nadel durch die durchsichtige Hornhaut beobachten kann. — Man trifft immer mit der Nadel zuerst die vordere Wand der Kapsel; bei der gewöhnlichen *Depressions*methode sticht man dieselbe oft seitwärts in die Substanz des Staares und läfst die vordere Wand sitzen, welche

---

(*Osservazioni pratiche sulle principali malattie degli occhi. Milano*, 1818. *Tom I. p.* 139.) behauptet, dafs, wenn durch eine zufällige Verletzung die *Iris* von ihrem Ciliarbande losgerissen worden, diese sich in ihrer grofsen Peripherie zusammenziehe, die losgerissene Parthie sich dem Ciliarbande wieder nähere und die entstandene Wunde vernarbe, wenn man jene Mittel anwendet.

Auch bei reinen Regenbogenhautentzündungen wirken diese Mittel trefflich. (Siehe dort das Weitere.)

*) Dagegen aber erleiden diese Parthieen immer mehr oder weniger eine Erschütterung, welche das gute Sehen in Zukunft beeinträchtigen kann; besonders habe ich mehrere Male eine geringere oder bedeutendere und allgemeinere Lähmung der Ciliarnerven beobachtet, die sich durch eine ungleichförmig erweiterte Pupille manifestirt, wobei das Gesicht nach Absorption der Staarstücken zwar wenig behindert zu sein scheint, die aber sicher mit halber oder ganzer Blindheit verbunden ist, wenn nicht allein Erschütterung der *Iris*, sondern auch bedeutendere Erschütterung der *Retina* vorausgegangen ist.

dann viel zu schaffen macht, denn nichts ist schwerer, als die Ueberreste der Kapsel zu zerstückeln. — Man kann bei den meisten Subjecten, bei gesunden und fehlerhaften Constitutionen *keratonyxiren*, weil eine gefährliche Entzündung weit weniger zu fürchten ist. Diefs ist besonders ein grofser Gewinn für arthritische Staarblinde. Ebenso können hier die Augenlieder eng oder weit gespalten sein, die Augen können tief liegen, oder weit hervorglotzen; der Ciliarkörper kann varicös sein oder nicht, *) auch kann der Staar selbst theilweise angewachsen sein, in allen dergleichen Fällen findet diese Methode keine Gegenanzeige.

Aufserdem ist die *Keratonyxis* noch ganz besonders bei Kindern und Blindgebornen indicirt, wo das Auge zu beweglich und zu zitternd ist, als dafs eine andere Methode mit Sicherheit ausgeführt werden könnte. Am zweckmäfsigsten ist es, Kinder zwischen dem 2ten und 5ten Lebensjahre zu operiren. Man hat zwar hie und da jedes operative Eingreifen bei Kindern verworfen, weil bei ihnen die Neigung zur Entzündung und *Atresie* der Pupille zu grofs wäre; allein abgesehen davon, dafs das kindliche Alter gegen operative Eingriffe in der That nicht heftiger reagirt als das Jünglingsalter, so habe ich auch noch folgende Gründe, welche den Nutzen einer zeitig unternommenen Operation beweisen. Ohne Gesicht entwickeln sich die schlummernden Fähigkeiten der Kleinen wenig, ihre ganze Psyche bleibt zurück, die *Retina*, des Lichtreitzes von Jugend auf ungewohnt, schlummert ein und wird gar nicht hinreichend geweckt; dadurch entsteht aber eine wahre Schwäche der Netzhaut, welche durch die in späteren Jahren glücklich vollbrachte Operation schwerlich ganz vertilgt werden wird. Endlich ist auch der Staar im frühen Kindesalter viel leichter zu removiren, als späterhin; ja oft ist eine ausgiebige Aufritzung der

---

*) Die Varicosität des Ciliarkörpers erkennt man augenblicklich aus dem in das Blauliche spielenden Ringe, welcher den Rand der Hornhaut umschliefst und die gewöhnlich die Folge vorausgegangener Entzündung etc. zu sein pflegt.

Kapsel, welche Saunders und mehrere andere empfahlen, hinreichend. Die *Cataract* ist bei jungen Kindern insgemein noch weich, ja flüssig, und also leicht zu *keratonyxiren*, nach und nach, nachdem die Linsenmasse selbst immer mehr absorbirt worden ist und der Staar sich als *Cataracta arida siliquata* gestaltet, wird er härter, fester, zäher, zeigt sich oft fest verbunden mit der *Uvea* und ist dann stets weit schwerer aus der Pupille zu entfernen, als früher.

Ein besonderer Grund, warum manche Augenärzte fast immer der Ausziehung des Staares huldigen, und diese Methode jeder andern vorziehen, mag wohl darin liegen, dafs, wenn die Operation nur einigermafsen gut von Statten geht, der Kranke sich selbst beim Sehversuche von dem Gelingen überzeugen kann; wodurch dann freilich der Arzt in imposanter Gröfse dasteht. Die vielleicht nachfolgende gesichtverwüstende Entzündung, kann übrigens leichter auf die Unfolgsamkeit des Kranken während der Nachbehandlung geschoben werden. Indefs darf uns diefs nicht zur Einseitigkeit im Handeln verleiten, oder uns gar bewegen, den Vortheil und das Beste unseres Kranken hintenan zu setzen. Es giebt Augen, welche durch wiederhohltes *keratonyxiren* oder *recliniren* ein gutes Gesicht wieder erhalten können; indefs der extrahirende Arzt durch seine unzweckmäfsig gewählte Lieblingsoperation den ersten Impuls zur völligen Vernichtung des Gesichts geben würde.

Die Erfahrungen eines Langenbeck, eines Ph. v. Walther, eines B. v. Siebold u. a. sprechen zu Gunsten der *Keratonyxe*. Doch darf man sie nicht als die beste und vorzüglichste Methode, den Staar zu operiren, betrachten, mufs sie den übrigen nicht vorziehen wollen. Wohl mag es sein, dafs sie im Allgemeinen nicht so oft angezeigt ist, als die *Extraction* und *Reclination* durch die *Sclerotica*; die Zukunft wird vielleicht unsere noch umnebelten Augen aufhellen.

Nicht immer wird der Staar nach mehrmalig wiederhohlter Zerstücklung völlig aufgesogen, und nicht immer erhält der Blinde nach der Aufsaugung ein so

schönes Gesicht, als nach der *Extraction*. Zuweilen stellen sich auch bei dyscrasischen Kranken, nach sehr geschickt vollbrachter *Keratonyxe*, Entzündungen ein, die man nimmermehr vermuthete, und die doch ohne Umstände das Gesicht unwiederbringlich vernichten können.

Indefs wird jeder gern zugeben, dafs die Verletzung nicht gar bedeutend ist; besonders wenn man sie mit Gibson's *) neuer Methode, den Staar durch Aufsaugung zu entfernen, vergleicht. Auch ist die *Keratonyxe* nicht schwer auszuüben. Doch scheint die *Reclination* durch die Hornhaut verhältnifsmäfsig in der That nicht so zweckmäfsig gemacht werden zu können, wenigstens nicht so günstigen Erfolg zu zeigen, als die *Reclination* durch die *Sclerotica*; sehr oft steigt der Staar wieder ganz, oder grofsentheils vor die Pupille und bleibt hier liegen, ohne bedeutend aufgesogen zu werden.

Es gereicht der *Keratonyxis* auch nicht zum Vortheile, dafs ihr eifrigster Vertheidiger, Hr. Hofr. Langenbeck, das sorgsam gepflegte Kind zu verlassen scheint. **) Er macht jetzt die Zerstücklung der *Cataract* durch die *Sclerotica* mit einer geraden lanzettenförmigen Nadel, oder er verzieht und wendet (um nicht unrichtig reclinirt zu sagen) die Linse durch die *Sclerotica* mittelst einer wenig gebogenen Nadel; so dafs ihr oberer Rand nach aufsen und vorn, ihre vordere Fläche abwärts, ihre hintere Fläche nach oben und ihr

---

*) Er zieht mittelst eines gekrümmten nähnadelförmigen Instrumentes, einen seidenen Faden durch die verdunkelte Linse und bildet dadurch ein Haarseil, dessen Enden aus der *Sclerotica* heraushängen. In mehreren Fällen wurde der Staar dadurch schnell resorbirt, in andern entstanden heftige Entzündungen, welche die Wegnahme des Fadens nöthig machten. Siehe *The New-England Journal of Medicine and Surgery and collateral Branches of Science. Vol. VIII. Boston*, 1819.

**) Siehe dessen neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie, 2. B. 3. H. S. 418.

ihr unterer Rand nach hinten gerichtet wird. Die Zerstücklung der Staarlinse, von der hintern Augenkammer aus, machte früher auch schon Adams; er schiebt aber die Stücke in die vordere Augenkammer, wovor Langenbeck warnt.

Stehen keine Hindernisse entgegen und ist der Staar hart; so bleibt die *Extraction* (in gewissen Fällen die *Reclination*) von geschickter Hand ausgeführt, in der That eine treffliche Methode, die Krankheit zu removiren. Ist der Staar weich, breiartig, vielleicht von Kapseltrübung begleitet, das Subject nicht zu alt, also Resorption mit Sicherheit zu erwarten, oder ist das Auge zu reitzbar, zu Entzündungen geneigt, u. s. w. so kommt man mit der *Reclination* durch die *Sclerotica*, oder mit der Zerstücklung durch die *Cornea*, in den allermeisten Fällen zum Zweck.

Sind beide Augen erblindet, eignen sie sich zur *Extraction*, oder wenigstens eines; so operire ich, wenn nichts entgegensteht, beide Augen zugleich, und zwar nicht selten das eine *per extractionem*, das andere *per reclinationem*, oder *per cataractae discisionem*. Es scheint mir dieſs Verfahren, dem Wohle des Blinden und der Politik des Arztes angemessen zu sein; denn wäre auch der Erfolg der *Extraction* nicht ganz günstig, so ist auf das andere Auge mehr zu rechnen, und im Falle einer zu langsamen Aufsaugung oder eines Wiederaufsteigens der *Cataract*, kann man ja die Operation repetiren. Gelangt der Leidende an dem durch *Extraction* operirten Auge zu Gesicht, so hat er mit dem vielleicht langsamen Erfolg des andern Geduld. Der Effect geschieht im ersten Falle schnell und der Ruf des Arztes ist geschützt. Im letzteren, wenn auch nicht in demselben Grade geschützt, doch auch nicht angegriffen. Ist bloſs ein Auge cataractös, das andere noch gesund; dann zieht die Politik des Arztes, wenn auch keine erhebliche Gegenanzeigen gegen die *Extraction* vorhanden sind, die *Keratonyxe* vor. Das sind Bemerkungen, die selbst auch der clinische Arzt nicht verschmähen sollte; denn sie stimmen mit dem Vortheile des Kranken und des Arztes völlig überein. Ich

wiederhohle es nochmals: die oculistische Praxis kann den Ruf des Arztes viel leichter gefährden, als die Praxis irgend eines anderen Theiles unseres Wissens; oft kommt der Ruf des Augenarztes da in Gefahr, wird wohl gar fast vernichtet, wo der, innere Krankheiten nur besorgende Mediker, unangetastet von dannen zieht. — Uebrigens bemerke ich noch, dafs nicht immer die leichtere Operation auch die bessere, die vorzüglichere sei; besonders haben dieses Aerzte zu beachten, welche die Kunst erst auszuüben anfangen. Um aber nicht am Leichtesten kleben zu bleiben, mufs man sich, hinsichtlich unseres Gegenstandes, fleifsig am todten Auge zu üben suchen; denn obgleich es ein grofser Unterschied ist, *) an der todten Masse oder am lebenden Organ zu operiren, so ist es doch noch der einzige Weg, das vorhandene Talent des Anfängers auf eine, dem menschlichen Geschlechte unschädliche, Weise zu vervollkommnen und auszubilden

---

*) Neuerlichst hat man versucht, künstliche *Cataracte*, sowohl bei lebenden Thieren als auch am Cadaver, zu fertigen, weil dadurch den Anfängern Gelegenheit gegeben wird, die Operation besser und sicherer zu vollbringen; denn es ist allerdings wahr, dafs man bei völlig durchsichtiger Linse, nicht sicher bestimmen kann, ob diese gehörig niedergedrückt oder umgelegt ist, oder ob man mit der Nadel schon im Staare selbst festsitzt, indem man sie auf erstern nur zu legen glaubt. Besonders hat sich in jener Hinsicht Troja (*Memoria etc. T. I. Milano*) viel Mühe gegeben. Wir finden die Resultate seiner Versuche im Auszuge in *Giovanni Baratta, Osservazioni pratiche sulle principali malattie degli occhi. T. II. Milano*, 1818. *p.* 109 *et* 114. Die Krystalllinse trübte sich bald, wenn die Augen mit unreinem Meersalze umgeben wurden, welches mit etwas Wasser angefeuchtet worden war. Doch auch die *Cornea* trübte sich dadurch oft bedeutend. Er gebrauchte defswegen und weil ihm die Versuche in Neapel nicht so, als die früher in Paris gemachten, gelingen wollten, die mit zehn Theilen Wasser verdünnte Salpetersäure. Zwar wurde durch dieselbe die *Cornea* auch getrübt, allein diese Trübheit lag blofs in der Oberfläche und liefs sich als ein Häutchen leicht abziehn, worunter die Hornhaut dann völlig klar erschien.

Bevor ich das Kapitel über den grauen Staar schliefse, will ich noch mit wenig Worten die Entzündungen im Allgemeinen berühren, welche nach Staaroperationen entstehen können. Sie äufsern sich durch verschiedene Symptome und auf verschiedene Weise, je nachdem sie dieses oder jenes Gebilde vorzugsweise ergriffen haben, oder je nachdem sie mehr acut oder chronisch verlaufen. Im Allgemeinen kann angenommen werden, dafs, je schneller Entzündungen nach Operationen entstehen, desto acuter auch der erste Zeitraum derselben verläuft und um so kräftiger auch das antiphlogistische Verfahren gehandhabt werden mufs. Nach *Extractionen* können *Iritis acuta* und *chronica*, *Ophthalmitis* und in Folge derselben *Ophthalmoblennorrhoea etc.* auftreten. Nach Nadeloperationen verlaufen die eintretenden Entzündungen gern chronisch und widerstehen den Mitteln oft sehr hartnäckig. Ein Entzündungszustand eigner Art kommt nach Nadeloperationen durch die *Cornea* häufig vor, welcher in einer chronischen *Iritis*, in Verbindung mit einem entzündlichen Zustande der *Descemet*ischen Haut besteht, dessen schon früher bei Gelegenheit der *Corneitis* Erwähnung geschehen ist, der indessen nach Operationen heftiger und umfassender zu sein pflegt und hier leicht Verwachsungen der Pupille zu Stande bringen kann.

Aufserdem können aber auch Entzündungen der *Retina*, der *Chorioidea*, der *Capsula lentis etc.* auftreten, welche sich durch die, diesen Gebilden eigenen Symptome zu erkennen geben.

Wie die specielle Behandlung einzurichten ist, erfahren wir in den einzelnen Kapiteln, und ich bemerke hier nur im Allgemeinen, dafs bei rein traumatischen Entzündungen anfangs immer antiphlogistisch verfahren werden mufs, und dafs man wohl thut, bei den durch die leichteren Nadeloperationen verursachten Entzündungen nach vorausgeschickten Blutentziehungen örtlich kalte Wasserumschläge, allenfalls mit etwas wenigem Bleiessig gemischt, thätig, jedoch vorsichtig anzuwenden.

Der Nachstaar, *Cataracta secundaria*, ist, wie

Schmidt *) lehrte, eine cataractöse Blindheit oder Schwachsichtigkeit, die sich vom wirklichen Staar (Vorstaar) nur durch die Zwischenzeit, in der sie erscheint, unterscheidet; daher sie auch mit demselben übereinkommende Symptome hat.

Bleiben nach irgend einer Operationsmethode, die Pupille verdunkelnde Linsenreste zurück; so nennt man diefs Linsennachstaar, dessen Aufsaugung man erst erwarten mufs und auch wohl durch trockne aromatische Kräuterkissen, sowie durch die bei der *Keratonyxis* angegebenen Mittel, u. s. w. befördern kann. Findet aber Absorption nicht statt; so mufs man kleinere Linsenreste deprimiren, gröfsere recliniren, und ganz zurück gebliebene Linsen, nach Beer, wo möglich extrahiren. Dergleichen Nachoperationen erfordern aber immer völlige Erholung des Auges von der ersten Operation, wozu nicht selten eine Zeit von 6 bis 8 Monaten nöthig ist. — Sollte nach einer *Keratonyxis* ein Linsennachstaar entstehen; so mufs dieser entweder extrahirt, oder durch die *Sclerotica* reclinirt, am besten aber nochmals zerstückelt werden. — Wenn die Linsenkapsel das Gesicht verdunkelt (Kapselnachstaar) und die Verdunklung bedeutend ist; so kann man die trübe Kapsel mit der Staarnadel nach allen Richtungen zerreifsen und die Flocken möglichst aus der Pupille entfernen.

d. Von den Krankheiten des Glaskörpers und der wäfsrigten Feuchtigkeit.

Das *Glaucom, Glaucoma,* [von *γλαυκος*, grünlichblau, und *ομμα*, Auge] *Glaucosis,* und der grüne Staar, *Cataracta viridis, s. glaucomatosa.*

Eine grau grünlichte oder meergrüne Trübung des Glaskörpers, wodurch das Gesicht völlig aufgehoben oder bedeutend vermindert wird, nennt man *Glaucoma.*

Die Krankheit beginnt mit einem Nebel, einem

---

*) Ueber Nachstaar und *Iritis.* Wien, 1801. S. 4.

Rauche, welchen man vor dem Auge zu sehen glaubt, und der in der Regel ganz plötzlich auftritt und dann um so deutlicher gleich anfangs beobachtet wird, wenn der Leidende das Unglück gehabt hat, das eine Auge durch *Glaucom* bereits zu verlieren. Dieser Nebel kann auf Stunden, ja auf Tage wieder weichen, wenn heitere Gemüthsaffecte und nahrhafte Speisen, Seele und Körper erheben. Allein nach und nach, wird der Rauch bedeutender, gleichsam consistenter und es scheinen in demselben dicke Flecke von schwarzer Farbe zu hängen, oder zu schwimmen. Oft erscheinen zu gleicher Zeit gewöhnliche *Mouches volantes* *), die sich aber nach meinen Beobachtungen in demselben Maafse verlieren, in welchem das Gesicht abnimmt. Betrachtet man das Auge in diesem Zeitraume der Krankheit, so bemerkt man noch nichts weiter, als eine Trägheit der Pupille. Nach und nach kommen leise Andeutungen von drückenden reifsenden Gefühlen über den Augenbraunen, die aber da schnell in heftigere Schmerzen ausarten, wo ein sichtbar congestiver Zustand des Blutes nach dem Auge oder gar Entzündungssymptome die Entstehung des Uebels begleiten. Diese Schmerzen können Tage, ja Wochen lang nachlassen, wenn günstige Witterungsverhältnisse eintreten. Sie exacerbiren gewöhnlich des Abends, remittiren des Morgens und werden gemeiniglich heftiger bei unangenehmer veränderlicher Witterung und bei der Lage des Kranken in Federbetten. Ein gewisser Grad von Lichtscheu, pflegt in diesem Zeitraume der Krankheit eben so wenig zu fehlen, als ein merklich starres Ansehn des Auges bei Betrachtung von Objecten. Zugleich erscheinen dem Leidenden mondlichtfarbige, schwarzgrüne oder bunte Flecke, wobei er schon früher des Abends die brennende Lichtkerze in einen Regenbogen eingehüllt sieht. Die Schmerzen über den Augenbraunen nehmen zu und verbreiten sich weiter, es entsteht im Augapfel ein Gefühl von Spannung, welches

---

*) Benedict, *Disquisitio ophthalmologica de morbis humoris vitrei in oculo humano.* 1809. *pag.* 11.

nach und nach wächst, und bald einen Grad erlangt, den die Kranken mit einem Schmerze, als solle der *Bulbus* gespalten werden, zu vergleichen pflegen. Dabei nimmt das Gesicht immer mehr ab, die Pupille wird unbeweglich, verliert ihre Schwärze und wird gleichsam matt. Die Kranken können nun nur noch gröfsere Gegenstände unterscheiden. Unter zunehmenden heftigen Schmerzen, die der Leidende in den Stirnknochen zu fühlen glaubt, erweitert sich nun die Pupille mehr und mehr, und deutlich bemerkt man eine schwarzgrünliche oder meergrüne Trübung in derselben, die offenbar concav ist; die *Conjunctiva bulbi* füllt sich nach und nach mit varicösen Blutgefäfsen, die bis nahe an den Rand der *Cornea* gehen, hier aber doch einen ringförmigen Raum übrig lassen, der einen schmutzig bläulichen Ring formirt, welcher sich um so deutlicher zeigt, je mehrere varicöse Gefäfse vorhanden sind. Die jetzt erweiterte starre Pupille bleibt entweder rund, oder sie wird unegal verzogen, oder endlich oval, in welchem letztern Falle sie der Pupille der wiederkäuenden Thiere ähnlich ist. Das Gesicht erlöscht unter zunehmenden Schmerzen, bis zum letzten Lichtschein, der Pupillarrand wirft sich nach aufsen um, wodurch das Tapetum der Traubenhaut ringförmig zum Vorschein kommt, die Farbe der *Iris* wird unscheinbar, gleichsam verwaschen, die Structur derselben ist kaum noch zu erkennen, und der ganze Augapfel gewinnt ein glanzloses, starres, unsicheres Ansehn. Insgemein werden braune Augen von der Krankheit ergriffen und in diesem Falle ändert sich die braune Farbe der *Iris* in eine schmutzig graublaue, verwaschene und matte Farbe um *). Endlich fängt sich auch die Krystalllinse zu trüben an, wodurch sich die früher concave schwarzgrünliche Trübung der Pupille in eine convexe graugrünliche umändert, die Linse

---

*) Dem Wifsbegierigen, welcher sich von dem Gesagten mehr noch überzeugen möchte, verweise ich auf den ersten Heft meiner *Select. circa morbos h. oculi. Lipsiae et Parisiis.*

wird nun weich, grofs, drängt die *Iris* nach vorn und verkleinert somit die vordere Augenkammer *). Es ist dieses die *Cataracta viridis* der Alten, die *Cataracta glaucomatosa* der Neueren. Nachdem die krankhaften Umänderungen im Augapfel auf solche Weise das *Acme* erreicht haben, nachdem selbst die Linsenkapsel sich getrübt und der ganze Augapfel eine unverkennbare Härte angenommen hat, pflegt sich derselbe nun nicht selten zu verkleineren und wird atrophisch, die Augendeckel fallen zu und bedecken den faltig verschrumpften *Bulbus* für immer.

Betrachten wir die Entstehung und den Verlauf des Uebels genauer, so finden wir überall, dafs die Krankheit mit Symptomen anfängt, welche nur ein Erkranktsein der Nerven des Auges manifestiren, und dafs erst später die eigene Umänderung des *Corp. vitr.* vor sich geht; dafs endlich die meisten Zeichen, welche eine *Amaurose* verkündigen, zuweilen bei unserem Uebel gefunden werden. Wir werden ferner gewahr, dafs die Trübheit im Glaskörper insgemein sehr langsam entsteht, die Abnahme des Gesichts aber oft sehr schnell, zuweilen augenblicklich; wenigstens steht die Trübheit des Glaskörpers mit der vorhandenen Blindheit in keinem Verhältnifse; auch kann eine geringe grünliche Trübung noch keinen hinlänglichen Grund zu dem gänzlichen, oder fast gänzlichen Verlust des Gesichts setzen; ja dadurch würde vielmehr das Sehen nur in so fern alienirt werden können, als den Gegenständen ein grünliches Ansehn mitgetheilt würde, was indefs, so viel ich beobachtet, nie der Fall ist. Bedenken wir dieses, so möchten wir wohl mit Zuversicht daraus abnehmen, dafs wir das *Glaucom* nicht als eine Krankheit besonderer Art, sondern als eine wirkliche *Amaurose* der bösesten Art zu betrachten haben. Ja, wer, wie ich, Gelegenheit gehabt hat, glaucomatöse Augen zu zergliedern und das *Corpus vitreum*, hinsichtlich der Farbe und Klarheit nur wenig braungrünlich verändert fand; der möchte wohl geneigt sein

*) S. *Taf. II. Fig.* 8.

zu glauben, der Grund der grünlich trüben Farbe der Pupille liege nicht allein im Glaskörper, sondern zugleich in der ihn umkleidenden Netzhaut, so wie in dem verschwundenen Lebensturgor der durchsichtigen Medien des Auges, welche hierdurch ein gröfseres und deutlicheres Sichtbarwerden der *Retina* bei der erweiterten Pupille zulassen. Auch Wenzel *) sagt schon: „*Ce qu'on nomme glaucome me semble être une véritable maladie du nerf optique, laquelle altération se comunique à la rétine, qui en est l'expansion.*" Ich füge diesem hinzu: und die Trübheit des Glaskörpers selbst mag demnach nur das Product jener Umänderung des Sehnerven sein, weſswegen man dieser Krankheit eigentlich kein besonderes Kapitel zu weihen nöthig hätte. Es wäre zu wünschen, dafs dieser Gegenstand immer noch einer genauern Beleuchtung gewürdigt werden möchte, damit endlich einmal die confusen Ideen über die Bedeutung *Glaucoma*, welche von den ältesten Zeiten bis jetzt geherrscht haben, verbannt würden.

Die Ursache dieser ominösen Krankheit, soll einzig und allein die Gicht sein; bis wir dessen ganz gewifs sein können, möchte es wohl besser sein, anzunehmen: dafs im Allgemeinen besonders dyscrasische Krankheitsursachen dem *Glaucome* zum Grunde liegen. Sie befällt übrigens vorzugsweise cholerische Subjecte und solche, die mit Unterleibsbeschwerden zuweilen zu kämpfen haben, besonders sind das *Hämorrhoidarii* und Personen, bei denen die Regeln cessiren.

Die Prognose ist im höchsten Grade niederschlagend, wenn das Uebel bereits vorgerückt ist, oder gar vollkommen besteht, denn schwerlich wird man dann etwas ausrichten können; höchstens ist man im Stande, die Schmerzen zu mildern. Es ist eine Wohlthat der Natur, dafs insgemein anfangs nur ein Auge von der Krankheit ergriffen wird, denn hier ist es oft dem Arzte möglich, das andere, welches aufserdem über lang oder kurz sicher gleichfalls erblindet, zu retten. Wie wichtig dieses ist, möge doch allen Aerzten einleuchten.

---

*) *Manuel de l'Oculiste. Tom. I. p.* 321.

Ich kann meinen Erfahrungen gemäfs folgendes Verfahren, die Entstehung des *Glaucoms* auf dem anderen Auge zu verhüten, nicht genug loben: ich lasse nähmlich bei robusten, blutreichen Personen, wo die *Phlogosis* auch bei dyscrasischen Processen anfangs immer mehr oder weniger prädominirt, zur Ader, meistens am Fufse, allein selten mehr als 4 bis 5 Unzen Blut, weil ich nicht gerade die Kräfte des Körpers herabsetzen, sondern die Circulation freier und gleichförmiger machen will. Später lasse ich, nach Befinden der Umstände, die Venäsection einmal oder mehrere Male wiederholen. Die Quantität des auszulassenden Blutes, darf aber jetzt 1 bis 2 Unzen nicht übersteigen. Zu gleicher Zeit reiche ich gelind abführende *Antiphlogistica*, sorge für das Anlegen von grofsen Fontanellen auf beide Arme, oder wo die Gefahr gröfser ist, für das kräftige Einreiben einer starken Brechweinsteinsalbe im Nacken, wobei zu bemerken ist, dafs ich die entstandenen Pusteln durch scharfe Salben so lange in Eiterung erhalte, bis ich hoffen kann, dafs die zugleich gesetzten Fontanelle hinreichende Ableitung für das Auge gewähren. Sind bereits Symptome vorhanden, welche dem anfangenden *Glaucome* angehören, z. B. Schmerzen über den Augenbraunen, so lasse ich eine Salbe aus *Linim. ammon.*, *Laud. liquid. S.* und *Ol. Sabinae*, täglich 3 bis 4 Mal hier einreiben, welche nach Minderung der *Phlogosis* meistens im Stande ist, diese zu beseitigen.

Innerlich lasse ich längere Zeit hindurch anfangs die milderen *Resolventia* nehmen, z. B. *Mellag. gramin.*, *Mellag. taraxaci*, *Extr. chelidon. maj.*, *Sap. medic.*, *Sal. ammon. dep.*, *Liq. terrae fol. tart.*, späterhin schreite ich zu den einschneidenderen Mitteln dieser Klasse, z. B. *G. guajaci*, *Gummi galban.*, *Gummi ammoniac.*, *Antimonial.*, *Extr. aconit. etc.* Wo aufhörende Menstruation oder unterdrückte Hämorrhoiden im Spiele sind, fand ich Schwefelmittel und das *Extr. aloes. aq.* sehr wirksam. Auf solche Weise war ich mehrere Male so glücklich, die Entstehung eines *Glaucoms* des anderen Auges zu verhindern, oder die ersten Zeichen dessel-

ben zu heilen, oder wenigstens zum Stillstand zu bringen.

Die Auflösung des Glaskörpers, *Synchysis*, [von συν, zusammen, und χυω, ich mische, bedeutet also eigentlich: Zusammenmischung, nicht Entmischung.]

Die *Synchysis* entsteht entweder als Folge einer Augenentzündung, vorzüglich einer syphilitischen *Iritis*, oder sie erscheint auch ohne diese, als Folge des übermäfsigen Quecksilbergebrauchs. Erscheint sie als Folge einer Augenentzündung, so giebt sie sich durch folgende Zeichen zu erkennen: Der Glaskörper verliert seine Klarheit, wird braunröthlich getrübt und das Sehvermögen ist dabei schwach oder gänzlich aufgehoben. Sieht der Kranke noch etwas, so ist er im höchsten Grade fernsichtig, die Pupille ist verengert, zuweilen erweitert und bald mehr bald weniger winklicht. Die *Iris* expandirt und contrahirt sich nur langsam, und wenig oder gar nicht, schwankt aber bei dem starken Bewegen des Auges u. s. w. von vorn nach hinten, und umgekehrt. Der Glaskörper ist dabei so dünn, wie die wäfsrigte Feuchtigkeit, die Zellen desselben sind verschwunden, und die *Hyaloidea* zerreifst bei geringer Veranlassung. Zuletzt wird die Linse cataractös, weich, weifs und käseartig, (schwillt aber nicht wie bei *Cataracta glaucomatosa* an,) der ganze *Bulbus* ist weich und die *Sclerotica* wird bläulich und läfst sich selbst ohne Schmerz gleichsam in Falten legen. Ganz zuletzt tritt eine *Atrophie* des Augapfels hinzu.

Der Grund dieses Uebels, mag wohl in einer Disproportion und Alienation der absorbirenden Kräfte der Glashaut und der benachbarten edeln Gebilde liegen.

Die Prognose ist im Ganzen nicht so schlimm als bei dem *Glaucom*, denn wenn die *Synchysis* unvollkommen war, und der Kranke nur an Fernsichtigkeit litt, verschwand die Krankheit in einigen Fällen bei dem Gebrauche zweckdienlicher Mittel ziemlich gänz-

lich. Auch kann die *Synchysis* das ganze Leben hindurch unausgebildet verbleiben, in welchem Falle der ursächliche Proceſs im Auge wohl abgelaufen sein mag; allein sie kann auch unaufhaltsam fortschreiten, und in diesem Falle participirt die *Retina* an dem Uebel, indem ihre Kräfte verlöschen. Vollkommene *Synchysis* ist bis jetzt unheilbar.

Was nun das Heilverfahren bei angehender Auflösung des Glaskörpers betrifft, so hat man bisher besonders *Rad. sarsaparill.*, *Calam. aromat.*, *Cort. peruvian.*, bittere Mittel, Stahlwässer, Wein, nahrhafte leicht verdauliche Speisen, reine trockne Luft und mäſsige Bewegung empfohlen und in diesen Mitteln zuweilen Heil gefunden.

Die Augenwassersucht, *Hydrophthalmia*, *Hydrophthalmus*, [von ὕδωρ, Wasser, und ὀφθαλμος, Auge] das Ochsenauge, *Buphthalmos*.

Diese Krankheit kann sich auf eine dreifache Art äuſsern; denn entweder ist die Ansammlung der wäſsrigten Feuchtigkeit zu groſs, oder es findet eine krankhafte Anhäufung der Glasfeuchtigkeit statt, oder beide Arten treten vereinigt auf.

Die Symptome der ersten Art sind folgende: die *Cornea* vergröſsert sich in ihrem Umfange wohl bis zum drei- bis vierfachen Durchmesser derselben, ohne daſs sie berstet; bleibt dabei aber durchsichtig und klar (T. II. F. 9.), nur späterhin scheint sie trübe zu werden, woran aber wohl mehr eine falsche Mischung der wäſsrigten Feuchtigkeit Schuld hat. Die vordere Augenkammer erweitert sich bedeutend, die *Iris* wird nach und nach starr und färbt sich zugleich immer dunkler, und die Pupille ist dabei weder verengert noch erweitert; zugleich fühlt der Kranke einen empfindlichen Druck, und eine lästige Spannung und Schwere des ganzen Augapfels. Anfangs ist bei dieser Krankheit Fernsichtigkeit zugegen; zuletzt entwickelt sich aber eine amaurotische Amblyopie, wobei die Bewegungen des *Bulbus* immer beschwerlicher werden.

Rings um die *Cornea*, in einer Breite von 2 Linien, findet man jetzt die *Sclerotica* so bläulich, wie man sie bei neugebohrnen Kindern bemerkt.

Die Ursachen der Krankheit sind oft nicht zu erkennen. Einmal beobachtete ich eine wenig ausgebildete Wassersucht der wäfsrigten Feuchtigkeit, nach einer äufsern Verletzung, die aber bald wieder verschwand; eben so haben Cheston u. m. a. Beispiele dieser Art, die aber unglücklicher abliefen, aufgezeichnet. Nicht selten sind schnell abgeheilte Haut- und Kopfausschläge, an der Entstehung unserer Krankheit Schuld.

Die Vorhersage ist immer bedenklich, und wenn das Gesicht beinahe, oder vollkommen aufgehoben ist, selbst für die Form des Auges, höchst ungünstig. Indefs ist die Prognose bei dieser Art der Augenwassersucht, immer noch günstiger, als bei den andern Arten; vorzüglich wenn die Krankheit nach abgeheilten Ausschlägen, u. s. w. entstand, und der Leidende nicht cachectisch ist. Bei cachectischen Subjecten hingegen, und wenn alle Hülfe versäumt wird, geht die Krankheit in die zweite Art der Wassersucht und zuweilen unter schrecklicher Verbildung des ganzen Auges, in den Tod über.

Kur. — Sollte das Uebel blofs Symptom einer allgemeinen Krankheit sein, so heilet man natürlich die letztere. Scheint die Augenwassersucht örtlich zu sein, ist sie der Ausgang einer vorhergegangenen Augenentzündung; so gebe man, mit Berücksichtigung der letztern,*) *Digitalis* mit *Calomel*, und zum Getränk eine Mischung von *Cremor tartari* und *Borax* mit Wasser, lege *Vesicatoria*, *Fontanelle*, u. s. w. Entstand die Wassersucht nach schnell abgeheilten Ausschlägen; so bringe man diese wieder hervor, oder mache künstliche Ausschläge und gebe innerlich *Camphor*, *Sulph. aur. -ant.* und *Sulph. depur.*

---

*) Blutigel und selbst Aderlässe sind zuweilen angezeigt und werden hier besonders häufig von den Franzosen in Anspruch genommen.

In Hinsicht der örtlichen Behandlung des wassersüchtigen Auges, kommt alles auf den Moment der Ausbildung der Krankheitsform an; denn ist diese noch im Beginnen, so sind aromatische, trockne, warme Kräuterkissen und abwechselnde Einreibungen in der Augenbraunengegend mit *Ungt. hydrarg. ciner.*, *Bals. vit. Hoffm.* oder *Aqua Coloniens.* mit *Spir. salis ammon. caust.* vermengt, hinlänglich; ist aber die Augenwassersucht sehr ausgebildet, sind jedoch keine Varicositäten des *Bulbus* zugegen, so mufs die *Cornea* an ihrem untersten Rande, eine halbe Linie von der *Sclerotica* entfernt, durch den senkrechten Einstich einer Lanzette, etwa zwei Linien breit geöffnet, und die wäfsrigte Feuchtigkeit ausgeleert, jedoch durch tägliches Lüften der Wunde, mehrere Tage und Wochen (wenn es angeht) in einem Entleerungszustande erhalten werden. — Oft wirken nach der Operation die innern Mittel herrlich, obgleich sie vorher keinen günstigen Erfolg zeigten. Der Verband ist übrigens nach der Operation, wie nach der Staarausziehung.

Wenn die *Paracenthesis corneae* bei varicösem Zustande des Auges, oder bei einem sehr auffallend cachectischen Individuum unternommen wird; so hat sie eine Vernichtung des Auges, durch Entzündung und gauchigte Eiterung, ja selbst durch Brand zur Folge, in welchem letzten Falle der Kranke in Lebensgefahr gesetzt wird.

Bei der zweiten Art, nämlich bei der Wassersucht des Glaskörpers, vergröfsert sich vorzüglich die hintere Hälfte des *Bulbus*, wobei zugleich die Hornhaut, ohne an Umfang zuzunehmen oder an Klarheit zu verlieren, etwas kegelförmig vorgedrängt wird. Die starre *Iris*, welche ihre Farbe hier unverändert behält, findet man beständig nach vorn gewölbt, wodurch die vordere Augenkammer zuweilen fast vollkommen aufgehoben ist. Die Pupille bleibt ziemlich verengert, erweitert sich aber, wenn der noch selbstständige, nicht zerrissene Glaskörper, die Linse verdrängt; die *Sclerotica* wird vermöge der Ausdehnung rings um die *Cornea* bläulich und schmutzig; der Leidende wird

schon im Anfange der Krankheit kurzsichtig, bald darauf schwachsichtig und endlich, ohne dafs Lichtempfindung zurückbliebe, vollkommen blind; die Bewegung des, immer sehr hart anzufühlenden *Bulbus* und der Augendeckel, leidet viel früher schon, als in der vorigen Art, und der Schmerz im Auge und in der ganzen leidenden Hälfte des Kopfes, die Schlaflosigkeit und der Mangel an Efslust, welches alles schon im Anfange des Uebels zugegen ist, verstärkt sich immer mehr, und bringt den Patienten oft der Verzweiflung nahe. Im höchsten Grade der Krankheit und bei Vernachläfsigung, berstet die *Cornea*, die Flüssigkeiten fliefsen aus und der *Bulbus* sinkt zusammen und wird atrophisch. Jedoch nicht immer ist der Ausgang nach dem Bersten so glücklich; denn zuweilen, und bei sehr cachectischen Subjecten, wandelt sich der Augapfel in eine fungöse Masse um, oder verhärtet und geht unter grofsen Schmerzen in ein krebsartiges Geschwür über.

Die Ursachen sind zum Theil hier eben so unerforscht geblieben, als bei der ersten Art; indefs kommt der *Hydrops corporis vitrei* meistens bei arthritischen, syphilitischen oder scrofulösen Subjecten vor, und erscheint bald nach Augenentzündungen, bald aber ohne dafs entzündliche Augenaffectionen vorhergegangen oder noch zugegen wären, und schreitet in diesem Falle meistens sehr langsam vor.

Die Prognose ist im Ganzen, vorzüglich wegen der vorhandenen Cachexien, ungünstig. Oft kann man nur das Vorrücken der Krankheit hemmen, allein die Heilung derselben ist selten möglich. Wenn das Sehvermögen vollkommen aufgehoben ist, so wird an eine künftige gute Form des Auges nicht mehr zu denken sein. Uebrigens kann sowohl diese zweite, als auch die erste Art der Augenwassersucht, auf einer geringern *) oder gröfsern Stufe der Ausbildung oft lange Zeit unverändert stehen bleiben.

---

*) Einen leichten Grad von *Hydrops c. v.* findet man zuweilen bei Greisen mit hervor ragenden Augen. Man hat

Zur Kur durch Medicamente, welche hier wohl blofs eine Hemmung des weitern Fortganges der Krankheit zur Absicht haben kann, hat man, neben der Beseitigung gegenwärtiger allgemeiner Krankheiten, mancherlei Mittel vorgeschlagen: Man soll, wenn die Wassersucht unter entzündlichen Symptomen auftritt, *Calomel* mit *Opium* und *Terra foliat. tartar.* innerlich geben, *) äufserlich über die Augenbraunen eine Salbe aus *Opium* mit *Ungt. hydr. cin.* einreiben lassen; man soll den *Bulbus* öfters mit einem schleimigen Augenwasser mit *Opium* waschen, oder soll trockne, warme, aromatische Kräuterkissen aufschlagen; man soll *Vesicatoria* auf den *Procefs. mastoid.* und öfters *Sinapismen* auf die Arme legen, u. s. w.

Wird nun durch diese Mittel das Uebel auch wirklich am Fortschreiten gehindert, so kehrt das Gesicht dennoch selten wieder; vielmehr sinkt der *Bulbus* zusammen und wird atrophisch.

Wenn aber die Wassersucht ohne Entzündung entstanden, in welchem Falle die Kur noch schwieriger ist; so soll man vorzüglich *Pulv. hbae digit. p.* in immer steigender *Dosis* geben, und das Mittel so lange fortsetzen, bis sich die Zahl der Pulsschläge vermindert, und Schwindel, beständiger Ekel und Blitze vor den Augen erscheinen. Auch jetzt soll man noch eine Zeitlang mit der *Digitalis* fortfahren und dabei *Vesicatoria* auf den Zitzenfortsätzen unterhalten.

Helfen alle jene Mittel nicht, ist der *Bulbus* schon sehr ausgedehnt, vergröfsern sich die Schmerzen immer mehr, so mufs die *Paracenthesis bulbi* auf folgende Art unternommen werden: Nachdem man die Hornhaut und die Linsenkapsel wie bei der Staarausziehung geöffnet, und die Linse sammt der Glasfeuchtig-

---

zwar hier nichts zu fürchten; allein wenn man bei solchen Alten die Staarextraction unternimmt, so kann ein *Prolapsus humoris vitrei* kaum vermieden werden, weswegen man hier die *Reclination* gebrauchen soll. (Benedict, *de morbis humoris vitrei in oculo hum. p.* 27.)

*) Benedict, a. a. O.

keit herausgeschafft hat, so schneidet man, um eine neue Wasseranhäufung zu verhüten, einen kleinen Theil des Hornhautlappen weg, und verbindet das Auge wie nach der Staarextraction.

In der dritten Art der Augenwassersucht, wo sowohl der Glaskörper, als auch die wäfsrigte Feuchtigkeit abnorm angehäuft ist, und wo sich die Symptome und Ursachen der eben beschriebenen zwei Arten vereinigt vorfinden, bemerkt man immer einen sehr varicosen Zustand des *Bulbus*. Nicht selten erreicht der Augapfel hier eine enorme Gröfse, wird aus der *Orbita* hervorgedrängt, und stellt dann das dar, was viele Augenärzte Ochsenauge, *Buphthalmos*, genannt haben.

Die Prognose ist höchst niederschlagend, denn gewöhnlich endet das Leiden, nach hinzugekommener carcinomatösen Ausartung mit dem Tode; diefs geschieht um so schneller, wenn man hier die Paracenthese anwendet. Im Anfange der Krankheit glückt es zuweilen, das Fortschreiten derselben zu hemmen.

Was die Behandlung anbetrifft, so ist hier immer ein passendes allgemeines diätetisches Verfahren bei den cachectischen Kranken, sehr indicirt.

Jourdon *) sagt: „Man wendet gegen diese Krankheit, Purgirmittel, Vomitive, *Diaphoretica*, *Squilla* mit *Nitr.* *Bacc. juniperi* in ♃ und Abkochung, *Digitalis*, *Pulsatilla*, Mercurialzubereitungen, *Antimonialia* und *Extr. cicutae* an. Alle diese Mittel sind als einzig gerühmt, aber man wird schwerlich eine glaubwürdige Beobachtung finden, welche die Wirksamkeit derselben aufser Zweifel setzt." Nach ihm sind es einzig die Vesicatoria, auf die Schläfe, über die Augenbraunen oder hinter die Ohren gelegt, welche die Schmerzen und das Gefühl von Ausdehnung in der *Orbita* mindern.

Oert-

*) *Dictionnaire des sciences médicales. Paris.* 1818. *Vol. 22. p.* 360.

Oertliche Mittel müssen nie gebraucht werden, nur die *Exstirpation* des Auges, wenn die Krankheit noch nicht weit vorgerückt ist, wäre zu versuchen, weil diese bald für kürzere bald für längere Zeit einige palliative Hülfe leistet. Hr. Prof. Beer beobachtete jedoch auch nach der *Exstirpation* immer einen nachfolgenden schwammigten carcinomatösen Auswuchs in der *Orbita*, welcher den Patienten nach und nach dem Tode zuführte.

Bevor ich dieses Kapitel schliefse, kann ich nicht umhin, noch einige Winke zu geben, deren Bedeutsamkeit mir mehrere neuerdings gemachte Beobachtungen zu bestätigen scheinen. Die Augenwassersucht scheint in Folge eines entzündlichen dyscrasischen, meist chronisch verlaufenden Procefses der inneren Umkleidung der *Cornea*, und der Oberfläche der *Iris* zu entstehen, der unglücklicherweise seinen Ausgang in übermäfsiger Secretion von wäfsriger Feuchtigkeit findet, das Gleichgewicht zwischen Secretion und Resorption dieser Flüssigkeit stöhrt und die Resorptionskraft hier mehr oder weniger lähmt. Ob eine Wassersucht des Glaskörpers ohne gleichen Zustand der wäfsrigen Feuchtigkeit auftreten kann, weifs ich nicht. In denen Fällen, wo ich diese Krankheit beobachtete, kam sie erst hinzu, als die Anhäufung der wäfsrigen Feuchtigkeit in der vorderen Augenhälfte, eine bedeutende Höhe erreicht hatte. Mir haben die gerühmten innern Mittel sowohl bei den stärkeren, als auch bei den geringeren Graden dieser Krankheit bisher sehr wenig oder gar nichts geleistet, wenn ich nicht äufsere Mittel mit zu Hülfe nahm; diese aber nützten mir auch nur in denen Fällen, in welchen das Uebel noch keinen hohen Grad erreicht hatte und dasselbe noch im Fortschreiten begriffen war. Diese äufsern Mittel waren besonders solche, von denen bekannt ist, dafs sie chronische Entzündungen heben und die Resorptionskraft neu beleben können. Die vorzüglichsten darunter sind folgende: *Ungt. hydr. cin. fort.*, von welchem alle 4 Stunden eine Linse grofs auf den Augapfel gebracht wurde und welches ich bei torpi-

dem Zustande des Auges mit einigen Tropfen *Spirit. sal. ammon. caust.* mischen liefs; oder eine Salbe aus zwei Granen *Merc. praec. rubr.* und 1 Drachma Fett, von welcher aber nur täglich 2 Mal eine Stecknadelkopfgrofse Quantität auf den *Bulbus* gebracht werden darf. Wo Salben nicht vertragen werden, lasse ich das *Hydr. oxydul. nigr.* mit *G. mimos.* zu einem gleichförmigen Brei mischen, und bringe etwas davon alle 3 Stunden mittelst eines Pinsels in das Auge. Kräftige Hautreitze habe ich nie vernachläfsigt, weil sie mir offenbar Nutzen gewährten; dasselbe kann ich von Ableitungen auf den Darmkanal rühmen, besonders wenn ich dazu Purganzen aus fünf bis acht Granen *Calomel* mit oder ohne *Rad. jalappae* wählte, indem gerade dieses Mittel die Resorptionskraft des ganzen Körpers besonders schnell und kräftig zu incitiren scheint.

Nach Scharlach, Masern und Pocken, entstehen nicht selten Entzündungen der Augen, die mit in der *Descemet*ischen Haut ihren Sitz zu haben scheinen und nach deren Ablauf die Augen dauernd kurzsichtig geworden sind. Ich glaube in einigen Fällen bemerkt zu haben, dafs nach solchen Entzündungen die *Cornea* offenbar convexer und die vordere Augenkammer gröfser geworden als vor der Entzündung. Sollte letztere ihren Ausgang hier nicht ebenfalls durch vermehrte Absonderung der wäfsrigen Feuchtigkeit genommen und somit einen geringen Grad von Augenwassersucht zu Stande gebracht haben? Und wäre dieses Uebel nicht auch durch die eben angeführten Mittel vielleicht noch zu heben, wenn sie bald nach Entstehung desselben angewendet würden? Man will zwar bei anfangender Wassersucht der wäfsrigten Feuchtigkeit nicht Kurz- sondern Weitsichtigkeit beobachtet haben, allein sollte dieses wohl auch immer richtig sein?

Meine Beobachtungen hierüber sind bis jetzt noch zu neu, zu geringe und zu unvollendet, als dafs ich mit mehr Sicherheit von diesem Uebel handeln könnte: allein eben defshalb mache ich die Aerzte hierauf aufmerksam, um hinsichtlich dieses Punktes der practi-

schen Augenheilkunde, schneller zu mehrerer Einsicht zu gelangen.

B. Von den Krankheiten der undurchsichtigen Gebilde des *Bulbus*.

a. Von den Krankheiten der *Iris*.

Die reine Entzündung der Regenbogenhaut, *Iritis*.

Man hat bis jetzt 3 Arten dieser Entzündung unterschieden, welche ich, mit Benedict, *Iritis acuta*, *Iritis chronica* und *Iritis subacuta* nennen will.

Iritis acuta.

Symptome des ersten Zeitraumes. — Unter stumpfem, drückendem, tiefem Schmerz, ganz gleichmäfsiger Verengerung der Pupille bei Abnahme des Sehvermögens, unter immer steigender Beschränkung aller Bewegungen der Regenbogenhaut, ohne dafs die Pupille ihre Zirkelform und Stellung verändert, mit zunehmender Lichtscheu und unter Unreinwerden der Pupille, tritt diese Entzündungsform ein. Dabei färbt sich anfangs nur der kleine Ring der *Iris*, späterhin auch der gröfsere immer dunkler, und die graue oder blaue Regenbogenhaut wird grünlich, die braune oder schwarze aber röthlich, schwellt zugleich an und drängt sich nach der *Cornea* hin vor. Je mehr sich jetzt die Entzündung über die vordere Linsenkapsel und über die tiefern Gebilde erstreckt, desto mehr nimmt das Sehvermögen ab, desto mehr vergröfsert sich der Schmerz, welcher sich endlich bis in den Scheitel ausbreitet, und desto leichter kommt ein entzündliches Fieber hinzu. Bei allen diesen heftigen Zeichen, ist die äufsere Röthe des Auges sehr unbedeutend, denn nur die *Sclerotica* ist rosenroth gefärbt, und selbst diese Röthe verwischt sich gegen den Umfang des *Bulbus* hin; jedoch hat die *Cornea* ihren eigenthümlichen Glanz verlohren, (T. II. F. 10.) ein Zeichen, dafs sie im Begriff steht, sich auch der Entzündung zu unter-

werfen. Die Entzündung verschwindet nun entweder langsam und zertheilt sich, wenn sie gelinder verlief oder durch die Kunst gebrochen wurde, oder sie geht in Eiterung oder Ausschwitzung von lymphatischem Gewebe über.

Symptome des zweiten Zeitraumes. — Der Schmerz wird unstät, es entwickeln sich Lichterscheinungen, die Röthe, selbst in der *Conjunctiva*, nimmt zu, die Pupille, die bisher rund blieb, wird eckigt, man entdeckt mit bewaffnetem Auge einen zarten Anflug von coagulirtem Eiweifsstoff, durch welchen erst der kleinere Ring der *Iris*, dann auch der gröfsere eine Verbindung mit der vordern entzündeten Linsenkapsel eingeht. Das Sehvermögen wird nun sehr beschränkt, und arbeitet man nicht bald kräftig gegen die lymphatischen Exsudationen in der Pupille, so wird dasselbe bis auf geringe Lichtempfindung aufgehoben. Die *Iris* wird jetzt immer wulstiger und drängt sich immer mehr nach der *Cornea* hin vor, und verengert somit die vordere Augenkammer, die Hornhaut wird immer trüber, und läfst nur undeutlich kleine gelblich rothe runde Erhabenheiten in der Regenbogenhaut entdecken, die sich bald als Eiterbälge zu erkennen geben, welche bersten und somit ein wirkliches Eiterauge, *Hypopion*, bilden. (T. III. F. 1.) Indefs auch ohne Abscefs kann die Oberfläche der *Iris* eiterartige Ausschwitzungen produciren. Hat sich die Entzündung auf der Markhaut, dem Glaskörper und auf der *Chorioidea* verbreitet, so geht das Sehvermögen mit Ende des zweiten Zeitraumes für immer verlohren. — Verbreitet sich die Entzündung mehr auf den äufsern Gebilden des Auges, so drängt sich die *Iris* immer mehr vor, verwächst zuweilen überall mit der *Cornea*, und bringt ein Totalstaphylom der Hornhaut zu Stande.

Die Ursachen, welche eine reine *Iritis* bedingen, sind meistens äufsere Verletzungen der Regenbogenhaut, und diese geschehen gewöhnlich bei Staaroperationen und künstlichen Pupillenbildungen, u. s. w. Allein auch unterdrückte Hämorrhoiden, gehemmte Men-

struationen etc. können die Entstehung einer reinen *Iritis* begründen.

Prognose im ersten Zeitraume. — Wenn die *Iritis* gleich anfangs erkannt und recht behandelt wird, und wenn sie sich noch nicht weiter ausgebreitet hat, so ist die Voraussage günstig. Hat sich die *Iritis* aber weiter auf die hintern oder vordern Gebilde des Augapfels ausgedehnt, so muſs man die Prognose am besten verschieben; denn hier kann die Entzündung in vollkommne *Ophthalmitis* übergehen, wo dann oft nicht einmal die Form des Auges, viel weniger das Sehvermögen erhalten werden kann.

Prognose im zweiten Zeitraume. — Bemerkt man in der hintern Augenkammer keinen deutlich sich zeigenden angeschossenen Eiweifsstoff, mit bewaffnetem Auge aber sehr unbedeutende graulichte Filamente, die nur wenig hinter dem Pupillarrande der *Iris* hervorblicken, ist bloſs der kleine Zirkel der *Iris* in seiner Farbe verändert, und ist noch kein Eiterbalg in der Regenbogenhaut zugegen, somit auch das Gesicht bloſs in einem geringen Grade beschränkt, oder nur etwas neblicht; so bleibt nach einer völlig zweckmäſsigen Behandlung, auch nicht eine Spur der Krankheit zurück; nur durch einige Zeit nach dem Verlaufe der Krankheit, werden die Bewegungen der Regenbogenhaut etwas träger als im gesunden Zustande vor sich gehen.

Findet man mit unbewaffnetem Auge ein sichtbares feines Gewebe hinter der Pupille, ist der gröſsere Ring der *Iris* in Hinsicht der Farbe alienirt, und somit das Sehvermögen mehr beschränkt; so kann zwar das Gesicht durch zweckmäſsige Behandlung bis zum Lesen und Schreiben gebracht werden, allein dennoch wird es, neben winklichter und trüber Pupille, immer schwach bleiben. War ein Eiterbalg in der *Iris*, war die Pupille durch exsudirten Eiweifsstoff vollkommen verschlossen, nimmt aber der Patient den Unterschied zwischen Licht und Finsterniſs noch wahr; so ist zwar für's Erste nichts für die Wiederherstellung des Sehvermögens zu hoffen, allein in Zukunft läſst sich zu-

weilen dasselbe, durch Anlegung einer künstlichen Pupille, wieder zurück bringen. Waren mehrere Eiterbälge in der Regenbogenhaut zugegen, welche bersteten und die Augenkammern mit Eiter füllten, so ist hier die Prognose ziemlich ungünstig, denn die *Cornea* kann sich alsdann auch in einen Eiterstock verwandeln und bersten. War nun gar die *Iritis* in eine eigentliche innere Augapfelentzündung übergegangen, so kann sich der Arzt Glück wünschen, wenn er die Form des Auges einigermafsen erhält.

Kur im ersten Zeitraume. — Die Behandlung stimmt hier mit derjenigen des ersten Zeitraumes der reinen innern Augapfelentzündung überein; nur modificire man den Grad der Anwendung der antiphlogistischen Methode gehörig nach dem Grade der Entzündung. Zu gleicher Zeit gebe man *Laxantia antiphlogistica* in dem Maafse, dafs täglich 2 bis 3 *Sedes* erfolgen. Wenn gegen Ende des ersten Stadiums, nachdem das Sehvermögen völlig aufgehoben ist, die Regenbogenhaut sich der Hornhaut nähert, so dafs eine Verwachsung beider Gebilde und somit ein Hornhautstaphylom zu erwarten steht; so soll man, nach Beer, um diese häfsliche Verbildung zu verhüten, die Entzündung, durch täglich mehrmaliges in's Auge Streichen der *Tinct. opii spl.* — oder wenn diese nicht hinreichend stark einwirkt, durch *Naphtha vitrioli* oder *Bals. vitae Hoffm.* — vermehren, um die Quellen der wäfsrigten Feuchtigkeit durch die mit Fleifs vergröfserte Inflammation zu vernichten, weil, wenn diese Quellen nicht versiegen, dadurch die letzte Bedingung zur Staphylombildung *) gegeben wird. Plattet sich nun die vordere Hälfte des *Bulbus* sichtbar ab, so ist diefs das sicherste Zeichen, dafs die Ab- und Aussonderung der wäfsrigten Feuchtigkeit, wirklich für immer aufgehoben ist.

Kur im zweiten Zeitraume. — Es kommt hier ganz besonders darauf an, ohne Aufenthalt, kräftige ableitende Mittel zu gebrauchen: vor allen eine Pur-

*) Siehe Hornhautstaphylom.

ganz aus drei bis fünf Gran Calomel und 25 bis 30 Gran Jalappe und eben so viel Citronenzucker. Dabei kommt ein lauwarm anzuwendendes Augenwasser aus *Decoct. herbae malvae* ℥jv. *ex* ℥ß. mit *Laud. liquid. Syd.* ℈j. trefflich zu Statten; späterhin *Vesicatoria* im Nakken oder hinter die Ohren. Sind keine erhebliche Gegenanzeigen vorhanden, so kann man hernach das *Calomel* früh und Abends zu einem bis anderthalb Gran noch fortgeben, und wenn nach dieser Dosis nicht täglich einige Stühle schon erfolgen, so können den Tag über noch *Laxantia salina* gereicht werden. Diese Mittel brechen gemeiniglich nicht allein die Entzündung, sondern wirken auch antagonistisch und befördern die Resorption ungemein. *) *Pediluvia* und örtlich trockne Wärme, sind in diesem Zeitraume ebenso wenig zu vernachläfsigen, als das schon genannte *Rubefaciens*. Zu gleicher Zeit thut man wohl, auf dem Wendepunkte des ersten und zweiten Zeitraumes, das, von dem verdienstvollen Himly in augenärztlicher Hinsicht zuerst näher bekannt gemachte, und von Adam Schmidt und Saunders vorzüglich gegen *Iritis* empfohlene *Extr. hyoscyami*, oder noch besser das stärker wirkende und von den Franzosen und Engländern vorzüglich gebrauchte *Extract. belladonnae* in Auflösung zu einigen Granen Extract in ½ bis 1 Drachma *Aq. destill* örtlich lauwarm auf's Auge selbst anzuwenden. Auch kann man einige Grane des Extracts zu obigem Augenwasser setzen lassen.

Die Radialfibern der *Iris* contrahiren sich möglichst dadurch, die Pupille erweitert sich, wenn nur irgend die Stärke des Mittels über die Contraction der Zirkelfibern der *Iris* den Sieg davon trägt, und der jetzt etwa ausschwitzende Eiweifsstoff, wird weit seltener die ganze Pupille verdunkeln können. Oefters schon habe ich mich dieses Verfahrens mit glücklichem

---

*) Saunders empfiehlt nach Anwendung der Venaesectionen und Purganzen, den *Tartar. emetic.* in kleinen nicht Brechen erregenden Dosen.

Erfolge bedient. Man *) hat auch späterhin, wenn die *Iris* mit der vordern Linsenkapsel schon durch frische Fäden ausgeschwitzter Lymphe an einander geheftet war, mit Nutzen das Belladonnaextract in das Auge gestrichen. Eigene glückliche Beobachtungen habe ich an einem andern Orte erzählt. **) Frische Fäden dieser Art dehnen sich meistens nur aus, und verdünnen sich somit, zerreifsen aber in Folge der Vergröfserung der Pupille selten; dahingegen werden alte, in der Pupille vorhandene, einzelne feine Fäden, gar nicht selten durch die Zusammenziehung der Radialfibern der *Iris* zerrissen und verbessern dadurch das, vorher etwas getrübte, Gesicht. Diese Heilmethode ist nicht nur bei den reinen, sondern auch bei den dyscrasischen Entzündungen der *Iris* mit Vortheil gebraucht worden, mufs aber, wenn geronnener Eiweifsstoff in der Pupille vorhanden ist, immer durch Mittel unterstützt werden, welche die Aufsaugung befördern; defswegen gebrauche man äufserlich eine *Solutio hydrarg. mur. corr.* mit *Opium*, oder streiche, wenn das Auge keine Feuchtigkeit verträgt, folgende Salbe zwischen die Augenlieder: ℞. *Merc. praec. rbr. gr. vj. Opii puri gr. vjjj. Butyr. rec. insuls.* ʒjj. *M. exact.* Dabei kann man um die Augen eine Salbe aus Fett und dem *Merc. solub. Hahnem.* oder *Ungt. hydrarg. ciner.* mit *Opium* einreiben lassen.

Wo endlich die vordere Augenkammer mit Eiter angefüllt ist, da mufs man denselben durch eine am unteren Theile der *Cornea* gemachte Incision auslassen, um das Bersten der Hornhaut zu verhüten und wenigstens eine leidliche Form des Augapfels zu erhalten.

Iritis chronica.

Zuweilen ist sie der Ausgang einer acuten Regenbogenhautentzündung, in welchem Falle die *Iris* nach

---

*) Saunders, a. a. O. p. 55.

**) Ueber künstliche Pupillen, und eine besondere Methode, diese zu fertigen. Berlin, 1821. In der Schüppel'schen Buchhandlung. S. 70. etc.

Heilung einer *Iritis acuta*, eine Neigung zur Production von Aftergebilden behält. Allein sie kann auch von vorn herein für sich eintreten, bestehen, und mit Hervorbringung lymphatischer Exsudationen enden.

Die Erscheinungen, unter welchen dieses Uebel anfängt, lassen mehr eine beginnende *Amblyopie* als eine Entzündung der *Iris* vermuthen.

Der Kranke klagt nähmlich über periodische, ziehende drückende Schmerzen im Augapfel und in der Stirngegend, über Herumschweben von *Mouches volantes* in Form schwärzlicher Flocken und Fasern; er klagt endlich über zunehmende Abnahme des Gesichts für Nähe und Ferne. Betrachtet man das Auge nun, so bemerkt man, dafs der Pupillarrand einigermafsen ungleich, winklicht ist, dafs die Farbe der Pupille nicht mehr dunkelschwarz, sondern graulich von Farbe ist, dafs sie enger ist und dafs sich der Rand der Pupille der vorderen Oberfläche der Linsenkapsel nähert, woher es kommt, dafs der kleine Ring der Regenbogenhaut gleichsam trichterförmig nach hinten gezogen erscheint. Bei der acuten *Iritis* ist letzteres gerade umgekehrt, denn bei dieser schwillt die *Iris* auf und drängt sich nach der *Cornea* hin vor. Zu gleicher Zeit entwickeln sich in der Pupille immer sichtbarer werdende lymphatische Exsudationen, welche, je mehr sie gedeihen und je gleichförmiger sie sich bilden, desto bedeutender das Gesicht schwächen; so dafs der Leidende zuletzt nur noch Farben und die Umrisse gröfserer Gegenstände zu unterscheiden im Stande ist. Auf der Oberfläche des *Bulbus* bemerkt man übrigens nur wenig Röthe, auch werden die Schmerzen weder im Auge noch in der Umgegend desselben heftiger, ja sie bleiben nicht selten längere Zeit aus, kehren aber auch ohne sichtbare Veranlassung zurück und leicht sieht es der erfahrene Practiker dem Auge an, dafs dasselbe nicht unbedeutend leidet. So kann der Entzündungsprocefs mehrere Monate lang dauern, bevor er Ausschwitzungen zu Stande bringt, welche das Gesicht bis zur stärkeren Blindheit beeinträchtigen. Herr Prof. Benedict (a. a. O. 1. B. S. 364.) beobachtete bei die-

ser *Iritis* weder Eiter, noch Trübung der hinteren Fläche der *Cornea* und der wäfsrigen Feuchtigkeit, noch vollständige Verwachsung der Pupille; vielmehr war letztere immer nur sehr verengt und von neblichen Exsudationen auf ihrer hinteren Fläche nur vielfältig durchzogen. Hierdurch unterscheidet sich auch die *Iritis chronica*, sowohl von der *Iritis acuta*, als von der noch abzuhandelnden *Iritis subacuta*.

Nach und nach läfst nun die Entzündung mit oder ohne Hülfe der Kunst nach, nachdem sie zuweilen leider erst einen synchitischen Zustand des Glaskörpers hervorgebracht hat; die Ausschwitzungen in der Pupille beschränken sich mehr und mehr, und oft kehrt das Gesicht auch dann noch einigermafsen zurück, wenn auch jener krankhafte Zustand des Glaskörpers bereits veranlafst worden ist.

Die Ursache zu dieser Entzündungsform liegt oft in unterdrückten Blutflüfsen, z. B. in unterdrückten Hämorrhoiden, Regeln, Nasenbluten, u. s. w., und nur bei diesen Causalverhältnissen und bei übrigens gesunden Subjecten, möchte diese Entzündung rein genannt und dem gemäfs behandelt werden dürfen. Häufig aber sind schnell geheilte oder unterdrückte Ausschläge, Geschwüre, Fufsschweifse, abgeschnittene Weichselzöpfe u. dergl. Ursach der Krankheit, und dann kann man das Leiden, streng genommen, wohl niemals als reine Entzündung betrachten.

Die Prognose ist günstig, wenn man die Krankheit noch im Entstehen und bei gesunden kräftigen Menschen antrifft; sie ist ungünstig, wenn schon bedeutende Ausschwitzungen vorhanden und die Entzündung in cachectischen, schwächlichen und abgelebten alten Körpern hauset, oder wenn gar schon eine Auflösung des *Corp. vitr.* entstanden ist.

Was die Behandlung betrifft, so richtet sich diese ganz nach den Ursachen, wobei Nebenumstände stets wohl zu berücksichtigen sind. Bei robusten Menschen und wo gewohnte Blutflüsse unterdrückt wurden, Minderung der Blutmasse, Darmausleerungen durch antiphlogistische Laxiermittel und baldige Anwendung des

Calomel. Wo unterdrückte Hautausschläge etc. Schuld waren, und bei schwächlichen Personen, wird man durch Blutentziehungen nicht eben gewinnen, vielmehr mufs man hier *Calomel* als Purgiermittel in grofser Dosis zu 6 bis 10 Gran gleich anfangs reichen, indem man die kleinen Dosen, wegen der Neigung dieser Entzündung, Entmischung des Glaskörpers hervorzubringen, gern vermeidet. Aufserdem sind Schwefelmittel und die *Antimonialien* sehr zu empfehlen. Höchst ersprieſslich ist es, an dem Orte wo der Ausschlag war, wenn irgend möglich, die Brechweinsteinsalbe kräftig einzureiben. Ebenso sind *Vesicatoria*, Haarseile, Fontanelle, Senfpflaster, lauwarme Halbbäder mit *Kali etc. etc.* als zweckdienliche Ableitungen sehr zu empfehlen.

Iritis subacuta.

Ich habe den gelinderen Grad dieser eigenen Entzündung, welche unter die Nachtheile der *Keratonyxis* gezählt werden mufs, bereits bei Gelegenheit der *Corneitis* erwähnt, glaube aber dieselbe hier ausführlicher abhandeln zu müssen, weil sie besonders für den Operateur von grofser Wichtigkeit ist, wovon ich mich selbst mehrfach durch eigne Erfahrung überzeugt habe.

Diese Entzündungsart, deren Kenntnifs wir ursprünglich Wardrop zu verdanken haben, wird bei den verschiedenen Schriftstellern unter verschiedenen Nahmen abgehandelt: so z. B. nennt sie Schindler (*Commentatio ophthalmologica de iritide chronica ex Keratonyxide suborta. Vratislaviae*, 1819.) *Iritis chronica*, Fabini mit mehreren anderen: *Inflammatio capsulae humoris aquei*, Helling möchte sie *Hydatocapsulitis* nennen, Benedict endlich belegt sie, wie ich bereits sagte, mit dem Nahmen *Iritis subacuta*. Das Gebilde, in welchem diese Entzündung haust, ist die seröse feine Haut, welche nach Annahme der Anatomen, die innere Oberfläche der Hornhaut, die vordere und hintere Fläche der *Iris* und die vordere Kapselwand der Linse überziehen soll. In wie weit diese Annahme richtig ist, wollen wir dahin gestellt sein lassen, genug wir sehen bei dieser Krankheit Erscheinungen, welche auf ein entzündliches Ergriffensein der Oberfläche der ge-

nannten Gebilde hindeuten und die zu gleicher Zeit hinreichen, um das Uebel sowohl von der *Iritis acuta*, als auch von der eben abgehandelten *Iritis chronica* mehr oder weniger wesentlich zu unterscheiden.

Gemeiniglich entsteht diese Entzündung nach durchdringenden Stichwunden der *Cornea*, besonders also nach verrichteter *Keratonyxis*. Der Verletzte klagt selten früher als den dritten oder vierten Tag nach geschehener Verwundung, über ein Gefühl von Fülle im Augapfel, über ein schmerzhaftes Drücken in demselben und in der Stirn, welches bald wieder vergeht, allein gewöhnlich schon nach 8 oder 12 Stunden verstärkt wiederkehrt. Die Ansicht des Auges läfst nichts als eine unbedeutende Röthe in der *Conjunctiva bulbi* erkennen. Allein schon nach dem 2ten, 3ten oder 4ten Schmerzanfalle, sieht man die *Cornea* getrübt, fast wie bei beginnendem *Pannus*, jedoch deutlich bemerkt man, dafs die Trübung nicht auf der äufseren, sondern auf der inneren Oberfläche jener Haut ihren Sitz hat. Auch der *Humor aqueus* scheint trübe zu sein. So viel man jetzt die *Iris* und die Pupille untersuchen kann, findet man letztere verengert und starr, und erstere gleichsam graulich oder graugelblich verwaschen. Fieber mit gastrischen Erscheinungen verbunden, kommt nun hinzu. Der Pupillarrand erscheint nach der Linsenkapsel hin gezogen. Die Schmerzen nehmen zu, treten des Abends ein, machen die Nacht schlaflos, dauern fast, wie bei der syphilitischen *Iritis*, bis gegen Morgen, und sind um so heftiger und ausgebreiteter, je heftiger die Entzündung selbst ist. Oft minderen sie sich oder verschwinden wohl auch tagelang gänzlich, kehren aber dann von neuem wieder, ohne dafs man einen Grund dazu aufzufinden vermag. Betrachtet man jetzt das Auge genauer, so findet man rings um die Hornhaut einen Gefäfskranz, der sich nur dadurch von dem die *Iritis syphilitica* charakterisirenden unterscheidet, dafs er jetzt erst hinzukommt, wogegen er bei letzterer, gleich von Anbeginn der Knochenschmerzen in der Stirngegend vorhanden ist. Zuweilen wird die Bindehaut der *Sclerotica* gleichförmiger,

saturirter geröthet und schwellt etwas auf. Die Lichtscheu ist bei diesem Uebel oft unbedeutend, stärker hingegen das Thränen des Auges.

Unter solchen Erscheinungen geht eine Ausschwitzung im Pupillarrande vor sich, die nach dem Grade der Heftigkeit der Entzündung, mehr oder weniger bedeutend werden, ja eine vollständige Verwachsung der Pupille verursachen kann und die man insgemein ohne Mühe zu entdecken defshalb im Stande ist, weil, sobald die Ausschwitzung im Pupillarrande vor sich geht, die Trübung der innern Fläche der Hornhaut nachzulassen pflegt. Ist die Verwachsung der Pupille vollendet, und sind endlich die Schmerzen und die übrigen Symptome der Entzündung verschwunden, so darf man sich nicht wundern, wenn das böse Uebel mit einem atrophischen Zustande des *Bulbus* endet. Noch einer der bedeutendsten Zufälle dieser Krankheit, welcher dem Acme derselben angehört, ist die *Ekchymose* auf der *Iris*, deren Dasein ein röthlicher Fleck oder Streifen auf derselben verkündigt, der sogar Blut zu dem Boden der vorderen Augenkammer treten lassen kann und immer ein Zeichen ist, dafs hier die Nachwehen des Uebels für die Kunst unbesiegbar sind.

Bei weiten nicht immer verläuft diese Entzündung so heftig, als ich sie hier beschrieben habe, vielmehr treffen wir die verschiedensten Grade an: doch auch nach dem gelinderen Grade bleibt häufig eine eckige, unbewegliche oder träge Pupille, längere oder kürzere Zeit, oder auch dauernd zurück, und wo der zerstückelte Staar den Pupillarrand berührt, finden wir fast immer Verwachsungen zwischen letzterem und den sich noch theilweise in organischer Verbindung befindenden Kapselflocken, wodurch, wenn auch die Masse des zerstückelten Staares endlich absorbirt worden ist, das gute Gesicht mehr oder weniger durch einen Kapselnachstaar getrübt wird. Nie findet man bei der *Iritis subacuta* Eiterproduction.

Die Ursach dieser Entzündung ist fast immer die Operation der *Keratonyxis*, allein leicht kann sich

Rheuma, Gicht u. dergl. mit derselben compliciren und dadurch die Hartnäckigkeit des Uebels steigern.

Die Prognose ist sehr ungünstig, wenn die Entzündung anfangs vernachläfsigt wurde und bereits einen hohen Grad der Ausbildung erhalten hat; denn dann sind oft alle Mittel nicht im Stande, dem Uebel Einhalt zu thun und die entstandenen Fehler der Form zu beseitigen. Nur wo die Entzündung gleich anfangs richtig erkannt wurde und die Symptome, bei zweckmäfsigem Verfahren, schon in den ersten zwei oder drei Tagen weichen, ist die Voraussage günstiger.

Kur. — Eine streng antiphlogistische Behandlung und dieser angemessene Diät, ist anfangs dringend angezeigt; daher eine starke Venaesection, hierauf Blutigel an die Schläfegegend und endlich Umschläge von kaltem Wasser. Wo kalte oder feuchte Umschläge überhaupt nicht vertragen werden, da wähle man örtlich die trockne Wärme, weil in diesem Falle wahrscheinlich eine gichtische oder rheumatische Complication Statt findet. Gleich nach Anwendung dieser Mittel, gebe man täglich 2 bis 3 Mal eine starke Dosis *Calomel*, so dafs mehrere *Sedes* täglich erfolgen. Weichen die Entzündungssymptome bei diesem Verfahren nicht bald, so entleere man ohne Zögerung die wäfsrige Feuchtigkeit, durch Oeffnung der vorderen Augenkammer. Dieses geschieht am besten mittelst eines Messers, nicht mittelst einer Nadel. Nicht selten mufs diese kleine und unschädliche Operation mehrere Male wiederholt werden, weil sich die wäfsrige Feuchtigkeit zu schnell wieder ersetzt, als dafs sie bei einer heftigen Entzündung dauernde Hülfe sogleich schaffen könnte. Zur Tilgung der Schmerzen über den Augenbraunen ist das öftere Einreiben einer Salbe aus *Opium* und *Ungt. hydrarg. cin.* heilsam. Wo schon Ausschwitzung im Pupillarrande vorhanden ist und bereits antiphlogistisch verfahren wurde, giebt man *Calomel* mit *Extr. hyoscyami*, wobei man sich örtlicher lauwarmer Fomentationen aus *Extr. hyoscyami*, ℞ *a opii* und Wasser bedienen kann. Nach sicherer Minderung der *Phlogosis* gewähren oft trockne, gewärmte, aromatische Kräuter-

säckchen mit oder ohne Kamphor, grofsen Nutzen. Dasselbe ist von den Ableitungen durch Hautreitze, z. B. von Blasenpflaster, Brechweinsteinpflaster, von dem Senfpflaster und den Senffufsbädern zu rühmen, die bei diesem Uebel nicht zu vernachläfsigen sind.

Wo aller dieser Mittel ungeachtet, die Zeichen der Krankheit nicht gänzlich weichen wollen, da kann man innerlich *China*, *Valeriana*, *Calamus aromat.* und ähnliche Mittel versuchen, welche auch während der Reconvalescenz anzuwenden sind.

Wo die Pupille durch ausgeschwitzte Lymphe schon verwachsen ist, wird auch das beste Verfahren schwerlich einen glücklichen Erfolg haben.

Die Anomalien der Pupille.

Die Pupille ist mancherlei Veränderungen unterworfen, die ich füglich unter obiger Ueberschrift zusammen abhandeln kann.

So hat man z. B. die *Iris* quer durch ihre Circularfibern, besonders an ihrer unteren Hälfte, gespalten gefunden, so dafs dadurch die Pupille gleichsam gestielt erschien; ein Zustand der angeboren ist und den man mit dem Nahmen *Coloboma iridis* belegt hat. Walther, Wagner u. a. haben dergleichen Fälle aufgezeichnet.

Zuweilen ist die Pupille zu sehr erweitert, mehr oder weniger unbeweglich, und dann nennt man diesen Fehler:

Mydriasis. Diese ist entweder consensuell und als solche bei Gehirnwassersucht, bei manchen Augenwassersuchten, bei Wurmkrankheiten, Amaurose und bei hysterischen und hypochondrischen Subjecten anzutreffen; oder sie kommt für sich bestehend vor, und äufsert sich dann oft, als eine wahre Lähmung der *Iris*, die öfters auch bei dem Gebrauch einiger *Narcotica*, z. B. der *Belladonna*, des *Hyoscyamus*, beobachtet wird. Auch angebohrne, so wie durch den langen Aufenthalt im Dunkeln — also durch Gewohnheit — entstandene Erweiterungen der Pupille, hat man beob-

achtet. Adhäsionen der *Uvea* mit der vordern Linsenkapsel, können ebenfalls eine *Mydriasis* bedingen. Die Folgen, welche aus diesem Fehler entspringen können, wenn die nervösen Gebilde des Auges noch reitzempfänglich sind, bestehen in Lichtscheu, völliger Tageblindheit und in einer endlich hinzukommenden amaurotischen Amblyopie, weil die in zu grofser Menge, bis in den Grund des *Bulbus* dringenden Lichtstrahlen, jene nervösen Gebilde überreitzen. Manchmal bleibt das Sehvermögen ungetrübt; ich selbst behandle eben jetzt einen Färber an dieser Krankheit, welche den bisher angewendeten Mitteln hartnäckig widersteht, wobei aber der Leidende die feinste Perlschrift ohne Anstofs zu lesen im Stande ist. Das Leiden kommt häufig nur an einem Auge allein vor.

Wie dieses Uebel zu behandeln und was für eine Prognose zu stellen sei, geht im Allgemeinen schon aus dem Gesagten hervor. Man heile also wo möglich die Hauptkrankheit, oder lege, wenn Lähmung der *Iris* vorhanden wäre, Vesicatorien über die Augenbraunen, und gebrauche überhaupt äufsere und innere antiparalytische Medicamente, z. B. ein reitzendes Augenwasser mit *Zinc. sulphuric.* oder *Infus. hbae nicotianae*; auch schafft folgendes Mittel zuweilen bedeutende Hülfe: ℞. *Salis culinar. gr. jj. — vj. Aqua destill.* ℥*j. M. S.* Einige Male des Tages etwas davon in's Auge zu tröpfeln. Innerlich *Valeriana, China, Arnica Coloquindten, etc.*

Als palliative Mittel hat man Augenschirme und vorzüglich schwarze Röhrenbrillen empfohlen, damit dadurch das überflüfsige und schädliche Licht, von dem Auge abgehalten werden möge.

Ein entgegengesetzter Fehler des Sehloches ist:

Die zu sehr verengerte Pupille, *Myosis.* Man beobachtet sie, wie die *Mydriasis*, zuweilen angebohren oder als Zufall der *Hypochondrie* und *Hysterie.* Manchmal ist sie paralytischer Natur. Personen, welche sich häufig mit Betrachten kleiner, vorzüglich glänzender Dinge abgeben müssen, z. B. Uhrmacher u. a. bekommen nicht selten eine *Myosis ex consuetudine*, die

die nur dann geheilt werden kann, wenn sie die schädliche Ursache möglichst entfernen, in einem etwas verdunkelten Zimmer leben, und sich eines grünen Schirmes oder einer Röhrenbrille bedienen. Eine oft vorkommende *Myosis* ist diejenige, welche nach innern Augenentzündungen zurückbleibt. Hier ist die Regenbogenhaut starr, die Pupille zwar verengert, aber vollkommen klar und schwarz, und durchaus nicht winklicht oder verschoben; dabei klagt der Kranke beständig über Gesichtsschwäche, die des Abends sehr zunimmt. Die Prognose ist hier ungünstig, denn viele angewendete Mittel, konnten das Uebel bis jetzt nicht heben.

Im Allgemeinen ist die Krankheit schwer zu beseitigen. Ist sie in Folge eines unterdrückten Hautausschlages etc. entstanden, dann nützt die Anlegung einer nicht zu kleinen Fontanelle. Oft mufs man nach allgemeinen Anzeichen handeln, die Vollblütigkeit und den Blutandrang nach dem Kopfe, durch Aderlässe, Blutigel und nachher gegebene Brech - und Abführungsmittel, vermindern. Gar nicht selten entdeckt man keine hinreichende Ursache, und in diesem Falle hat man empirisch den innern und äufsern Gebrauch des *Extr. belladonnae* oder *hyoscyami* angerathen. Hinsichtlich des letzteren Mittels führen Mehrere erfolgreiche Versuche an. Corvisart z. B. erzählt zwei glückliche Fälle, in denen die Leidenden anfangs $\frac{1}{6}$ Gran, dann steigend bis zehn Gran im Tage nahmen.

Ein dritter Fehler endlich ist:

Die Verwachsung der Pupille, *Atresia pupillae.* — Wenn die äufserst feine und gefäfsreiche *Membrana pupillaris*, welche im Fötusalter die Pupille eine Zeitlang verschliefst, auch nach der Geburt zurück bleibt, so ist die *Atresia pupillae* angeboren; indefs sind Fälle dieser Art aufserordentlich selten. Bleiben dergleichen Membranen ja nach der Geburt zurück, so erfordern sie noch weit seltener augenärztliche Hülfe, denn meistens werden sie in wenigen Wochen von selbst absorbirt. Gewöhnlich ist der hier abzuhandelnde Fehler aus einer Entzündung hervor-

gegangen. Immer heben solche Atresien, je nachdem sie vollkommner oder unvollkommner sind, das Gesicht mehr oder weniger auf; indefs wird die Lichtempfindung auch durch die festeste *Atresie*, wenn sie allein zugegen, fast niemals vernichtet.

Die Entstehungsart der Pupillenverwachsung als Folgekrankheit der Augenentzündung, ist sehr verschieden. Oft entsteht sie nach einer innern Augapfelentzündung, welche von der *Retina* und *Chorioidea* ausgeht. Hier ist jedoch die *Atresia pupillae* nicht die Ursache der Blindheit, weil das Sehvermögen früher schon durch entstandene organische Veränderungen der Markhaut, aufgehoben ist. — Leicht und häufig entsteht eine unvollkommne Verschliefsung der Pupille, bei jeder *Iritis*, mit dem Uebergange des ersten Zeitraumes in den zweiten; vorzüglich oft geschieht diefs bei *Iritis syphilitica*, wie späterhin bei derselben gezeigt werden wird. Mangelt bei dieser *Atresie* zugleich alle Lichtempfindung, so ist auch hier die Verschliefsung der Pupille nicht an der völligen Blindheit Schuld, sondern oft andere noch wichtigere organische Veränderungen im Innern des *Bulbus*. — Auch nach resorbirten Eiteransammlungen in den Augenkammern, so wie nach Blutextravasaten in den letztern, bleiben oft Verschliefsungen der Pupille, durch darin sitzen gebliebenen Eiter oder coagulirtem Blut, zurück. *) — Auch eine partielle Verwachsung der *Iris* mit der *Cornea*, *Synechia anterior*, kann eine Pupillenverwachsung verursacht haben. Ist in diesem Falle die Pupille noch nicht vollkommen geschlossen, wird aber der Rest derselben, von einer Narbe der *Cornea* so bedeckt, dafs die Lichtstrahlen nicht durchdringen können, oder wird das Eindringen der Lichtstrahlen in die, selbst ganz normale Pupille, durch ein Leukom

---

*) Erstere Pupillenverschliefsung macht den sogenannten Eiterstaar, *Cataracta spuria purulenta*, die zweite aber den Blutstaar, *Cataracta spuria grumosa*, aus. Wird die Pupille nur von coagulabler Lymphe ausgefüllt, so ist diefs der sogenannte Lymphestaar, *Cataracta spuria lymphatica*.

völlig verhindert; so kann man diesen, von der Pupillenverwachsung ganz verschiedenen Zustand, füglich Pupillensperre nennen.

Aus den angegebenen Entstehungsarten wird klar, dafs die Vorhersage in manchen Fällen sehr ungünstig, und an die Bildung einer künstlichen Pupille gar nicht zu denken ist; ja zuweilen ist letztere selbst dann nicht statthaft, wenn die Pupillenverwachsung die einzige Bedingung der entstandenen Blindheit war.

Nur wenn mit einer *Atresie* der Pupille keine Complicationen in Hinsicht der Form und Mischung im Auge vorhanden sind, wenn die Blindheit nur in dem geschlossenen Sehloche liegt, der Kranke alle Abstufungen des Lichtes deutlich unterscheidet, sich von der vorhergegangenen Entzündung im Auge vollkommen wieder erholt hat, und nicht mit einer dyscrasischen Krankheitsanlage begabt ist, wird die Bildung einer künstlichen Pupille wahrscheinlich einen glücklichen Erfolg haben. — Sehr zweifelhaft hingegen ist der Erfolg dieser Operation, wenn sich die Lichtempfindung nicht ganz deutlich in allen Abstufungen ausspricht, und die Hornhaut sehr leucomatös, oder vernarbt und abgeplattet, oder staphylomatös erscheint, u. s. w. — Die Operation wird aber ganz erfolglos sein, wenn keine Lichtempfindung vorhanden, oder wenn ein normwidriger Zustand der *Iris*, oder gar des ganzen Augapfels zugegen ist. Daher kann die Anlegung einer künstlichen Pupille bei Fehlern der *Retina*, bei *Synchysis*, *Glaucom*, bei *Hydrops* oder *Atrophia bulbi*, bei allgemeiner Varicosität des Augapfels, so wie bei noch gegenwärtigen entzündlichen Affectionen des Auges, nichts helfen. — Die Trübung der Krystalllinse und ihrer Kapsel für sich allein, selbst wenn sie vollkommen mit der *Uvea* verwachsen wäre, setzt keine Gegenanzeige wider die künstliche Pupillenbildung; nur auf die Auswahl der Operationsmethode hat sie einen wichtigen Einfluss.

In der Regel soll die künstliche Pupille in dem innern Augenwinkel und mehr nach unten zu, angelegt werden; was aber bei weitem nicht immer mög-

lich sein wird, wo man dann jede Stelle, die am bequemsten ist, als nöthig und nützlich wählen muſs. Indeſs bleibt die beste Stelle zu einer Pupille, immer die Mitte der *Iris*.

Wenn es irgend thunlich ist, so legt man die neue Pupille in einem gesunden Theile der Regenbogenhaut an; denn da, wo diese durch vorausgegangene Entzündungen destruirt worden, schlieſst sich die künstliche Sehöffnung, durch Exsudation coagulabler Lymphe, gar leicht wieder.

Im Allgemeinen giebt es drei Hauptmethoden, künstliche Pupillen zu formiren; denn entweder wird die *Iris* bloſs eingeschnitten, *Corotomia*, *Iridotomia*, (von κορη, Pupille, ἱρις, Regenbogenhaut und τεμνω, ich schneide) oder es wird ein Stück derselben ausgeschnitten, *Corectomia*, *Iridectomia*, (ersteres Wort von κορη, ἐκ, aus, und τεμνω, letzteres von ἱρις, ἐκ, und τεμνω) oder endlich, sie wird in einem bestimmten Umfange von ihrem Ciliarbande losgerissen, *Corodialysis*, *Iridodialysis* (von κορη, ἱρις und διαλυσις, Auflösung, Ablösung). Die Männer, welche sich um die erste Methode besonders verdient gemacht haben, sind: Cheselden, der Erfinder künstlicher Sehöffnungen, dann Janin, Guerin, Sharp, Beer, Jurinne, Maunoir, Adams, Langenbeck u. a. Diejenigen, welche die zweite Methode besonders auszubilden suchten, waren: Wenzel, als Erfinder, Beer, Demours, Sabatier, Forlenze, Benedict, Gibson u. a. Das dritte Verfahren haben vorzüglich betrieben: Assalini, Buzzi, Scarpa, Schmidt, Himly, Beer, Buchhorn, Reisinger, Langenbeck, Graefe, u. m. a. Donegana zu Como vereinigte die *Iridodialyse* mit der *Iridotomie*, und Assalini die erstere mit der *Iridectomie*.

Urtheilen wir über die Vorzüglichkeit der Methoden, eine künstliche Pupille zu bilden, nach ihrer allgemeinern Brauchbarkeit, nach ihren glücklichern oder unglücklichern Erfolgen, so ist ohne Zweifel bei dem jetzigen Stande dieses Zweiges unseres Wissens, die *Iridodialyse* allen übrigen vorzuziehen, und diese Me-

thode ist jetzt auch die herrschende. Der Gebrauch der *Iridectomie* steht dieser hinsichtlich des öftern Gelingens und der Anzahl der Fälle, weit nach, und die mindest anwendbare ist die *Iridotomie*.

Die *Iridodialyse* glückt am oftesten, wenn sie durch die vordere Augenkammer gemacht werden kann.

Soll das Gesicht, so viel als bei neuen Sehöffnungen möglich, wieder hergestellt werden, so mufs entweder die Linse durchsichtig sein und bleiben, oder diese mufs aus der Pupille entfernt werden, oder der hinter der gemachten Sehe liegende Theil des *corporis* und der *coronae ciliaris*, mufs weggenommen worden sein, (welches aber in den meisten Fällen zu verwerfen ist) denn ohne eine von diesen drei Bedingungen, können, wie Beer und nach ihm mehrere bewiesen haben, die Lichtstrahlen nicht zur *Retina* gelangen.

Man darf die Bildung einer künstlichen Pupille im Allgemeinen nicht vornehmen, wenn ein gesundes, sehendes Auge noch vorhanden ist; denn hier wird auch die bestgerathenste Pupille die Sehkraft nicht vermehren, im Gegentheil, die gegenwärtige oft nur verwirren und ein Schielen herbeirufen.

Auch mufs man diese Operation bei jungen Kindern nicht verrichten.

Ich übergehe jetzt die meisten der Verfahrungsarten, welche die angeführten Männer auffanden und befolgten, und mag vorzüglich nur diejenigen erwähnen, die bei dem jetzigen Stande der Oculistik wahren practischen Nutzen gewähren können, und diesen durch längere Erfahrung auch unbezweifelt dargelegt haben. Manche der ältern Methoden führe ich nur des Zusammenhanges wegen an; neuere aber, deren Vorzüglichkeit noch nicht hinreichend dargethan, oder deren practischer Nutzen noch problematisch ist, werde ich nur beiläufig berühren.

Cheselden machte die erste künstliche Pupille an einem Knaben von 14 Jahren Anno 1728, und zwar durch *Iridotomie*; dieses war also die erste Methode künstliche Pupillen zu bilden. Er bediente sich dazu

eines kleinen schmalen Messerchens, welches nur auf der einen Seite schneidend war. Er stiefs es in die hintere Augenkammer bis an die Stelle der Niederdrückung des Staares ein: durchbohrte dann damit die Regenbogenhaut, führte es in die vordere Augenkammer, schob es nach dem innern Augenwinkel zu, zwischen der *Iris* und Hornhaut hin, wendete dann den schneidenden Theil des Messerchens gegen die *Iris* und machte in deren Mitte eine länglichte Queröffnung.

In neuern Zeiten hat Maunoir eine Methode der *Iridotomie* (und wohl nicht mit Unrecht) in Frankreich in Gebrauch gebracht, welche darin besteht, dafs der Operateur, durch einen vorhergemachten Hornhautschnitt, der nicht sehr grofs zu sein braucht, eine äufserst feine, wenig gebogene Knieschеere, in die vordere Augenkammer bringt, sie nun sanft öffnet, mit dem unteren scharfen und spitzigen Blatte, die *Iris* in der Mitte durchsticht, dieses Scheerenblatt an der hintern Fläche jener Haut, so lange vorschiebt, bis das obere mit einem Knopfe versehene Blatt an dem Orte der Vereinigung der *Cornea* mit der *Sclerotica*, in der vordern Augenkammer gekommen ist, und darauf die *Iris* auf einmal durchschneidet. Auf dieselbe Weise macht man nun einen zweiten, von dem ersten divergirenden Schnitt, so dafs beide Schnitte eine V bilden, deren Spitze sich in der Mitte der Regenbogenhaut befindet. Die Zirkel, wie die Radialfibern oder Gefäfse der *Iris* wirken nun bald, und eine halbmond- oder rautenförmige Pupille stellt das Gesicht des Kranken wieder her. *)

Auch Adams **) hat eine neue Methode der *Iridotomie* bekannt gemacht, nach welcher er mit einem

---

*) Siehe *Maunoir, Mémoires sur l'organisation de l'iris, et l'operation de la pupille artificielle. Paris*, 1812.

**) *Observations on ectropium or eversion of the eyelids, with the description of a new operation for the cure of that disease; on the modes of forming an artificial pupil, etc. London*, 1814.

scalpellähnlichen Messerchen, in die hintere Augenkammer durch die *Sclerotica* eingehend, von hinten einen gehörig grofsen einfachen Schnitt in die *Iris* macht, darauf ein Stück von der schon früher mit dem Instrumente zerschnittenen Linse in den *Iris*schnitt schiebt und diesen dadurch hindert, sich wieder zu schliefsen, was sonst fast unfehlbar geschehen würde.

Langenbeck *) modificirte die Adam'sche Methode, fand indessen darin, so wie in der *Iridotomie* überhaupt, kein Heil.

Die Einschneidung der *Iris* möchte wohl da, noch nicht ganz zu verwerfen, vielmehr zu versuchen sein, wo diese Haut durch eine vorhergegangene Entzündung nicht in ihrer Substanz alienirt worden, sondern förmlich normal ist, und wo sich die Fasern derselben in einem straffen, angespannten Zustande befinden; doch mufs die Oeffnung in der *Iris* auch hinreichend grofs gefertigt werden: auch müssen sonst keine Hindernifse im Wege stehen.

Die zweite Methode, zur Zeit weit weniger geübt als die Iridodialyse, wurde von Wenzel, dem Vater, zu Anfange des letzten Drittheiles des vorigen Jahrhunderts zuerst gemacht. Er bildete nämlich einen Hornhautschnitt, wie bei der Staarextraction, und machte, wenn sein Messer in die vordere Augenkammer gedrungen war, in derselben Zeit und mit demselben Instrumente einen Schnitt in die *Iris*, welcher im verjüngten Maafsstabe die Form des Hornhautschnittes nachahmte; den dadurch entstandenen Lappen der *Iris*, schnitt er ab. Diese Methode ist vorzüglich von Gibson **) und Beer modificirt und verbessert worden. Ersterer macht nämlich den gewöhnlichen Horn-

---

*) *Siehe dessen neue Bibliothek für Chirurgie etc. 1 Band, 2 St.*

**) *Practical observations on the formation of an artificial pupil, in several deranged states of the Eye; to wich are annedex, remarks on the extraction of soft Cataraks and those of the membranous Kind, trough a puncture in the cornea. London*, 1811.

hautschnitt, drückt den *Bulbus* etwas, damit die *Iris* vorfällt, und schneidet den vorliegenden Theil derselben ab.

Beer giebt hingegen zur *Corectomie* folgende Anweisung: Nachdem man mit dem Staarmesser *) (F. 11.), so nahe am Rande der *Sclerotica* als möglich, einen, eine Linie langen Lappenschnitt gemacht hat, fafst man sogleich, wenn die *Iris* nirgends mit der *Cornea* verwachsen, und erstere durch die in der hintern Augenkammer sich befindende wäfsrigte Feuchtigkeit, wulstig zwischen die Wundlippen der Oeffnung hervorgedrängt worden, die vorliegende Regenbogenhaut mit dem kleinen Staarhaken (F. 15.), und schneidet sie schnell mittelst der Daviel'schen Scheere an den Wundlippen weg, worauf dann, nachdem sich die *Iris* zurückgezogen, die gehörig gestaltete Pupille erscheint. — Ist die *Iris* aber irgendwo mit der Hornhaut verwachsen und die Pupille nur verzogen, so bringt man, nach vollendetem Hornhautschnitt, den kleinen Staarhaken so in die Wunde, dafs die Spitze desselben weder nach der *Iris*, noch nach der *Cornea* hinsteht, sucht in schiefer Richtung den Pupillarrand der *Iris* damit zu fassen, letztere zwischen die Wundlippen hervorzuziehen, und schneidet schnell den hervorgezogenen Theil mittelst der Daviel'schen Scheere weg. — Ist endlich die Regenbogenhaut auch an der Stelle, wo die künstliche Pupille angelegt werden soll, mit ihrem Pupillarrande an die Hornhaut geklebt, dann mufs man sie mittelst des eingebrachten Hakens, oder wenn dieser etwa immer ausreifst, mit der feinspitzigen Pincette (F. 5.) in ihrem grofsen Ringe fest fassen, zwischen den Wundlippen herausziehen, und etwas innerhalb derselben abschneiden, damit die *Iris* durch ein stärkeres Hervorziehen nicht zerreifse. **)

---

*) Ein gutes Staarmesser ist hierzu sehr brauchbar, weil man mit demselben die Hornhautöffnung, nach Erfordernifs, gröfser oder kleiner machen kann.

**) Dieses Abschneiden des *Iris*stückes, innerhalb der Hornhautwunde, ist aber ein ziemlich schwieriges Manöuvre

Nach vollendeter Operation wird der Operirte wie nach der Staarausziehung behandelt.

Da die Beer'sche Methode die Grundlage der Verfahrungsarten deutscher Operateure jetzt vorzüglich ausmacht, so habe ich diese auch genauer beschrieben.

Rathsam ist es, das Schnittchen in der Hornhaut, wie Philipp v. Walther zu thun pflegt, ohngefähr bis auf zwei Linien, oder noch etwas mehr, zu vergrösern. Die extensivere Verwundung in der *Cornea* schadet nichts und bewirkt eine weit bequemere Vollendung der zarten Operation; denn macht man einen gröfsern Hornhautschnitt, als Beer angiebt, so hat man den Vortheil, die, nach Ausfluſs der wäfsrigten Feuchtigkeit besser sich vordrängende und in die Wunde legende *Iris*, leichter mit dem Häkchen fassen zu können. Bei dem nur liniengrofsen Schnitt hingegen, geschieht dieses bei weitem nicht immer; wenigstens seltener in einem solchen Grade, dafs das Eindringen des Häkchens in die vordere Augenkammer, beim Fassen der Regenbogenhaut, umgangen werden könnte.

So modificirt, werden die Vortheile des Beer'schen und des Gibson'schen Verfahrens, in eine Methode vereinigt und das Rauhe des letztern vermieden.

Wenn *Centralleukome* den Durchgang der Lichtstrahlen durch die völlig normale Pupille verhindern, so macht der würdige Himly *) eine linienweite Oeffnung der Hornhaut, nahe an ihrer Peripherie, bringt einen kleinen Haken in die vordere Augenkammer, fafst damit den Pupillarrand der *Iris*, zieht ihn durch die Oeffnung der Hornhaut vor, und klemmt ihn in die Wunde ein, wo er dann mit der *Cornea* verwächst

---

und in der That kaum anzurathen. Beer selbst operirte auch nur in frühern Zeiten auf diese Weise, und übte späterhin bei den angegebenen Umständen fast ausschliefslich die *Iridodialyse*, die hier auch einen weit bessern Erfolg zeigt.

*) Dessen Biblioth. f. Ophth. 1. B. 1. St. Seite 175.

und die jetzt verzogene Pupille neben dem *Leukom* erscheint.

Wenn die *Cornea* sammt der *Iris* völlig destruirt ist, so schlägt Autenrieth vor, eine Pupille durch Ausschneidung eines Stückes der *Sclerotica* und der unter derselben liegenden undurchsichtigen Gebilde, neben der *Cornea* zu formiren, worauf sich dann diese Wunde mit einem durchsichtigen Häutchen überziehen und das Sehen möglich machen soll. Ob sich eine dergleichen Oeffnung in der harten Haut, jemals mit einem auch nur einige Zeit durchsichtig bleibenden Häutchen überziehen könne, und ob es möglich sei, durch solche Operation das Gesicht wieder zu erlangen, überlasse ich der eigenen Einsicht.

Die *Corectomie* ist vorzüglich dann angezeigt, wenn eine unverdorbene Linse zugegen, und die Durchsichtigkeit der *Cornea* zugleich nicht so sehr auf eine kleine Stelle beschränkt ist, als dafs man fürchten müfste, nicht hinreichenden Raum für die Pupille zu erhalten, wenn die Hornhautwunde etwa sichtbar vernarben sollte. Die nach einer Staarextraction entstandene Pupillenverwachsung, ist nur dann mit Sicherheit auf Erfolg zu operiren, wenn keine Verdunklung der zurückgebliebenen Linsenkapsel, und kein über den kleinen Ring der *Iris* sich hinaus verbreitender coagulirter Eiweifsstoff zu fürchten ist, welches beides man aus der sehr undeutlichen Lichtempfindung des Kranken erkennt. Ueberhaupt ist die Hoffnung: dafs die *Iridectomie*, durch einen glücklichen Erfolg, belohne, besonders dann vorhanden, wenn die Regenbogenhaut in ihrer Masse gesund und keinesweges durch einen vorhergegangenen Entzündungsprocefs bedeutend alienirt worden; denn ist letzteres der Fall, dann ist eine folgende Entzündung mit Ausschwitzung von Faserstoff, wovon die neue Pupille wieder verschlossen wird, sehr zu fürchten, denn die *Iris* behält hier die Neigung, denselben Procefs zu erneuern, durch welchen sie früher die normale Sehöffnung verschlofs und in ihrer Structur verändert wurde.

Die dritte Operationsmethode, die *Iridodialysis*, ist

die jetzt am meisten gebräuchliche, die am oftesten erfolgreiche, (obgleich die *Iridectomie*, unter den angegebenen Bedingungen gemacht und beim tadellosen Gelingen, dem Blinden, im Verhältnifs, ein besseres Gesicht zu verschaffen geschickt ist) und kann beinahe in allen Fällen mit Vortheil angewendet werden, in denen die Bildung einer künstlichen Sehe überhaupt zuläfsig ist.

Besonders aber ist sie dann angezeigt, wenn der, nach einer Entzündung in der hintern Augenkammer entstandene, Eiweifsstoff sich über den kleineren Ring der Traubenhaut gegen das Ciliarband hin erstreckt, welches man aus einer bedeutenden *Alienation* der Farbe in dem gröfsern Ringe der *Iris* und der undeutlichen Lichtempfindung erkennt. Nur sie fast allein pflegt ferner geübt zu werden, wenn ein mit der Traubenhaut überall verwachsener Kapselnachstaar, Kapsellinsenstaar oder ein Eiter- oder Blutstaar zugegen ist, wobei der Kranke noch eine bestimmte Lichtempfindung hat; denn alle diese Staare werden durch das Abziehen der *Iris* von ihrem Ciliarbande, aus der neuen Pupille meistens mit weggeschoben. Ferner endlich ist die *Iridodialyse* zu machen, wenn die Hornhaut bis auf einen so kleinen Theil unheilbar verdunkelt ist, dafs man sie nicht mit dem Messer gehörig öffnen kann, um eine Operation zu unternehmen, die allein durch die vordere Augenkammer gemacht wird und mithin eine Trübung des noch bestehenden durchsichtigen kleinen Hornhauttheiles, befürchten lassen würde.

Dafs Adam Schmidt der erste Entdecker der *Iridodialyse* sei, lassen uns Nachrichten aus Italien bezweifeln, denn Assalini soll sie schon früher, und Buzzi *) bereits im Jahre 1788 gemacht haben; da der treffliche Schmidt indefs davon, so wie von den Arbeiten Scarpa's, nichts wufste, so kann er wohl als Erfinder, wenn auch nicht als der erste, angesehen

---

*) Siehe G. Wagner, *Commentatio de Coremorphosi etc. Goettingae*, 1818. *pag.* 35. und *Baratta*, *l. c.*

werden. Bei seinen anfänglichen Versuchen machte er an einer noch durchsichtigen und bequem gelegenen Stelle der *Cornea*, eine Oeffnung, ging durch diese mit einer feinen Pincette in die vordere Augenkammer und trennte mittelst derselben fast den dritten Theil der *Iris* von dem Ciliarbande los. Später aber, und um den, vielleicht kleinen, noch durchsichtigen Theil der Hornhaut, in Folge des Eingehens durch letztere, nicht zu trüben, ging er, so wie fast zu gleicher Zeit auch Scarpa, mit einer vorn gebogenen, lanzettenförmigen Nadel *) durch die *Sclerotica*, wie bei der Depression, in die hintere Augenkammer vor der Linse, oder wenn diese fehlte, vor der vorderen Fläche der *Hyaloidea* vorbei, pflanzte die Spitze des Instruments etwa $\frac{1}{4}$ Linie vom *orbiculo ciliari* entfernt, in die Regenbogenhaut so ein, dafs die Spitze sichtbar wurde, fafste jene Haut so fest als möglich und löste sie durch leises Ziehen vom Ciliarbande ab.

Himly, Flajani, Beer und auch Schmidt, gingen mit ähnlichen Nadeln durch die vordere Augenkammer und trennten die *Iris* von da aus von dem *Ligamento ciliari* ab. Hier fand man den Erfolg im Allgemeinen günstiger.

Mag nun die Operation durch die hintere oder vordere Augenkammer unternommen werden, so wird die Linse durch obige Manöuvre aus ihrer Lage verrückt und von der neuen Pupille weggeschoben, und kann daher in Zukunft dem Gesichte nicht hinderlich sein, sie mag sich nun bereits in einem verdunkelten Zustande befinden, oder — was immer geschieht — erst in der Folge cataractös werden.

Wenn die *Iris* der *Cornea* so nahe liegt, dafs die Lostrennung der erstern ohne Verletzung der letztern, nicht gut möglich ist, so macht Himly die Operation *à deux temps*, indem er erst die Linse aus der Gegend der neuen Pupille removirt und nach einiger Zeit,

---

*) Siehe dessen *Ophthalm.* Biblioth. und Beer's Lehre von den Augenkr. 2. B. Instrumententafel Fig. 13.

nachdem die vordere Augenkammer wieder mit dem *Humore aqueo* angefüllt worden, die *Iridodialyse* unternimmt.

Die *Iridodialyse*, nach der Schmidt-Scarpa'schen Methode ausgeübt, zeigte den Aerzten eben keine glänzenden Erfolge. Die Operation mifslang häufig, was ganz besonders in dem Zurückziehen der losgerissenen *Iris* nach ihrem Ciliarbande, wodurch sich die kaum gefertigte Pupille wieder verschlofs, begründet war.

Da trat unser scharfsinniger Langenbeck auf *) und zeigte eine durchdachte Methode an, die *Iris* zu fixiren, wodurch er sich allein schon mit unverlöschbaren Zügen in die Jahrbücher der operativen Chirurgie eingeschrieben.

Sein Verfahren ist folgendes:

Nachdem er mit einem Staarmesser einen kleinen Schnitt in die *Cornea*, an einer bequem gelegenen Stelle gemacht hat, bringt er durch die Wunde ein feines Häkchen, wendet es, wenn er damit ganz nahe am grofsen Rande der *Iris* angekommen, so, dafs die Spitze desselben der letzteren zugekehrt ist, faſst nun die *Iris* einhakend und zurückziehend, löst auf diese Art fast den dritten Theil der Regenbogenhaut vom *Corpore ciliari* ab, zieht den am Häkchen hängenden Theil der *Iris* geschickt und vorsichtig in die Hornhautwunde, klemmt denselben hier ein und bildet auf solche Art, nachdem er leise das Häkchen gelöst, einen künstlichen Vorfall der Regenbogenhaut, neben einer künstlichen, sich nun nicht wieder verengenden Pupille zugleich. **)

Ist hinter der neuen Sehöffnung eine cataractöse Linse, die durch das Wegziehen der *Iris* nicht zugleich

---

*) Siehe dessen neue Bibliothek etc. 1. B. 2. St.

**) Der Gedanke, so wie die erste Ausführung des angegebenen Verfahrens, kommt Hrn. Hofrath Langenbeck, nicht Hrn. Hofrath Bonzel in Rotterdam zu, worüber sich ersterer im 4ten Hefte des 1sten Bandes seiner neuen Bibliothek hinreichend erklärt.

mit auf die Seite geschoben wurde, oder werden konnte; so zerstückelt er sie, wenn sie weich, und deprimirt sie, wenn sie hart ist.

Reisinger *), erwägend, dafs das einfache Häkchen öfters ausreifst und die Operation erfolglos macht, erfand ein doppeltes Häkchen, in Form einer Hakenpincette. **) Er bringt diese geschlossen, wo sie nur einen einfachen Haken darstellt, durch die Hornhautwunde in die vordere Augenkammer, bis zum grofsen Rande der *Iris*, wo er die neue Pupille anlegen will, dreht das Instrument mit der Spitze des Häkchens gegen die Regenbogenhaut hin, öffnet es etwas, hakt nahe am Ciliarrande in diese Haut ein, schliefst nun die Pincette wieder, zieht die *Iris* langsam vom Ciliarbande los gegen die Hornhautöffnung hin, und klemmt hier ein Stück derselben in die Wunde ein, damit das Zurückziehen der Regenbogenhaut, wodurch die neue Pupille vernichtet werden könnte, verhindert werde.

Der berühmte Graefe erfand ein Instrument, von ihm *Coreoncion* genannt, ***) welches aus einem feinen Häkchen mit einem Hakendecker, der sich vor und hinter schieben läfst, besteht, und welches so zusammengesetzt ist, dafs, wenn das Häkchen die *Iris* gefafst hat, der Hakendecker mit dem Häkchen nicht nur pincettenartig wirkt, sondern dem Instrumente auch einen anstofslosen Ausgang, beim Zurückziehen aus der Hornhautwunde verschafft.

Denselben Zweck hat ein neuerlichst von Langenbeck ****) erfundenes Instrument, dessen Mechanismus noch künstlicher und sinnreicher zu nennen sein möchte.

---

*) Darstellung eines neuen Verfahrens, die Mastdarmfistel zu unterbinden, und einer leichten und sichern Methode, künstliche Pupillen zu bilden. Augsburg, 1816.

**) Tab. V. Fig. 16.

***) Das *Coreoncion*, ein Beitrag zur künstlichen Pupillenbildung, von Ch. Jüngken. Berlin und Leipzig, 1817.

****) Neue Bibliothek für die Chirurgie etc. 1. B. 1. und 4. H. 1818. und 2. B. 1. H. 1820.

Es ist allerdings wahr, dafs der Ausgang aus der Hornhautwunde, mit unbedeckten Häkchen, zuweilen nicht ohne Anstofs vor sich geht, besonders bei unruhigen Kranken; indefs kann ich nicht läugnen, dafs ich das einfache Häkchen oder die Reisinger'sche Hakenpincette allen complicirten Instrumenten vorziehe, und will lieber das sehr unruhige Auge durch ein Häkchen fixiren und mich auf eigne Einsicht und genaue Handhabung verlassen, als auf den zusammengesetzten Mechanismus der Werkzeuge. Das einfache Häkchen, dessen ich mich bediene, ist zwar in der Gröfse der Krümmung dem Langenbeck'schen gleich, aber etwas stärker, wodurch das Ausreifsen desselben mehr verhindert wird.

Soll das Instrument nicht in die Regenbogenhaut einreifsen und diese leicht sich von dem Ciliarbande lösen, so mufs die Spitze des Häkchens, der grofsen Peripherie der *Iris* so nahe, als irgend möglich, eingepflanzt werden.

Es sind aufser den schon angeführten, in den neuesten Zeiten noch mehrere Instrumente zur *Iridodialyse*, von Deutschen erfunden worden, die zwar zum Theil noch complicirter sind, dem Erfindungsgeiste der Aerzte aber, alle Ehre machen. Ich nenne nur die Staarnadelzange von Wagner, das zangenförmige Instrument von Dzondi, das Staarnadelhäkchen von Emden und das *Iriankistron* von Schlagintweit.

Obgleich die angegebenen drei Methoden, künstliche Sehöffnungen zu fertigen, hier die eine, dort die andere, fast überall angewendet werden können, wo bei bestehender Sehfähigkeit der *Retina*, ein gröfserer oder kleinerer Theil der Hornhaut noch durchsichtig ist; so giebt es doch auch noch Fälle, wo weder die *Iridotomie* noch die *Iridectomie*, gelingen kann, noch die gewöhnlichen Species der *Iridodialyse* mit Vortheil auzuwenden sind.

Ein solcher Fall ist unstreitig der, wo eine *Cataract* mit dem verschlossenen Pupillarrande der Regenbogenhaut gröfstentheils oder rings herum adhärirt und der, durch die ursächliche Entzündung exsudirte,

Lymphstoff sich so weit über die *Uvea* verbreitet hat, dafs dieselbe mit dem Ciliarbande und den nahe gelegenen hinteren oder vorderen Parthieen in festerer Verbindung steht, als dieses im Normalzustande gefunden wird. Hier reifsen die Häkchen und Hakenmaschinen gewöhnlich aus, ohne dafs sich die Regenbogenhaut gehörig abtrennt.

Ich habe unter solchen Umständen, bei einem jungen Mädchen, ein besonderes Verfahren befolgt, welches ich hier zwar kürzlich beschreiben will, über das Weitere aber auf ein unlängst von mir erschienenes Schriftchen verweise. *)

Nach-

---

*) Ueber künstliche Pupillen, und eine besondere Methode, diese zu fertigen. Mit einer Kupfertafel. Berlin, 1821. In der Schüppel'schen Buchhandlung.

In einem Werke, wie vorliegendes Handbuch, welches sich nicht zum besonderen Vorwurfe macht, Operateurs zu bilden, kann man überhaupt nicht in die genauesten Details der Indication und der technischen Handgriffe eingehen; wenigstens nicht bei so wichtigen und schweren Operationen, als die verschiedenen Methoden, ein neues Sehloch zu formiren, für den Anfänger sind und sein müssen. Nur unter Aufsicht eines Meisters, kann sich das Talent zur operativen Technik gehörig practisch ausbilden, und wer dann die Goldkörner folgender Schriften herauszufinden weifs, wird in Zukunft mit deutlicherm Bewufstsein als unsere Vorfahren, künstliche Pupillen anzulegen fähig sein.

Beer, Ansicht der staphylomatösen Metamorphosen des Auges und der künstlichen Pupillenbildung. Wien, 1805, und der Nachtrag dazu 1806. — Himly's und Schmidt's Bibliothek für *Ophthalmologie etc.* — Benedict, *de pupillae artificialis conformatione libellus. Lipsiae*, 1810. — Langenbeck's neue Bibliothek für die Chirurgie u. s. w. — Scarpa's a. W. — Reisinger's a. W. — Jüngken, das *Coreoncion etc.* 1817. — Wagner, *Commentatio de coremorphosi etc.* 1818. — Wenzl, über den Zustand der Augenheilkunde in Frankreich; nebst kritischen Bemerkungen über denselben in Deutschland. Nürnberg, 1815. — Schlagintweit, über den gegenwärtigen Zustand der künstlichen Pupillenbildung in Deutschland. München, 1818. — Cooper's und Richerand's Handbücher der Chirurgie. — Endlich die schon angeführten Schriften von Baratta, Quadri, Adams, Gibson, Maunoir u. m. a.

Nachdem ich die Stellung der Blinden, die des Assistenten, meine eigne und das Halten der Augenlieder, auf dieselbe Art, wie bei der Staarausziehung, geordnet und bewerkstelligt hatte: öffnete ich die *Cornea*, eine halbe Linie von ihrer Peripherie, in der Gegend des äufseren Augenwinkels, durch einen kaum liniengrofsen Einstich, mittelst eines Beer'schen Staarmessers, und, weil ich das rechte Auge zu operiren hatte, durch die linke Hand. Durch diese Oeffnung führte ich jetzt meine Hakennadel *) (welche nicht gröfser als das Beer'sche Staarhäkchen, aber weiter geöffnet, daher nadelförmiger, nach vorn zu nicht rund, sondern in der vorderen Krümmung ein wenig breit und am äufsersten, scharf spitzen Ende, lanzettenförmig, an beiden Rändern völlig abgerundet und stumpf ist) so in die vordere Augenkammer, dafs die Spitzenseite derselben nach oben, die in den Stiel verlaufende aber nach unten sah, die Spitze selbst aber weder der *Iris*, noch der *Cornea* zugekehrt war, schob dieselbe schnell durch die von wäfsrigter Feuchtigkeit noch ziemlich strotzende vordere Augenkammer, bis eine Linie über den noch sichtbaren verwachsenen Pupillarrand nach dem grofsen Augenwinkel hin, wendete jetzt, ohne die *Iris* zu verletzen, das Instrument so, dafs die zugleich schneidende Spitze in der innern und obern Gegend der Regenbogenhaut, diese berührte, und machte perpendiculär nach unten, auf der vordern Fläche der *Iris* hingleitend einen oberflächlichen Schnitt von der Länge des Halbmessers der ganzen Breite der vorderen Augenkammer, bei welchem ich so wenig Druck anwendete, dafs diese Haut nur eingeschnitten, nicht aber durchgeschnitten war. Indem ich nun von unten nach aufwärts, bis in die Mitte der Schnittrinne, zurückkehrte, hier mit der Spitze der Hakennadel die Regenbogenhaut durchstach und möglichst fest fafste, zog ich das Werkzeug etwas nach dem Eingangspunkte der Hornhaut zurück, durch

---

*) Siehe d. ang. Werk.

welches Manöuvre ich eine ziemlich lange, wegen der dahinter liegenden cataractösen Linse aber, getrübte Spalte in der *Iris* bewirkte. Jetzt schob ich das Instrument, die Spitzenseite nach oben, die in den Stiel verlaufende nach unten gerichtet, in horizontaler Richtung wieder nach dem Einstichsorte der *Iris* hin, und nachdem ich in die gemachte Regenbogenhautspalte, kaum eine halbe Linie weiter nach dem innern Augenwinkel hin, vor — und eingedrungen war, wendete ich, ohne mich um die von der Hakennadel losgegangene *Iris* zu kümmern, das Instrument so, dafs ich den Linsenrand, welcher nach dem innern Augenwinkel hin gerichtet ist, fest mit demselben fassen konnte, kehrte, das Häkchen drehend, dafs die Spitzenseite halb nach innen und oben, die in den Stiel verlaufende aber halb nach aufsen und unten blickte, mit diesem zurück nach der Hornhautöffnung, wälzte dadurch die ganze Linse, mit ihrer (wie es schien) ziemlich festen Kapsel, um ihre Perpendicularaxe in die neugebildete, und sich, durch das Einklemmen der Linse, erweiternde Pupille und zwar so, dafs der innere Linsenrand der vordere, der äufsere aber der hintere wurde, und die hintere Linsenfläche nach dem innern, die vordere nach dem äufsern Augenwinkel hin gerichtet war. Mit der in der Linsenkapsel noch fest sitzenden Spitze des Instruments, suchte ich diese, so wie die, weder harte noch weiche, Substanz der Linse selbst, durch unregelmäfsige Bewegungen möglichst zu zerreifsen und zu zertheilen, doch ohne dadurch die Linse zurück und aus der neuen Sehöffnung zu drücken, und nachdem ich durch eine Bewegung des Häkchens nach dem Boden der vorderen Augenkammer, dieses von der Krystalllinse entfernt hatte, führte ich es, die Spitzenseite nach oben, die in den Stiel verlaufende nach unten gerichtet, aus der kleinen Hornhautwunde heraus, indem ich die Convexität des Halbkreises der Hakennadel am untern Winkel der Hornhautwunde herausgleiten liefs, wobei der Stiel des Instruments fast eine Diagonallinie aufwärts beschreiben mufste. Dadurch verhütet man das Einha-

ken des Werkzeugs beim Herausgehen aus der Hornhaut am sichersten, wenn nur die Krümmung der Nadel nicht zu stark ist.

Die neue Pupille war ansehnlich grofs, von ovaler Form, und hatte ihre Lage ziemlich in der Mitte der *Iris*: doch etwas mehr nach dem Nasenwinkel hin. Die Krystalllinse ragte in die vordere Augenkammer so hinein, dafs sie die innere Fläche der *Cornea* fast berührte; übrigens lag sie beinahe ganz im Centro der *Iris*, und liefs einen freien dreieckigten Raum in der gefertigten Pupille, der einen kleinen Winkel nach der Nase hin bildete, aber mit etwas Blut verstopft zu sein schien. Die Blutung aus der Regenbogenhaut war indefs unbedeutend; doch trübte sich durch erstere die wäfsrigte Feuchtigkeit schon während der Operation etwas, wodurch aber die Einsicht in das Auge eben nicht gestöhrt wurde.

Die Linse wurde in Kurzem resorbirt und die neue Pupille völlig schwarz.

b. Von den Krankheiten der *Retina* und des Sehnerven.

Die reine Entzündung der Markhaut, *Retinitis.*

Wenn man anfangs ungemeine Lichtscheu mit Thränenfluſs, bei Kopfschmerzen und stechenden Gefühlen in der Tiefe des Auges findet, wenn der Kranke hierauf Blitze und Feuerfunken vor dem *Bulbus* aufschiefsen sieht, die durch alles was Congestionen nach dem Kopfe erregt, gesteigert werden, wenn derselbe nach Abnahme jener Symptome an einer gröfsern oder geringern wirklich nervösen *Amblyopie* leidet, wenn beim ersten Auftreten des Uebels, *Mouches volantes* der gewöhnlichen Art erscheinen, von denen einige nicht selten mit einer hellen, ja feurigen Peripherie eingefafst sind und die in dem Grade mehr und mehr erlöschen und verschwinden, in welchem die *Amblyopie* zunimmt, und wenn der Arzt endlich während dem Verlaufe des Uebels nichts auf Entzündung deutendes am Auge be-

merkte, als etwa eine wenig verengerte Pupille; so kann man eine möglichst beschränkte *Retinitis* muthmafsen. Selten wird man aber eine so beschränkte Entzündung der *Retina* wahrnehmen, denn meistens leiden die *Chorioidea*, *Iris* und *Sclerotica* mit, und zeigen dann dieselben Symptome, welche unter *Ophthalmitis interna* angegeben werden.

Ueberreitzung der Netzhaut durch heftiges Licht, durch anhaltendes Betrachten kleiner glänzender Gegenstände und unterdrücktes Nasenbluten u. s. w. brachten die Krankheit hervor.

Die Prognose ist noch ziemlich günstig, wenn die Krankheit nicht lange dauerte, gleich anfangs gehörig behandelt wurde, und die nachfolgende *Amblyopie* unbedeutend ist. Tritt aber das Leiden langsam und schleichend auf, so bleiben oft Varicositäten zurück, welche die *Amblyopie* unterhalten. Hat die Entzündung die Markhaut organisch verändert, so ist die amaurotische *Amblyopie* oder *Amaurose* unheilbar.

Die Kur ist wie bei *Ophthalmitis interna*. Eine nachbleibende *Amblyopie*, welche durchaus nicht in organischen Entmischungen der Gebilde des *Bulbus* ihren Grund hat, wird durch Einreibungen und Dämpfe jener flüchtig reitzenden Mittel geheilt, welche bei der Heilung der *Amaurose* im Allgemeinen, angegeben werden.

Der schwarze Staar, *Amaurosis*, (von αμαυρος, schwach, stumpf, hier vom Auge gebr.) *Gutta serena*.

Unter dem Worte, schwarzer Staar, versteht man eine wahre Blindheit, deren Grund in denen Gebilden liegt, welche die Sehkraft im normalen Zustande leiten; da nun diese Kraft den nervösen Gebilden des *Bulbus* angehört, so mufs die Krankheit auch in diesen und vorzugsweise in der *Retina* und dem Sehnerven ihren Sitz haben. Ist solche nervöse Blindheit nicht vollkommen, sieht der Kranke noch mehr oder weniger, so nennt man diese unvollkommene

Blindheit, amaurotische Gesichtsschwäche, *Amblyopia amaurotica*, die zuweilen nie in völlige Amaurose übergeht, vielmehr unverändert durch das Leben dauern kann.

Symptome des schwarzen Staares im Allgemeinen. — Füglich theilt man die Zeichen der *Amaurose* in solche ein, welche nur der Patient selbst bemerkt (subjective Zeichen) und in solche, die von dem Arzte bemerkt werden (objective Zeichen).

Subjective Zeichen. — Bald auf einem Auge allein, bald auf beiden zugleich, nimmt das Sehvermögen ab, oder ist schon gänzlich vernichtet. Dieses Symptom ist immer zugegen; nur gehen demselben bald einige der folgenden Zeichen voran, bald wird die Abnahme des Sehvermögens von diesen oder jenen der gleich folgenden Symptome begleitet.

Der Kranke empfindet nicht selten eine lästige Trockenheit der Augen, und ein Gefühl, als wenn der *Bulbus* aus der *Orbita* gedrängt würde; oft klagt er über eine Empfindung im Augapfel und seinen Umgebungen ohne allen Schmerz, er klagt über eine besondere Vollheit des Auges, über eine ungewöhnliche Schwere des Augapfels; öfters wird er dabei von einem heftigen Schwindel ergriffen, welcher gewöhnlich mit einer bedeutenden Abnahme des Sehvermögens und zuweilen mit heftigen Kopfschmerzen endet; manchmal glaubt er, ein feiner Staub liege unter den Augenliedern und fürchtet sich defswegen, dieselben zu bewegen. Oft werden die Patienten unter wiederkehrenden allgemeinen oder halbseitigen Kopfschmerzen amaurotisch. Solche schmerzhafte Gefühle gehen überhaupt häufig der amaurotischen Blindheit ziemlich lange voraus, oft erfolgen sie erst, wenn ein oder wenn beide Augen bereits erblindet sind, aber nicht selten entsteht der Schmerz mit der angehenden Blindheit zugleich; endlich giebt es Amaurotische, bei welchen der heftigste Schmerz nur bis zur vollkommensten Ausbildung der Amaurose anhält und dann allmählig und auf immer verschwindet. Zuweilen wird der Schmerz so heftig, dafs die Leidenden die Besinnung verlieren,

und selbst zu rasen anfangen; in diesem Falle findet man jederzeit nach dem Tode, vorzüglich an der *Basis* der Schädelhöhle, wichtige organische Fehler der Knochen oder des Gehirns. Fangen neben der vorhandenen vollkommenen Amaurose die übrigen Sinne und auch das Gedächtnifs an schwach zu werden, so enden diese Leiden nur mit dem baldigen Tode.

Zuweilen scheint nur die Hälfte der *Retina* amaurotisch zu sein, und dann sieht der Kranke nur die Hälfte der vorliegenden Gegenstände, (*Hemiopsia*, *Visus dimidiatus*) oder es scheinen nur einzelne Theile an den Gegenständen zu fehlen, (*Visus interruptus*) oder die Sehkraft ist in der *Retina* ungleich vertheilt, woher denn halbdurchsichtige, strich- ring- oder schlangenförmige Gestalten, *Scotomata*, entstehen, die anfangs vor den Augen unstät herumfliegen, späterhin aber fest stehen. Diefs nennt man Mückensehen, (*Visus muscarum*). Erscheinen jene Gestalten netz- oder florartig, so heifst diefs *Visus reticulatus*. Oefters sieht der Kranke Licht und Blitze vor den Augen, (*Visus lucidus*, *Photopsia*, *Marmaryge Hippocratis*). Zuweilen leidet er an Lichtscheu, (*Photophobia*) während welcher er oft bei schwacher Beleuchtung die kleinsten Dinge erkennen kann, (*Oxyopia*). Nicht selten sieht der Kranke alle Gegenstände neblicht oder wie mit Kohlenstaub bedeckt, (*Visus nebulosus*). Manchmal sehen die Patienten doppelt, (*Diplopia*) oder sehen Farben, *Crupsia*, vorzüglich an den Peripherien der Objecte; zuweilen fehlt ihnen aber auch die Fähigkeit, die Farben richtig zu unterscheiden *), *Achromatopsia*, oder sie schielen, (*Strabismus*) oder leiden am Schiefstehen des Auges, (*Luscitas*). Zuweilen sind sie kurzsichtig, zuweilen fernsichtig; manchmal hingegen se-

---

*) Besonders sind dieses diejenigen Farben, welche wegen ihrer Mattigkeit in einander überfliefsen. Insgemein ist es eine Gesichtsschwäche. Mangel an schwarzen Pigment kann nicht Schuld sein, weil man den Fehler sonst bei den Kackerlacken immer beobachten müfste.

hen sie die Gegenstände ganz verunstaltet und verschoben, (*Visus defiguratus, Metamorphosia*). *)

Die objectiven Zeichen des schwarzen Staares liegen vorzugsweise in der Pupille, denn bald, und meistens, findet man diese zu grofs, bald zu klein, aber fast immer erscheint sie winklicht und verzogen. Dabei ist die Schwärze der Pupille selten so rein, wie bei gesunden jungen Subjecten, denn bald ist sie etwas rauchigt und neblicht, bald aber dunkelgrau oder graugrünlicht, bald endlich ist sie röthlich oder gelblich weifs und wird dann einer Trübung der Pupille, wie man sie bei der *Cataract* bemerkt, mehr oder weniger ähnlich; doch erscheint in allen diesen Fällen die Trübung deutlich im Hintergrunde des Auges und ist oft merklich concav. Die *Iris* ist zugleich bald ganz starr und bei dem stärksten Lichtwechsel unbeweglich, bald bewegt sie sich etwas, bald aber, wiewohl selten, zeigt sie grofse Beweglichkeit. Wenn nur ein Auge amaurotisch ist, so contrahiren und expandiren sich zuweilen beide Pupillen, so lange beide Augen offen stehen, schliefst man aber das noch gesunde Auge, so wird die *Iris* des andern augenblicklich starr und die Pupille erweitert und winklicht. Auch die Farbe und Structur der Regenbogenhaut, erleiden in manchen Arten der Amaurose eine sichtbare Umänderung, besonders wo ein dyscrasischer Procefs die

---

*) So häufig auch alle diese Phänomene, Symptome einer angehenden Amaurose sein können und wirklich sind, so kommen sie doch fast alle auch an dem übrigens gesunden Auge vor, welches wenigstens von keiner *Amblyopia amaurotica* befafst zu werden fürchten darf; denn Nervengebilde sind in ihren Aeufserungen höchst wandelbar und vielfältig. Eben so wenig ein Kältegefühl im Rücken in jedem Falle ein Fieber anzeigt, eben so wenig ein plötzliches unwillkührliches Zittern eines Fufses oder Armes eine *Chorea St. Viti* constituirt oder nur ankündigt, eben so wenig läfst eines jener Symptome geradezu eine wahre Gesichtsschwäche oder gar Blindheit immer befürchten. Es erfordert daher nicht selten grofse Umsicht des Arztes, über die Gefährlichkeit oder Unbedeutenheit einer oder mehrerer jener Erscheinungen richtig zu urtheilen.

Kräfte der *Retina* und des *Nerv. optic.* vernichtet. Wo diese Umänderung bereits eingetreten, verspottet das Uebel meinen Beobachtungen zufolge gewöhnlich alle Mittel. Man hat dieses objective Symptom mancher Amaurosen bisher fast gänzlich unberücksichtigt gelassen, weſswegen ich glaube, die Aerzte darauf aufmerksam machen zu müssen; vielleicht daſs dadurch die *Symptomatologie* des schwarzen Staares einen reichen Zusatz gewinnt. Oefters leiden Amaurotische auch an wahrer Schlafsucht oder Schlaflosigkeit, an paralytischen Erscheinungen der Gesichtsmuskeln oder der Extremitäten, so wie auch an convulsivischen Zufällen, die, wenn sie erst nach vollkommen ausgebildeter Blindheit sich einstellen, meistens ein sehr böses Zeichen in Hinsicht des Lebens abgeben.

Uebrigens kann der schwarze Staar plötzlich, oder wie gewöhnlich, langsam entstehen; er kann dauernd, vorübergehend, periodisch und selbst intermittirend sein; er kann ferner rein örtlich oder mit *Glaucom, Cirsophthalmie, Cataracta, Blepharoplegie, Atrophia bulbi etc.* complicirt auftreten, oder kann endlich mit allgemeinen Krankheiten verbunden, und aus diesen entstanden sein. Solche allgemeine Krankheiten sind vorzüglich Gicht, *Rheumatismus, Chlorosis, Typhus, Hydrocephalus*, Keuchhusten, Auszehrung, u. v. a.

Bei *Hydrophthalmie*, bei *Glaucom*, bei bedeutender *Cirsophthalmie*, leidet die Kraft der Nervenhaut immer zugleich mit, und ein unvollkommener oder vollkommener schwarzer Staar ist deſswegen stets damit verbunden.

Die Ursachen des schwarzen Staares im Allgemeinen. — Im Allgemeinen bindet sich die Amaurose an kein Alter und Geschlecht, indessen besitzen Menschen mit schwarzen oder braunen Augen weit mehr Anlage zur Krankheit, als die blau- oder grauäugigen; vorzüglich haben dunkle Augen beim Aufhören der Menstruation oder bei unterdrücktem Hämorrhoidalfluſs, für ihr Gesicht zu fürchten. Menschen, welche mit einem sogenannten nervösen *Habitus* begabt sind, bei welchen das Nervensystem sich in einem beson-

ders aufgeregten Zustande befindet, oder die an wahrer Plethora, mit Neigung zu Blutcongestionen nach Kopf und Auge leiden, haben eine besondere Disposition zu dieser Krankheit. Ueberhaupt bemerken wir bei der Mehrzahl der Fälle, dafs im Allgemeinen die nächste Ursache in einem ungewöhnlichen Andrange des Blutes nach den Augen besteht, dieser mag nun durch ein ungewöhnliches quantitatives Verhältnifs des letzteren, oder durch einen qualitativen Reitz verursacht werden. — Zuweilen ist die Amaurose erblich, doch nur sehr selten; auch sind die von den Aerzten aufgezeichneten Beobachtungen, nicht völlig überzeugend. — Derjenige schwarze Staar, welcher seinen Grund in einer *Idiosyncrasie* gegen manche Nahrungs- oder Arzneimittel, oder gegen diesen oder jenen körperlichen Zustand hat, ist selten. Zu dieser seltenen Amaurose gehört vorzüglich jene, welche gleich anfangs einer Schwangerschaft entsteht, und nach Ende derselben verschwindet, aber immer mit Ekel und einem nicht zu stillenden Erbrechen verbunden ist. Morgagni (*Epistola XIII.*) erwähnt einen solchen Fall, in welchem die Blindheit wieder verschwand. Beer erzählt einen andern, wo die Blindheit endlich dauernd blieb und die Leidende, auch nach der Entbindung, nicht wieder verliefs.

Der Cichorienkaffee, das Bitterbier, bittere Arzneimittel, vorzüglich *Quassia*, auch *Narkotica* *) und das Blei haben schon öfters einen schwarzen Staar verursacht. — Ebenso können Infarcten des Unterleibes, Hypochondrie und Hysterie, andauernde Blutcongestionen nach dem Kopfe durch Anstrengung der Denkkraft, und nach Schmucker u. a. durch forcirte Märsche bei heifsem Wetter u. s. w., Unterdrückung gewohnter Blutflüfse u. ähnl. Urs. einen amaurotischen Zustand hervorbringen. Defsgleichen geben der Son-

---

*) Auch der allzuhäufige örtliche Gebrauch narkotischer Mittel können endlich eine wahre Schwäche der Sehkraft bedingen. Dasselbe gilt von den ammoniacalischen Dämpfen, wenn die Augen denselben oft und lange ausgesetzt werden.

neustich, innere reine Augapfelentzündungen, *Encephalitis*, Mifsbrauch der Augen beim Betrachten kleiner glänzender Gegenstände, besonders durch Microscope, das Anschauen des Mondes und der Sonne, das Eindringen eines Blitzes in eine dunkle Stube, das Reisen bei Sonnenschein in einer beschneieten Gegend, eine häufige Ursache zur Entstehung einer amaurotischen Amblyopie oder einer vollkommenen Amaurose. — Oft liegt das Ursächliche des schwarzen Staares in einer allgemeinen oder örtlichen Schwäche, die z. B. durch Onanie, zu häufige Pollutionen, Salivationen und anhaltende Diarrhöen, durch Erschütterungen des Augapfels als Folge eines heftigen Niesens oder von Schlägen auf den *Bulbus* und auf die Supraorbitalgegend u. s. w. entstanden sein kann. Oft ist langwierige Betrübnifs oder Verdrufs, immerwährendes Weinen bei kummervollen Nahrungssorgen, langes Fasten, Wachen, heftiger plötzlicher Schreck, unmäfsiger oder verhaltener Zorn, zu häufiges Waschen und Baden der Augen mit sehr kaltem Wasser, u. s. w. Schuld an der Krankheit. Zuweilen bemerkt man nach *Typhus*, wie Reil, Beer u. a. vorübergehende oder dauernde Amaurosen.

Eine sehr häufige Ursache, ist die Gicht, so wie auch manche andere Dyscrasien. — Auch Würmer, gehemmte und zurückgetriebene Fufs- und Gesichtsschweifse, das schnelle Zuheilen alter Fufsgeschwüre, Unterdrückungen chronischer Hautausschläge u. dergl. bringen nicht selten einen schwarzen Staar zu Stande. Dasselbe thun auch Geschwülste in der *Orbita*, *Caries*, innerer Wasserkopf, *Hydrophthalmos*, *Cirsophthalmie*, *Synchysis* und *Glaucom.* — Eine bis jetzt nur von Beer beachtete Schädlichkeit, welche gröfstentheils die *Amblyopia senilis* bedingt, soll nach ihm in einer immer mehr abnehmenden Absonderung des schwarzen Pigments an der *Chorioidea* bestehen. Endlich kann auch der Schwefeldampf, wenn er häufig das Auge trifft, *Amblyopie*, *Amaurose*, zuweilen auch nur *Mydriasis* herbeiführen; eine Ursache, die bis jetzt noch unbekannt zu sein scheint, deren ominöse Fol-

gen ich aber hier in Dresden, besonders bei Strohhutverfertigern mehrere Male zu beobachten Gelegenheit gehabt habe.

Die Vorhersage des schwarzen Staares im Allgemeinen. — Den Grund, warum die Amaurose so selten wirklich geheilt wird, vermuthet Beer in der mangelhaften Aetiologie, in der zu sehr gemischten Complication der Krankheit und in der wenigen Mühe, die sich die Aerzte geben, dieselbe gehörig zu durchblicken; oft verliert auch der Kranke die Lust zur Fortsetzung einer wirklich mit einigem Erfolg angefangenen Kur.

In der Regel können jene Amblyopien oder Amaurosen am wahrscheinlichsten geheilt werden, welche unlängst und schnell entstanden waren, weil sich hier die Krankheit den nervösen Gebilden noch nicht sehr angeeignet hat und das Ursächliche der Amaurose oft leicht erforscht wird.

Zuweilen verschwindet die amaurotische *Amblyopie* ohne Hülfe der Kunst, nachdem zuvor plötzlich eine krankhafte oder normale Thätigkeit des Körpers auftrat. Zu diesen heilenden Thätigkeiten gehören Hautausschläge, eiterartige Ausflüsse der Ohren, heftiges Nasenbluten, wiedererschienene Hämorrhoidalflüsse und Menstruationen, u. s. w. — Amaurosen, die durch übermäfsigen Gebrauch narkotischer Mittel entstanden sind, verschwinden oft von selbst wieder. — Heilt der Arzt eine Amaurose glücklich, so bleibt doch häufig *Amblyopie* zurück. Oft wird das eine Auge nur geheilt, das andere aber nicht, oder der Staar heilt nur auf einer Stelle der *Retina*, wo dann der Kranke die Gegenstände, wenn er sie deutlich sehen will, dem geheilten Punkte der Netzhaut gerade gegenüber stellen mufs. — Völlige Heilung beider Augen ist selten. — Wenn der Staar nach und nach geheilt wird, so kehrt gewöhnlich das Sehvermögen unter denselben Erscheinungen zurück, (z. B. unter Netz- Mücken- und Lichtsehen u. dergl.) unter denen der Verlust desselben entstanden war.

War anfangs nur ein Auge amaurotisch, so wird

meistens auch das andere erblinden, besonders wenn das Uebel aus einer allgemeinen Ursache hervorging.

Uebrigens kann man oft schon aus dem Anblick des kranken Auges die Unheilbarkeit der Blindheit prognosticiren, vorzüglich wenn der Kranke nicht einmal eine beträchtliche Lichtempfindung besitzt und das Auge den sogenannten Blick verlohren hat.

Die Heilung des schwarzen Staares im Allgemeinen. — Nachdem man nun die Ursachen, woraus die Amaurose entstanden war, erforscht und die Quantität und Qualität derselben gehörig erwogen hat, sucht man diese durch passende Mittel zu entfernen.

Auf die Ursachen hat man also vor allen Dingen zu sehen, wenn man bei der Behandlung möglichst glücklich sein und das Umhertappen im Finstern vermeiden will. Es giebt nicht blofs gichtische, psorische, syphilitische etc., sondern, wie mehrere Beobachtungen mich gelehrt haben, auch scrofulöse Amaurosen. Das nun aufzufinden und die angezeigten Mittel kräftig anzuwenden, bleibt der Vorwurf des rationellen Heilkünstlers. Doch auch dann, wenn wir die Ursachen der Blindheit sicher entdeckt haben, ja selbst dann, wenn wir die erstern entfernt zu haben glauben müssen, ist die Belohnung oft nicht grofs, die Besserung nur geringe oder wohl auch gar nicht vorhanden. Hier liegt der Grund, warum die ausgezeichnetsten Aerzte nur mit Widerwillen an die Behandlung schwarzer Staare gehen, und warum gerade in diesem so hochwichtigen Theile der Augenheilkunde, noch so wenig Genügendes geleistet wurde. Die Natur der Krankheit verspottet ihre Mühe, sie verlacht nur zu oft die richtigste Diagnose, die kräftigste Handhabung zweckmäfsiger Mittel. Worin dieser unangenehme Erfahrungssatz gegründet sein mag, ist zum Theil schon angegeben, zum Theil aber dürfte wohl die ungemeine Zartheit der Markhaut, so wie die Unzugänglichkeit der Heilmittel zu derselben, Schuld daran sein. Indessen dürfen wir uns hierdurch von der genaueren Erforschung dieser Krankheit nicht abschrecken lassen; bleiben wir auf dem Wege der Erfahrung, sammeln

wir wahre und richtige Beobachtungen, lassen wir uns durch die trügenden Speculationen geistreicher und voreiliger Köpfe nicht von diesem einzig richtigen Wege abziehen, so können vielleicht die Nachkommen die Früchte erndten, die letztere schon der Gegenwart vergeblich entreifsen möchten. — Ich habe sehr ausgebildete Amaurosen behandelt, bei Kindern, wo kein anderer Grund zu entdecken war, als Würmer im Darmkanale. Ich entfernte bei einem sechsjährigen Mädchen, welches drei Jahre hindurch völlig blind war, und während dieser Zeit von zwei Aerzten beständig, doch ohne allen Erfolg, behandelt worden war, binnen 6 Tagen 13 Spulwürmer von aufserordentlicher Gröfse. Das Sehvermögen war am 7ten Tage meiner Behandlung schon so weit wiedergekehrt, dafs das Kind gröfsere und kleinere Gegenstände deutlich sahe; allein der zweckdienlichsten Mittel ungeachtet, rückte die Besserung von dieser Zeit an, fast gar nicht vorwärts. In solchen Fällen mag wohl in der Netzhaut oder im Sehnerven, eine Umänderung der Nervenmasse vorgegangen sein, welche sie absolut unfähig macht, das Licht zu percipiren. Es ist dieses keine Speculation, die Erfahrung lehrt es und die Sectionen lassen die Substanzumänderungen amaurotischer Retinen oft deutlich erkennen. Indefs entsteht diese Desorganisation bei manchen Amaurosen früher, bei andern später, doch gewifs da fast immer, wo die Blindheit längere Zeit hindurch dauerte; denn organische Gebilde, welche aufgehört haben, ihre eigenthümlichen Functionen zu verrichten, zeigen gewöhnlich auch veränderte Vegetation.

Sind nun aber die Ursachen einer Amaurose nicht zu beseitigen, oder finden sich gar keine bedeutenden *Causalmomente*; so bleibt nichts, als eine geregelte *Empirie* anzuwenden übrig, wobei vorzüglich das Geschlecht und Alter, so wie die krankhaften Erscheinungen, womit der Staar entstanden ist, zu berücksichtigen sind.

Die Mittel, welche gegen den schwarzen Staar empirisch angewendet werden und die sich einen gegrün-

deten Ruf erworben haben, bestehen in den hier folgenden innern und äufsern Medicamenten:

Brechmittel werden entweder angewendet, um gastrische Unreinigkeiten zu entfernen, oder um eine Umstimmung der Nerven zu bewirken. — Starke Purgiermittel sind angezeigt, vorzüglich bei Blutcongestionen nach dem Kopfe, wenn der Stuhlgang dabei selten und hart ist, wobei man sich indefs, wenn Stuhlverstopfung zugegen ist, wohl vor drastischen Purgiermitteln zu hüten hat; in diesem Falle müssen immer eröffnende Klystiere vorausgeschickt werden. — *Diaphoretica* sind zu versuchen, wenn, vorzüglich bei trockner Haut, Verdacht einer vorausgegangenen gestöhrten Hautthätigkeit vorhanden ist. Aus dieser Ursache entstehen sehr viele *Amblyopien* und Amaurosen, weil dadurch häufig ein krankhafter Procefs in den Nervengebilden des Auges hervorgerufen wird, der, je nachdem er kräftiger oder schwächer ist, auch rascher oder langsamer die Sehkraft vermindert. Wenn in dergleichen Fällen *Plethora universalis* zugegen ist, so thut man stets wohl, den schweifstreibenden Mitteln ein Aderlafs, und bei Hartleibigkeit und stark belegter Zunge etc. ein antiphlogistisches Laxans vorauszuschicken. — Die *Menstruation* befördernde Mittel, müssen vorsichtig und nur dann angewendet werden, wenn unterdrückte, noch nicht zu Stande gekommene, oder zu früh aufhörende *Menstruation*, als muthmafslicher Grund der Amaurose anzunehmen ist. Da wo unmittelbar oder bald nach Unterdrückung eines Blutflusses, *Amaurosis* oder *Amblyopia amaurotica* eingetreten ist und der Arzt sogleich hinzugerufen wird, mufs er augenblicklich ein Aderlafs machen, und wo bedeutende Besserung des Gesichts nicht bald erscheint, diesen repetiren lassen. Ist auf solche Art die Blutmasse vermindert, so wirkt zur möglichst schnellen Herstellung des Gesichts nichts besser, als ein Brechmittel. Diese Heilmethode gilt bei dem ersten Entstehen der Krankheit fast immer, der Blutfluss mag nun in Folge einer Erkältung, in Folge eines Schreckes oder Aergers unterdrückt worden sein.

Zuweilen erscheint die Amaurose oder die *Amblyopie* als Folge eines apoplectischen Zufalles, der sich manchmal durch kein anderes Symptom äufsert, als durch die plötzlich entstehende Schwachsichtigkeit oder Blindheit eines Auges. Geschieht dieses bei vollsaftigen oder kurzhalsigen untersetzten Personen, so mufs der Anfang der Behandlung gleich nach Auftreten des Zufalles, stets mit einem starken Aderlafs gemacht werden. Klystiere, abführende Mittel, örtlich kalte Umschläge, bilden die Fortsetzung der Kur, durch welche endlich der Uebergang zu der Klasse der reitzenden Mittel geöffnet wird. Ueberhaupt ist es ein gewagtes Unternehmen, plötzlich entstandene *Amaurose* gleich anfangs reitzend zu behandeln; die Krankheit wird insgemein dadurch befördert, wurzelt fester und widersteht endlich allen Heilversuchen. Wo innere, im Augapfel bestehende Entzündungen oder Blutcongestionen nach diesem Organ die Schwachsichtigkeit unterhalten, da empfiehlt Dr. Vetch (*A Practical Treatise on the Diseases of the Eye.* (London, 1820.) Aderlässe bis zur Ohnmacht. — Wurmmittel können ebenfalls zuweilen den Grund der Amaurose wegschaffen. — Mercurialien sind dann vorzüglich zu gebrauchen, wenn *Syphilis* mit im Spiele ist, oder Infarcten des Unterleibes Schuld an der Amaurose haben, müssen aber bei scorbutischer Anlage und wenn *Synchysis* mit dem schwarzen Staare verbunden ist, durchaus vermieden werden.

Mercurialien sind neuerlichst wieder sehr empfohlen worden, besonders von Langenbeck, (neue Bibliothek etc. B. 1. H. 1. S. 51.) Wedemeyer u. a. Sehr häufig mag die Amaurose in Folge eines entzündlichen Zustandes in der Retina entstehen, wie Ersterer des Weiteren lehrt, und oft mag wohl das Product dieser Entzündung die Unfähigkeit der Retina, das Licht zu empfinden, begründen. Mehrere Amaurosen heilten nach ihm, mehr oder weniger schnell, nachdem er den Sublimat innerlich gebrauchen liefs. Seine Formel ist folgende:

℞. *Hydr. mur. corr. gr. j.*
Gumm. mimosae ʒjjj.
Aquae destill. ʒvj.
Tinct. Thebaic. ℈j.

M. D. S. Früh und Abends einen Eſslöffel voll zu nehmen.

Vier bis acht Gran Sublimat waren zur Kur hinreichend. Die Trübung in der Tiefe der Pupille, welche er der materiellen Umänderung in der Netzhaut zuschreibt, verschwand und das Gesicht kehrte nach und nach zurück. Andere Aerzte haben ebenfalls den Nutzen des Sublimats bestätigt, und obgleich ich in meiner eigenen Praxis noch nicht viel Heil von der Anwendung des Sublimats bei schwarzen Staaren gesehen zu haben gestehe; so verdient doch das Mittel gewiſs alle Aufmerksamkeit vorsichtiger und kundiger Mediker. Wedemeyer heilte durch *Calomel* mit Einreibungen von *Ungt. mercur.* in die Augenlieder, einen Maler, der 5 bis 6 Jahre blind war. Er salivirte, nachdem er 10 bis 12 Gran *Calomel* und 2 Drachmen *Ungt. merc.* verbraucht hatte. Während der Salivation kehrte sein Gesicht zurück. Es war in diesem Falle Verdacht von Bleivergiftung vorhanden, und hinreichende Anzeichen dazu gegenwärtig. Siehe Langenbeck's neue Bibliothek, 1. B. 1. St. S. 187. Noch muſs ich bemerken, daſs da, wo Mercurialien wegen organischer Umänderungen in der Tiefe des *Bulbus* versucht werden sollen, diese auch örtlich in Salbenform auf das Auge selbst mit Vortheil gestrichen werden können.

Die *Nervina,* welche sich gegründeten Ruf erworben haben, sind nur dann zu gebrauchen, wenn der Staar sich als reine Nervenkrankheit offenbart; wenn das Uebel mit verminderter Sensibilität verbunden besteht; wenn ein gewisser Torpor vorhanden, der sich im Auge, so wie im Körper überhaupt ausspricht; wenn endlich das Leiden als ein reines Erlöschen der Nervenkräfte des Auges erscheint, wie dieses z. B. öfter bei Greisen der Fall ist. Sie wirken insgemein nachtheilig

theilig und befördern die Schwachsichtigkeit, wenn dyscrasische Processe in der Tiefe des Auges hausen, oder die Ursache der *Amblyopie* ausmachen. Die vorzüglichsten jener *Nervina* sind: die *Arnica*, *Valeriana*, *Naphthen*, *Camphor*, *Millepedes*, *Sulph. stib. aurant.*, *Belladonna*, *Pulsatilla*, *Hellebor. nig.*, *Rhus toxicod.*, *Oleum animale aethereum*, *Phosphor*, *Spir. corn. c.*, *Asa foetida*, *Opium*, *Hyoscyamus*, *Castoreum*, *Moschus*, *Zinc. oxydat. alb.*, *Kalmus* und *China*, welche letztere indefs die Blindheit vermehrt, wenn Hartleibigkeit zugegen ist. Sollte man eine periodische, ja intermittirende Amaurose zu behandeln haben, so darf nicht gleich anfangs *China* gegeben werden, sondern man mufs jenem Mittel ein *Vomitiv* aus *Tart. emetic.* nebst resolvirenden Mitteln vorausschicken; allein dann wirkt auch die China oft vortrefflich. Zuweilen reicht man mit derselben nicht aus, in welchem Falle man zu dem innern Gebrauche des Arseniks überzugehen, empfohlen hat. Man kann sich zu diesem Behufe der *Solut. Arsenici* nach Heim bedienen, zu welcher die Formel folgende ist:

℞. *Arsenici albi*,
Kali carbonici depurati āā. ʒß.
Aquae fontanae destillat. ℥j.
Coq. in balneo arenae ad Solut. Arsenici.
Frigefact. adde
Spirit. Angelic. comp. ʒj.
Aquae dest. ʒvj.

D. S. Alle 2 Stunden 5 Tropfen zu geben.

Man kann nach und nach bis 8, ja bis 12 Tropfen steigen. Wo man den Arsenik mit Nutzen anzuwenden hoffen will, mufs die Zunge rein, der Unterleib frei, die Haut thätig sein, und der Leidende nicht an Blutcongestionen nach dem Kopfe leiden. Es giebt periodisch wiederkehrende oder wirklich intermittirende *Amblyopien* und *Amaurosen*, denen von Anfang an ein krampfhafter Zustand zum Grunde zu liegen scheint, die sich nach meinen Beobachtungen besonders dadurch von allen übrigen Arten unterscheiden, dafs sie, wenigstens im Anfange, nach Ablauf des Anfalles nicht

die mindeste Schwäche der Sehkraft hinterlassen. Ich habe einen höchst interessanten dergleichen Fall beobachtet, den ich durch *Asa foetida* sehr schnell, gänzlich und dauernd zu heilen, so glücklich war.

Wo das Auge sich in einem sehr torpiden Zustande befand, wo keine Lichtscheu, keine Spur von einem entzündlichen Ergriffensein der inneren Gebilde des Augapfels zu bemerken war, der Kranke überhaupt an einem schmerzlosen Verlöschen der Sehkraft zu laboriren schien und keine Ursache mit Sicherheit ausgemittelt werden konnte, da habe ich, neben den geeigneten äufsern Mitteln, von dem innern Gebrauch der *Herba rhois toxicodendr.* zu $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Gran *pro dosi*, in Verbindung mit Goldschwefel, zuweilen mit Camphor, in mehreren Fällen einen sehr guten Erfolg gesehen. Da aber, wo mit jenem Zustande eine grofse Unthätigkeit des Darmkanals, die besonders bei sehr fetten älteren Personen so häufig angetroffen wird, verbunden war, und die daher kommende *Obstruction* offenbar die Schwäche des Gesichts vermehrte, habe ich das *Rhus toxic.* mit *Colocynth. praep.* so verbunden, dafs täglich zwei- bis dreimalige Leibesöffnung erfolgte.

Die *Belladonna* in Extract zu $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{6}$ Gran *pro dosi* gereicht, habe ich besonders in denen Fällen mit Nutzen empirisch gebraucht, wo bei nervösem *Habitus* eine der vorzüglichsten Erscheinungen der vorhandenen angehenden *Amaurose*, in dem Sehen von lebhaft bunten Farben bestand. Die Eisenpräparate müssen sehr behutsam gebraucht werden, weil leicht Blutcongestionen nach dem Kopfe entstehen, welche die Blindheit vermehren können.

Die äufsern Mittel werden entweder entfernt vom Auge, oder auf dasselbe selbst angewendet. Zu erstern gehören Blutausleerungen, Fontanelle, Sinapismen, Haarseile, die *Moxa*, Vesicatorien und Einreibung der Autenrieth'schen Salbe; welche beide letztere auch unmittelbar über die Augenbraunen angebracht werden, wenn man Verdacht hat, dafs der Staar von früherhin an dieser Stelle unterdrückten krankhaften Thätigkeiten, (z. B. nach schnell abgeheilten Ausschlägen des

Gesichts, oder des behaarten Theiles des Kopfes) entstanden sei. Alle diese Ableitungen und Gegenreitze müssen indefs kräftig angewendet werden, wenn sie nicht völlig indifferent sein sollen. Mit den spanischen Fliegen, dem Seidelbast, den Fontanellen etc. nur zu spielen, dem Kranken die kleine Plage obendrein noch zu versüfsen, ist hier ganz am unrechten Orte; denn oft schon habe ich die Bemerkung machen müssen, dafs das alle 8 oder 14 Tage gelegte und wieder verheilte Vesicator nichts fruchtete, dahingegen das schmerzhafteste Offenerhalten mit ätzenden Salben Wunder bewirkte.

Wo dyscrasische Procefse die Kräfte des Sehnerven und der *Retina* zerstöhren, da sind, nach möglichster Entfernung der Ursachen durch die geeigneten inneren Mittel, jene angeführten kräftigen Ableitungen durch Hautreitze, z. B. die *Moxa*, das *Empl. tart. stibiat., etc.* im Allgemeinen besonders angezeigt.

Zu den äufsern Mitteln gehören noch Klystiere, ganze und halbe, warme und kalte, Fufs- und Sturz-Bäder, welche Bäder indefs meistens wenig helfen; ferner Niefsmittel, die von Ware *) und mehreren andern gar sehr gelobt werden, deren man sich aber nur bedienen darf, wenn keine Blutcongestionen nach dem Kopfe vorhanden sind. Zu den unmittelbar auf das Auge anzubringenden Mitteln zählt man: Blutigel, die man bei Turgescenz der Blutgefäfse des Auges und bei übriger Vollblütigkeit des Subjects, anzuwenden hat; die Electricität, welche Hey **) vorzüglich dann heilsam fand, wenn die Amaurose noch nicht lange gedauert hatte; den Galvanismus und Magnetismus, welche beide, so wie auch die Electricität, die Tropf- und Tuschbäder, vorzüglich bei reinen Lähmungen der nervösen Gebilde des Auges, aber immer mit Vorsicht an-

---

*) Z. B. *Merc. vitriolat. gr. v.*
Pulv. asari comp. gr. xxv.
M.

**) *Medical. obs. and inquiries, Vol. V. p. 26.*

zuwenden sind. Bei Vollblütigen hingegen, bei varicösen Zuständen der Blutgefäfse des Auges, oder bei Augen, deren durchsichtige Medien zu Fehlern der Mischung geneigt sind, und endlich bei Amaurotischen, welche an wiederkehrenden Kopfschmerzen leiden, sind alle jene Mittel unnütz oder schädlich.

Findet man, dafs der Amaurotische, ohne an *Photopsie* zu leiden, des Abends und im Dunkeln viel schlechter sieht, dafs sein Gesicht Morgens beim Erwachen schwächer ist als am Mittage, ist die *Iris* dabei wenig oder gar nicht beweglich, ist weder allgemeiner noch örtlicher Blutüberfluſs und keine Mischungsveränderung im Innern des Auges zugegen; so kann man die viel gelobten spirituösen und flüchtigen Einreibungen in die Augenbraunen gebrauchen. Zu diesen sind vorzüglich folgende zu rechnen: *Spir. Anthos, Spir. Serpylli, Spir. Cornu Cervi, Aqua Reg. Hungar., Aqua Coloniensis, Bals. vitae Hoffm., Ol. Rorismarini, Ol. cajeput, Naphthen, Tinct. Opii, Tinct. Cantharid.* und *Liqu. Ammonii caust.* *) Von denselben Arzneien

*) Ein Mittel, welches diesem in qualitativer Hinsicht ganz gleich kommt, ist das sogenannte Laeyson'sche Augenpulver, ein Product der Pariser Industrie, welches durch die Marktschreierei der Krämer als ein Universalmittel gegen Augenschwäche besonders hier in Sachsen aufserordentlich bekannt geworden ist und so vielfältig gebraucht wird, dafs der Absatz in diesem Lande allein jährlich viele Hundert Thaler beträgt. Es besteht ohngefähr aus gleichen Theilen Salmiak und ganz frisch gebranntem Kalk, etwas Kohle, etwas Eisenoxyd und etwas Zimmet, welche letztere drei Bestandtheile, als unwesentlich wegbleiben können. Allenfalls kann man den Zimmet beibehalten, oder *Pulv. caryophyll. arom.* oder auch kräftige ätherische Oehle zusetzen lassen. Es wirkt besonders da heilsam, wo bei Abnahme der vitalen Kräfte des Auges im Alter, bei Abnahme der Turgescenz der Säfte nach diesem Organe, die sich durch *Presbyopie* äufsert, eine wahre Schwäche und Verminderung der Sehkraft einfindet; es wirkt aber hier nicht besser, als der *Liq. ammon. caust.* oder ähnliche bereits angeführte äufsere Mittel, welche die nervösen Gebilde des Sehorgans zu gröfserer Thätigkeit anspornen und den Stoffwechsel im Augapfel befördern. Um es anzuwenden, schüttelt man das sich in einem trock-

läfst man auch die Dämpfe an das Auge gehen, indem man einige Tropfen zwischen beiden Händen reibt, und letztere flach vor die Augen hält. Uebrigens darf man von den schwächsten dieser Mittel nur stufenweise und vorsichtig zu den stärkern und flüchtigern übergehen.

Ein weites Feld zu Versuchen bieten noch die verschiedenen Gasarten dar, von denen ich nur so viel bemerke, dafs dieselben niemals durch Schwefeldämpfe verunreinigt sein dürfen, wenn sie dem Auge nicht mehr schaden als nützen sollen.

Bis hierher von der Amaurose im Allgemeinen, jetzt:

Von den verschiedenen Formen derselben. Indem ich jede, nicht durch die Erfahrung bestätigte Eintheilung zu vermeiden suche, glaube ich dem Practiker einen Dienst zu erweisen, wenn ich, nach Beer, *) folgende vier Gattungen der Amaurose aufnehme, nähmlich

1) Einen rein dynamischen Staar, dessen charakteristische Merkmale allein in der Subjectivität des Auges hervortreten, ohne dafs dabei irgend eine Verletzung der Mischung und Form des Auges zugegen wäre; — 2) Einen schwarzen Staar, in welchem die

---

nen wohlverwahrten Glase befindende Pulver, um, öffnet den Propf und läfst den aufsteigenden Dampf gegen das geöffnete Auge gehen; zugleich kann man die Kranken des Tages mehrere Male daran riechen lassen. Da man dieses Mittel in jeder Apotheke für wenige Groschen bereiten lassen kann, so wäre das allgemeinere Bekanntwerden dieser Anmerkung vielleicht geeignet, das unnütze aus dem Lande gehen nicht unbedeutender Summen, (man läfst sich für ein 2 bis 3 Unzen ♁ haltendes Glas, 1 bis 2 Speciesthaler bezahlen) zu verhüten.

*) Ungeachtet die Beer'sche Eintheilung manche Mängel zeigt und oft willkührlich erscheint, so verdient sie doch in diagnostischer Hinsicht vorzügliches Lob. Andere, oft scharfsinnige, Eintheilungen (wie z. B. die vom Prof. Kieser) übergehe ich, weil sie dem practischen Zwecke dieses Werks nicht entsprechen, oder gar zu empirisch und fragmentarisch aufgestellt sind.

Mischung der organischen Materie krankhaft erscheint; — 3) Einen andern, wo die Form des Auges überhaupt, oder seiner einzelnen, vorzüglich irritabeln, Gebilde leidet; — 4) endlich einen gemischten schwarzen Staar, in welchem die Zeichen der eben vorgetragenen drei Gattungen vereinigt anzutreffen sind.

Bei der ersten Gattung, nämlich der rein dynamischen Amaurose, sind die nervösen Gebilde des Auges ganz allein unmittelbar in ihrer Vitalität ergriffen, ohne dafs irgendwo die Structur des *Bulbus* selbst litte; demnach charakterisirt sich dieselbe auch fast blofs durch subjective Zeichen. Indefs bemerkt der Arzt zuweilen einen sogenannten falschen Blick, weil der, nur auf einem Auge amaurotische Kranke, mit diesem kein Object mehr fixirt; bedeckt man in diesem Falle das noch völlig gesunde Auge vollkommen, so wird die vorher normale Pupille des amaurotischen Auges sogleich erweitert und die *Iris* starr, wenn man auch das stärkste Licht in das kranke Auge fallen läfst. Der dynamische schwarze Staar, befällt übrigens meistens beide Augen zugleich, und kommt selten vor.

Liegt nun der Grund dieser Amaurose in einer zu sehr gesteigerten Vitalität der nervösen Gebilde, so äufsert sie sich auf eine ganz andere Weise, als wenn die Vitalität zu sehr deprimirt ist.

Die erstere Art, nähmlich die Amaurose von übermäfsig gesteigerter Vitalität, entsteht ziemlich schnell, liebt robuste vollblütige Subjecte, und giebt sich durch folgende Zeichen zu erkennen: Im Anfange leidet der Kranke an einem eigenthümlichen Gefühl von Vollheit in dem Augapfel, verbunden mit unausgesetzten heftigen Lichterscheinungen und merkbarer Gesichtsschwäche; bald darauf folgt ein betäubender zunehmender Kopfschmerz, bei dem das Sehvermögen auffallend abnimmt, ohne dafs man in und an dem Auge etwas Innormales bemerkt. Nachdem nun der Schmerz nach und nach unstät geworden, dem Leidenden ein dichter Flor vor dem Auge erschienen, der bei hellem Lichte völlig schwarz, im Finstern aber feurig glänzend, bald röthlich bald bläu-

lich und bei Blutcongestionen nach dem Kopfe viel stärker und dichter sich zeigt — geht endlich jede Lichtempfindung unter fortdauernden Kopfschmerzen und mit dem Gefühle, als wenn der Augapfel an Umfang zunähme, verloren.

Die vorzüglichsten Ursachen dieser Amaurose sind Congestionen des Bluts nach dem Kopfe, *Idiosyncrasien*, Anstrengungen des Seh- und Denkvermögens, das häufige Betrachten sehr weifser glänzender Gegenstände, u. dergl.

Die Prognose ist verschieden. Wenn das Sehvermögen noch nicht erloschen ist, und der Kranke sich allen zur Heilung erforderlichen Bedingungen unterwirft, so kann man immer eine günstige Prognose stellen. Wenn aber vollkommene Blindheit bereits eingetreten, so ist die Voraussage bedenklich. Bei der durch *Idiosyncrasie* bedingten Amaurose ist die Vorhersage am günstigsten. Dahingegen derjenige schwarze Staar, welcher von Anstrengung der Seh- und Denkkraft entsprungen war, die bedenklichste Prognose zuläfst, ja nicht selten der Vorbote einer Verrücktheit sein kann.

Kur. — Kommt der Arzt gleich zu Anfange der Krankheit hinzu, so ist ein antiphlogistisches Verfahren angezeigt. Defswegen mache man bei Blutüberfluſs und bei Congestionen nach dem Kopfe, Aderlässe am Fufse, oder setze, wenn allgemeine Aderlässe nicht nöthig sind, Blutigel an das Auge, verordne lauwarme Fufsbäder mit Salz und Senfmehl, lasse Senfteig auf die Waden legen, gebrauche eröffnende Klystiere, Abführungsmittel, kühlende Getränke, und verbiete dabei jedem Lichtreitz den Zutritt. Kehrt das Gesicht bei dieser Behandlung dennoch nicht völlig und nur langsam zurück, so bade man die Augen öfters in kaltem Wasser, wobei man aber das starke Vorwärtsbeugen des Kopfes verhüten mufs.

Hat die Krankheit schon länger gedauert, ist die Amaurose mehr ausgebildet, und fehlen Indicationen zur antiphlogistischen Kurmethode, oder wurden diese schon befriedigt; so sind jene ätherischen Einreibun-

gen und Dämpfe oft nützlich, deren in der allgemeinen Therapie der Amaurose gedacht wurde, welche durch Vesicatorien, die man über die Augenbraunen legt, trefflich unterstützt werden. Hilft dieses alles noch nicht, so mufs man die Heilung durch eine reitzende stärkende Diät und dieser entsprechende innere Heilmittel, so wie auch durch öftere körperliche Bewegung unterstützen. Oft sieht man sich jedoch genöthigt, zu den stärksten Mitteln, nämlich der Electricität, dem Galvanismus, u. s. w. seine Zuflucht zu nehmen.

Die zweite Art der dynamischen Amaurose, nähmlich diejenige, wo die Vitalität des Sehnerven unzweckmäfsig herabgestimmt ist, tritt meistens bei geschwächten Subjecten und immer sehr langsam auf, und wird, wie die vorige Art, unter Flor- und Nebelsehen, welches aber niemals von einem blendenden Schimmer begleitet ist, ausgebildet. Nach Vermehrung der Reitze des Körpers, bessert sich das Gesicht; diefs geschieht z. B. nach kräftigen Mahlzeiten, nach Genufs eines starken Weines, eben so nach psychischen angenehmen Reitzen, u. s. w. Das Gesicht vermindert sich aber, wenn entgegengesetzte Dinge die Schwäche des Körpers vermehren. Gar nicht selten erscheint dieser schwarze Staar in Form der *Hemeralopie*. Die Flamme der Kerze und der Mond erscheinen solchen Schwachsichtigen in einer neblichten Hülle, mit einem weit verbreiteten Dunstkreise, der verschiedene Farben spielt; übrigens klagt der Patient aber weder über Kopf- noch Augenschmerz, selbst kein Gefühl von Vollheit oder Schwere des Auges, begleitet diese Amaurose.

Ursachen. — Eine örtliche oder allgemeine bedeutende wahre Schwäche, wenn sie dynamisch auf die nervösen Gebilde einwirkt, kann diese Amaurose herbeiführen. Dahin gehören psychische Nervenerschütterungen, bedeutender und anhaltender Säfteverlust, langer Aufenthalt in finstern Wohnungen, Altersschwäche, u. s. w. Auch nach dem Typhus bleibt solche Blindheit zuweilen zurück.

Die Vorhersage ist im Allgemeinen hier schlimmer, als bei der vorigen Art, denn diese hier ist weit seltener heilbar. Bei armen Menschen, denen gehörige Pflege mangelt, kann diese Amaurose als unheilbar angesehen werden.

Die Kur mufs natürlich durch äufsere und innere reitzend stärkende Mittel, bei angemessener Diät, deren schon bei der Heilung des schwarzen Staares im Allgemeinen, Erwähnung geschah, unternommen werden.

Zu dieser Art der Amaurose mufs man auch die von *Onanie* entsprungene zählen, die sich, aufser durch die schon angegebenen Kennzeichen, noch besonders durch den stieren, scheuen Blick, so wie durch das Furchtsame und Ungewisse in den Augen und im ganzen Wesen des Kranken charakterisirt. In einem merkwürdigen Falle bei einem königlichen Diener, der seit 13 Jahren onanirt hatte, wirkten die China und vorzüglich die Richter'schen Pillen, natürlich bei Unterlassung der Ursache, so vortrefflich, dafs das Gesicht in 11 Wochen fast gänzlich wieder hergestellt wurde.

Die zweite Gattung der Amaurose enthält, nach Beer, nur eine einzige Art, nämlich:

Das amaurotische Katzenauge. — So lange diese Amaurose unvollkommen ist, bleibt die *Iris* beweglich und die Pupille normal. Ist der Kranke aber völlig blind, so findet man die *Iris* träge und die Pupille erweitert. Ganz tief im Hintergrunde des Auges, entwickelt sich eine concave, bleichgraue, oder weifsgelbliche, oder in das röthliche schillernde Verdunkelung, die immer heller und deutlicher wird, je mehr sich die Blindheit ausbildet; in eben dem Verhältnisse wird auch die *Iris* bleicher. *) Dabei wird das Gesicht nicht nur immer schwächer, sondern auch im strengsten Sinne verworren. Ist die Sehkraft des Auges völlig erloschen, so sieht man auf der, hinter der Pupille sich befindenden Trübung, ein zartes Blutgefäfsnetz. Ein solches Auge leuchtet dann bei gewissen Stellungen im Halbdunkel gelblich oder röthlich,

*) Siehe Taf. III. Fig. 2.

weſswegen es auch Beer mit dem Namen Katzenauge belegt hat. Uebrigens bildet sich dieser schwarze Staar selten völlig aus. Man findet ihn meistens bei alten hagern Leuten, zuweilen auch bei jugendlichen zur Auszehrung geneigten, oder schon daran leidenden Subjecten, bei atrophischen Kindern, und nach heftigen Verletzungen des Auges.

Ein Mangel des schwarzen Pigments scheint zum Theil die Ursache dieses Staares zu sein; indeſs hat man Sectionen hierüber noch nicht angestellt.

Die Vorhersage ist die ungünstigste, wenn das Auge völlig erblindet ist. Ein Glück ist es, daſs es meistens nur bei einer *Amblyopie* bleibt.

Eine helfende Behandlung dieser Amaurose ist noch zu erwarten. Beer sucht den Vegetationsproceſs mehr zu heben, beobachtete aber dabei dennoch keine Besserung der Krankheit, sondern nur ein Stehenbleiben derselben.

Die dritte Gattung des schwarzen Staares enthält mehrere Arten, wovon die erste Art:

Durch übermäſsigen Gebrauch bitterer oder narkotischer Nahrungs- und Arzneimittel und durch den Miſsbrauch des Bleies erzeugt wird. — Turgescenz der Blutgefäſse der *Conjunctiva* und *Sclerotica*, Gefühl von Vollheit des Auges, völlig starre und erweiterte Pupille, besonders Schwärze ohne Trübheit derselben, Zittern der Glieder, und das Sehen eines pelzartigen Nebels, womit der Kranke alle Gegenstände verhüllt oder umgeben erblickt, sind Symptome, welche sich bei dieser Amaurose anfänglich entwickeln. Nach und nach werden diese Zeichen immer heftiger, das Gesicht des Kranken wird endlich völlig aufgehoben, die Pupille nimmt die Form derjenigen der wiederkäuenden Thiere an, und ist sehr erweitert; zugleich sind die Bewegungen des Auges und der Augenlieder träge, letztere öfters gedunsen, erschlafft, und die Muskeln der Extremitäten und des Rückens mit klonischen Krämpfen behaftet. Zuletzt fangen selbst auch die andern Sinne an zu leiden. War Blei die Ursache der Krankheit, dann stellen sich

meistens auch *Kolik*, *Ileus* und *Contracturen* der Extremitäten ein.

Die Prognose ist günstig, wenn der Kranke nur an einer *Amblyopie* leidet, und die Krankheit jüngst entstanden ist. Am hartnäckigsten ist, nach Beer, diejenige *Amblyopie*, welche durch *Belladonna*, *Stramonium* und Blei verursacht wurde. Ist der Kranke schon längst erblindet, hat er aber noch Lichtempfindung, so ist die Prognose sehr bedenklich; ist aber auch jede Lichtempfindung erloschen, dann ist die Vorhersage sehr ungünstig; unwiederbringlich verloren bleibt aber das Gesicht, wenn die Blindheit schon lange dauerte, und Mischungsfehler der durchsichtigen Medien des Auges sichtbar sind.

Wird der Arzt gleich im Anfange der Krankheit hinzugerufen, und ist nur eine amaurotische *Amblyopie* gegenwärtig; so hat er ein, der Vollblütigkeit des Subjects angemessenes antiphlogistisches Verfahren einzuschlagen. Hier leisten kleine Aderlässe, Blutigel an die Augen, antiphlogistische Diät, Genufs von Säuren und äufserlich Umschläge von Brotkrumen und Essig, u. s. w. die besten Dienste. Ist aber das Gesicht aufgehoben, hat die Amaurose schon länger gedauert, und sind übrigens auch keine Indicationen zur antiphlogistischen Methode vorhanden, oder wurde letztere schon vorausgeschickt; so wende man innerlich *Camphor* mit *Naphthen* und äufserlich Einreibungen und Dämpfe der mehrmals erwähnten flüchtig reitzenden Medicamente an. Bei Bleivergiftungen mufs man neben jener örtlichen Behandlung auch die gewöhnlichen Gegengifte in Anspruch nehmen.

Die zweite Art der dritten Gattung der Amaurose ist diejenige, welche als symptomatische Erscheinung bei Hypochondrischen, Hysterischen, Epileptischen und Convulsivischen vorkommt. Diese Art artet sich anders bei Hypochondrischen und Hysterischen, anders bei Epileptischen und wieder anders bei Convulsivischen. Denn aufser den Zeichen der Hypochondrie und Hysterie, finden wir, — wenn die damit behafteten Personen vorzüglich oft an toni-

schen Krämpfen leiden, — bei der damit verbundenen Amaurose, die Pupille sehr erweitert, die *Iris* starr und nach vorn gewölbt, den Augapfel unbeweglich und ein eigenes Gefühl von Druck in demselben; die Augenliedspalte bleibt dabei entweder krampfhaft offen oder verschlossen, und das Sehvermögen ist schwach, aber selten vollkommen aufgehoben. Sind Hypochondrische und Hysterische hingegen vorzüglich klonischen Krämpfen unterworfen, so findet man, bei kleiner Pupille: ein Wogen der *Iris* zwischen *Expansion* und *Contraction*, *Hippus pupillae*; dabei sieht man ein Blinzeln der Augenlieder, *Nictitatio*, ja wohl auch ein unwillkührliches pendulartiges Rollen des *Bulbus*, *Nystagmus*. — Bei Epileptischen hingegen findet man aufser den Zeichen der *Epilepsie* und aufser einer erweiterten Pupille, eine sehr beschränkte Bewegung der *Iris*, und oscillatorische Bewegungen des Augapfels, welche dann Zeitlebens fortdauern, wenn auch *Epilepsie* und *Amaurose* geheilt sind. — Die *Amaurose* oder amaurotische *Amblyopie* der Convulsivischen, trifft man vorzüglich bei Kindern während der *Dentition* an. Diese zeichnet sich vor den andern durch ein convulsivisches Rollen des *Bulbus*, vorzüglich nach oben, durch eine ungeheuer erweiterte Pupille, und durch Unbeweglichkeit der *Iris* aus. Wenn die allgemeinen Convulsionen auch vorübergegangen sind, und nur eine amaurotische *Amblyopie* zurückbleibt, so schielt der Kranke doch mit beiden Augen nach verschiedenen Richtungen.

Einen schwachen stumpfen Kopfschmerz, der seinen Sitz vorzüglich in den Augenbraunen hat, und eine völlig reine und schwarze Pupille findet der Arzt immer bei allen jenen drei symptomatischen Amaurosen.

Die Prognose ist schon sehr bedenklich bei einer blofsen amaurotischen *Amblyopie*, weit ungünstiger noch, wenn vollkommne *Amaurose* eingetreten ist; am schlimmsten und ganz unheilbar ist die Krankheit, wenn sie allemal der Vorläufer der hypochondrischen, epileptischen u. s. w. Anfälle ist, und nach denselben immer eine lange Zeit zurückbleibt.

Nur durch Heilung derjenigen Krankheit, deren Symptom die *Amaurose* ist, kann dieselbe beseitigt werden; bleibt sie aber auch dann noch zurück, so soll man empirisch krampfstillende, stärkende und ähnliche Arzneien anwenden.

Eine dritte Art der dritten Gattung des schwarzen Staares, ist die symptomatische *Amaurose* von Infarcten des Unterleibes, welche sich durch die lange, oft 10 bis 20 Jahre dauernde Zeit der Entwickelung, durch die etwas bleichschwarze, erweiterte winklichte Pupille, die gewölbte träge *Iris*, durch die Anfüllung der Blutgefäfse der Bindehaut und die rothgelbliche etwas schmutzige Farbe im Weifsen des Auges, von den andern Arten auszeichnet. Dabei sieht der Leidende bei zunehmender Gesichtsschwäche alle Gegenstände im dichten Nebel, der bei herannahender Blindheit einmal schwarz wie Kohlenstaub, ein anderes Mal weifslichtgrau zu seyn scheint. Mit allen jenen Zeichen vereinigt, findet man meistens auch ein unterbrochenes Gesicht, *Visus interruptus*, violette Lippen, schmutzig gelbliches Gesicht, stumpfen Kopfschmerz und gehinderte Verdauung, nebst allen andern, den *Infarctus* ankündigenden Symptomen.

Alles was Infarcten des Unterleibes hervorbringt, kann auch, (vorzüglich bei schon vorhandener langwieriger Schwäche der Augen) ein Causalmoment dieser Amaurose werden.

Wegen der Unmöglichkeit, die ursächliche Krankheit jederzeit gehörig zu heben, kann man fast immer nur eine schlechte Prognose stellen. Ist man aber im Stande durch die bekannten Mittel den Infarctus zu heben, so wird auch die Amaurose weichen; nur hüte man sich hier örtlich am Auge etwas gebrauchen zu wollen, denn immer richtet man dadurch Schaden an.

Eine vierte Art der dritten Gattung ist die consensuelle gastrische Amaurose, welche Beer nur dann in völlige Blindheit übergehen sah, wenn sie von Würmern bedingt wurde. Die vorzüglichsten Symptome der *Amblyopie* bestehen in einer erweiterten, etwas winklichten, doch reinen und schwarzen

Pupille, wenig beweglichen *Iris* und in einem öftern unwillkührlichen Ueberlaufen der Augen von Thränen, womit Sodbrennen, gespannte Hypochondrien, Aufstofsen, Druck in der Herzgrube und andere gastrische Zeichen verbunden sind. Waren Würmer im Darmkanale an der Amaurose Schuld, so entsteht, wie schon gesagt worden, leicht völlige Blindheit; zugleich aber zeigt sich auch ein bläulicher Schein auf der *Sclerotica* rings um die Hornhaut, der neben den eben angegebenen Merkmalen der consensuellen gastrischen *Amblyopie* als charakteristisches Zeichen der von Würmern entstandenen Amaurose dasteht. Dabei bemerkt man auch Unstätigkeit der Augäpfel und Schielen derselben, nebst allen übrigen Zeichen von Würmern.

Säureerzeugnifs im Magen, Mangel an Verdauung und Würmer im Darmkanale, machen die *Aetiologie* dieser Krankheit aus.

Sind nur allein die eben angeführten Ursachen Schuld an der Amaurose, so ist die Prognose sehr günstig; leiden die Kranken aber aufserdem noch an Scrofeln, Gicht, Hypochondrie und Infarcten, so wird die Vorhersage dadurch mehr oder weniger ungünstig, ja oft ist die Krankheit selbst als *Amblyopie* unheilbar.

Die Behandlung ist leicht, sobald die Ursachen des Staares nicht complicirt sind. Man hebe daher die Säure, stärke den Magen und entferne die Würmer; nur vermeide man gewaltsames Erbrechen, weil dadurch die, oft schon ohnedieſs vorhandene, Blutcongestion nach dem Kopfe sehr vermehrt wird. Ein örtliches Verfahren ist hier ganz unnöthig und schädlich.

Eine fünfte Art der dritten Gattung ist der vicariirende schwarze Staar der acuten Hautausschläge. Diese Art der vollkommenen oder unvollkommenen Amaurose, zeigt sich schnell nach einer Unterdrückung des Scharlachs, der Masern oder der Pocken, während des Ausbruches. Die Pupille ist bei diesem Staar rein, verengert, jedoch regelmäfsig gestaltet, die Regenbogenhaut ist unbeweglich und die Blutgefäfse der *Conjunctiva* und *Sclerotica*, sind strotzend angefüllt.

Ist die Amaurose eben erst entstanden, kann sogleich noch während des Verlaufes der acuten exanthematischen Krankheit völlig zweckmäfsige Hülfe geleistet werden; so ist die Prognose nicht ungünstig. Wenn aber das Exanthem schon verlaufen, die Amaurose wohl gar schon veraltet ist, so ist wenig Hoffnung eines günstigen Erfolgs der Behandlung zugegen.

Bei eben unterdrücktem Ausschlage, suche man diesen, so schnell als möglich, durch warme Bäder, Camphor, u. s. w. wieder hervorzubringen; eben diefs gebrauche man, wenn man zu dem Amaurotischen etwas später nach dem Entstehen der Blindheit gerufen wird, daneben wende man bei Pocken, *Calomel*, bei Scharlach, *Antimonialien* und die übrigen nöthigen Dinge an. Sobald die Amaurose schon veraltet ist, mufs man neben den letztern Mitteln, Fontanelle, Einreibungen von *Ungt. Tartar. stibiat., etc.* gebrauchen, und bei schwächlichen Subjecten innerlich auch reitzend stärkende Arzneien verordnen.

Eine sechste Art der dritten Gattung des schwarzen Staares ist die rheumatische Amaurose. Bei dieser nicht seltenen Art, welche gewöhnlich nur *Amblyopie* bleibt, ist die völlig reine Pupille von normaler Gröfse und die *Iris* starr; die Augen thränen bei geringer Veranlassung und sind immer mehr oder weniger lichtscheu; dabei wird der Kranke von einem reifsenden, herumirrenden Sehmerz im Auge, in der Augengegend, den Zähnen oder dem Halse geplagt. Der Arzt bemerkt einen falschen Blick, und zuweilen auch ein Schiefstehen des Auges. Fast immer wird diese Amaurose von einer bedeutenden *Atonie* des *Levator. palpebr. superior.* begleitet.

Die vorzüglichste Ursache liegt hier in einer plötzlichen und anhaltenden Erkältung des schwitzenden Kopfes, bei rheumatischer Anlage.

Sobald die Amaurose noch nicht ausgebildet, die *Amblyopie* nicht alt, und das befallene Subject nicht gichtisch ist, zugleich die Aufsenverhältnisse des Leidenden günstig sind, dann ist die Krankheit heilbar; findet aber das Gegentheil von allen diesen Bedingungen

Statt, so geht die rheumatische Amaurose, leicht in eine gichtische über, wo dann freilich die Voraussage sehr ungünstig wird.

Wird der Arzt bald nach Entstehung des Uebels hinzugerufen, so mufs nicht selten ein Aderlafs der folgenden Behandlung vorausgehen; dann erst befördere man die Diaphoresis. Man lasse daher den Kranken lauwarm baden, Flanellhemden tragen, gebe innerlich anfangs gelind schweifstreibende Mixturen mit Zusatz von etwas *Infus. sennae comp.*, späterhin: *Sulph. aurat. antimon.* mit *Camphor* oder *Extr. Guajaci* mit *Camphor* abwechselnd mit dem Dower'schen Pulver; nachher, wenn die Schmerzen in und um das Auge etwas nachgelassen haben, *Extr. Aconit.* mit *Antimonialien* und gereinigtem Schwefel. Auch leisten *Petroleum rectificatum*, alle 2 Stunden 5 Tropfen auf Zucker, so wie Pillen aus *Resin. guajaci, Kali sulphurat.* und *Camphor*, nicht selten treffliche Dienste. Aeufserlich lege man Vesicatorien bald hinter das Ohr, bald an die Schläfe, bald über die Augenbraunen; sobald aber der rheumatische Schmerz die Augenbraunengegend völlig verlassen hat, sich vielleicht mehr in den Augen selbst concentrirt, reibe man *Liniment. volatil.*, erst mit *Opium*, dann mit *Extr. Hyoscyami* vermischt, in die Augenbraunen ein. Ist der Schmerz nun ziemlich ganz verschwunden, hält aber die amaurotische *Amblyopie* immer noch einigermafsen an; so zeigen sich Einreibungen von *Naphthen* mit etwas *Tinct. Cantharid.* und *Tinct. Opii simpl.* äufserst wirksam. Sollte der Schmerz aber schon längere Zeit völlig verschwunden, das Sehvermögen aber dennoch nicht gänzlich wieder hergestellt sein; so ist die vorsichtige Anwendung der Electricität am rechten Orte, vorzüglich wenn Atonie oder gar Paralyse des Aufhebers des obern Augenliedes vorhanden ist. Auch kann man von dem Schmidt'schen *Cauterium*, welches bei der *Blepharoplegie* angegeben wurde, oder von der *Moxa*, welche auf die Stirn oder auf die Schläfegegend gesetzt wird, mit Vortheil Gebrauch machen.

Eine

Eine siebente Art der dritten Gattung ist der vicariirende schwarze Staar des unterdrückten Schnupfens, ohne wahrnehmbare Schleimansammlung in den Stirnhöhlen, welcher neben einer erweiterten starren, aber reinen Pupille, immer das Eigne hat, dafs der Pupillarrand jedesmal nach der Schläfengegend hin, einen Winkel bildet, und überhaupt die Pupille näher dem äufsern als dem innern Augenwinkel steht. Trockenheit der Nase und der Augen, so wie Gefühl von Vollheit im *Bulbus*, Kopfschmerzen und Druck in der Nasenwurzel pflegen dabei nicht zu fehlen.

Diese Staarspecies, welche nie in gänzliche Blindheit übergeht, wird völlig geheilt, wenn man nur bald einen bedeutenden Schleimfluſs aus der Nase zu Stande bringen kann. Um diesen nun zu bewirken, applicire man erweichende Dämpfe in die Nase, später eine Mannaauflösung und gebrauche zuletzt schwache Niefspulver mit *Calomel* und endlich *Helleborus*, oder den Dampf von *Liqu. Ammonii caust.*

Eine achte Art ist der rein paralytische schwarze Staar. Diese nicht gar seltene, immer schnell entstehende Amaurose, ist mit einer verengerten, doch klaren Pupille, starren *Iris* und beständig mit Lähmung irgend eines Augenmuskels, oder mehrerer zugleich, vergesellschaftet. Das Sehvermögen ist dabei oft völlig aufgehoben; ja nicht selten jede Lichtempfindung verschwunden. Sind alle Augapfelmuskeln zugleich gelähmt, so fällt das wie todt aussehende Auge, aus der *Orbita* vor, *Ophthalmoptosis paralytica.* *)

---

*) *Ophthalmoptosis* bedeutet immer ein wirkliches Herausfallen des Augapfels aus der Augengrube, welches entweder, wie z. B. hier, von einer Lähmung, oder von einer Zerreifsung mehrerer Augapfelmuskeln bedingt sein kann, ohne dafs der *Bulbus* selbst angeschwollen ist, oder verletzt zu sein braucht. Die *Ophthalmoptosis* darf nicht, wie es zu geschehen pflegt, mit *Exophthalmie* verwechselt werden, denn so nennt man (neuerer Einwendungen ungeachtet) nur dasjenige Hervortreten des Augapfels über die gewöhnlichen Gränzen, welches durch irgend einen *acut* oder chronisch entzündli-

Erschütterungen des Augapfels und seiner Umgebungen, so wie des ganzen Gehirns und Rückenmarks, können diesen Staar verursachen. Zuweilen ist er jedoch eine bloſse symptomatische Erscheinung apoplectischer Anfälle.

Nur wenn die Amaurose in einer Erschütterung des Auges und der Umgegend, ohne Verschiebung oder Zerreiſsung einzelner Gebilde des *Bulbus* gegründet ist, wird die Heilung möglich.

Bei Apoplexien und bedeutenden Gehirn - und Rückenmarkerschütterungen, steht nur der Tod zu erwarten.

Die stufenweise Anwendung der in der Therapie der Amaurose im Allgemeinen angegebenen äuſsern und innern Nervenmittel ist bei *Amaurosis paralytica* nützlich.

Eine neunte Art der dritten Gattung der Amau-

---

chen Zustand desselben, oder durch eine andere krankhafte Vergröſserung des Augapfels verursacht wird. Ebenso ist *Exophthalmos* von jenen beiden Zuständen wohl zu unterscheiden, denn mit diesem Namen belegt man jene innormale Lage des *Bulbus*, wo derselbe durch Balg-Knochen-Fleisch- und andere Geschwülste und Auswüchse, in und auſser der *Orbita* aus letzterer verdrängt worden ist; wobei sich der Augapfel in seiner Structur gerade nicht verändert zu haben braucht. — Ein sehr merkwürdiger und in seiner Art fast einziger *Exophthalmos*, der von einer auſser der *Orbita* entsprungenen Geschwulst, entstanden war, wird im *Journal de Médicine, Chirurgie, Pharmacie etc. Tome XXXIV.* 1815. *pag.* 393. erzählt, und ist kürzlich folgender: Bei einer Frauensperson entstand am linken Seitenbeine des Kopfes eine Geschwulst, die nach und nach immer mehr zunahm, so daſs sie endlich keulenförmig bis zum Knie herabhing. Bei dieser ungeheuern Gröſse der Geschwulst und bei der auſserordentlichen Ausdehnung der Haut, war das linke Auge fünf Zoll weit aus der Augenhöhle sammt den Augenliedern herabgezogen worden: dennoch aber konnte die Kranke ungeachtet der erstaunlichen Ausdehnung des Sehnerven, den Tag von dem Abend unterscheiden, und versicherte sogar, sie habe einige Zeit früher, noch recht gut mit dem Auge sehen können. Die Materie des *Bulbus* war übrigens nicht sichtbar verändert.

rose endlich, ist der symptomatische schwarze Staar des Wasserkopfes. Diese, immer beide Augen befallende, Amaurose kommt häufiger bei einem innern Wasserkopf, vorzüglich bei *Hydrops cerebri*, seltener bei einem äufsern, oder bei *Spina bifida* vor. Die *Iris* ist hier starr, die erweiterte reine schwarze Pupille macht zuweilen hie und da kaum bemerkbare Winkel und die *Sclerotica* erscheint rings um die *Cornea* mit einem bläulichen Schein. Dabei zeigen die Muskeln des *Bulbus* wenig Beweglichkeit, oder oscilliren in verschiedenen Richtungen, nur nicht in der Richtung der geraden Augapfelmuskeln. Zugleich sind die übrigen Zeichen der Hauptkrankheit zugegen. *)

So heilbar oder unheilbar die Hauptkrankheit ist, ebenso heilbar oder unheilbar ist auch die symptomatische Blindheit. Die Behandlung geschieht durch Behandlung der Hauptkrankheit.

Die vierte Gattung des schwarzen Staares enthält, nach Beer, folgende Arten:

Als erste Art den traumatischen schwarzen Staar, der aber schon unter den Wunden der Augengegend mit abgehandelt wurde.

Als zweite Art den gichtischen schwarzen Staar. Diese sich meist nur erst nach Jahren ausbildende Amaurose wird vorzüglich oft bei Frauen mit dunkeln Augen beobachtet, und giebt sich durch folgende Zeichen zu erkennen: Der Kranke sieht anfänglich einen weifslich grauen oder schwarzen Nebel,

---

*) Ich habe zwei Mal bei ausgebildeter Brustwassersucht, bei Frauen in ihren mittlern Jahren, eine symptomatische amaurotische *Amblyopie* in einem äufserst hohen Grade entwickelt gefunden, die sich objectiv durch eine sehr erweiterte, fast starre, aber reine Pupille, durch Trägheit und Schwere des *Bulbus* und der Augendeckel bei geringerer oder gröfserer Anschwellung derselben, und durch ein eigenes gläsernes Ansehn des Auges, so wie durch eine sehr schmutzig braune *Iris* bei früher lichtbrauner Regenbogenhaut, zu erkennen gab. Das Sehen besserte sich, wenn die Hauptkrankheit sich besserte, obgleich die Patienten fast beständig alles mit einem schwarzen Flor überzogen zu sehen glaubten.

sieht Farben, fühlt einen reifsenden, herumirrenden, geringern oder heftigern Schmerz in der Umgegend des Auges, im Auge selbst, ja im ganzen Kopfe, womit zuweilen ein Gefühl, als wenn Ameisen rings um das Auge auf der Haut kröchen, verbunden ist. Der Schmerz wird heftiger bei nassem kalten Wetter, ebenso durch Liegen auf Federkissen, durch Genufs unverdaulicher Speisen und nach heftigen Gemüthsbewegungen; er wird aber milder oder verschwindet eine Zeitlang ganz, wenn entgegengesetzte Dinge auf den Patienten einwirken. Dabei ist die *Iris* ganz oder fast ganz unbeweglich, und ihre Farbe in's Dunkle verändert. Die Pupille ist erweitert, und nach den Augenwinkeln hin so verzogen, dafs sie die Form derjenigen Pupille, welche man bei wiederkäuenden Thieren bemerkt, angenommen hat, *) übrigens ist sie entweder blafs mattschwarz von Farbe, oder graugrünlich, und kündigt im letztern Falle ein *Glaucom* an, welches sich nach jedem Schmerzanfalle mehr ausbildet. Neben jenen Symptomen findet man immer einen varicösen Zustand der Blutgefäfse des Auges. Aufser dem Trübwerden des Glaskörpers wird nun oft auch die Linse zuletzt undurchsichtig, *Cataracta glaucomatosa*, wo dann gewöhnlich eine *Atrophie* des *Bulbus* zu erwarten steht.

Leicht wird diese Amaurose hervorgebracht, wenn bei gichtischer Anlage, Körper- und Geistesdiät vernachläfsigt wurden und die Augen schon ohnehin in einem kränklichen Zustande sich befinden. Vorzüglich haben Weiber nach dem Aufhören der Menstruation zu fürchten.

Ungeachtet des langsamen Fortschreitens des Uebels, ist die Prognose traurig. Selbst wenn der Arzt gleich anfänglich hinzukommt, läfst sich die Krankheit selten aufhalten, viel weniger aber heilen, weil man die ursächlichen Schädlichkeiten nicht entfernen kann. Indefs wird zuweilen, wenn nur erst ein Auge afficirt ist, durch thätige Bekämpfung der Gicht, so

---

*) Siehe Taf. III. Fig. 3.

wie durch völlige Umänderung der vorigen ungünstigen Lebensart, das andere noch gerettet.

Bei Behandlung dieser Amaurose, kommt aufserordentlich viel auf eine zweckmäfsige körperliche und geistige Diät an. Man erhalte demnach einen heitern Sinn, vermeide jeden Schreck, Aerger, jede Erkältung und Magenbeschwerde, vermeide alle unreine Luft, so wie auch den Gebrauch der Federkissen, substituire dafür Kissen mit Rofshaaren, und sorge für eine trockne, reine und gesunde Wohnung. Zugleich suche man die verderblichen Schmerzen durch jene Mittel zu entfernen, welche in eben der Absicht bei *Iritis arthritica* angegeben werden und handhabe die antiarthritischen Mittel, vorzüglich die stärkern, ja vorsichtig. Ableitungen durch Vesicatorien, Sinapismen, Haarseile und durch Einreibungen der Brechweinsteinsalben, sind bei der Kur nicht zu vernachläfsigen *).

Eine dritte Art der vierten Gattung ist derjenige vicariirende schwarze Staar, welcher nach schnellunterdrückten und abgeheiltenKopfausschlägen, alten Fufsgeschwüren und der Krätze, nach Abschneiden eines Weichselzopfes, u. s. w. entsteht. Die Symptome dieser Amaurose, kommen mit denen der arthritischen ganz überein, nur dafs sich der hier abzuhandelnde Staar viel schneller als der gichtische ausbildet, und dafs er gleich Anfangs nie von heftigen Schmerzen im Auge und Kopfe, begleitet ist.

So lange die Blindheit noch nicht vollkommen ist, und unlängst entstanden war, und so lange durchaus keine Fehler der Mischung im *Bulbus* sichtbar sind, so lange wird die Prognose noch günstig sein. Im entgegengesetzten Falle ist sie sehr schlecht.

Um diese Amaurose zu heilen, suche man wo möglich die unterdrückten Hautausschläge und Geschwüre, u. s. w. wieder hervorzubringen; man impfe die Krätze wieder ein, man lege beim Weichselzopf

---

*) Man sehe unter *Glaucom* das Weitere.

Vesicatorien auf den abgeschornen Kopf; man mache nach Umständen künstliche Geschwüre und Ausschläge durch *Ungt. Tart. stibiat.* u. a. M.; man lege Senfteig auf die Füfse, wenn ausgetrocknete Fufsgeschwüre Ursach waren; man lasse Senffufsbäder gebrauchen, lege Fontanellen, u. s. w. Bei allen jenen äufsern Mitteln sind innere, die Thätigkeit der Haut vermehrende Medicamente, z. B. eine Mischung von *Sulph. aurat. Antimon., Flor. Sulphur.* und *Camphor,* bei Schwächlichen mit tonischen Mitteln vermengt, neben dem Gebrauch von Schwefelbädern, sehr nützlich und heilsam.

Als vierte Art stellt Beer einen schwarzen Staar auf, der als unmittelbare Folge eines sehr heftigen und verbissenen Zornes entsteht. Diese, bei cholerischen mit dunkeln Augen begabten Menschen vorkommende, Form der Amaurose, charakterisirt sich durch erweiterte Pupille ohne auffallende Winkel, durch vollkommne Starrheit der *Iris* und durch ein dichtes Netz von Blutgefäfsen in der *Conjunctiva.* Dabei entwickelt sich oft eine Gelbsucht, wodurch auch öfters die *Sclerotica* und die wäfsrigte Feuchtigkeit gefärbt wird. Oft ist die Blindheit mit paralytischen Erscheinungen der Muskeln des Gesichts verbunden.

Die Vorhersage ist unsicher, vorzüglich wenn die Blindheit schon mehrere Tage oder Wochen dauerte.

Wird der Arzt gleich nach dem Entstehen der Blindheit hinzugerufen, so haben Richter, Beer u. a. Brechmittel mit Glück angewendet *), welche indefs gewöhnlich nichts halfen, wenn das Uebel schon länger gedauert hatte; hier brachte der fortgesetzte Gebrauch von *Camphor, Arnica* und ähnlichen Mitteln, neben der Anwendung der Schwefelbäder, das Gesicht öfters wieder.

Eine fünfte Art der vierten Gattung ist der vica-

---

*) Bei vollsaftigen Personen, oder wo nur einiger Verdacht von Blutandrang nach dem Kopfe Statt findet, versäume man übrigens ja nicht, dem Brechmittel ein Aderlafs vorauszuschicken.

riirende schwarze Staar vom unterdrückten Schnupfen, mit Schleim- und Eiteransammlung in den Stirnhöhlen. Unter Druck und begränztem entzündlichen Schmerz in der Nasenwurzel und in der Gegend der Stirnhöhlen, wird die Pupille verengert und bleich schwarz, bleibt aber rund; die *Iris* wird starr und das Gesicht nimmt auf einem oder beiden Augen ab. Dabei ist ein Auge oder beide, je nachdem nur eines oder zwei ergriffen sind, aus der Sehaxe verstellt, weſswegen der Kranke an einem Doppeltsehen leidet. Atonie des obern Augenliedes, Trockenheit der Nase und Gefühl von Staub in derselben, bei öfterm Niesen und dem Sehen plötzlich erscheinender furchtbarer Lichtgestalten, sind hierbei zugegen. Das kranke Organ wird endlich unter vermehrter Abnahme des Gesichts und unter Ungestaltsehen aus der *Orbita* nach unten und auſsen gestellt, wobei der Schmerz zwar unstät wird, aber immer zunimmt. Zuletzt wird auch die vordere Wand der Stirnhöhlen vorgedrängt.

Die Heilung dieser sehr seltenen Form der Amaurose, ist noch möglich, wenn nur *Amblyopie* und kein Ungestaltetsehen vorhanden ist; im Gegentheile, und wenn der *Bulbus* von den Knochen der ausgedehnten Stirnhöhlen aus der *Orbita* hervorgestoſsen ist, bleibt meistens alle Mühe ohne Erfolg.

Sollten die Schmerzen über der Nase sehr heftig sein, so lege man Blutigel, verfahre, wenn ein entzündliches Fieber vorhanden, auch allgemein antiphlogistisch, und gebrauche erst nach Abnahme der Schmerzen, jene örtlichen Nasenschleim aussondernden Mittel, welche bei der siebenten Art der dritten Gattung der Amaurose empfohlen wurden, die indeſs durch Vesicatorien auf die Augenbraunengegend, so wie durch Einreibungen flüchtig reitzender Arzneien und dem innern Gebrauch von *Arnica, Camphor* mit *Guajak*, unterstützt werden müssen. Hilft dieſs nicht, wird vielmehr der *Bulbus* aus der *Orbita* verdrängt, oder die vordere Wand der Stirnhöhlen ausgedehnt, dann muſs man diese Stelle trepaniren, den Schleim oder Eiter

aus den Höhlen herauslassen und die Oeffnung nach den Regeln der Chirurgie behandeln.

Auch nach der plötzlich unterdrückten Milchabsonderung bei Wöchnerinnen, hat man in äufserst seltenen Fällen eine Amaurose entstehen sehen, welche die sechste Art der vierten Gattung ausmacht, und folgende Zeichen hat: Plötzlich nach unterdrückter Milchabsonderung entsteht ein wüthender Schmerz in der Stirn- und Augenbraunengegend, wobei die Pupille wenig erweitert, die Regenbogenhaut starr, angeschwollen, und die Farbe derselben alienirt erscheint. Die Kranke leidet an *Photopsie* und heftiger *Photophobie*. Die durchsichtigen Medien des Auges trüben sich etwas, die Blutgefäfse der *Conjunctiva* sind strotzend angefüllt, und die anfängliche *Amblyopie*, geht endlich plötzlich in völlige Amaurose über. Dabei findet man die noch kurz vorher von Milch strotzenden Brüste der Wöchnerin, jetzt beutelartig hängend, leer, aber völlig schmerzlos.

Die Vorhersage ist unsicher, und wenn schon die Medien des Auges getrübt sind, ganz ungünstig.

Alle jene, dem Arzte bekannten Mittel, welche die unterdrückte Milchsecretion bald wieder hervorbringen können, sind hier angezeigt. Defswegen mache man über die Brüste warme Leinmehlumschläge mit *hba cicutae, hyoscyami* und ähnl., oder mit Semmelkrume und Milch; nehme späterhin reitzendere Kräuter, Nachts trockne gewärmte Kräuterkissen oder doppelte Flanelltücher, die mit *Succin. Gum. mastich. olibani etc.* durchräuchert sind. Man versäume endlich nicht das Anlegen des Kindes, oder eines jungen Hundes, oder den Gebrauch der künstlichen Milchsauger. Hilft alles dieses aber nicht, bleibt vielmehr das Gesicht nach hergestellter, oder nicht hergestellter, Milchabsonderung in den Brüsten, immer noch aufgehoben, so versuche man innerlich *Arnica* mit *Calomel* und *Camphor*, und mache Ableitungen durch Fontanelle, Seidelbast, Vesicatorien, u. s. w.

Es giebt endlich eine siebente Art der Amaurose der vierten Gattung, welche entweder aus organi-

schen Fehlern des Sehnerven, oder aus organischen Fehlern der Schädelhöhle und des Gehirns entsprungen ist. Der berühmte Beer hat Symptome gefunden, welche die organischen Veränderungen als Ursachen dieses schwarzen Staares diagnosticiren lassen. Er erkennt die Amaurose, welche in organischen Fehlern des Sehnerven gegründet ist, aus folgenden Erscheinungen.

Der Kranke sieht einen immer dichter werdenden Nebel, wobei ihm die Gegenstände ungestaltet erscheinen, er fühlt einen geringen stumpfen Druck im Hintergrunde der Augengrube, und ihm ist, als wenn der *Bulbus* aus der *Orbita* hervorgedrängt werde, wovon aber nicht das geringste Zeichen vorhanden ist; dabei findet man die *Iris* völlig starr, die Pupille sehr erweitert und winklicht, so, dafs sie zuweilen ein ungleichseitiges Fünf- oder Sechseck bildet. Endlich entwickelt sich langsam und ohne Varicositäten des Auges, ein *Glaucom,* nach und nach eine glaucomatöse *Cataract,* worauf zuletzt der *Bulbus* ein merkliches kleiner wird, ohne indefs völlig atrophisch zu werden. Uebrigens bildet sich diese Amaurose nur langsam und gewöhnlich nur in einem Auge aus, und befällt meistens hagere Subjecte, welche die Spuren der Scrofeln noch an sich tragen.

Diejenige Amaurose, welche aus organischen Fehlern der Knochen der Schädelhöhle oder des Gehirns hervorgeht, entwickelt sich, nach Beer, bei vormals rhachitischen und nachmals syphilitischen Subjecten, erscheint gemeiniglich auf beiden Augen zugleich, und zwar auch langsam und unter *Metamorphopsie,* allein anstatt des Sehens eines schwarzen Nebels, sieht der Kranke die Gegenstände hier undeutlich und verwirrt, und hat dabei Schwindel und furchtbare Lichterscheinungen, welche meistens mit Lichtscheu, mit lebhaften Bewegungen der *Iris,* mit verengerter Katzenpupille, mit convulsivischen Bewegungen der Augen und Augenlieder, und mit Schielen beider Augen, verbunden sind. Dabei bemerkt man eine auffallende Turgescenz der Blutgefäfse des Auges, die unter den hef-

tigsten Kopfschmerzen in *Cirsophthalmie* übergehen. Nachdem endlich vollkommne Blindheit eingetreten ist, nimmt oft der, bedeutende Remissionen machende, Kopfschmerz sehr zu, Gehör, Geruch und Geschmack gehen verlohren, und endlich hören auch Gedächtnifs und die übrigen Geistesthätigkeiten auf. Zuweilen wird jetzt der *Bulbus*, oft unter Anfällen von Raserei und paralytischen Erscheinungen, aus der *Orbita* hervorgedrängt.

Die Ursachen beider Unterarten sind: Abmagerungen des Sehnerven, Verhärtungen und Verwachsungen dieses Nerven mit seiner Scheide, Verhärtungen der gestreiften Körper, Hydatiden zwischen der Scheide des Sehnerven, das Fehlen eines *Plexus chorioideus*, *Caries* und *Exostosen* der Schädelhöhle, sehr weiche Consistenz des Gehirns, u. s. w.

Die Prognose ist äufserst ungünstig. Sollte jedoch eine bestimmt ausgesprochene *Dyscrasie*, den *Exostosen* oder den andern organischen Fehlern zum Grunde liegen, so kann man, wenn der Kranke noch Kräfte besitzt, eine Kur versuchen, die jenen *Dyscrasien* angemessen ist.

Die Anomalien des Gesichts.

Die Anomalien des Gesichts, welche schon unter den subjectiven Merkmalen der Amaurose berührt wurden, z. B. die *Myopie*, die *Presbyopie*, das Schielen, u. s. w. kommen nicht allein als Symptome der Amaurose oder anderer Krankheiten vor, sondern einige davon treten auch als für sich bestehende Leiden auf, und verdienen defswegen besonders abgehandelt zu werden.

Das Schielen, *Strabismus*, [στραβισμος, v. στρεφω, ich verkehre, verdrehe,] *Strabositas*, ist derjenige Mifsstand des *Bulbus*, wo beide Augen, oder eines allein, bei Betrachtung der Gegenstände von der Sehaxe abweichen, wo jedoch die schielenden Augen, durch den Willen des Kranken, in jede beliebige Richtung gebracht werden können. Dabei sieht der Schielende

im Anfange der Krankheit gewöhnlich doppelt, weil derselbe, wenn er nur auf einem Auge schielt, mit diesem aus der Sehaxe verrückten *Bulbus* nicht denselben Punkt des Gegenstandes fixirt, welchen das normale Auge beobachtet; weichen beide Augen von der Sehaxe ab, so wird ebenso jedes Auge besondere Punkte des Gegenstandes sehen: Bei längerer Dauer der Krankheit verliert sich gewöhnlich diese Diplopie. Man kann im Allgemeinen 4 verschiedene Arten des Schielens annehmen, nähmlich: 1) dasjenige, wo sich die Sehaxen der Augäpfel einander zu sehr näheren, *Strabismus convergens*, diese Art findet man meistens mit *Myopie* verbunden; 2) dasjenige, bei welchem sie sich zu sehr von einander entfernen, *Strabismus divergens;* 3) das Schielen von ungleicher Höhe, wo das eine Auge nach oben, das andere nach unten gerichtet ist, *Strabismus horrendus*; 4) endlich das Schielen, wo ein Auge oder beide, gerade nach oben stehen, welches man Uebersichtigkeit nennt, ein der deutschen Sprache eigenthümlicher Ausdruck, den man allenfalls durch *Strabismus sursumvergens* oder *Sursumversio oculorum* übersetzen könnte. Diese Art entsteht insgemein dadurch, dafs die liegenden Kleinen, ihnen interessante Gegenstände, welche über und hinter ihrem Kopfe sich befinden, oft und lange betrachten; beobachten sie vorzüglich die Scheibe eines sich stets hin- und herbewegenden Uhrpendels, welcher hinter und über ihnen hängt, so bekommen sie nicht selten eine Uebersichtigkeit, welche mit beständigem Hin- und Herbewegen des *Bulbus, Nystagmus bulbi,* nach beiden Winkeln hin, verbunden ist.

Die Ursachen des Schielens sind verschieden. Oft ist es symptomatisch, z. B. bei *Epilepsie*, Würmern, *Catalepsie, Hydrocephalus, Apoplexie, Hemiplegie,* u. s. w. In einigen Theilen Asiens findet man das Schielen endemisch. Zuweilen ist Nachahmung anderer Schielenden Ursach des Uebels. Oft entsteht es von der übeln Gewohnheit der Kinderwärterinnen, den Kleinen das Spielzeug zu nahe vor die Augen zu halten. Ein *Strabismus divergens* wird manchmal durch die Gewohnheit

der Kinder verursacht, zwei ihnen werthe aber von einander entfernte Gegenstände zugleich anzusehen, was den leicht beweglichen Augen eines Kindes nicht schwer fällt. Die grofse Beweglichkeit der Augen bei Neugebohrnen und die Unsicherheit, mit welcher dieselben die Gegenstände auffassen, veranlafst ein, schon von Petit beobachtetes Schielen, welches sich bald in einem höhern, bald geringern Grade bei allen Neugebohrnen findet. Zuweilen entsteht ein Schielen dadurch, dafs das eine Auge eine von dem anderen unterschiedene Brennweite hat, wefshalb dann die Brennweiten beider Augen nicht in den zweckmäfsigsten Brennpunkt sich vereinigen können, vielmehr der eine Augapfel unsicher umherzuschwanken anfängt. Wenn auch in derlei Fällen anfänglich die Nervenkräfte beider Augen in völliger Integrität bestehen, so vermindert sich doch nach und nach die Kraft des schielenden Auges immer mehr, weil es aufhört die Gegenstände gehörig zu fixiren und weil somit die Nervenkräfte nothwendig einschlafen müssen. Häufig finden wir diesen Zufall bei Myopen, wenn ihre beiden Augen eine unverhältnifsmäfsig verschiedene Brennweite besitzen; zuweilen erwerben sie sich diesen Zustand, wenn sie einfache *Lorgnetten* gebrauchen und stets mit einem und dem nähmlichen Auge allein sehen; in solchem Falle ist dasjenige Auge das beste, welches am meisten geübt wird. Dieser Gegenstand bietet noch ein sehr weites Feld zu Untersuchungen dar, welche ich mir für einen schicklicheren Ort vorbehalte: nur so viel will ich noch hinzufügen, dafs wir dadurch eine sehr häufig vorkommende *Species* von schwarzem Staar oder amaurotischer *Amblyopie* kennen lernen, welche da, wo sie nicht ganz veraltet und zeitig genug erkannt wird, unter gewissen Bedingungen meistens noch zu heilen ist.

Die Prognose ist natürlich sehr verschieden und wird grofsentheils durch die Ursachen bedingt; wo letztere nicht zu beseitigen sind, da wird man auch auf eine wahre Heilung verzichten müssen. Je bedeutender das Schielen ist, je länger es gedauert hat und

je älter der damit Behaftete ist, desto schwieriger wird die Heilung. Bei Kindern heilt man es am oftesten, viel seltener bei Erwachsenen; zuweilen verschwindet das Uebel ohne Zuthun der Kunst in dem Maafse, als die Entwicklung des Körpers vor sich geht, dagegen man fast niemals auf eine freiwillige Heilung bei vorgerücktem Alter rechnen darf.

Die Heilung richtet sich nach den Ursachen. Wenn also das Schielen blofs symptomatisch ist, so mufs die Urkrankheit gehoben werden. Waren obenerwähnte Gewohnheiten der Kinder Schuld an dem Uebel, so mufs man solche abzuschaffen suchen. Wenn die Kinder daher durch Hinblicken auf seitwärts stehende Gegenstände ein Schielen bekommen haben, so gewöhne man sie nach und nach, gerade vor den Augen stehende Objecte zu betrachten; nur dürfen letztere den Augen der Kinder nicht zu nahe sein. *) Stehen beim Schielen beide Augäpfel nach oben und aufsen, also nach den Schläfewinkeln hin; so hat man das Aufkleben eines Stückes schwarzen Pflasters auf die Nasenspitze empfohlen, damit dadurch den Kindern ein fixer Punkt, zu einem recht häufigen Betrachten, bestimmt werde. Erfahrungen haben mich indefs gelehrt, dafs das Besehen der Nasenspitze fast immer von den Kindern vernachläfsigt wird, und man daher nach halbjährigem und längern Gebrauch des Pflasters, keine Besserung bemerkt. Hier fand ich in zwei Fällen Folgendes ziemlich schnell heilsam: Ich liefs eine Art von ganz kurzem Trichter aus Pappe verfertigen, dessen Basis oval ist, und beide Augen einschliefst; in der Gegend über der Nasenspitze befindet sich eine fast zollweite Oeffnung, durch welche die Schielenden bei ganz gerade und fest aufgebundener Maschine, sehen und nach und nach lesen müssen. Hierdurch werden die Kinder gezwungen, wenn sie anders etwas sehen oder lesen wollen, die Augen mehr nach innen und selbst nach unten zu stellen. Das Anschauen der

---

*) S. Fischer's Theorie des Schielens.

Gegenstände mit einem Auge, wozu die Kinder zuweilen geneigt sind, mufs man dabei verhüten. Bei *Strabismus convergens* soll man das Kind einen grofsen grünen Augenschirm tragen lassen. Schielen junge Mädchen, so heilt man die böse Angewohnheit, wenn man ihre Eitelkeit in Anspruch nimmt, und ihnen den Spiegel zeigt, sobald sie ihre Unart exerciren. Was ich bis hieher über die Heilung gesagt habe, gilt meistens nur von dem geringern Grade des Uebels, von ganz kleinen Kindern, und da, wo beide Augen zugleich schielend gefunden werden.

Obgleich nun Buffon *) Unrecht hatte, wenn er behauptete, dafs immer nur ein Auge allein schielen könne (indem es in der That Fälle giebt, wo in Folge einer Krankheit beider Augen, auch beide zugleich wahrhaft schielen, und somit beide aus der normalen Richtung herausgetreten sind) so ist es doch in den meisten Fällen so, und zugleich fast durchgängig anzunehmen, dafs das wahre Schielen für die Folge einer ungleichen Kraft beider Augen anzusehen ist, oder dafs diese wenigstens später hinzutritt und die fehlerhafte Stellung des Augapfels unterhält. Ist das Vorausgeschickte wahr, so wird das Heilmittel hauptsächlich in einer Stärkung des schwächeren Auges zu finden sein, welche meistens durch Uebung des letzteren erzielt wird; und wirklich geschehen auch die meisten Heilungen nur dadurch. Es versteht sich übrigens, dafs da, wo das Schielen symptomatisch ist, die Hauptkrankheit zuvor gehoben werden mufs. Da, wo ein Auge allein schielend gefunden wird, stellt sich dasselbe insgemein augenblicklich in die normale Richtung, wenn man das gute Auge zubindet. Darin liegt nun auch ein Hauptmittel zur Heilung des Schielens. Obgleich die Anwendung dieses Mittels seine grofsen Unbequemlichkeiten mit sich führt, so steht doch der Gewinn, den man dadurch erhält, mit jenen in gar keinem Verhältnisse. Indefs kann man nur Nutzen davon erwarten: wenn die etwa vorhandene ursächliche Krankheit

*) *Mémoires de l'Academie des Sc. de Paris. Année* 1743.

bereits gehoben ist, wenn das Schielen noch nicht lange gedauert hat und endlich: wenn die Schwäche des kranken Auges nicht gar zu grofs und bedeutend ist. Erfreulich bleibt es immer, wenn der Fehler nicht angeboren ist und wenn derselbe noch im Kindesalter behandelt werden kann. Schon nach dem Zubinden des gesunden Auges von einer halben oder ganzen Stunde im Tage, kann man über die Kräfte des anderen, sowie über die Möglichkeit, dessen normale Bewegungen wieder herzustellen, urtheilen. In demselben Augenblicke, wo dem gesunden Auge das Licht entzogen wird, giebt das andere zwar ein verworrenes Bild der Gegenstände, aber dieses ist nicht von langer Dauer, denn schon nach dem Zubinden des gesunden Auges während einiger Minuten, fängt das andere an, deutlicher zu sehen, und noch besser nach einigen Stunden. Wird das gesunde Auge hierauf geöffnet, so bemerkt man häufig, dafs die Abweichung der Sehaxen schon geringer ist, und man hat Ursache einen günstigen Erfolg zu hoffen. In keinem Falle darf man anfangs das Zubinden forciren, denn nicht selten erregt das schärfere Sehen mit dem schwachen Auge allein, Wüstigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel; nur nach und nach kann daher das stundenlange Zubinden des gesunden Auges erlaubt werden.

Ein ähnliches Schielen, welches aus der Vernachläfsigung des einen Auges entspringt, bemerken wir bei manchen *Myopen*, weil sie die Gegenstände nur einem einzigen Auge sehr nahe halten. Da es diesen nun oft ungemein schwer wird, die Objecte, z. B. das Buch beim Lesen, mehr zu entfernen, so ist in diesem Falle nur die zweckmäfsige Auswahl einer Hohlbrille anzurathen. — Schielbrillen, die nach und nach beständig getragen werden müssen, schaffen nur selten bedeutende Hülfe. — Ein schon eingewurzeltes Schielen kann meistens nicht gehoben werden.

Das Schiefstehen oder Schiefsehen des Auges, *Luscitas*, *Visus obliquus*. — Unter Schiefstehen des Auges versteht man eine Verstellung des *Bulbus* von der Sehaxe, wobei der Kranke nicht im Stande

ist, den Augapfel vollkommen in die, der fehlerhaften Stellung entgegengesetzte, Richtung zu bringen. Man wird hieraus schon muthmafsen können, dafs ein Schiefstehen häufig aus einem Schielen hervorgeht; denn wenn z. B. Centralflecken der *Cornea* anfangs nur ein Schielen verursacht haben, so wird die angenommene Stellung dem Auge endlich so habituell werden, dafs der *Bulbus* nicht mehr fähig ist, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bringen, woran denn die, aus Mangel an Uebung, atonisch gewordenen Augapfelmuskeln Schuld sind.

Aufser den Centralflecken der *Cornea*, können auch Geschwülste in der *Orbita* und in der Oberkieferhöhle, Verwundungen, Zerreifsungen, oder Atonie eines Augapfelmuskels, amaurotische Flecke im Mittelpunkte der *Retina*, u. s. w. den *Bulbus* schief stellen. Zuweilen entsteht das Uebel in Folge einer Erkältung, welche eine Lähmung eines Augapfelmuskels veranlafste; ebenso kann das Leiden durch *Apoplexie*, *Hydrocephalus internus* und endlich selbst durch Würmer bedingt werden.

Die Prognose des Uebels ist, nach der Verschiedenheit der Ursachen, verschieden. War eine Erkältung Schuld, so wird es häufig glücklich geheilt. Auch wo syphilitische Geschwülste in der *Orbita* die Krankheit verursachen, ist eine Heilung möglich. Wo das Schiefstehen symptomatisch ist, da ist die Prognose meistens ungünstig. Wo endlich Zerreifsung eines Augapfelmuskels vorhanden, da bleibt die innormale Stellung des *Bulbus* für immer zurück.

Die Heilung, wenn sie möglich ist, geht aus dem Gesagten hervor. Man suche daher die Hornhautflecke zu heben, entferne die dyscrasischen Procefse, wende, wo *Tophi* und *Exostoses* das Schiefstehen veranlassen, innere und äufsere *Resolventia* an, unter welchen die Mercurialien den ersten Rang zu behaupten pflegen, und gebrauche *Vesicatoria*, spirituöse Einreibungen und Dämpfe, so wie Electricität und Galvanismus, wenn Atonie eines Augapfelmuskels vorhanden ist. Wo das Schiefstehen als Symptom einer anderen Krankheit auftritt,

tritt, behandle man die primäre Krankheit nach den Regeln der Kunst.

Die Kurzsichtigkeit, *Myopia*, (von *μυω*, ich mache kleine Bewegungen, und *ωψ*, Gesicht.) — Die Entfernung von 15 bis 20 Zoll vom Sehorgan, ist derjenige Gesichtspunkt, wo ein gesundes Auge auch kleine Gegenstände deutlich sehen kann. Ein Auge, welches sich den kleinen Gegenständen viel mehr nähern mufs, um dieselben deutlich zu sehen, nennt man kurzsichtig, *myops*.

Der *Myope* kann meistens schon durch Blick, Haltung, so wie durch sein ganzes Benehmen erkannt werden. Er schreibt immer sehr klein, er liebt den kleinen Druck, und liest denselben bei schwacher Beleuchtung; die Gegenstände, welche er betrachten will, nähert er dem Gesichte sehr, und wenn die Kurzsichtigkeit bedeutend ist, gewöhnlich nur dem einen Auge. Um entfernte Gegenstände zu sehen blinzt er mit den Augenliedern und hält diese über die Hälfte geschlossen. Die Pupille ist meistens etwas weit. Häufig betrachtet der Kurzsichtige die mit ihm sprechenden Personen nicht, sondern schlägt seinen Blick zu Boden. Uebrigens sieht er bei einer starken Beleuchtung deutlicher in die Ferne, als bei einer schwachen.

Das Nächstursächliche der Kurzsichtigkeit liegt in der zu frühen Brechung und Vereinigung der Lichtstrahlen in einen Brennpunkt, wodurch die Strahlen, weil der Brennpunkt vor der Markhaut gebildet wird, nothwendig wieder zerstreut auf die *Retina* fallen, und ein mehr oder weniger undeutliches Bild bezeichnen müssen. Oft ist daran die grofse Convexität der Hornhaut oder der vordern Hälfte der Krystalllinse, oft aber die zu grofse Quantität der Glasfeuchtigkeit Schuld; im letzten Falle scheint das Auge schon beim ersten Anblick zu grofs zu sein und wird defshalb Glotzauge genannt. Zuweilen wird die zu frühzeitige Brechung und Vereinigung der Lichtstrahlen in einen Focus, durch einen ungewöhnlichen *Turgor vitalis*, und eine besondere Dichtheit der *Cornea*, der Linse, oder des ganzen Augapfels veranlafst, was vorzüglich bei sehr jun-

gen gesunden Kindern der Fall ist. Ferner liegt die Ursache der Kurzsichtigkeit oft in einer erworbenen fehlerhaften Länge des Augapfels, welche schon in der frühesten Jugend Statt findet, wenn den Kleinen die Spielsachen öfters zu nahe vor das Gesicht gehalten werden. Höchst selten ist die *Myopie* natürliche Folge einer habituell gewordenen *Mydriasis*. Zuweilen liegt die Kurzsichtigkeit in einer angebohrnen fehlerhaften Bildung des Augapfels, in welchem Falle das Uebel in dem frühesten Lebensalter vorkommt. Eine der vorzüglichsten Ursachen, ist das tägliche Anstrengen der Augen durch Gesichtsarbeiten, durch Schreiben, Lesen, Nähen, Sticken oder durch ähnliche Beschäftigungen, ganz besonders aber, wenn sich die Personen keine Erhohlung im Freien gönnen; wenn sie sich angewöhnen, den Kopf allzusehr auf die Arbeit zu beugen, und wenn das Arbeitszimmer nicht hinlängliches Licht hat. Da nun bei dem Arbeiten bei künstlichem Lichte, immer Lichtmangel gegeben ist, indem auch eine grofse Anzahl Lichtkerzen doch niemals Tageshelligkeit gewähren können, so ist auch besonders das Arbeiten bei Abend zum Hervorbringen einer dauernden Kurzsichtigkeit höchst geeignet. Ich kenne viele Personen, welche durch anhaltende Gesichtsarbeiten, während einer einzigen Nacht, dauernd kurzsichtig geworden sind, und ich gestehe aufrichtig, dafs die gröfste Mehrzahl der Kurzsichtigen, welche ich kennen gelernt habe, an einer erworbenen *Myopie* gelitten. Es ist dieses eine den Grofsstädtern eigenthümliche Krankheit, die der Landmann oft kaum dem Nahmen nach kennt.

Da sich das Auge im fortschreitenden Alter immer mehr und mehr abplattet, so geht schon daraus hervor, dafs das kurzsichtige Organ, wenn es nicht durch Mifsbrauch des Gesichts, so wie der Brillen und scharfen Hohlgläser zu sehr verdorben worden ist, allmählig immer mehr zur Normalität zurückgeführt wird, und sich so die Kurzsichtigkeit nach und nach verliert; diefs ist um so sicherer zu erwarten, wenn nur eine üble Gewohnheit die *Myopie* verursachte.

Wird der *Turgor vitalis* im Auge durch Blutcon-

gestionen erzeugt, und ist dadurch die *Myopie* bedingt; so mufs die Ursache nach bekannten Regeln entfernt werden. Man läfst zur Ader, reicht kühlende Mittelsalze, läfst Fufsbäder gebrauchen und erhitzende Speisen und Getränke vermeiden. Um eine unlängst erworbene *Myopie* zu mindern oder zu heilen, ist das beste, aber gewöhnlich auch das unthunlichste Mittel, die Ermäfsigung oder das völlige Aussetzen der das Gesicht anstrengenden Arbeiten, die Uebung der Augen, ohne Brille in die Ferne zu sehen, welches durch häufige Spaziergänge im Freien, besser durch Reisen, am besten aber durch Seereisen erzielt wird. Liegt der Grund der Kurzsichtigkeit in einer veralteten übeln Gewohnheit, in einer habituell gewordenen *Mydriasis*, oder in einer fehlerhaften Bildung des Auges; so kann man nur selten an eine Heilung denken, sondern mufs dann die zweckmäfsige Brechung und Vereinigung der Lichtstrahlen in einen Focus, auf der Markhaut selbst, mit Hülfe der hohlgeschliffenen Brillen, so viel möglich bewirken, aber sowohl bei der Auswahl, als bei dem Gebrauche dieser Brillen, dahin sehen, dafs die Gläser nicht zu schwach sind, weil dann das Auge noch immer einen grofsen Aufwand von Sehkraft nöthig hat, um die, aufser dem Brennpunkt des kurzsichtigen Individuums liegenden Gegenstände, genau zu unterscheiden, wodurch er sich nothwendig bald eine bedeutende Gesichtsschwäche zuziehen müfste; bedient sich aber der Kurzsichtige einer zu scharfen Hohlbrille, so nimmt die *Myopie* offenbar zu, und er sieht endlich ohne Brille selbst diejenigen Gegenstände nicht mehr, die er vorher mit unbewaffnetem Auge ganz deutlich erkannt hat, und auf solche Art sieht er sich nicht nur genöthigt, die Brille gar nicht mehr von der Nase zu lassen, sondern mufs sich auch von Zeit zu Zeit eine schärfere anschaffen, bis er endlich keine mehr findet, die scharf genug für sein Auge wäre, wo er dann beinahe so gut als blind ist. Eine Hohlbrille, mit welcher der Kurzsichtige in einer Entfernung von 15 bis 20 Zoll vom Auge, die kleinste Druckschrift vollkommen fertig zu lesen im Stande ist,

ohne dafs das Auge dabei sogleich ermüdet, ist immer die zweckmäfsigste. Uebrigens ist noch zu bemerken, dafs der Kurzsichtige die Brille nicht beständig tragen darf, wenn er die Hoffnung behalten will, von seinem dreifsigsten oder vierzigsten Jahre an, auch ohne Brille ganz gut in die Ferne sehen zu können.

Bei dem höchsten Grade veralteter Kurzsichtigkeit, welche schon an Blindheit gränzt, hat man den Vorschlag gethan, die Krystalllinse auszuziehen, um dadurch eine Radikalkur herbei zu führen, weil der das Licht am stärksten brechende Körper dem Auge durch diese Operation entzogen wird, und man bei am grauen Staare glücklich operirten Individuen, die vorher kurzsichtig waren, die Erfahrung gemacht hat, dafs sie nach Entfernung der Linse ein sehr gutes Gesicht erhielten. Ich glaube indefs kaum, dafs sich Jemand zu einer solchen Kur entschliefsen wird, indem für das ganz sichere Gelingen der Operation doch Niemand einstehen kann.

Die Fernsichtigkeit, *Visus senilis*, *Presbyopia*, [von πρεσβυς, alt, ehrwürdig, weitsehend, und ωψ, Gesicht.] — Ein Auge, welches die Objecte nur dann deutlich sehen kann, wenn sie sich in einer viel gröfsern Entfernung als die von 15 bis 20 Zoll ist, befinden, nennt man fernsichtig, *presbyops*. Hier werden die Lichtstrahlen immer viel zu langsam gebrochen; sie fallen, noch ehe sie in einen Focus sich sammeln können, folglich zerstreut, auf die Markhaut, und vereinigen sich erst hinter ihr in einen Brennpunkt, daher kein deutliches Bild von allen nahe liegenden Gegenständen auf der *Retina* zu Stande kommen kann. Die Fernsichtigkeit kommt selten vor dem vierzigsten Jahre, und tritt immer bei zu flacher *Cornea* ein.

Die wichtigste Ursache zur Entstehung der *Presbyopie* ist das herannahende Alter, denn hier platten sich die *Cornea* und Linse ab, und der *Turgor vitalis* im Auge verliert sich; doch ist bei weitem nicht jeder alte Mensch fernsichtig. Eine habituell gewordene Verengerung der Pupille kann eben so gut Fernsichtigkeit erzeugen, als eine zu grofse Erweiterung der-

selben, *Myopie* hervorbringen kann. Auch die Gewohnheit, beständig entfernte Gegenstände zu betrachten, giebt selbst in jüngern Jahren Anlafs zu einer *Presbyopie*. Uebrigens findet man die wahre Weitsichtigkeit nur höchst selten bei jungen Leuten.

Eine Radicalkur ist hier niemals möglich; als Palliativmittel dienen jedoch die linsenförmig geschliffenen Brillen.

Die Anwendung dieser Brillen mufs man nie zu lange verschieben, denn wenn man mittlern Druck nicht, ohne Beschwerde, in der sonst gewohnten Entfernung vom Auge mehr lesen kann, und sobald man zu jeder Arbeit immer mehr Licht zu haben wünscht, so ist es Zeit, Anfangs eine schwache linsenförmige Brille zu gebrauchen, die man freilich bei herangekommenem höhern Alter mit einer schärfern vertauschen mufs. Wenn der Leidende nur an Weitsichtigkeit laborirt und nicht gar zu lange wartete, so bedarf er insgemein nur sehr schwacher convexer Gläser, indem diese nur etwa zwischen 90 und 70 Zolle Brennweite, selten unter 70 Zollen, zu haben brauchen.*)

Das Doppeltsehen, *Visus duplicatus*, *Diplopia*, [von *διπλοος*, doppelt, und *ωψ*, Gesicht.] — Es ist zwiefacher Art, denn der Kranke sieht entweder einen Gegenstand doppelt, wenn er beide Augen geöffnet hat, und sieht ihn nur einfach, sobald er das eine Auge schliefst, oder er erblickt das Object schon mit einem Auge doppelt. Im erstern Falle liegt gewöhnlich ein Schielen oder ein Schiefstehen des Auges zum Grunde, im zweiten Falle wird das Doppeltsehen von Narben, Flecken oder Facetten in der Mitte der *Cornea*, oder der vordern Linsenkapsel, oder vom Druck auf den *Bulbus*, oder endlich von einer doppelten Pupille bedingt. Häufig liegt der Fehler ursprünglich in den Muskeln des Augapfels, besonders wenn diese von Krampf oder *Rheuma* befallen sind, in welchem Falle der Kranke an schmerzhaften Gefühlen in der Orbita leidet. Zuweilen scheint das Leiden in einem Fehler

*) Siehe das Weitere unter den Brillen.

der *Retina* zu liegen und geht auch öfters aus allgemeinen Krankheiten hervor; so z. B. findet man es bei Hypochondrie und Hysterie, nach entzündlichen Fiebern mit und ohne örtliche inflammatorische Affectionen, u. s. w. Einmal fand ich ein Doppeltsehen nach völlig ausgebrochenem Scharlach, und ein Ungestaltetsehen während des Ausbruches. Uebrigens sind gemeiniglich die doppelten Gegenstände nicht gleich deutlich, vielmehr erscheint das eine vorzüglich deutliche Bild, als der wahre Gegenstand, das andere minder deutliche aber, stellt gleichsam nur den Schatten des erstern vor, und steht dem wahren Gegenstande meistens zur Seite. Manchmal sieht der Kranke die Gegenstände nur alsdann doppelt, wenn er die Augen einige Zeit hindurch angestrengt hat, z. B. des Abends bei künstlichem Lichte, und wo dieser Zufall sogleich wieder verschwindet, sobald er die Augen etwas ausruhen läfst. Auch kommen Fälle vor, wo die Kranken die Gegenstände nur in einer gewissen Entfernung doppelt sehen. Auch erscheinen den Leidenden die Objecte oft nur bei einer gewissen Richtung der Augäpfel doppelt.

Die Vorhersage ist verschieden, allein meistens sehr ungünstig, wenn die ursächliche Krankheit nicht gehoben werden kann.

Die Heilung richtet sich nach den Ursachen. Man beseitige defswegen das Schielen, die Flecke der Hornhaut, u. s. w. Liegt in der *Retina* und in allgemeinen Krankheiten der Grund der *Diplopie*, so verschwindet sie gemeiniglich ohne Hülfe der Kunst.

Bleibt aber dennoch die *Diplopie* längere Zeit zurück, so leisten *Vesicatoria*, besonders auf die Schläfegegend gelegt, oft treffliche Dienste. Ueberhaupt wirken bei Krankheiten der nervösen Gebilde des Auges die *Vesicatoria* in der Schläfegegend besser, als wenn sie auf die gewöhnlichen Stellen hinter den Ohren, im Nacken, u. s. w. gelegt werden, worauf besonders Rust*) aufmerksam gemacht hat.

*) Dessen Magazin für die gesammte Heilkunde, 4. B. 2. H. S. 358.

Die Halbsichtigkeit, *Hemiopia* [von ἡμι, halb, und ωψ, das Sehvermögen.] Ist dieser Fehler, welcher darin besteht, dafs die davon Befallenen, die Objecte nur halb oder theilweise sehen, nicht in den durchsichtigen und bedeckenden Theilen des Auges begründet, und kann er daselbst nicht aufgefunden werden, so hat er gemeiniglich in einer fehlerhaften Stimmung der Nervengebilde des Auges seinen Grund. Er ist dann entweder vorübergehend, periodisch und begleitet allgemeine Verstimmungen des Nervensystems, wie bei der *Hysterie, Hypochondrie* und bei Krampfkrankheiten, oder er ist anhaltend, erhält dann eine weit wichtigere Bedeutung und wird mit dem Nahmen *Amaurosis dimidiata* belegt, welche leider auch in eine *Amaurosis completa* übergehen kann.

Die Behandlung richtet sich nach den bei dem schwarzen Staare entwickelten Heilregeln.

Die Tagblindheit, *Coecitas diurna, Amblyopia meridiana, Nyctalopia,* [von νυξ, Nacht, und ωψ, Gesicht.] — Hier sehen die Kranken am Tage entweder gar nicht, oder undeutlich; am Abend aber, oder bei Kerzen- und Mondlicht, können sie sehen.

Zuweilen findet sich diese Erscheinung bei einer *Mydriasis,* weil hier durch die grofse Menge der, bis in die Tiefe des Auges dringenden Lichtstrahlen, die *Retina* am Tage überreitzt wird. Manchmal ist die *Iris* so reitzbar, dafs die Pupille am Tage ganz zusammengezogen erscheint, und dadurch das Gesicht aufhebt. Nicht selten hindert eine *Cataracta centralis,* oder ein Centralflecken der Hornhaut den Lichteintritt durch die am Tage verengerte Pupille. In seltenen Fällen ist die *Nyctalopie* eine rein nervöse Erscheinung der *Retina* und zeigt sich als eine periodische Amblyopie oder Amaurose.

Aus der Aetiologie der Tagblindheit sieht man, dafs das Leiden meist Symptom eines andern Uebels ist, und defswegen gewöhnlich auch durch gehörige Behandlung des letztern geheilt wird. Bei zu reitzbarer *Iris* wende man demnach eine schwache Auflösung von *Extr. Hyoscyami* in Wasser aufs Auge an,

wobei man, wenn die *Retina* selbst an dieser übermäfsigen Reitzbarkeit participiren sollte, zugleich ein allgemeines Verfahren, welches der Constitution des Subjects und dem Zustande des Sehorgans insbesondere angemessen ist, einschlagen mufs. Die für *Amaurosis periodica* erkannte Nyctalopie wird, nach den vorzüglichsten Augenärzten, durch Anfangs auflösende, nach unten durchschlagende Mittel, und nachherigen Gebrauch der *China* geheilt, wobei indefs ableitende Hautreitze nicht zu vernachlässigen sind.

Die Nachtblindheit, Hühnerblindheit, *Hemeralopia*, [von ἡμερα, der Tag, und ωψ, *Genit.* ωπος, das Gesicht, Sehvermögen,] *visus diurnus*, *Amblyopia crepuscularis*, *Coecitas nocturna*, *Dysopia tenebrarum*. — Dieser Gesichtsfehler ist der *Nyctalopie* entgegengesetzt. Die Kranken sehen hier nähmlich am Tage vollkommen gut, in der Dämmerung aber, des Abends oder bei Kerzen- und Mondlicht, können sie die Objecte nicht unterscheiden, oder sie sehen dieselben nur verworren und undeutlich. Oft ist das Uebel weniger ausgebildet. Zuweilen aber sehen die Nachtblinden an den trübsten Tagen nur deutlich, so lange die Sonne noch über dem Horizonte steht; ist diese aber untergegangen, dann ist das Gesicht undeutlich und das Auge sieht entweder gar nichts oder nur sehr verworren. Wie sehr die Unzulänglichkeit des künstlichen Lichtes zum Sehen manchmal ausgesprochen ist, ersieht man unter andern aus einem Falle, den Laserre*) erzählt: in welchem ein junges Mädchen bei Nacht nicht einmal eine sehr nahe Laterne bemerken konnte, am Tage aber so gut sahe, als hätte sie das beste Gesicht. Die Pupille ist bei dieser Krankheit in der Regel bei Licht wie im Schatten mehr oder weniger erweitert und unbeweglich, oder träge; oft aber fehlt auch dieses Merkmal. Uebrigens ist das Sehloch hell und klar.

Gewöhnlich vergesellschaftet sich das Leiden mit

---

*) *Ephemerides curiosorum naturae. Dec. II. Annus sextus. Obs.* 79.

Kopfschmerzen, Schwere im Kopfe und mit periodischen Schmerzen an verschiedenen Theilen des Körpers, Symptome welche gegen Abend zunehmen; auch gehen diese dem Eintritte der Krankheit öfters vorher. Manchmal leidet der Kranke am Schwindel, besonders beim Bücken. Nicht selten gesellen sich Zeichen von Vollblütigkeit, von gastrischen und biliösen Unreinigkeiten hinzu.

In manchen Fällen kann eine *Amblyopia amaurotica* die Nachtblindheit allein bedingen, oft aber mufs sie als eine periodische amaurotische Amblyopie betrachtet werden; ja häufig scheint sie mit einem Wechselfieber äufserst nahe verwandt zu sein, und dann möchte man den Grund derselben wohl nur in einem peculiairen Ergriffensein der Nervengebilde des Auges suchen dürfen.

Mehrere Ursachen, welche eine Amaurose hervorbringen können, besonders kalte Morgen- und Abendluft im Frühjahre, können auch zur Entstehung der *Hemeralopie* Gelegenheit geben. In manchen Ländern herrscht sie zu Zeiten epidemisch und endemisch, z. B. in verschiedenen Gegenden Frankreichs, Pohlens, Brasiliens, auf den Moluckischen Inseln, in denen Theilen von China, wo Moräste sind und viel Reifs gebaut wird, und zuweilen selbst bei uns. Sie befällt in der Regel Leute niederen Standes, von jedem Alter, die erste Kindheit ausgenommen, indessen häufiger die Männer als die Frauen und entsteht meistens langsam, nur zuweilen sehr plötzlich.

Die Dauer des Uebels ist unbestimmt, doch hält es, sich selbst überlassen, selten länger an, als drei oder vier Monate. Der zweckmäfsigen Behandlung weicht es oft nach wenigen Tagen. Zuweilen kehrt die Krankheit nach einem Jahre in derselben Jahreszeit wieder; überhaupt sind Recidive, besonders in Gegenden wo das Uebel endemisch herrscht, gar nicht selten.

Aderlässe, Brechmittel, und darauf gegebene schweifstreibende Abkochungen des *Lign. guajac. sassafras, Sarsaparill., Tart. emetic.*, nach Scarpa in gebro-

chenen Dosen, so wie Laxiermittel, China, Valeriana, Blasenpflaster im Nacken und hinter den Ohren und Fufsbäder, sind die nöthigen Medicamente, welche nach den bestehenden Anzeichen benutzt werden müssen.

Da, wo die Krankheit endemisch und epidemisch haust, scheinen die Dämpfe von gekochten Ochsenlebern, durch welche sich im Jahre 1787 zu Strasburg eine grofse Anzahl Soldaten sicher und schnell von ihrer Nachtblindheit befreiten, vorzüglich nützlich und heilsam zu sein. Meifsner*) berichtet, dafs ein grofser Theil der Bewohner Podoliens während der Fastenzeit an *Hemeralopie* laborirt, die sich indessen sicher verliehrt, wenn sie die Leber eines Hahnes oder Schweines genieſsen.

Auch Dämpfe von Bernstein, starkem Kaffee, Storax, Masticatoria von Angelica- und Bertramswurzel, hat man empirisch gebraucht.

Das Mückensehen, *Myïodeopsia*, [von μυϊωδης, fliegenähnlich, und ωψ, das Gesicht.] *Visus muscarum*, *Mouches volantes*. — Das Mückensehen kommt nicht blofs als Mitsymptom einer angehenden Amaurose vor, sondern tritt auch für sich allein, ohne wichtigere Bedeutung zu haben, auf und besteht in einem vor den Augen Schweben von schwärzlichen, graulichen, halbdurchscheinenden Punkten, Ringelchen, Streifen und Flocken, welches zunimmt, wenn man in lichte Gegenden, auf weifse Stellen schaut, z. B. auf weifses Papier, oder wenn man eben an sein Uebel denkt, welches hingegen abnimmt und oft völlig verschwindet, wenn man von Dämmerung umgeben ist, oder nicht Zeit hat, sich sein Uebel zu vergegenwärtigen. Die Ansicht der Augen läfst übrigens nichts Unregelmäfsiges erkennen. Gewöhnlich sind zwei oder drei jener fliegenden Figuren vor allen andern sichtbar. Manchmal giebt es aufser diesen hervorstechenden, noch eine zahllose Menge daneben, welche oft weit schwe-

---

*) Bemerkungen aus dem Taschenbuche eines Arztes u. s. w. Halle, 1819.

rer zu erkennen sind. Einige Personen sehen nur eine einzige dergleichen Figur. In der Regel leiden beide Augen zugleich an dem Uebel. Diejenigen *Mouches volantes*, welche der Sehfähigkeit nicht schädlich zu werden pflegen und von welchen ich hier nur allein rede, haben immer eine bestimmte Structur, deren Grundform zwei parallel nebeneinander laufende Linien und Ringelchen zu sein scheinen, welche ich der Natur vollkommen getreu auf der 5ten Tafel des ersten Heftes der von mir herausgegebenen *Icones ophthalmologicae seu selecta circa morbos humani oculi,* dargestellt habe.

Man hat das Wesen dieser Erscheinung in einem eigenen Leiden der Netzhaut, in einem Herumschwimmen trüber Körperchen in der wässrigen Feuchtigkeit im *humore Morgagniano*, in dem Glaskörper und in der Crystalllinse etc. gesucht, allein ich kann diesem nicht beistimmen; vielmehr suche ich an dem angegebenen Orte den Beweis zu stellen, dafs nur vor der Netzhaut befindliche Blutkügelchen und deren Gefäfse dem *Mouches volantes* gleiche Erscheinungen hervorbringen können.

Die gewöhnlichste Ursache, nach welcher ein Mückensehen auftritt, ist häufiger und anhaltender, auch wohl anstrengender Gebrauch des Gesichts, indem dadurch häufig ein nur partieller Blutandrang nach den Sehwerkzeugen veranlafst wird.

In heftigen Anstrengungen des Gesichts kann ein Mückensehen ganz allein seinen Grund haben, ohne dafs andere Zeichen des Ergriffenseins der Sehkraft damit vergesellschaftet zu sein brauchen. Es entsteht in solchen Fällen sehr langsam und wird meistens zuerst bei heller Witterung im Freien, z. B. bei einem Spaziergange entdeckt.

Das scharfe Sehen leidet bei dieser Erscheinung, wenn sie allein zugegen ist, gar nicht, und es ergiebt sich überhaupt aus den Untersuchungen und Beobachtungen der Aerzte, dafs man jene Flocken, Ringelchen, und Punkte vor seinen Augen sehen kann, ohne je eine Vernichtung der Sehkraft befürchten zu dürfen. Zwar giebt es mehrere Arten von Blindheit, bei deren

Entstehung Mückensehen als Symptom sich zeigt; allein in diesen Fällen kann unser Uebel nur als Nebenzeichen gelten, denn andere, viel wichtigere Zeichen lassen den Augenarzt nur das schwerere Uebel im Hintergrunde erkennen.

Die Heilung des Mückensehens ist weit schwieriger als man glauben sollte. Der Grund davon mag besonders darin liegen, dafs es bei derselben mehr auf Anordnung einer fehlerfreien Augendiät, als auf den Gebrauch von Medicamenten ankommt; erstere aber in den wenigsten Fällen gehörig befolgt wird. Schonung der Sehkraft, besonders bei künstlichem Lichte, ist vor allen Dingen nöthig. Dabei ist der Genufs der freien Luft, der freien weiten Aussicht und der recht häufigen Körperbewegung und Zerstreuung, vorzüglich durch Reisen, sehr heilsam. Zugleich kann man sich, des Tages mehrere Male, der Umschläge von sehr kaltem Wasser, mittelst 6fach zusammengelegter leinener Compressen bedienen. Bei Congestionen des Blutes nach den Augen, leisten Aderlässe, öftere Fufsbäder mit Salz und Asche oder Senf, und der anhaltende Gebrauch des Bitterwassers, oder einer Auflösung der *Magnesia sulphurica* in Wasser, so dafs täglich 2 bis 3 Sedes erfolgen, vortreffliche Dienste. Ist das Mückensehen schon eingewurzelt, jahrelang schon vorhanden und kann sich der Leidende, hinsichtlich der Gesichtsarbeiten nicht gehörig schonen, dann werden die *Mouches volantes* auch schwerlich weichen.

Dasjenige Mückensehen, welches nach erschöpfenden Nervenfiebern und ähnlichen Krankheiten manchmal zurückbleibt, verschwindet bei zweckmäfsiger Diät ohne andere Mittel und in demselben Verhältnifs, in welchem die Kräfte des Patienten zurückkehren.

Der Markschwamm der Netzhaut, *Fungus medullaris retinae.*

G. Burns nannte das Uebel *Inflammatio fungosa*, W. Hey aber *Fungus haematodes retinae*, welche Benennung nach ihm auch Wardrop, Cooper, Scarpa,

Bell, Boyer u. m. a. annahmen. Dupuytren, Breschet u. einige a. nennen es *Carcinoma encephaloides* oder *cerebriforme*, Abernethy, *Sarcoma pulposum* oder *medullare*, Maunoir endlich nennt es *Fungus medullaris*, welchen Namen ich mit vielen anderen Aerzten am meisten bezeichnend finde.

Diese fürchterliche, in neuern Zeiten erst bekannt gewordene, Krankheit der *Retina* kommt vorzüglich bei Kindern unter 12 Jahren vor, und unterscheidet sich schon dadurch vom Krebse des Auges, (der vorzüglich im höhern Alter vorkommt,) als welcher sie früher wahrscheinlich immer betrachtet worden ist;*) daher es sich auch erklären läfst, warum ein Drittheil der im *Hôtel Dieu* zu Paris am Augenkrebse Operirten, nur Kinder waren, welche das zwölfte Jahr noch nicht erreicht hatten.

Das Leiden, welches in einer schwammigten Ausartung der Markhaut besteht, macht folgenden Verlauf: Unter Lichtscheu bildet sich eine amaurotische Amblyopie, mit völliger Erweiterung und Starrheit der Pupille aus, welche bald in eine vollkommene Amaurose übergeht. Dabei bemerkt der Arzt im Hintergrunde des Auges, in der Gegend der *Retina*, etwas, welches mit einer concaven Silberplatte, oder mit polirtem Eisen Aehnlichkeit hat. Späterhin verändert sich dieses metallne Ansehn in einen gelblichen oder grünlichen unregelmäfsigen Flecken, welcher einer kleinen Ansammlung gerinnbarer Lymphe, die sich in den Grund des Auges ergossen zu haben scheint, ähnlich ist. Diejenigen, welche mit der Krankheit unbekannt sind, glauben jetzt auch wohl eine partielle Verdunkelung der Glasfeuchtigkeit zu erkennen. Die Blutgefäfse der *Conjunctiva* füllen sich während dieser

---

*) Man könnte zwar die Krankheit unter *Carcinoma Bulbi* und mit demselben Rechte vielleicht auch bei der letzten Art der vierten Gattung der Amaurose abhandeln, indefs da sich das Leiden von diesen beiden Uebeln, — und wenn auch nur als Modification — unterscheidet, so halte ich für rathsam, die Krankheit als ein besonderes Uebel der *Retina* aufzuführen.

Zeit, unter beständigem Schmerz im Auge, an. Die kleine gelbliche oder grünliche Masse, die mit Blutgefäfsen von der *Arteria centralis* versehen ist, wächst nach und nach, und dehnt sich weiter nach der *Iris* zu aus, giebt sich jetzt deutlich als eine gelbe schwammigte Substanz zu erkennen, und tritt endlich unter zunehmenden, vorzüglich in der Stirn und im Nacken haftenden Schmerzen, die besonders zur Nachtzeit erscheinen, — in die vordere Augenkammer, welche jetzt, und auch schon früher, durch eine gelbliche Flüssigkeit getrübt erscheint; zugleich fängt der *Bulbus* an höckerig zu werden, und die Farbe der *Sclerotica* verändert sich und fällt ins Dunkelblaue, Livide. Zuweilen wird um diese Zeit der *Bulbus* wassersüchtig. Endlich ist die aus der Tiefe des Augapfels wachsende Masse, bis zur *Cornea* gedrungen, letztere trübt sich, wird durch den Druck jener Substanz dünner, fängt an zu eitern, und läfst so den lappenförmigen Schwamm, unter den heftigsten Schmerzen, nach aufsen hervortreten. Der aufser dem Auge erschienene Schwamm nimmt nun eine röthliche, mit gelben oder schwarzen Flecken versehene Farbe an, behält aber immer eine weiche, sehr lockere, gehirnartige Consistenz, die ihm gleich Anfangs eigen war, und ergiefst bei der leisesten Berührung eine Menge Blut, nebst einer, dem Fleischwasser ähnlichen, stinkenden Jauche. Nachdem sich der *Fungus* ganz ausgebildet, zeigen sich nun auch Symptome von Aufsaugung der Jauche; die lymphatischen Drüsen in der Gegend der *Parotis*, unter der untern Kinnlade und am Halse, schwellen an, und so geht der Kranke ohne Rettung seinem Tode entgegen.*)

Diese schreckliche Krankheit geht, — wie Sectionen bei Augen, wo erst jener gelbliche Fleck bemerkt wurde, lehren, — immer von der *Retina* aus, und zwar vorzüglich von derjenigen Stelle derselben, wo der *Nervus opticus* in den *Bulbus* tritt.**) Ich fand, wie meh-

---

*) Siehe Taf. III. Fig. 4.

**) Taf. III. Fig. 5.

rere andere Aerzte, das den Sehnerven umgebende Fett verhärtet, und fast an der Nervenscheide adhärirend, und den Nerven selbst in eine markartige Geschwulst ausgeartet. Die *Retina* ist in eine voluminöse hirnartige Masse degenerirt, in welcher sie gleichsam untergegangen zu sein scheint. In einem Falle schien mir die hirnartige Substanz allseitig aus der innern Wand der *Sclerotica* zu entspringen, und hatte die *Chorioidea* ungleich nach vorn gedrängt, und in der Gegend, in welcher im normalen Zustande die Crystalllinse liegen sollte, befand sich eine steinigte, körnigte Masse. Unter allen Häuten des Augapfels habe ich die *Chorioidea* und die *Sclerotica* immer am wenigsten degenerirt gefunden. Allein man hat nicht nur die *Retina*, nicht nur den Sehnerven und die dem Augapfel unmittelbar angehörenden Gebilde destruirt gefunden, sondern selbst auch Theile des Gehirns, z. B. die *Corpora striata*, *Thalami nervorum opticorum*, u. s. w. Man fand in den Hirnkammern 4 bis 5 Unzen blutiges Serum, und in dem 3ten Ventrikel zwischen den *Thalam. nerv. opt.* eine voluminöse weiche Masse. Ja selbst Spuren einer Degeneration der *Dura mater*, der *Arachnoidea*, so wie der *Pia mater* sind beobachtet worden.

Die Ursachen dieser schrecklichen Krankheit sind unbekannt. Man hat sie zuweilen nach einem Stofse oder Schlage auf den Augapfel entstehen sehen. In einem Falle sah ich sie bei einem Kinde auftreten, wo unmittelbar nach dem Verlauf von Scharlachfriesel deutliche Symptome von Scrofeln mit dem Uebel im Auge zugleich sich entwickelten. In einem andern von mir beobachteten Falle hatte sich das Augenleiden bald nach dem schnellen Verschwinden einer entzündeten und bedeutend vergröfserten Halsdrüse entsponnen.

Die Exstirpation des *Bulbus*, durch welche man bis jetzt gesucht hat die Krankheit zu beseitigen, hatte selbst dann einen unglücklichen Erfolg, wenn sie in der Periode der Krankheit gemacht wurde, wo der gelbliche Fleck im Hintergrunde des Auges eben erst

erschienen war; die Operation beschleunigt vielmehr den Untergang des Kranken, denn bald (in wenigen Monaten) nach derselben, erscheint im Grunde der *Orbita* die fungöse, weiche, bösartige Excrescenz wieder, die Kräfte des Kranken nehmen ab, und nach hinzugekommenem schleichenden Fieber, endet der Tod das Leiden unter convulsivischen Bewegungen und Empfindungslosigkeit. Auch ich habe die Exstirpation des Augapfels ohne allen Erfolg vorgenommen, ja ich bekenne, dafs dadurch der Tod immer eher beschleunigt als verzögert worden sein mochte. Indefs vermuthet Wardrop,*) dafs die Operation vielleicht noch etwas helfen könne, wenn die Krankheit in ihrem ersten Entstehen erkannt würde, wo also nur allein erst die Markhaut afficirt wäre.

Betrachten wir das Uebel genauer und ohne vorgefafste Meinung, erinnern wir uns, dafs in der Regel nur Kinder unter 12 Jahren, von der Krankheit ergriffen werden, so mufs uns die Ahnung befallen, dafs die Ursache derselben wohl unter denen, dem kindlichen Alter eigenthümlichen Krankheiten zu suchen sei: wir müssen versucht werden zu ahnen, dafs einem so wichtigen, hartnäckigen und unter so auffallenden Symptomen fortschreitenden Uebel, eine allgemeinere, dauernder bestehende Krankheit zur Quelle diene, aus welcher das Leiden des Auges, Wurzel und Wachsthum erhält, und woher es auch kommt, dafs die topische Ausrottung des Sitzes des pathischen Procefses ohne allen Erfolg ist, wenn wir die allgemeine Ursache, die Quelle des Uebels nicht vernichten, oder derselben wenigstens eine minder ominöse Richtung geben können.

Genaue Beobachtungen der wenigen Fälle, welche mir bisher von dieser Krankheit vorgekommen, haben mir die Ueberzeugung gegeben, dafs sie ein aufserordentlicher Zufall der Scrofelkrankheit sei, welche letztere

---

*) Beobachtungen über den *Fungus haematodes*. Uebers. v. Prof. Kühn. Leipz. 1817.

letztere in neueren Zeiten unstreitig viel häufiger vorkommt, als sonst, weshalb auch das sonderbare Augenleiden jetzt häufiger von den Aerzten beobachtet wird.

Welche verschiedenartige Zufälle können nicht Scrofeln veranlassen? Sind sie es nicht, die hier Entzündung und Degeneration der Knochen, dort Vereiterung der Drüsen veranlassen? Die hier das Zellgewebe unter der Haut zum Sitz erwählen, indefs sie dort die Structur der Bedeckungen des Körpers vernichten? Die hier die Haut zum Substrate pathischer Absonderungen machen, und dort im Auge eigenthümliche Entzündungen gebähren? Wer wollte es läugnen, dafs dieselbe Krankheit in der Lunge, in dem Gehirne, gleichwie in den Drüsen des *Mesenterii* krankhafte Processe begründen kann? ja sollten die sogenannten Scrofeln des Gehirns, welche öfters in den Schriften der Aerzte beschrieben werden, nicht häufig ganz dasselbe Uebel sein, welches wir im Auge, nur durch den Ort, so wie durch die Bedeutung des Organs modificirt, als *Fungus medullaris retinae* wiederfinden? Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, dafs manche, als Hirnentzündungen, als hitzige und chronische Hirnwassersuchten verlaufende Uebel bei Kindern, jene markartigen Wucherungen finden lassen würden, auf welche uns leider nur bisher der Markschwamm im Auge aufmerksam machen konnte. Ich bin überzeugt, dafs alle jene Degenerationen des Gehirns, welche wir bei dem *Fungus medullaris retinae* daselbst vorfanden, auch ohne letzteren auftreten können und aufgetreten sind. Die Zukunft mag das Gesagte beleuchten und beurtheilen!

Vielleicht wirft man mir ein, dafs die an *Fung. medullar. retinae* leidenden Kinder nicht immer Symptome der Scrofeln klar an sich tragen. Allein wenn dieses auch richtig wäre, so können wir ja täglich topische Producte beobachten, die Jedermann für Kinder der Scrofeln hält, und wo doch die gewöhnlichsten Symptome dieser Krankheit fehlen. Ist es nicht hinsichtlich der Gicht derselbe Fall? Welcher erfahrene Practiker hätte nicht schon Augen durch Gicht destruirt

gefunden, wo aufserdem der Körper keine Spur dieser Krankheit zeigte?

Zu meiner Freude finde ich, dafs auch B. Panizza in seinen gehaltvollen *Annotazioni anatomico-chirurgiche sal fungo midollare dell' occhio. Pavia* 1821. die Meinung hegt, dafs es die Scrofelkrankheit sei, welche dieses furchtbare Uebel hervorbringe.

Ein höchst instructiver Fall, bei einem Kinde von zwei Jahren, scheint meine Vermuthung hinsichtlich der Entstehung unseres Uebels zu bestätigen, und der Erfolg meiner Behandlung ist zu wichtig, als dafs ich diesen Fall ganz mit Stillschweigen übergehen könnte. Das Kind bekam unmittelbar nach Verlauf des Scharlachfriesels Symptome von Scrofeln, zugleich aber auch eine gleichförmige Röthe in der *Sclerotica* und diese bedeckende *Conjunctiva* des rechten Auges, erblindete unter Lichtscheu auf diesem Auge und lernte mit demselben schielen. Als es zu mir gebracht wurde, fand ich alle Zeichen eines beginnenden *Fungus medullaris retinae.* Offenbar erblickte man in der Tiefe des Auges eine höckrige gelbröthliche Masse, wodurch die Schwärze der Pupille verloren gegangen zu sein schien. Ich verordnete damals starke Dosen *Calomel* mit *Rad. jalappae*, unterhielt auf solche Weise einen ziemlich heftigen Durchfall, und habe das Vergnügen gehabt zu sehen, wie der Procefs im Auge gar bald stehen blieb. Es ist seit jener Zeit fast ein Jahr verflossen, das Kind hat sich von der angreifenden Kurmethode längst erholt und befindet sich sehr wohl. Das Ansehn des Auges hat sich verbessert, die höckrige gelbröthliche Masse ist gröfstentheils verschwunden, die Pupille theilweise in der Tiefe wieder schwarz geworden; allein diese Schwärze ist nur matt, man bemerkt noch in der Gegend wo der Nerve in die *Retina* übergeht einen weifsgraulichen Körper, die Pupille ist starr, etwas erweitert, das Auge schielt immer noch und ist amaurotisch wie früher. Ich hoffe über diesen und über andere Fälle in meiner schon erwähnten Zeitschrift bald ausführlicher sprechen zu

können und erlaube mir hier nur noch Folgendes über die Heilmethode dieses Uebels zu bemerken.

Obgleich ich der Meinung bin, dafs markartige fungöse Ausartungen in Folge scrofulöser Processe in dem Gehirn bei Kindern gewifs häufiger vorkommen, als man glaubt, so ist doch der *Fungus medullaris retinae* selten. Ein einziger Mediker ist daher nicht wohl im Stande, die Richtigkeit seiner Ansicht einer ihm erfolgreich scheinenden Kurmethode bis zur Evidenz zu beweisen; er kann, wenn er sich nur auf einzelne Erfahrungen zu stützen im Stande ist, die Methode den Aerzten nur vorschlagen und zu weiteren Versuchen anempfehlen, was aber bei einer Krankheit wie diese, bei welcher wir eigentlich noch kein Heilverfahren kennen, gewifs nicht unwichtig ist.

Indem ich nun von der Idee ausgehe, dafs der Entstehung des *Fungus medullaris retinae* ein scrofulöser Procefs des Sehnerven und der Markhaut, mit der Neigung, eine weiche hirnartige Masse zu producíren, ja das Substrat desselben selbst in jene Substanz umzuwandeln, zum Grunde liege, dafs aber auch das ursächliche Allgemeinleiden nicht schnell zu beseitigen und zu heilen sei; so mufs die Tendenz der Kurmethode dahin gehen, den krankhaften Procefs von einem Theile zu entfernen oder durch Erlöschung des ersteren zu sistiren, welcher zu den edelsten gehört und von welchem uns die Erfahrung lehrt, dafs er, auf solche Weise ergriffen, selbst das Leben des Leidenden bedroht.

Ich schlage daher vor, in denen Fällen, wo der *Fungus medullaris* noch im Beginnen ist, oder wo er wenigstens noch allein in der hinteren Hälfte des Auges sich befindet, Folgendes zu versuchen: Man reiche täglich 3 bis 4 Mal $\frac{1}{2}$ bis 1 Gran *Calomel* mit Rhabarber oder Jalappenwurzel, und unterhalte auf diese Art längere Zeit hindurch einen ziemlich heftigen Durchfall. Kann aus begreiflichen Ursachen der *Calomel* nicht mehr fortgegeben werden, so gehe man zu dem Gebrauch des *Aethiop. antimon.* mit dem *Tartar. tartar.* und *Hba cicutae* über. Man lasse ferner

das *Unguentum hydrarg. cin.* über die Augenbraune einreiben und versuche zugleich, ob diese Salbe nicht auch vom Augapfel selbst vertragen werde, in welchem Falle man täglich zwei- bis dreimal eine Linse grofs zwischen die Augenlieder bringen könnte. Zu gleicher Zeit lege man ein fast handtellergrofses Pflaster aus einem Theile *Tart. emetic.* und zwei oder drei Theilen *Empl. adhaesiv.* bestehend, in den Nacken, unterhalte die in Folge der Pocken bald eintretende Eiterung wo möglich Wochen- und Monatelang, und endige die Kur mit dem inneren Gebrauch einer Abkochung von Rhabarber, *Dulcamara*, endlich *Calam. ar.*, *Cort. chin.* und ähnlichen geeigneten Mitteln.

Ich warne übrigens vor allgemeinen Bädern, weil ich fast in allen Fällen scrofulöser Augenübel, augenscheinliche Verschlimmerung danach beobachtet habe.

Was die Diät anbetrifft, so sei sie anfangs mager; nach Durchführung dieser allerdings angreifenden Kurmethode aber lasse man zu dem Genusse nahrhafter, leicht verdaulicher Speisen übergehen.

C. Von den Krankheiten, welche durchsichtige und undurchsichtige Gebilde des Auges zugleich ergreifen.

Die reine äufsere Augapfelentzündung, *Ophthalmitis externa*, besser *Ophthalmia externa*.*)

Sie kommt häufig vor und wird von den Schriftstellern, ihrem Grade und Sitze gemäfs, bald *Ophthal-*

---

*) Mit Unrecht glaubt man, (Benedict, Handbuch der pract. Augenheilkunde. 1. B. Leipzig, 1822. S. 305.) dafs diese Entzündung als die Urform aller *Ophthalmien* gleichsam anzusehen sei und den anderen Entzündungsformen des Augapfels vorausgehe; die Entzündung der Iris, der Linse, der Netzhaut etc., kann aber rein local sein, ohne dafs eine derselben die Erscheinungen an sich trägt, welche die *Ophthalmia externa* charakterisiren.

mia levis, Ophthalmia angularis, Taraxis, bald *Chemosis, Ophthalmia sicca,* u. s. w. genannt.

Der Sitz des Uebels ist hier in der Bindehaut des Augapfels, in der *Cornea* und in der *Sclerotica,* besonders in dem vorderen Theile derselben.

Man kann die Entzündung füglich in zwei Hauptgattungen theilen, die vorzüglich hinsichtlich des Grades verschieden sind. Man nennt den gelinderen Grad *Taraxis,* der heftigste aber wird *Chemosis* genannt.

Taraxis. — Der gelindere Grad einer reinen *Ophthalmia externa* könnte leicht mit einer catarrhalischen Augenentzündung verwechselt werden, wenn nicht bei letzterer immer eine weit ausgebildetere *Blepharophthalmia glandulosa* vorhanden wäre; wogegen man ein entzündliches Ergriffensein der Augenliederdrüsen bei der reinen *Ophthalmia externa* weit seltener, oder doch weit weniger bemerkt.

Die Zeichen der einfachen *Taraxis* sind folgende: Der Kranke fühlt zuerst ein gelindes Drücken im Auge, dasselbe fängt an zu thränen und sich zu röthen, doch zeigt sich die Röthe anfangs nur in den Augenwinkeln, besonders in dem innern. Dieser geringe Grad von *Taraxis* ist es, den man mit dem Nahmen *Ophthalmia angularis* belegt hat. Bleibt nun die Entzündung auf diesem Punkte nicht stehen, so vermehren sich die Röthe, die Spannung, der Thränenfluſs und der Schmerz, ja nicht selten gesellt sich noch etwas Lichtscheu hinzu, und deutlich bemerkt man, daſs nicht allein die *Conjunctiva bulbi,* sondern auch die *Sclerotica* inflammirt ist. Dabei beobachtet der Leidende nur dann Zunahme der Schmerzen, wenn er die Augenlieder bewegt, oder wenn überhaupt äuſsere Reitze auf das Auge einwirken; wogegen bei specifischen Entzündungen eine periodische Verschlimmerung ohne sichtbare äuſsere Veranlassung, nicht zu fehlen pflegt. Die *Cornea* trübt sich selten, es sei denn, daſs fremde Körper dieselbe verletzten, oder die *Taraxis* in *Chemosis* überginge.

Nach und nach, und nachdem die Ursachen entfernt worden sind und das zweite Stadium eingetreten

ist, nehmen jene Erscheinungen ab: nur die Röthe nimmt häufig noch zu und wird saturirter. Es findet sich eine geringe Schleimabsonderung ein, die aber weniger von den Meibomschen Drüsen, als vielmehr von der entzündeten *Conjunctiva* der Augenlieder ausgeht. Endlich nimmt auch die Röthe ab, bleibt aber in den Augenwinkeln doch noch am längsten.

Die Ursachen dieser Entzündung bestehen insgemein in dem Einfallen fremder Körper in das Auge, die theils rein mechanisch wirken, wie z. B. Staub, Sand, Späne von Holz und Eisen, u. s. w., theils mechanisch-chemisch, wie z. B. Schnupftaback, u. s. w., theils endlich rein chemisch, als z. B. Säuren, Aetzkali u. dergl. Indessen finden wir auch eine reine *Taraxis* zuweilen bei einfachen Entzündungsfiebern oder auch in Folge von Blutcongestionen nach dem Kopfe.

Wenn nicht fremde Körper bedeutende Exulcerationen der *Cornea* verursacht haben, in welchem Falle Trübungen und unheilbare Flecken dieser Haut, Vorfälle der *Iris* und Aufhebung der Pupille zurückbleiben können, so ist die Prognose bei der einfachen *Taraxis* immer günstig.

Was nun die Kurmethode anbetrifft, so sind bei den gelinderen Graden, nach Wegräumung der äufseren Ursachen, kalte Wasserumschläge mit oder ohne einigen Zusatz von Bleiessig hinreichend. Wo aber die Entzündung heftiger ist, wo Lichtscheu vorhanden und wo der Uebergang in *Chemosis* zu fürchten steht, da sind theils allgemeine, theils örtliche Blutausleerungen, neben jenen kalten Umschlägen angezeigt. Dasselbe Verfahren ist auch bei dem geringeren Grade der Entzündung heilsam, wenn der Leidende robust und blutreich ist, oder wenn gar Congestionen nach dem Kopfe oder unterdrückte Blutflüsse allein Schuld an der *Taraxis* sind.

Tritt nun der zweite Zeitraum der Entzündung ein, der sich durch jene vermehrte Schleimabsonderung zu erkennen giebt, so ist es rathsam, die örtlichen Mittel nur lauwarm anzuwenden. Ich kann hier vorzüglich Auflösungen des *Zinc. sulphuric.*, des *Lap. di-*

vin. und Mischungen aus Wasser und Bleiessig empfehlen, und müssen dieselben sehr schwach (z. B. gr. *j.* ℥*jj.* ▽) sein, wenn sie die Entzündung recht bald heben sollen. Wo man die *Conjunctiva* in einem etwas aufgelockertem Zustande findet, da kann jenen Mischungen etwas *Laud. liquid. Sydenh.* mit Nutzen zugesetzt werden.

Chemosis. — Wenn aber die *Taraxis* in *Chemosis* übergeht, so nehmen im ersten Zeitraume Schmerzen, Röthe und Spannung zu, die früher einzeln sichtbaren Gefäfsnetze weichen einer gleichförmig saturirten Röthe, die Bindehaut fängt an zu schwellen, die Bewegung des Auges und der Augenlieder ist schmerzhaft, und die *Cornea* verliert vieles von ihrer Klarheit, obgleich sie noch nicht trüb zu nennen ist. Nach und nach verbreitet sich der Schmerz immer mehr und mehr, und selbst bis in den Kopf, ja nicht selten treten Symptome ein, welche nicht zweifeln lassen, dafs auch die *Iris* entzündet sei; die Unbeweglichkeit des *Bulbus*, die Lichtscheu und die Trockenheit nehmen zu, ja die Thränenabsonderung verliert sich am Ende fast ganz, welchen Zustand man nicht mit Unrecht *Xerophthalmia* oder *Xeroma* genannt hat; die scharlachrothe Bindehaut bedeckt die *Sclerotica* nun gleich einem Tuche und bildet rings um die jetzt immer trüber und röthlich grau werdende *Cornea*, eine rothe Wulst.*) Die *Iris* und Pupille können jener Trübheit wegen nicht mehr gesehen werden, und das Gesicht ist eben darum sehr schwach, der Augapfel unbeweglich, und ein entzündliches Fieber dabei zugegen.

Symptome des zweiten Zeitraumes. — Nun wird die Geschwulst der *Conjunctiva* immer gröfser und dunkelroth, die Hornhaut wird weifs, dann gelblich und bildet endlich einen wahren Eiterstock. Nachdem nun die Eiterung verlaufen, bleibt ein unbeweglicher, weifslicher, mit Stricturen versehener, zusammengeschrumpfter Augapfel zurück, der aus dieser sogenannten *Phthisis* oder *Consumptio purulenta Bulbi* hervorgegangen

---

*) Siehe Taf. III. Fig. 6.

und sorgfältig von der Atrophie des Auges zu unterscheiden ist.

Aetiologie. — Körper, welche zwischen das Auge und die Augenlieder kommen und Verletzungen des Auges, sind meistens Schuld an dieser Entzündung. Ein sehr heftiger Grad der Krankheit entsteht, wenn die *Conjunctiva* des Auges durch den Stachel der Biene oder Wespe verletzt worden war und dieser stecken geblieben ist; dann geht zuweilen eine solche heftige Entzündung in eine sehr gefahrvolle allgemeine *Ophthalmitis* über.

Ist die *Chemosis* rein, nicht zu heftig, participirt die *Iris* nicht an der Entzündung, ist das erste Stadium noch vorhanden und daher nirgends Eiter zu spüren, so wird der zeitig hinzugerufene Arzt oft noch im Stande sein, nicht allein die Form des Augapfels, sondern auch die Functionen desselben zu retten. Wenn aber der Kranke ein Kind, sehr empfindlich und der Arzt zu spät hinzugerufen ist; so geht die Krankheit unaufhaltsam in das zweite Stadium über, wo dann natürlich die Prognose sehr bedenklich werden mufs.

Im zweiten Zeitraume ist die Prognose äufserst bedenklich; denn wenn sich schon ein Eiterstock in der *Cornea* gebildet hat, so ist das Gesicht, und zum Theil die Form des Auges, auf immer verloren. Zeigen sich rings um die *Cornea* zugleich Eiterpunkte, so kann der Arzt oft nicht einmal die zur Einsetzung eines täuschenden künstlichen Auges nöthige Form retten. Es gelingt dem Arzte überhaupt selten, das Gesicht und die Form des Auges ganz zu erhalten, wenn die *Chemosis* schon in den zweiten Zeitraum übergegangen ist.

Kur im ersten Zeitraume. — Der antiphlogistische Heilapparat mufs hier im ganzen Umfange angewendet werden. Aderlässe, bei blutreichen Personen bis zur Ohnmacht, Blutigel an die Schläfegegend, Scarificationen der geschwollenen Bindehaut, und wo die Geschwulst sehr bedeutend ist, das stückweise Ausschneiden der letzteren, sind hier dringend angezeigt. Hierauf kalte Umschläge von Wasser, ohne oder mit

einem geringen Zusatz von Bleiextract. Innerlich grofse Dosen *Calomel* mit *Nitrum*, so dafs täglich 4 bis 5 *Sedes* erfolgen. Solche Dosen sind auch da vortrefflich, wo man bei schwächlichen Constitutionen mit dem Blutlassen nicht so freigebig sein darf. Auch sind Ableitungen durch *Sinapismen* im Nacken und auf dem Arm, so wie reitzende Fufsbäder nicht zu vernachlässigen. Dafs die Diät im Allgemeinen, so wie die der Augen ins Besondere, dem ganzen Verfahren angemessen sein mufs, brauche ich wohl nicht zu erinnern.

Wenn aber die Entzündung in den zweiten Zeitraum übergegangen ist, so mufs die Eiterung örtlich und allgemein behandelt werden. Daher gebrauche man trockne gewärmte Kräutersäckchen, die nach und nach mit *Camphor* bestrichen werden können; man gebrauche gewärmte Auflösungen des *Lap. divin.* mit Bleiextract, bestreiche nöthigenfalls die eiternden Stellen mit *Laud. liquid. Syd.*, welches in dringenden Fällen mit *Bals. vitae Hoffm.* vermischt werden mufs. Zu gleicher Zeit kann anfänglich *Calomel* noch fortgegeben werden; wenn aber ein synochöser Charakter nicht mehr anzunehmen ist, wenn vielmehr ein gewisser Torpor eintritt, so reicht man innerlich *China* mit *Naphthen*, oder ähnliche tonische und flüchtige Mittel, und läfst eine kräftige Diät beobachten. Die rings um die Hornhaut sich zeigenden Eiterpunkte müssen mit der Lanzette geöffnet werden, damit sich die Eiterung nicht noch weiter verbreite.

Die reine innere, von der Netzhaut ausgehende Augapfelentzündung, *Ophthalmitis interna.**)

Zeichen des ersten Zeitraumes. — Ein drückender, spannender, stumpfer, mit jedem Augenblicke empfindlicher werdender Schmerz des ganzen Auges, der sich schnell über die Augenbraunen bis in den Scheitel

---

*) Die beschränkte Netzhautentzündung ist unter dieser Aufschrift am gehörigen Orte schon abgehandelt worden.

fortpflanzt, ein Feuerfunkensehen, eine Abnahme des Sehvermögens, gleichförmige Verengerung der Pupille und ein Unreinwerden der letztern, sind die ersten Symptome dieser gefahrvollen Entzündung. Nachdem das Sehvermögen völlig aufgehoben, schliefst sich die Pupille gänzlich.*) Unter fortwährender Entwickelung von einem lästigen Flammensehen, wird die Regenbogenhaut, wenn sie grau oder blau war, in eine grünliche, wenn sie aber braun oder schwarz war, in eine röthliche verwandelt, schwillt dabei auf, drängt sich gegen die Hornhaut hin vor, und verkleinert demnach die vordere Augenkammer beträchtlich. Im gleichen Grade mit jener Aufschwellung der *Iris*, und unter fürchterlichen Kopfschmerzen, röthen sich auch die *Sclerotica* und *Conjunctiva*, die *Cornea* verliert ihren Glanz, und ein entzündliches Fieber entwickelt sich.

Zeichen des zweiten Zeitraumes. — Während eines ungleichen, klopfenden, mit Schwere- und Kältegefühl verbundenen Schmerzes im Auge, röthet sich die Bindehaut des Augapfels immer mehr, und unter beständigem Frösteln zeigt sich plötzlich Eiter auf dem Boden der vordern Augenkammer, *Hypopium*, welcher bei Bewegungen des Kopfes seine Lage verändert. Wenn sich dieser Eiter immer mehr anhäuft, und der Kranke dabei vernachläfsigt wird; so wölbt sich die *Cornea*, wird konisch und berstet endlich unter unerträglichen Schmerzen, die allmählig aufhören, nachdem der *Bulbus* zusammengesunken ist. Hat sich die Pupille am Ende des ersten Zeitraumes nicht völlig geschlossen, so schiefsen in derselben jetzt lymphatische Filamente an, die man mittelst einer Lupe in Gestalt eines Netzes erblickt, in welchem letztern in der Folge noch unaufgesogene Eiterklümpchen sitzen bleiben, die Pupille zuweilen wie mit einem Pfropf verschliefsen, und das darstellen, was bei der Pupillenverwachsung unter dem Namen *Cataracta spuria purulenta* aufgeführt wurde.

---

*) Siehe Taf. III. Fig. 7.

Der Causalmomente giebt es wenige, weſswegen die Entzündung auch sehr selten vorkommt. Einer der wichtigsten ist andauernde Anstrengung des Sehvermögens bei der Betrachtung sehr kleiner, vorzüglich glänzender Gegenstände. Ferner sind zuweilen unterdrückte Blutflüsse, Operationen am Auge, so wie Hirn- und Hirnhautentzündungen Schuld an diesem Uebel.

Die Voraussage im ersten Zeitraume bleibt noch günstig, so lange die Pupille noch nicht völlig verkleinert und das Sehvermögen noch nicht sehr beschränkt ist; sehr ungünstig ist sie hingegen, wenn das Sehvermögen erloschen zu sein scheint. Hat sich die Pupille ganz geschlossen, so bleibt der Kranke für immer blind. Wird die Krankheit im jetzigen Zeitraume verkannt und vernachläſsigt, oder falsch behandelt, dann geht sie in eine sehr gefahrvolle allgemeine *Ophthalmitis* über.

Die Prognose im zweiten Zeitraume ist in Hinsicht der Sehkraft immer sehr schlecht, und letztere unwiederbringlich; nur die Form des Auges kann man oft retten. Ist aber die Entzündung schon in allgemeine *Ophthalmitis* übergegangen, so kann auch diese nicht erhalten werden, sondern es wird dann meistens eine scheuſsliche Verbildung des Augapfels zurückbleiben.

Die Behandlung stimmt im ersten Stadio ganz mit derjenigen desselben Zeitraumes der weiter hinten vorgetragenen allgemeinen *Ophthalmitis* überein, nur können hier Scarificationen der Bindehaut nicht Statt finden.

Auch im zweiten Stadio gleicht das Verfahren demjenigen des zweiten Zeitraumes der allgemeinen *Ophthalmitis*, indeſs giebt es auch hier noch etwas zu bemerken. Warme Breiumschläge dürfen hier nur bei einer sehr sorgfältigen Pflege angewendet werden. Wenn sich Eiter in der vordern Augenkammer zeigt, so ist dieser am besten durch Aufsaugung wegzuschaffen: Man entferne deſswegen jetzt alle Breiumschläge, reibe täglich 3 bis 4 Mal *Ungt. hydrarg. cin.* über den Augenbraunen ein, gebe innerlich starke Dosen *Calo-*

mel, wie unter *Iritis* und *Chemosis* bereits gelehrt wurde, wende trockne Wärme an, lege *Epispastica* bald hinter das Ohr, bald an die Schläfe, streiche täglich drei bis vier Mal mittelst eines Miniaturpinsels *Laudanum liquid. S.* in das Auge und öffne dasselbe nur dann mit der Lanzette, wenn es zu bersten droht. Oeffnet man das Auge hier früher, so hat man es sich selbst zuzuschreiben, wenn nicht einmal so viel von der Form desselben gerettet wird, dafs ein künstliches Auge gut eingelegt werden kann. War eine Oeffnung des Auges mit der Lanzette nöthig, so befördert das, schon von Janin empfohlene, warme Malvendecoct, welches man eintröpfelt, das leichtere Herausfliefsen des dikkern Eiters sehr.

Das Hornhautstaphylom, *Staphyloma Corneae.*

[v. σταφυλη, Weinbeere.]

Wenn nach einer Entzündung die *Cornea* ihre Durchsichtigkeit verliert, wenn sie nach innen und aufsen aufschwillt, wenn die *Iris* durch die Entzündung ebenfalls angeschwollen und nach vorn gedrängt ist, wenn beide entzündete Häute mit einander verwachsen sind, und wenn endlich die Entzündung die Secretion der wässrigen Feuchtigkeit — welche vorzüglich in der hintern Augenkammer vor sich geht, — nicht aufgehoben hat; so entsteht die Krankheit, von welcher hier gehandelt werden soll.*) Sobald nun die Verwachsung der *Iris* mit der *Cornea* allgemein ist, so hat man ein Totalstaphylom, beschränkt sich aber die Verwachsung beider Häute nur auf eine bedeutende Stelle der vorragenden Hornhaut, so nennt man dieſs ein partielles Hornhautstaphylom. Die Totalstaphylome sind in Hinsicht der Form wieder verschieden; denn hatte die Entzündung bloſs die vordere Augenkammer aufgehoben, und findet die Verwachsung der

*) Siehe J. Beer's Ansicht der staphylomatösen Metamorphosen u. s. w. Auch dessen Leitfaden.

vordern Fläche der *Iris* mit der innern Fläche der *Cornea* allgemein Statt, so wird ein Totalstaphylom der *Cornea* zu Stande kommen, welches eine sphärische Form erhält, *Staphyloma Corneae totale sphaericum,* weil die ungestört abgesonderte wässrige Feuchtigkeit die staphylomatöse Hornhaut gleichmäfsig ausdehnt.*) Da nun zugleich auch die Resorption dieser Feuchtigkeit (die vorzüglich in der vordern Augenkammer vor sich geht) sehr gehemmt ist, weil eine vordere Augenkammer hier nicht mehr existirt; so kommt es zuweilen, dafs sich das sphärische Staphylom immer mehr ausdehnt und endlich wohl gar berstet, *Rhexis Oculi,* worauf dann die staphylomatöse Verbildung zwar auf einige Tage verschwindet, sich aber bald wieder in der alten Form und in dem vorigen Umfange erhebt. Wiederholt sich dieser Zufall öfters, dann wird das Staphylom leicht bösartig und fordert eilig die Operation. War aber nicht blofs die *Iris* mit der *Cornea,* sondern auch die *Uvea* mit der Linsenkapsel völlig verwachsen, ist also nicht nur die vordere Augenkammer, sondern in Folge der heftigern Entzündung auch die hintere vernichtet; so entsteht ein kegelförmiges Totalstaphylom, *Staphyloma Corneae totale conicum*, welches niemals eine so bedeutende Gröfse erreichen kann, wie das kugelförmige zuweilen erhält, weil die Secretion der wässrigen Feuchtigkeit in der hintern Augenkammer mehr oder weniger aufgehoben ist.

Insgemein wächst das Staphylom bald nach seinem Entstehen bis zu einer gewissen Gröfse und bleibt dann entweder ruhig stehen, oder auch nicht. Blindheit, auffallende Entstellung, häufig wiederkehrende Entzündungen, beständiges Thränenträufeln, u. s. w. sind die gewöhnlichen Folgen dieses Uebels. Durch das Unvermögen, den Augapfel gänzlich mit den Augenliedern zu bedecken, entstehen nicht selten Geschwüre, ja das gesunde Auge wird zuweilen sympathisch afficirt. Staphylome von bedeutender Gröfse

---

*) Taf. III. Fig. 8.

drängen das untere Augenlied nach aufsen und geben dadurch Gelegenheit zur Bildung eines *Ectropiums*. Zuweilen haben die Totalstaphylome, besonders die conischen, Neigung zu carcinomatösen Umänderungen; in einem solchen Falle hören die entzündlichen Affectionen im Auge kaum auf, die Varicosität des *Bulbus* nimmt immer mehr zu, die Schmerzen beschränken sich nicht, wie früher, allein auf das Auge, sondern verbreiten sich oft über einen grofsen Theil des Kopfes, und es bedarf unter solchen Umständen nur eines kleinen äufsern Momentes, um jene carcinomatöse Umänderung in's Leben zu rufen, die den Tod des Leidenden herbeizuführen im Stande ist.

Es ist merkwürdig, wie verschieden die Ansichten hinsichtlich der *Genesis* dieses Uebels bei den Aerzten der verschiedenen Länder Europa's sind, und wie wenig sie sich bis heute über die Structur der Totalstaphylome vereinigen konnten. Beer war es, welcher die unsichern und schwankenden Begriffe über unsere Krankheit berichtigte, wodurch wir zu einer klareren Ansicht derselben gelangten. Obgleich ich nun von der Richtigkeit seiner Ansichten im Allgemeinen überzeugt bin, so kann ich doch aus eigner Erfahrung noch Folgendes hinzufügen.

Das Staphylom kann sich auf zwei verschiedene Arten ausbilden. Die genaue Kenntnifs dieser beiden Arten ist sowohl hinsichtlich der Prognose als auch hinsichtlich der Vorbeugung des Uebels und der Hebung desselben wichtig, wefswegen ich nicht anstehe, hier etwas ausführlicher zu werden.

Erste Art. — Einmal nähmlich entstehen Staphylome der Hornhaut in Folge blennorrhoischer Entzündungen der vordern Fläche des Augapfels, in welchem Falle dann das Staphylom auf folgende Art zu Stande kommt: Die Hornhaut leidet anfänglich an einem superficiellen Eiterungsprocesse, der bald einen beschränkten Raum, bald die ganze *Cornea* umfafst; die Eiterung vernichtet nach und nach eine Hornhautlamelle nach der andern. Da indefs der Procefs nicht überall gleichmäfsig fortschreitet, so geschieht es häufig, dafs

die Hornhaut nur an einer einzigen kleinen Stelle durchbricht: Die wässrige Feuchtigkeit sickert nun anfänglich nur unbedeutend durch, so dafs die vordere Augenkammer fortbesteht, weil jetzt noch die Secretion jener Feuchtigkeit mit dem Verluste derselben durch die Hornhautöffnung im Verhältnifs steht. Wird nun jetzt dem ferneren Fortschreiten des krankhaften Processes nicht Einhalt gethan, und vergröfsert sich die Hornhautöffnung langsam nur, so sickert die wässrige Feuchtigkeit stärker heraus, die *Iris* legt sich an die innere, in einem inflammatorischen Zustande befindliche Wand der *Cornea* mehr oder weniger gleichförmig, allseitig und ohne *prolaps. iridis* zu verursachen an, wodurch die vordere Augenkammer verschwindet, und die Linse drängt sich näher nach der *Uvea* hin, wozu natürlich die Augapfelmuskeln thätig beitragen. Bald hierauf entzündet sich die hintere Wand der *Cornea* heftiger, die *Iris*, der neuen Lage ungewohnt, dem Hauptsitze des Leidens näher gebracht, und manchem entzündungerregenden Momente mehr ausgesetzt, participirt nun an der Entzündung, wenn auch anfänglich mehr an ihrer vorderen Oberfläche; die Secretion der wässrigen Feuchtigkeit in der vorderen Augenkammer läfst nach und hört endlich auf; die vordere Fläche der Regenbogenhaut klebt in Folge des entzündlichen Zustandes an die hintere Fläche der Hornhaut, welches Ankleben durch die fortschreitende Entzündung natürlich inniger wird. Heilt nun in diesem Momente die Natur oder die Kunst das Uebel, so vernarbt die vereiterte Hornhaut, wird weifslich, weifsgrau und emailartig, und die von Beer bereits angeführten Bedingungen zur Entstehung eines Hornhautstaphyloms sind vollständig gegeben. Es wird aber dasselbe hier in jedem Falle ein sphärisches sein, welches zwar gröfser werden und auch bersten kann, allein gewifs selten bedeutende Varicosität der Gefäfse, und am wenigsten jene der inneren, in der Tiefe des *Bulbus* gelegenen, zu Stande bringen wird, wenn nicht andere dergleichen begünstigende Momente vorhanden waren oder noch hinzutreten. Bei diesem sphärischen Totalsta-

phylom der Hornhaut, behält der Leidende eine in der Regel deutliche Lichtperception.

Wenn nun aber, unter übrigens gleichen Umständen, die Hornhautöffnung schneller grofs wird, und wenn somit die wässrige Feuchtigkeit schneller hervordringt, so pflegt sich nicht allein die vordere Fläche der *Iris* an die hintere der *Cornea* zu legen, sondern die erstere tritt auch in die Hornhautöffnung ein, und verwächst mit den Geschwürrändern. Durch dieses Einlegen oder Einklemmen eines Theiles der *Iris* in die Geschwüröffnung, wird aber auch eine gröfsere oder geringere Anspannung derselben bedingt, woher es kommt, dafs dieselbe jetzt an denen, von dem eingeklemmten Theile entfernten Parthien, die hintere Fläche der *Cornea* natürlich nicht berührt. Heilt nun in diesem Zeitpunkte der Krankheit die Natur oder die Kunst den pathischen Procefs, so vernarbt die Hornhaut: selbst über die vorgefallene *Iris* bildet sich eine weifsliche oder bläuliche feste, nach und nach noch härter werdende Masse, und es bleibt, je nachdem der Vorfall gröfser oder kleiner war, ein gröfserer oder kleinerer Höcker auf der *Cornea* zurück, und das ist es, was wir *Staphyloma corneae partiale* nennen.

Man wird ohne meine Erinnerung einsehen, dafs hier die *Cornea* noch theilweise durchsichtig, und die Pupille noch vorhanden und zum Sehen noch einigermafsen geeignet, oder auch nicht geeignet sein kann. Sie kann aber auch fehlen, kann dann vielleicht noch angelegt oder auch nicht angelegt werden, wenn z. B. die ganze Hornhaut vernarbt erscheint.

Wenn nun aber unter denselben Umständen, unter welchen ein *Staphyloma corneae totale sphaericum* zu Stande kommt, die Entzündung und Eiterung da nicht abläuft, der Procefs da nicht heilt, wo alle Bedingungen zur Entstehung eines kugelförmigen Totalstaphyloms bereits erfüllt worden, wenn vielmehr der Entzündungszustand jetzt noch fortdauert, von der *Iris* auf die Linsenkapsel und Linse überschreitet, und diese so mit der Regenbogenhaut verwächst, dafs die schon früher verengerte Pupille nun gleichsam gänzlich verstopft

stopft wird, so dafs, wenn nun auch die Eiterung in der *Cornea* sich jetzt mehr extendiren sollte, doch jene feste Verwachsung das Hervorstürzen des Glaskörpers und der Linse verhindert, nothwendig aber ein Hervordrängen der überall verschlossenen *Iris* und der Linse verursachen wird, wozu denn die Augapfelmuskeln thätig beitragen, und heilt nun jetzt die Natur oder die Kunst den pathischen Proceſs; so vernarbt die äufsere Oberfläche der kegelförmigen Hervorragung, und wir sehen das zu Stande gebracht, was wir *Staphyloma corneae totale conicum* nennen. Auch in diesem Falle pflegt nicht jeder Lichtschein zu fehlen, allein er ist viel unbedeutender, als bei dem kugelförmigen Totalstaphylom der Hornhaut.

Zweite Art. — Die zweite, viel seltener vorkommende Entstehungsart des Staphyloms ist folgende: Meistens in Folge unterdrückter Kopfausschläge u. dergl. entspinnt sich *per Metastasin* in der Regenbogenhaut und Hornhaut zugleich eine heftige Entzündung, die mit allen Zeichen einer furchtbaren *Iritis* eintritt. Die Pupille contrahiret sich schnell, verwächst in ihrem Rande in sich selbst, und die *Uvea* mit der Linsenkapsel, die *Iris* schwellt auf, tritt dadurch der Hornhaut näher und verengert somit die vordere Augenkammer; gleichzeitig mit jener schwellt auch die *Cornea*, nachdem sie sich zuvor trübte, auf, sowohl nach aufsen, als auch nach innen. Da die Entzündung fortschreitend wächst, so nimmt natürlich die Secretion der wässrigen Feuchtigkeit, sowohl in der vorderen als auch in der hintern Augenkammer erst ab, und hört bald gänzlich auf. Beide Häute, die *Iris* und die *Cornea* berühren sich nun, und fangen an sich in ihren Flächen organisch zu verbinden. Allein ehe dieses noch vollkommen möglich wird, beginnt schon der zweite Zeitraum dieser heftigen Entzündung, und indem die *Cornea* ihre ungemeine Neigung, in Eiterung überzugehen, nicht länger bergen kann, wird sie weich oder bricht auch wohl durch; in beiden Fällen drängen aber die Augapfelmuskeln die mit der Linsenkapsel innigst verwachsene *Iris* kegelförmig nach vorn, und verhindert

nun in diesem Zeitraume die Kunst*) das weitere Fortschreiten des Uebels, so mufs nothwendig wiederum ein *Staphyloma corneae totale conicum* entstehen.

Bei diesem Hornhautstaphylome fehlt jede Lichtperception, weil die Intensität des Uebels es nicht zuliefs, dafs allein nur die vordere Hälfte des Augapfels erkrankte. Die auf solche Art entstandenen Staphylome sind es besonders, welche grofse Varicosität der Gefäfse des Bulbus hinterlassen, und welche repetirende Entzündungsanfälle lieben, ohne dafs äufsere Ursachen oder Ausdehnung des Bulbus, die hier fehlt, aufzufinden sind.

Dafs bei allen Hornhautstaphylomen die *Cornea* und selbst die *Iris* zuweilen verdickt, zuweilen aber auch verdünnt gefunden wird; dafs die halb desorganisirte Masse, bald nach Entstehung des Uebels in der Regel weicher ist, später aber härter wird, davon haben mich Sectionen mehrmals überzeugt.

Man verwechsle übrigens das *Staphyloma corneae totale sphaericum* nicht, wie es jüngst geschehen, mit einem totalen Hornhautbruche, bei welchem die *Iris* in ihrer völligen Integrität besteht, und nur die vernarbte Hornhaut vorgedrängt erscheint. Eben so wenig darf das wahre Staphylom mit einer allgemein über die Hornhaut verbreiteten Narbe, bei welcher diese Haut nicht vorgedrängt ist, verwechselt werden. Um sich vor solcher Verwechselung zu hüten, dient einmal die genaueste Ansicht des Uebels, zweitens aber auch noch folgendes diagnostische Merkmal. In beiden Fällen nähmlich haben die Kranken nicht nur noch eine ziemlich bedeutende Licht- und Farbenperception, sondern diese vermehrt sich auch augenscheinlich, sobald man das Auge in Schatten setzt und die Objectivgegend gut beleuchtet. Das Erkennen der Farben verliert sich aber meistens gänzlich, sobald man

---

*) Die Natur allein wird unter solchen Umständen selten etwas vermögen, vielmehr würde erst nach völliger *Colliquation* des Bulbus die heilende Kraft derselben sichtbar werden können.

auch das Auge in starkes Licht bringt, besonders wenn die als Object dienende Farbe zu gleicher Zeit mehr in Schatten gesetzt wird. Bei dem wahren *Staphyloma corneae totale sphaericum* hingegen fehlt dieses Zeichen, die Leidenden zeigen vielmehr hier stets einen wahren Lichthunger, der bei auf beiden Augen staphylomatös Erblindeten höchst auffallend erscheint.

Uebrigens ist die staphylomatöse Hornhaut weicher und dicker, wenn die Verbildung erst vor kurzem und bei Kindern entstand, hingegen härter und weniger dick, wenn das Uebel veraltet ist und bei ältern Menschen erst auftritt. Die Farbe eines Staphyloms ist bald weifs, weifslichtgrau, bläulichtgrau oder röthlich. Partielle Hornhautstaphylome kommen gewöhnlich an dem untern Theile der Hornhaut vor. (Taf. III. Fig. 9. *)

Die Ursachen dieser Krankheit sind vorzüglich variolöse, auch morbillöse Ophthalmien, scrofulöse Ophthalmoblennorrhöen, Augenentzündungen der Neugebornen, Verwundungen des Auges, u. s. w.

Die Vorhersage ist verschieden; denn wenn bei einem partiellen Hornhautstaphylom das Sehvermögen noch vorhanden ist, so kann man das Staphylom zwar heilen und das vorhandene Sehvermögen erhalten, aber letzteres nicht vermehren. Hat das partielle Staphylom das Sehvermögen gänzlich vernichtet, so kann man die vorragende Verbildung (wenn keine Varicositäten am Auge zu bemerken sind) zwar beseitigen, allein das Sehvermögen kehrt nie wieder. Ist aber das Auge bedeutend varicös; so würde man durch Anwendung der sonst

---

*) Wenn man unter dem Namen *Staphylom* nur eine Ausdehnung und Verdünnung einer Augenhaut versteht, wie man wohl zu thun pflegte: so findet man auch *Staphylome* der *Sclerotica*, z. B. bei Varicositäten der *Chorioidea*, welche die *Sclerotica* hervordrängen. Scarpa fand solche *Staphylome* nie an der vordern Hälfte des Augapfels, wohl aber in zwei gewifs seltenen Fällen an der hintern Hälfte des *Bulbus*, nahe an der äufsern Seite der Stelle, wo der Sehnerve durch die *Sclerotica* in den Augapfel dringt. S. a. a. O. Vol. II. pag. 146, u. s. w.

heilenden ätzenden Mittel, dasselbe völlig vernichten. Bei Totalstaphylomen kann nicht nur nicht der geringste Grad des Sehvermögens wieder hergestellt werden, sondern oft, wenn beträchtliche Cirsophthalmie damit verbunden ist, steht sogar das Leben des Patienten in Gefahr, indem bei so bewandten Umständen unbedeutende Quetschungen, nicht selten furchtbare Exophthalmien u. s. w. entstehen machen; weſswegen denn auch jedes groſse Totalstaphylom so geschwind als möglich durch die Operation weggeschafft werden muſs. Bei einem kugelförmigen Totalstaphylom ist die Prognose indeſs im Allgemeinen günstiger als bei einem kegelförmigen. — Jedes Staphylom kann bald auf einem Auge allein, bald auf beiden zugleich vorkommen.*) Uebrigens ist der Fortgang der Staphylome verschieden: bald wachsen sie plötzlich bis zu einem gewissen Umfang und bleiben dann stehen, bald wachsen sie stufenweise gröſser, bis sie bersten; und öfter arten sie in eine sich vergröſsernde Fleischmasse aus, und erfordern die Ausrottung des ganzen Auges.

Um nun ein *Staphyloma Corneae partiale* zu beseitigen, hat man früher örtlich adstringirende Mittel gebraucht; ebenso rühmte man die rauchende Salpetersäure, die Schwefelsäure, den *Lapis infernalis* und empfahl gleichsam als spezifisches Mittel das *Butyrum Antimonii*. Letzteres hat auch Beer mit vollem Rechte angepriesen. Wenn demnach das miſsgeformte Auge nicht gar zu empfindlich ist und Varicositäten an demselben nicht zu bemerken sind; so berühre man mittelst eines feinen, sehr wenig in Spieſsglanzbutter getauchten Haarpinsels, die Spitze des partiellen Staphyloms, und erhalte die befestigten Augenlieder so lange offen, bis sich auf dem Staphylom eine kleine weiſse Brandkruste

---

*) Wardrop, (a. a. O. p. 99.) beobachtete eine sehr merkwürdige Sympathie zwischen beiden Augen; denn indem ein Auge durch einen Stich verwundet und staphylomatös wurde, nahm auch das andere unverletzte Auge an derselben Metamorphose Theil.

bildet, über die man dann sogleich mit einem gröfsern, in Wasser oder Milch getauchten Miniaturpinsel wegwischt, damit nichts von dem Aetzmittel irgendwo sich verstecken und böse Zufälle verursachen kann. Die Wiederanwendung dieses Mittels findet nicht früher Statt, als bis die dadurch erregte Entzündung völlig verschwunden und die Brandkruste abgefallen ist. Scharfe Augensalben und überhaupt Mittel, welche sich weit über das Auge verbreiten, müssen durchaus vermieden werden.

Eben erst entstandene, noch weiche Staphylome, kann man durch das Baden des kranken Auges in eiskaltem Wasser zuweilen beseitigen oder verkleinern.

Ein *Staphyloma Corneae totale* kann nur durch die Operation weggebracht werden, und da verdient wieder die Beer'sche Methode allen vorgezogen zu werden; denn Beer sah nach derselben die schönsten Erfolge, nämlich Aufhebung der Entstellung, Aufhören des Schmerzes, so wie aller übrigen Zufälle, und mögliche Anlegung eines künstlichen Auges. Um diese Operation zu machen, sticht man ein Beer'sches, ungewöhnlich breites Staarmesser (Tab. V. Fig. 6.) am äufsern Augenwinkel an der Grundfläche der staphylomatösen Hornhaut, wie bei der Staarextraction, ein, man führt es im innern Augenwinkel an der genau entgegengesetzten Stelle ebenso wieder heraus, und vollendet den Lappenschnitt blofs durch das Fortschieben des Messers in horizontaler Richtung, wie bei der Staarausziehung gelehrt worden ist. Der Gehülfe, welcher das obere Augenlied blofs mit dem Zeige- oder Mittelfinger, oder wenn das Staphylom sehr klein und der Kranke sehr unruhig ist, mit dem Richter'schen Silberdrahthaken während diesem Acte in die Höhe gehoben hält, darf den Augendeckel nach Vollendung des ersten Schnittes nicht herabfallen lassen, sondern der Operateur ergreift unverzüglich mit einer Pincette den Lappen des Staphyloms, und schneidet denselben mit einer Daviel'schen Scheere durch einen Schnitt vollends ab, jedoch ohne den *Bulbus* zu drücken, um dadurch nicht Veranlassung zum Verluste der Linse

und des Glaskörpers zu geben. Jetzt läfst der Gehülfe das obere Augenlied niederfallen, welches dann nicht eher geöffnet werden darf, als bis die Heilung zu Stande gekommen ist. Bei der Operation der conischen Staphylome kann die Linse und der Glaskörper niemals erhalten werden, weil der Schnitt hier hinter der Linse geschieht; auch mufs man hier gleich Anfangs das Staphylom mit einem Haken fassen und dann die Operation, wie beschrieben wurde, fortsetzen.

Der Verband nach dem Abschneiden des Staphyloms ist einfach und geschieht, wie nach einer Staaroperation, durch einen Streifen englischen Heftpflasters, über welchen eine Compresse aufgelegt wird, die aber nicht fest auf's Auge gebunden werden darf; überhaupt mufs aller Druck auf das Sehorgan, so wie jede Gelegenheit zu einem *Blepharospasmus*, vermieden werden, weil sonst leicht die Linse und der Glaskörper aus dem Auge dringt, weswegen auch nach der Operation einige Zeit hindurch eine horizontale Lage des Kranken zu empfehlen ist.

Nach völliger Heilung kann man endlich ein künstliches Auge einsetzen, welches vorzüglich dann sehr täuschend eingebracht werden kann, wenn die Linse und der Glaskörper erhalten worden sind. — Ist das Auge (vorzüglich bei conischen Staphylomen) sehr varicös, so entstehen oft 2 bis 6 Stunden nach der Operation furchtbare Blutungen und Blutgeschwülste, wodurch die *Chorioidea* und *Retina* vorgedrängt werden; nachdem man jedoch diese beide Häute abgeschnitten hat, hört die Blutung schnell auf, allein eine nachfolgende, zur Einlegung eines künstlichen Auges recht geschickte Form des *Bulbus* kann dann nicht erhalten werden.

Der Vorfall der Regenbogenhaut, das Regenbogenhautstaphylom, *Prolapsus, Ptosis Iridis, Staphyloma Iridis.*

Wenn die *Iris* sich in irgend eine Oeffnung der *Cornea* legt oder klemmt, und in derselben äufserlich

sichtbar wird, so hat man die erst entstandene Krankheitsform, welche hier abgehandelt werden soll. Solche Einklemmungen der Regenbogenhaut verursachen ganz anfänglich das schmerzhafte Gefühl, als stäcke ein Dorn im Auge, welches Gefühl sich nach und nach in einen Druck verwandelt und endlich den ganzen Augapfel umfafst. Nachdem nun ein Ausfluſs brennender Thränen und Lichtscheu entstanden, stellt sich ein entzündlicher Zustand des Auges ein, wenn letzterer nicht schon ohnedieſs zugegen war.

Die Diagnose ist bei eben erst entstandenem Vorfall ziemlich leicht, denn man bemerkt nicht nur einen schmerzenden Punkt auf der *Cornea*, welcher die Farbe der Regenbogenhaut hat, sondern man wird auch eine, aus ihrem Centro nach dem vorliegenden Regenbogenhautstück hin verzogene und verengerte Pupille gewahr. Späterhin aber, wenn die vorgefallene *Iris* mit der *Cornea* fest verwachsen und unempfindlich geworden ist, und wenn das vorliegende Stück Regenbogenhaut mit dem reproducirten Bindehautblättchen der *Cornea* überzogen und dadurch in der Farbe verändert erscheint, ist die Diagnose des Uebels schwerer; indeſs führt eine knotenförmige, mit einem breiten weiſsen Rande umgebene Erhabenheit in der Hornhaut, und eine mehr oder weniger verzogene oder verengerte Pupille, auch hier immer zur richtigen Erkenntniſs.

Aus leicht begreiflichen Gründen befindet sich der Vorfall der *Iris* äuſserst selten in der Mitte der Hornhaut, sondern immer mehr oder weniger seitwärts und von dieser entfernt.

Solche Vorfälle der Regenbogenhaut haben, nach ihrer verschiedenen Gröſse verschiedene Namen, denn hat das Staphylom die Gröſse und Gestalt eines Fliegenkopfes, so nennt man es *Myocephalon;* ist es aber platt gedrückt, wenig über der *Cornea* erhaben, und hat es somit Aehnlichkeit mit einem Nagelkopf, so heiſst es *Hylon*, *Clavus.**) Waren aber in der Horn-

*) Taf. IV. Fig. 1.

haut mehrere Oeffnungen, durch welche die *Iris* zugleich vorgefallen ist, so bildet sich jene Krankheitsform, welche man mit dem Namen *Staphyloma racemosum* belegt hat.

Die vorzüglichsten Ursachen, aus welchen diese Krankheit hervorgeht, sind durchdringende Geschwüre der Hornhaut nach Entzündungen, und Schnittwunden dieser Haut, z. B. durch Hornhautschnitte bei Staarextractionen, bei Oeffnung eines *Hypopion* und so weiter.

Hinsichtlich der Beseitigung eines eben erst entstandenen Regenbogenhautvorfalles, ist das Nöthige theils unter den Wunden des Augapfels, theils bei der Staarextraction schon gesagt worden.

Ist der Vorfall schon veraltet, die *Iris* in und mit der *Cornea* schon fest verwachsen, und sind dabei keine bedeutenden Varicositäten am Auge zu sehen; so hebt man die dem Sehorgan unbequeme Hervorragung durch öfteres Betupfen mit *Lapis infernalis*. Sollte die vorliegende *Iris* aber durch die lange Dauer des Uebels unempfindlich geworden und mit dem reproducirten Bindehautblättchen der *Cornea* bedeckt sein; so gebrauche man die Spiefsglanzbutter auf dieselbe Weise, wie bei der Heilung des partiellen Hornhautstaphyloms vorgetragen wurde. Wenn indefs das Staphylom ganz unempfindlich und hart ist, oder wenn ein veraltetes Regenbogenhautstaphylom stielartig*) auf dem *Bulbus* sitzt; so ist das Abschneiden mit dem Messer den Aetzmitteln vorzuziehen, und befindet sich das Auge in einem varicösen Zustande, so kann und darf man nur das Messer gebrauchen. Auch bei dem glücklichsten Gelingen der Kur eines Staphyloms der *Iris* wird indefs der Kranke immer eine Verwachsung der *Iris* mit der Hornhaut und eine dadurch bedingte, mehr oder weniger verzogene und verengerte Pupille, nebst einer gröfsern oder kleinern Hornhautnarbe behalten.

---

*) Scarpa (a. a. O. Vol. II. pag. 18.) und a. erwähnen dergleichen Regenbogenhautstaphylome.

Die Verwachsung der vordern Fläche der *Iris* mit der Hornhaut, *Synechia anterior*, und die Anwachsung der hintern Fläche der *Iris* an die Linsenkapsel, *Synechia posterior*, [von συνεχω, ich hafte mit etwas zusammen.]

Dieses Uebel wird allemal als Folge einer vorhergegangenen Entzündung beobachtet, während welcher, bei der *Synechia posterior*, die Linsenkapsel mit der *Iris*, bei der *Synechia anterior* aber, die *Iris* mit der *Cornea*, sich berührt haben.

Aus der Entstehungsart der Krankheit läfst sich schon muthmafsen, dafs die verursachende Entzündung nicht selten zugleich andere Augenfehler hinterlassen könne, und diese findet man auch wirklich; denn bei der *Synechia posterior* bemerkt man oft eine *Cataracta lenticularis* oder eine *Cataracta capsularis*, bei der *Synechia anterior* aber hat man immer Gelegenheit, zum Theil bedeutende Narben und Flecken der Hornhaut zu beobachten, welche die Erkenntnifs mancher vordern Synechie gar sehr erschweren. Bei beiden Arten der Synechie finden sich übrigens zuweilen verschlossene oder verengerte, zuweilen aber erweiterte Pupillen, manchmal auch Amaurose und dergl.

Die Synechie überhaupt kann nun entweder total oder nur partiell sein. Totale vordere Synechien bemerkt man bei Totalstaphylomen der Hornhaut. Partielle vordere Synechien finden sich bei partiellen Hornhautstaphylomen und bei Staphylomen der *Iris*. Aufserdem giebt es nun auch partielle vordere Synechien, welche weder mit der einen, noch mit der andern der eben genannten Augenkrankheiten vereinigt vorkommen, und von diesen, meistens sehr beschränkten, Verwachsungen der Regenbogenhaut mit der Hornhaut, soll hier zuerst die Rede sein.

Diese Arten von Verwachsungen entstehen fast immer in Folge von durchdringenden Geschwüren oder Wunden der *Cornea*, weil die *Iris* sich nur bei durchlö-

cherter Hornhaut, nach Ausfluſs der wässrigen Feuchtigkeit, an die *Cornea* legen, und mit dieser, an einer kleinern oder gröſsern Stelle, verwachsen kann. Das hier Gesagte gilt im Durchschnitt von allen kleinen vordern Synechien. Zuweilen indeſs entstehen auch beschränkte Verwachsungen der *Iris* mit der *Cornea*, ohne Durchlöcherungen der letztern, was ich z. B. nach einer geringen entzündlichen Affection der *Iris* und *Cornea* beobachtete, wo sich die Synechie aber nur am Ciliarrande der *Iris* befand, nach gehobener Entzündung die Function des Auges nicht störte, und an der Trägheit der *Iris*, der kaum merkbar verzogenen Pupille und an einer geringen Hinneigung der Pupille nach der verwachsenen Stelle, zu erkennen war. Eben so leicht läſst sich gewöhnlich die Verwachsung der *Iris* mit einer Wundstelle der *Cornea* entdecken; denn man bemerkt eine, mehr oder weniger nach einer vernarbten Stelle der Hornhaut hin, verzogene Pupille, und blickt man von der Seite ins Auge, so wird man auch nicht selten die Vorwärtsneigung der *Iris* gewahr. In manchen Fällen ist die Diagnose des Uebels sehr schwierig, vorzüglich wenn der, bei jeder vordern Synechie gegenwärtige Hornhautflecken bedeutend grofs ist, und den verzogenen Theil der Pupille verdeckt.

Um solche vordere Synechien zu heben, hat man vorgeschlagen, mit einem Staarmesser oder mit einer lanzenförmigen Staarnadel durch die *Cornea* einzugehen, und nun recht geschickt und bei möglichster Vermeidung des zu frühzeitigen Ausflusses der wässrigen Feuchtigkeit, die Adhäsion von unten nach aufwärts zu trennen. Dieſs Verfahren wäre jedoch nur in dem Falle zu versuchen, wenn man durch den, nach der Operation veränderten Pupillenstand eine bedeutende Verbesserung des beschränkten Sehvermögens erwarten könnte. Vordere Synechien, welche das Sehen nicht bedeutend hindern, werden am besten unangetastet gelassen. Synechien, die einen bedeutenden Umfang haben, und schon lange dauerten, sind unheilbar.

Jetzt zur *Synechia posterior*. — Diese kann, wie schon gesagt wurde, total oder partiell sein; im erstern

Falle ist sie dann unheilbar und immer mit *Cataracta* verbunden, im zweiten aber zuweilen noch durch äufsere und innere Medicamente zu beseitigen. Freilich darf aber eine noch heilbare Anwachsung der *Iris* an die noch durchsichtige Linsenkapsel, nur durch einen äufserst zarten, Spinngewebeartigen, lymphatischen Anflug zu Stande gekommen sein.

Solche zarte Adhäsionen sind nicht immer leicht zu erkennen, indefs findet der Arzt neben einer beständigen Gesichtsschwäche eine nicht ganz bewegliche *Iris* und winklichte, meist verengerte Pupille, welche letztere nach in das Auge gestrichenem Belladonna- oder Bilsenkrautextract noch winklichter wird, weil sich dieselbe vorzüglich an denen Stellen erweitert, an welchen die hintere Fläche der Regenbogenhaut nicht mit der Linsenkapsel in Verbindung steht. Untersucht man die künstlich erweiterte Pupille mit bewaffnetem Auge, so entdeckt man einen fadenartigen graulichten oder grauröthlichten Lymphanflug, welcher die *Iris* mit der Linsenkapsel abnorm verbindet, und in welchem man zuweilen Blutgefäfschen erblickt.

Als Ursachen solcher fadenartigen, lymphatischen Ausschwitzungen in der hintern Augenkammer, sind vorzüglich syphilitische und arthritische Ophthalmien zu nennen; doch können auch reine Augapfelentzündungen u. a. hintere Synechien zurücklassen.

Bei Subjecten, deren Körperconstitution zuläfst, innerlich und äufserlich Quecksilber zu gebrauchen, ist die Prognose günstig; indefs wird sie noch günstiger, wenn man in dem fadenartigen Gewebe mittelst der Lupe, Blutgefäfse entdeckt, weil in diesem Falle dasselbe mit dem ganzen Organismus in organischer Verbindung steht und die Aufsaugung des innormalen Anflugs um desto sicherer und schneller zu erwarten ist. Ungünstig ist die Prognose, wenn Quecksilber nicht vertragen wird, wie diefs besonders bei arthritischen Individuen der Fall ist.

Die Heilung des Uebels geht im Allgemeinen schon aus dem Gesagten hervor. Man gebrauche daher äufserlich auf das Auge eine Salbe aus Schmalz, rothem

Präcipitat mit etwas *Extr. Hyoscyami;* letzteres erweitert die Pupille und zerreifst zuweilen die schwächsten angeschossenen Fäden, wodurch der Sehstern freier und das Sehvermögen verbessert wird. Ebenso findet man das *Ungt. Hydr. cin.*, welches man aber nur über die Augenbraunen einreiben läfst, nützlich. Verträgt das Auge Fettigkeiten nicht gut, so wurde eine *Solutio Hydr. mur. corr.* mit *Tinct. Thebaic.* dienlich gefunden.

Innerlich giebt man den *Mercur* nur dann gern, wenn in dem kranken Subjecte eine besondere Neigung zu Afterproductionen, oder auf Syphilis deutende Symptome wahrgenommen werden. Indefs auch wenn diese Bedingungen fehlten, beschleunigte ich die Heilung in einigen Fällen offenbar durch innere Anwendung des *Calomel.*

Die Beseitigung der mit Cataract verbundenen hintern Synechie wurde bei der Extraction des grauen Staares abgehandelt.

D. Von den Krankheiten, welche den *Bulbus* in seiner Totalität ergreifen.

Die reine Entzündung des ganzen *Bulbus*, *Ophthalmitis*, [von *οφθαλμος*, Auge, mit der Endung *itis*, welche Entzündung bedeutet.]

Symptome des ersten Zeitraumes. — Heftiger, drückender, spannender Schmerz des Auges und seiner Umgebungen, und Röthe der *Sclerotica* und *Conjunctiva*, sind die ersten Zeichen dieser furchtbaren Entzündung. Die Röthe nimmt immer mehr zu, die *Conjunctiva* des Augapfels schwillt an, und bildet einen gleichförmigen, äufserst empfindlichen und harten Wall um die *Cornea*, der bald so anläuft, dafs er endlich kaum noch das Centrum der *Cornea* erkennen läfst. Die Pupille ist dabei verengert, die *Iris* starr, und das Sehvermögen gröfstentheils oder völlig aufgehoben; zugleich helfen Photopsien den immer heftiger werdenden Schmerz vermehren. Die blaue oder graue Re-

genbogenhaut wird jetzt grünlich, die braune oder schwarze aber röthlich. Der *Bulbus* schwillt mehr an und wird unbeweglich. Die Hornhaut trübt sich und wird nach und nach undurchsichtig. Die Augenlieder entzünden sich immer mehr, und das untere stülpt sich endlich, wegen der jetzt ungeheuren Geschwulst des Augapfels, nach aufsen. Die Thränen- und Schmeersecretion ist völlig aufgehoben. Zu allen diesen gesellt sich endlich eine *Febris inflammatoria*, wobei schwächliche Personen nicht selten deliriren.

Symptome des zweiten Zeitraumes. — Die Geschwulst der Bindehaut des Augapfels nimmt nun auffallend zu, wird dunkelroth, aber weicher. Der Schmerz fängt an unstät, klopfend und bei Berührung stechend zu werden. Das obere Augenlied wird durch den sich vergröfsernden Augapfel ausgedehnt, und bekommt eine blaurothe Farbe. Der noch sichtbare Theil der *Cornea* wird schneeweifs und endlich gelblich,*) dabei stellt sich Gefühl von Schwere und Kälte in der Augengrube und im Auge selbst ein, und der spannende Schmerz nimmt immer mehr zu. Schafft man jetzt noch keine zweckmäfsige Hülfe, so berstet der *Bulbus* unter wüthenden Schmerzen und hörbarem Knall, *Rhexis, Rhegma oculi*, und es fliefsen Eiter und Blut mit Resten der Linse und des Glaskörpers aus. Hat man aber unglücklicher Weise die Krankheit im ersten Zeitraume für eine asthenische Entzündung gehalten und demnach durch mancherlei Mittel die Entzündung noch vermehrt, oder hat sich der Kranke während dieser Zeit den Genufs geistiger Getränke, derber Nahrungsmittel und des Tabacks nicht versagt; so beginnt meistens, unter den bekannten Erscheinungen, eine furchtbare Gangrän, die bei fortwährender Vernächlässigung in kalten Brand und in den Tod übergeht.

Die Ursachen dieser Entzündung sind vielfach, vorzüglich entsteht sie aber von dem Sonnenstich, vom

---

*) Diesen Moment bezeichnet das von Beer gemalte, auf Taf. IV. Fig. 2. kopirte Bild.

Losbrennen des Schiefspulvers unmittelbar vor den Augen, vom Anschlagen einer Feuerflamme an den *Bulbus*, u. dergl.

So lange im ersten Zeitraume der Entzündung das Sehvermögen noch nicht aufgehoben und der *Bulbus* noch nicht angeschwollen ist, kann man mit Recht noch Zertheilung hoffen; indefs bleibt oft eine Amblyopie zurück, welche bald kürzere, bald längere Zeit hindurch dauert. Sobald aber das Sehvermögen vollkommen aufgehoben, die Pupille beinahe geschlossen ist und der Augapfel selbst zusehends anschwillt; dann wird man höchstens noch die gute Form des Auges retten können, das Sehvermögen kommt nie wieder, und oft bleibt selbst eine vollkommne Verschliefsung der Pupille zurück.

Im zweiten Zeitraume der Krankheit kann das Sehen nicht nur nicht wieder hergestellt werden, sondern es wird, wenn der Augapfel einigermafsen angeschwollen war, auch keine Rede von Erhaltung der guten Form desselben mehr sein können. Berstet der *Bulbus*, so bleiben nicht einmal solche Reste desselben zurück, welche in der Folge die Einlegung eines künstlichen Auges möglich machen könnten. Ist schon *Gangraena bulbi* entstanden, so hat man alles anzuwenden, um diesen nicht in *Sphacelus* und in den Tod übergehen zu lassen.

Um die Heilung der Krankheit möglichst zu bewirken, verfahre man im ersten Zeitraume ganz antiphlogistisch und betrachte die Krankheit nicht etwa blofs als örtliches Leiden. Daher mache man Venaesectionen, lege Blutigel um das Auge und scarificire nachher die rings um die *Cornea* aufgeschwollene *Conjunctiva* strahlenförmig. Aufser diesem dürfen andauernde Umschläge von sehr kaltem Wasser nicht versäumt werden. Nach Minderung der Blutmasse können Senfteige auf die Arme und Vesicatoria in den Nacken gelegt werden. Innerlich reicht man starke Dosen *Calomel*, dessen hier nothwendige Wirkung auf den Darmkanal, dadurch noch zu vermehren ist, dafs antiphlogistische laxierenerregende Mixturen gegeben wer-

den. Geht der entzündliche Zustand des Auges auf Theile über, welche innerhalb der Schädelhöhle liegen, so wird es selbst nöthig, eine Jugularvene oder die *Arter. temporal.* zu öffnen.

Da im zweiten Zeitraume keine Wiederherstellung des Sehvermögens möglich ist, so befördere man die Eiterung durch erweichende Umschläge, die aber auf dem Auge nicht erkalten dürfen. Dabei gebe man Eiterung und Kräfte unterstützende Mittel, z. B. *China, Calamus aromat., Valeriana,* u. s. w. mit *Naphthen* und ähnlichen Medicamenten. Zeigt sich nun irgendwo ein bedeutender Eiterpunkt, so öffne man diesen mit einer Lanzette und lasse den Eiter ausfliefsen. Auf diese Weise rettet man meistens einen solchen Rest des Augapfels, dafs nach einigen Monaten ein künstliches bewegliches Auge eingelegt werden kann. War der Augapfel dem Zerspringen nahe, und machte man auch hier dreist einen grofsen Einschnitt in denselben, und behandelte die Eiterung wie im vorigen Falle, so kann wenigstens in der Folge ein unbewegliches künstliches Auge eingelegt werden. War das Auge schon geborsten, so ist die Form desselben nicht mehr zu erhalten; hier sorge man nur durch allgemeine und örtliche, schon öfter angeführte Mittel dafür, die vielleicht schon gegenwärtige schlechte jauchigte Eiterung zu beschränken. Wenn schon *Gangraena oculi* entstanden ist, dann wird der Uebergang in kalten Brand am besten dadurch verhütet, dafs man Umschläge von warmem concentrirten Chinadecoct mit Theriak, *Bals. Peruvian.* und der Thebaischen Tinctur vermischt, macht, und innerlich einen starken Absud der Rinde mit *Naphthen* und dergleichen schon angeführten Mitteln giebt.

Die Dörrsucht, das Schwinden des Augapfels, *Atrophia,* [von *α, priv.* und *τρεφω,* ich nähre,] *Aridura bulbi.*

Der Augapfel kann auf verschiedene Weise schwinden, das heifst, kleiner werden. Er kann sich nach einem Verlust der Glas- oder der wässrigen Feuchtig-

keit verkleinern, worauf dann immer eine Zusammenrunzelung der Hornhaut, *Corrugatio corneae*, entsteht, welche verschwindet, nachdem die Oeffnung, wodurch jene Feuchtigkeiten ausflossen, geheilt und der *Humor aqueus* ersetzt ist. Ebenso kann eine Entzündung und nachherige Vereiterung des *Bulbus* an dem Kleinerwerden desselben Schuld sein, wo dann solches Schwinden *Phthisis bulbi* genannt wird. Ist aber durch den Eiterungsprocefs nur die *Cornea* verkleinert und destruirt, so nennt man diefs *Phthisis corneae*. Dergleichen Vereiterungen sind schon bei ihren ursächlichen Entzündungen, z. B. der reinen Augapfelentzündung, u. s. w. erwähnt worden. Alle jene Arten von Volumsverminderungen des Auges, sind aber keine Atrophien (Dörrsuchten) desselben. Unter diesem Nahmen versteht man vielmehr einen ganz eignen Zustand des Augapfels, wo in demselben die Resorption überwiegend wird, ohne dafs eine Spur von Eiterung vorhanden wäre. Bei dieser überwiegenden Resorption nimmt nicht blofs der ganze Augapfel an Umfang ab, sondern auch seine einzelnen Gebilde: er zieht sich immer mehr in den Hintergrund der *Orbita* zurück, und erscheint endlich als ein kleiner weifslichter, oder vielmehr schmutzig weifsgelblichter, mit Furchen versehener Klumpen, der sich endlich nicht mehr verkleinert, sondern im gleichen Zustande fortdauert, jedoch immer noch deutliche Spuren seiner ehemaligen Structur erkennen läfst, daher man auch noch eine pupillenlose *Iris*, u.s.w. zu unterscheiden im Stande ist.*)

Die Atrophie des *Bulbus* entsteht sehr oft als Folge einer arthritischen *Ophthalmitis;* selten nach allgemeinen scrofulösen Augapfelentzündungen.

Ergreift die Dörrsucht nur die Hornhaut, wie diefs wohl bei durchdringenden, mit langwierigem Ausfluls der wässrigen Feuchtigkeit verbundenen Geschwüren die-

*) In der 3ten Fig. der IV. Tafel, erkennt man einen atrophischen *Bulbus*, der sich in Zukunft jedoch immer noch mehr verkleinern wird.

dieser Haut, so wie bei Colobomen, Haasenaugen, Entropien, u. s. w. der Fall sein kann; so stirbt das Bindehautblättchen ab, die *Cornea* wird trocken, schmutzig, verliert endlich Durchsichtigkeit und Wölbung, verkleinert sich und zeigt so jenen Krankheitszustand, den man Verschrumpfung der Hornhaut, *Atrophia corneae*, *Rutidosis*, *Rhytidosis* nennt und der von oben erwähnter *Corrugatio corneae* wohl zu unterscheiden ist.

Die Prognose der *Phthisis* und *Atrophia bulbi et corneae* ist sehr schlimm und sind die Uebel wirklich unheilbar. Indefs läfst sich eine noch nicht ausgebildete, aus arthritischer *Ophthalmitis* hervorgegangene Atrophie des Augapfels, bei sehr zweckmäfsiger Behandlung der Gicht, zuweilen noch im Fortschreiten aufhalten.

Als palliative Hülfe dient das Einlegen eines künstlichen Auges, *Hypoblepharon*, *Oculus artificialis*, wodurch der häfslich destruirte Bulbus verdeckt wird.

Indefs ist bei einer wirklichen Atrophie des Auges auch dieses nicht anwendbar, weil es hier von dem Kranken nicht vertragen wird und der an sich schon sehr verkleinerte Augapfel durch den beständigen Reitz, welchen das künstliche Auge verursacht, noch mehr schwindet.

Künstliche Augen können überhaupt dann nur mit bedeutendem Nutzen eingelegt werden, wenn der zurückgebliebene Augapfel nicht zu klein ist, wenn keine Schmerzen, keine Entzündung und keine Eiterung des Auges mehr zugegen, vielmehr alles dieses längst vorübergegangen ist. Besonders müssen Suppurationen des Augapfels wenigstens seit drei Monaten völlig abgelaufen sein, bevor man an Einsetzung eines künstlichen Auges denken kann, und sehr richtig bemerken viele Aerzte, z. B. Beer, Boyer, (*Traité des Maladies chirurgicales, tom.* 5. *p.* 618. und die Uebersetzung von *Textor*) dafs man nur dann anfangen kann, Gebrauch von dem Emailauge zu machen, wenn gänzliche Vernarbung schon zu Stande gekommen ist. Nach Exstirpationen des Sehorgans, hilft das Einsetzen eines

künstlichen Auges wenig; ebenso nützt es nicht viel, wenn die Linse und der *Humor vitreus* verloren gegangen, defsgleichen in allen denen Fällen, wo von dem *Bulbus* überhaupt nur ein kleiner unbeweglicher Stumpf zurückgeblieben ist. In diesen Fällen wird wenigstens das neue Auge ganz unbeweglich sein, und so die Täuschung, die man dadurch zu bezwecken Willens ist, nicht gelingen. Je weniger hingegen von dem *Bulbus* verloren gegangen ist, desto besser sitzt das künstliche Auge, desto besser macht es alle Bewegungen des gesunden Auges mit, und desto täuschender erscheint der Anblick desselben.

Im Allgemeinen ist es zwar wahr, was Hazard-Mirault*) bemerkt, dafs wegen Einsetzung eines künstlichen Auges, keine Operation am Sehorgan vorgenommen werden solle, vielmehr verlangt es ohnedem oft schon die Krankheit des Auges selbst, dafs man operire, wie z. B. bei gröfseren Staphylomen; indessen ist es doch nicht zu läugnen, dafs es Fälle giebt, wo man operiren mufs, wenn ein Emailauge geschickt eingelegt werden soll, welche Operation aber aufserdem nicht eben nöthig gewesen sein würde.

Die künstlichen Augen, die man jetzt gebraucht, haben die Form convexer Tellerchen, deren convexe Fläche nach aufsen steht. Auf dieser nun befindet sich die *Sclerotica* mit den wenigen, in deren Bindehaut sichtbaren Blutgefäfsen, ferner die *Iris* mit einer Pupille von mittlerem Durchmesser, die *Cornea* und endlich die täuschend vorhandene vordere Augenkammer. Diese Augen sind entweder von Glas- oder Emailmasse gefertigt, oder sie bestehen aus reinem Ducatengolde, und sind dann emaillirt. Beide Arten künstlicher Augen werden vorzüglich schön in Paris bei *Hazard-Mirault, Membre de l'Athénée de Sciences etc. rue St.-Apolline*, No. 2. und bei *Desjardins, Artiste de la Faculté de Medecine, rue Traversière-St.-Honoré*

---

*) *Traité pratique de l'oil artificiel. A Paris.* 1818. *pag.* 50.

No. 20. *près le passage St. Guillaume*, gefertigt. Der Preis der vorräthigen Emailaugen ist circa 25 Franken, von den besonders bestellten und genau nach eingeschickten Modellen gefertigten bis 50 Franken.

Aufser Paris werden auch zu Venedig in den dasigen Fabriken Glasaugen gefertigt, die für solche Personen, welche in der Nähe wohnen und eine zweckmäfsige Auswahl treffen können, wohl anwendbar sind. Insgemein aber sind sie doch weniger täuschend und mit weniger Accuratesse gefertigt, als die pariser; allein sie sind auch um Vieles wohlfeiler, denn der Preis eines Stückes an Ort und Stelle beträgt zwischen 2 und 3 Thaler.

Obgleich die Glasaugen den Fehler der Zerbrechlichkeit an sich tragen, so können sie doch, im Falle sie zu grofs wären, an ihren Rändern ebenso abgeschliffen werden, als die goldenen; nur freilich gehört zu dieser Arbeit grofse Geschicklichkeit und Vorsicht. Der Unterschied in der Schwere beider Arten ist nicht bedeutend, denn das Gewicht der Glasaugen beträgt zwischen 20 und 30 Gran, der goldenen emaillirten aber zwischen 35 und 45 Gran. Diejenigen, welche ich von letzterer Gattung bisher anfertigen liefs, wogen niemals über 40 Gran. Je leichter das künstliche Auge, desto bequemer ist es für den Kranken. Wenn die goldenen bis 2 Quentchen wiegen könnten, wie Bernstein in seiner systematischen Darstellung des chirurgischen Verbandes S. 187. meint, so würde ein solches den Leidenden nur zur Pein werden.

Dafs die Deutschen in Fertigung künstlicher Glasaugen bisher gar nichts leisteten, ist allerdings unverantwortlich. Die vorzüglichste Schwierigkeit bei deren Fabrication liegt darin, dafs die *Iris* und die Hornhaut in die passend ausgeschliffene *Sclerotica* eingesetzt und eingeschmolzen werden müssen; eine Aufgabe, die allerdings ungemeine Aufmerksamkeit, Uebung und Vortheile verlangt, welche nur der Schüler eines in dieser Kunst anerkannten Meisters bald erlangen dürfte. Die goldenen wären in solchen Städten Deutschlands wohl zu fertigen, wo tüchtige Email-

leurs wohnen, die guten Willen genug haben, die mühsame und undankbare Arbeit zu unternehmen. Aber auch in diesem Falle kann nur lange und viele Uebung das Geschäft erleichtern und etwas täuschend Schönes zu Stande gebracht werden.

Leidende, bei welchen das gesunde Auge sehr hervorsteht, bedürfen insgemein ein künstliches Auge von mehr runder Gestalt. Diejenigen dagegen, bei welchen das gesunde Auge tief liegt, oder bei denen die Augenliederränder nahe an einander zu liegen pflegen, bedürfen insgemein ein künstliches Auge von mehr flacher, länglicher Form.

Will man ein dergleichen künstliches Auge verfertigen lassen, so mufs man nicht nur ein genaues Gemälde des gesunden Auges einschicken, sondern auch die Dimensionen unter den Augenliedern gehörig nehmen, damit das Auge selbst nicht zu grofs oder zu klein, oder überhaupt unpassend wird. Diefs geschieht nun am besten, indem man durch einen Emailleur oder geschickten Goldarbeiter ein convexes Tellerchen von Blei fertigen läfst, welches die Dimensionen des Auges und dessen Convexität genau anzeigt. Ein solches bleiernes Muster, nebst dem Gemälde, wird dann dem entfernt wohnenden Künstler zugeschickt, um danach ein goldenes emaillirtes und passendes künstliches Auge zu erhalten. In der Regel mufs das künstliche Auge etwas kleiner, selten gröfser sein als das noch bestehende natürliche. Besonders hat man diefs da zu beachten, wo noch kein Emailauge getragen worden ist, denn es darf den Stumpf des *Bulbus*, so wie die Augendeckel, nicht drücken und dadurch lästig werden; nur nach und nach kann ein gröfseres an die Stelle des früher gebrauchten treten. Uebrigens müssen die Emailaugen nicht blofs leicht sein und genau mit dem Bilde des noch vorhandenen gesunden Auges übereinstimmen, sondern auch so glatt und eben sein wie Glas, und ein feuchtes Ansehn haben.

Die Hornhaut mufs im künstlichen Auge, wie natürlich, so gestellt sein, dafs die Entfernung ihres äufsern Randes vom Schläfewinkel die gröfste ist, und

dafs folglich die Hornhaut in die Sehaxe kömmt; ebenso mufs auch der Raum zwischen dem obern Rande der Hornhaut und dem Rande des künstlichen Auges, viel gröfser sein als der untere.

Um das Auge selbst einzulegen, schiebt man das vorher angefeuchtete, concav convexe Tellerchen, mit seinem obern breiten Rande, nachdem man das untere Augenlied mit dem Zeigefinger von dem *Bulbus* abwärts gezogen hat, unter den obern Augendeckel so hoch als möglich hinauf, und läfst dann das untere Augenlied los. Erregt es in kürzerer oder längerer Zeit Schmerzen, wird das Augenlied roth; so mufs es herausgenommen und der Augapfelstumpf nebst Umgegend, zur Ertragung des neuen Reitzes gleichsam gestärkt werden. Diefs geschieht durch fortgesetzte Anwendung von kaltem Wasser, welches man rein, oder mit etwas *Alumen, Spir. Vin. rectificat.* und ähnl. Dingen vermischt, örtlich gebraucht. Macht das eingelegte Auge an ungleichen, nicht passenden Stellen desselben Schmerz; so müssen diese abgefeilt werden. Ueberhaupt wird ein künstliches Auge sehr selten gleich Anfangs vertragen. Ist der zurückgebliebene Theil des *Bulbus* sehr klein, und sitzt das künstliche Auge defswegen nicht gehörig fest; so kann man den concaven Theil desselben, nach Erfordernifs bald mehr bald weniger mit weifsem Wachs ausfüllen. Das Herausnehmen des Auges geschieht am leichtesten, wenn man eine Stecknadel mit ihrem Kopfe unter den untern Rand des Tellerchens schiebt, und dadurch dasselbe nach und nach abwärts drückt, da es dann auf der Stelle aus der Augenliederspalte herausfällt. Uebrigens mufs es der Kranke jeden Abend auf diese Weise herausnehmen, damit der angesammelte, bei heifser Witterung oft scharf gewordene Schleim, der sich unter den Augenliedern befindet, ausgespült werden kann, und das künstliche Auge über Nacht nicht verletzt wird.

Das Emailauge wird durch die beständigen Bewegungen der Augenlieder, vielleicht auch durch den oft scharfen Schleim, welchen diese, so wie die Orbita-

absondert, corrodirt, rauh und verliert dann, besonders so weit als dasselbe von den Augenliedern bedeckt ist, den Glanz und die Politur; dieſs geschieht oft in drei bis vier bis acht und zehn Monaten. Man muſs demnach zu einem neuen seine Zuflucht nehmen, weil sonst nicht bloſs das gute Ansehn des Auges dadurch verliert, sondern die rauhen Stellen auch reitzen und reiben, und Röthe der Augenlieder verursachen.

Zuweilen befinden sich neben dem Augapfelstumpfe, in der Augenhöhle Fleischauswüchse etc., wo dann ein gewöhnlich geformtes Kunstauge nicht eingesetzt werden kann; in diesem Falle muſs man es entweder danach ausfeilen und ihm die passende Form zu geben suchen, oder die unwichtigen Excrescenzen nach den Regeln der Kunst, aus der Orbita entfernen.

Fehlen sogar die Augenlieder, so hat man wohl auch diese, von Stahl oder Holz nachzuahmen gesucht;*) indeſs gelingt hier die Täuschung niemals, und in diesem Falle ist es in der That besser, eine schwarzseidne, den scheuſslichen Anblick versteckende Binde tragen zu lassen.

Die allgemeine Varicosität des Auges, *Varicositas oculi universalis, Cirsophthalmia,* [von *κιρσος*, Krampfader, und *οφθαλμος*, Auge.] *Telangectasia oculi.*

Das Auge ist bei einer allgemeinen Varicosität vollkommen erblindet, selbst die Lichtempfindung mangelt, wenn auch zuweilen Blitze von verschiedenen Farben sich blicken lassen; der Augapfel bietet einen eigenen, Jedem auffallenden Anblick dar, ist sehr hart,

---

*) Es ist dieses eine der ältesten Erfindungen. Die alten Griechen nannten solche künstliche Augen *Ecblephari.* Es bestand ein solches aus einer mit einer feinen Haut überzogenen Stahlplatte, auf welcher ersteren nun Augenlieder und Auge fein gemalt waren. Diese, die Augenhöhle deckende Platte wurde mittelst zweier, nach rückwärts gebogenen stählernen Arme, befestigt.

kegelförmig und sein Umfang merklich vergröfsert, so dafs ihn manchmal die Augenlieder nicht mehr bedecken können; das Weifse des Auges ist schmutzig blau, fast bleifarben und die Bindehaut nebst *Sclerotica* erscheinen mit varicosen, schwarzes Blut führenden Gefäfsen erfüllt, wobei letztere Haut an ihren dünnsten Stellen nicht selten kleine bläulichte Wülste zeigt, die einzig und allein von den, unmittelbar unter der *Sclerotica* befindlichen gröfsten Blutaderknoten der *Chorioidea* herrühren.*) Die Hornhaut ist dabei entweder verdunkelt, staphylomatös, oder zwar durchsichtig, aber matt. Alle Bewegungen des *Bulbus* gehen langsam vor sich, die Pupille — wenn sie nicht etwa durch Entzündung verschlossen worden ist — findet man sehr erweitert, winklicht und im Hintergrunde deutlich getrübt: zugleich zeigt die Regenbogenhaut keine Spur von Beweglichkeit. Unterwirft man ein solches Auge der anatomischen Untersuchung, so findet man die *Sclerotica* verdünnt, hie und da mit der *Chorioidea* verwachsen, diese letztere varicös, den Theil der *Retina*, welcher an varicöse Geschwülste anstöfst, verdünnt, oder gänzlich mangelnd; die gläserne Feuchtigkeit flüssiger und meistens bräunlich getrübt, und die Crystalllinse schmutzig gelb, so wie überhaupt alle Gebilde des Augapfels qualitativ und quantitativ verändert.

Eine vernachlässigte oder oft wiederkehrende arthritische Augapfelentzündung, vorzüglich bei pastosen Subjecten, bringt vorzugsweise diese Krankheit hervor, wozu dann in der Folge *Glaucom* und glaucomatöse *Cataract* noch hinzukommt.

Wenn ein an diesem Uebel leidendes Auge unberührt gelassen wird, so kann es lange ohne Wachs-

---

*) Das schmutzig blaue Ansehn der *Sclerotica* rings um die *Cornea*, entsteht in Folge der Verdünnung der erstern, wodurch die mit dunkelm Blute überfüllte *Chorioidea* hindurchschimmert. Diese schmutzig blaue Farbe erscheint defswegen um die Hornhaut herum am deutlichsten, weil hier die harte Haut ohnedem am dünnsten ist.

thum der Zufälle bestehen; denn ungeachtet es wohl an Atrophie zu leiden anfängt, so treten doch nicht so leicht schädlichere Veränderungen ein. Wird es aber mit scharfen oder ätzenden Dingen, oder überhaupt mit Mitteln behandelt, welche sehr reitzend auf das Auge einwirken, so verschlimmert sich der Zustand schnell, die gröfsten varicosen Gefäfse bersten, wodurch oft Blutextravasate in den Augenkammern entstehen; ja es kann sogar der Augapfel selbst bersten und dadurch bedeutender Blutverlust verursacht werden; auch kann eine carcinomatöse Ausartung desselben erfolgen, wo dann der Tod dem Uebel bald früher bald später ein Ende macht. Noch leichter und schneller werden solche Verschlimmerungen hervorgerufen, wenn das kranke Auge eine Verwundung oder Quetschung erlitten hat.

Der *Scirrhus* und Krebs am Augapfel, *Scirrhus et Carcinoma bulbi.*

So wie sich der eigentliche Krebs immer aus einem *Scirrhus* herausbildet, ebenso scheint dem wirklichen *Carcinom* des *Bulbus* immer eine bösartige Verhärtung desselben vorherzugehen.

Solche bösartige Verhärtungen oder Scirrhen des Augapfels, die ihn zum Sehen unfähig machen, äufsern sich durch eine höckerige, knotige, sehr harte Anschwellung des ganzen Augapfels, durch Gefühl von Schwere in demselben, durch eine weifsröthliche Farbe, und durch den Mangel an Schmerz und Fieber; dabei entwickeln sich dunkelviolette varicöse Gefäfse auf dem *Bulbus*, nach und nach aber, und wenn der *Scirrhus* in Krebs übergeht, verdicken sich die Häute des Augapfels, werden fleischartig, das Auge wird schon früher schmerzhaft, die Schmerzen sind stechend, reifsend, juckend, brennend, verbreiten sich weit über den Kopf und werden selten durch *Opium* besänftigt; der *Bulbus* artet endlich in eine unkenntliche Masse aus, jede Spur seiner vormaligen Structur geht verloren, so dafs er nicht selten einem Stück har-

ten Fleische ähnlich ist. Der Umfang des Auges vergröfsert sich nun immer mehr, hectisches Fieber stellt sich ein, und endlich bricht es unter entsetzlichen Schmerzen in einem oder mehreren Krebsgeschwüren auf, wobei nicht selten aus den varicösen Gefäfsen heftige Blutungen entstehen, die zwar jene Schmerzen mildern, allein öfters Gelegenheit zu dem erfolgenden Tode geben. Zugleich sondern die vorhandenen, mit einem unegalen warzenartigen Grunde und aufgeworfenen harten und bleifarbigen Rändern versehenen Krebsgeschwüre, eine jauchigte Materie von ekelhaftem Geruch ab, und nicht selten sind zugleich auch die Augenlieder, besonders das obere, geröthet, schmerzhaft und die Gefäfse derselben varicös. Zuweilen sind gleich anfangs gauchigte Geschwüre vorhanden, welche am vorderen Theile des *Bulbus* haften, endlich die *Cornea* und *Iris* destruiren, die *Periorbita* ergreifen, leicht Knochenfrafs herbeiführen und in und neben sich schwammige Auswüchse hervortreiben.

Meistens kommt das *Carcinom* auf einem Auge allein vor; indefs wird auch das andere bei Vernachlässigung zuweilen afficirt.

Mancherlei Augenentzündungen, vorzüglich solche, die mit zu reitzenden, zusammenziehenden Mitteln behandelt wurden, und welche einen scrofulösen oder auch einen andern Charakter haben, können einen *Scirrhus* und endlichen Krebs des Augapfels verursachen.

So lange als der scirrhöse Zustand des *Bulbus* als ein reines Localübel besteht, scheint die Prognose nicht bedenklich zu sein, deuten aber an andern Orten erschienene Scirrhositäten auf allgemeiner verbreitete Krebsdisposition, entstehen stechende Schmerzen im *Bulbus*, dann ist die Prognose äufserst ungünstig, wenigstens höchst unsicher; denn bei der geringfügigsten Veranlassung stellt sich in dem scirrhösen Auge unter solchen Umständen ein verborgener Krebs ein, der früher oder später in offne Geschwüre überschreitet und dem Kranken unter den furchtbarsten Leiden das Leben raubt. Sehr selten findet man den *Scirrhus*

bulbi als ein örtliches Leiden; meistens liegen dyscrasische Krankheiten bei cachectischen Subjecten dem Uebel zum Grunde, wo dann selbst die Exstirpation des Augapfels, als das einzige Heilmittel, öfters fehlschlägt, und defswegen die Voraussage sehr mifslich ist.

Nach Beer's Ueberzeugung ist die Exstirpation eines scirrhösen Auges nur dann angezeigt, wenn die Verhärtung nicht mit dyscrasischen und cachectischen Krankheiten complicirt erscheint, der Augapfel noch ziemlich frei in der *Orbita* bewegt werden kann, und wenn das Auge nur nach einer äufsern Veranlassung, z. B. nach einem Stofs oder einer andern Verletzung im Innern schmerzhaft wird und oben angeführte, einen kommenden verborgnen und offnen Krebs ankündigende Symptome auftreten. Sobald aber dyscrasische, cachectische alte Subjecte an einem *Scirrhus oculi* laboriren, und sich unter den angeführten Erscheinungen ein verborgener und offener Krebs ausbilden will, der *Bulbus* schon unbeweglich ist, und also die Verhärtung aufser dem Augapfel auch andere Theile in der *Orbita* ergriffen hat; dann ist die Operation meist ohne glücklichen Erfolg.

Ist schon *Carcinoma bulbi* zugegen, so kann man nur eine sehr ungünstige Prognose stellen; am ungünstigsten ist sie aber, wenn Knochendesorganisationen in der *Orbita* vorhanden, oder wenn schon lymphatische Drüsen am Halse, u. s. w. angeschwollen sind. Hat das *Carcinom* schon hectisches Fieber mit colliquativen Schweifsen und Durchfällen verursacht, erfolgen öftere Blutungen aus den varicösen Gefäfsen; dann ist die Operation völlig unnütz, denn der Kranke stirbt entweder während oder gleich nach derselben. — Innere und äufsere Arzneimittel vermögen nach den Beobachtungen der besten Aerzte sowohl bei *Carcinom* als selbst beim blofsen *Scirrhus*, gar nichts.

Von diesem hier eben vorgetragenen wahren Augenkrebse, unterscheiden sich, vorzüglich durch ihre günstigere Prognose, diejenigen Geschwüre des Augapfels, welche in Folge fungöser Excrescenzen der Binde-

haut des *Bulbus* entstehen. Schwammigte Excrescenzen kommen nicht selten auf der *Conjunctiva sclerotica*e, oder überhaupt an dem vordern Theile des Augapfels zum Vorschein. Sie bluten leicht, sind in Lappen getheilt, nicht von Fieber begleitet, bestehen in unschmerzhaften einzelnen weichen blafsrothen Wülsten, die nach und nach die *Cornea* verstecken, auf diese selbst selten übergehen, aber dennoch zuweilen einen verdickten pannusartigen Zustand derselben erblicken lassen. Diese Auswüchse nehmen bei Vernachlässigung immer mehr zu, können endlich von den Augenliedern nicht mehr bedeckt werden, und erhalten jetzt, da sie den äufsern Einflüssen mehr Preis gegeben worden sind, eine bräunliche harte runzlichte Kruste; weicht man diese mit lauwarmem Wasser los und drückt die schwammigten Lappen etwas von der *Cornea* zurück, so erblickt man letztere meistens unversehrt. Bei diesem Aufweichen der Borke entstehen gar leicht heftige Blutungen, wodurch sich zwar die Excrescenzen an Gröfse bedeutend vermindern, aber auch bald wieder wachsen.

Solche Sarcome sind Anfangs meistens gutartig, werden aber bei Vernachlässigung, Mifshandlung und wenn ihnen scrofulöse, syphilitische, arthritische und andere Diathesen zum Grunde liegen, zuweilen sehr hartnäckig, bösartig, kommen wieder, nachdem man sie abschnitt oder wegätzte und erregen Geschwüre, welche oft wirklich krebsartig (*Ulcus carcinodes,*) genannt zu werden verdienen: im letztern Falle sind die früher gutartigen, schwammigten, weichen Excrescenzen, rigide, hart, warzenartig und in jeder Hinsicht scirrhös geworden.

Dergleichen gutartige Auswüchse entstehen leicht nach blennorrhoischen und ähnlichen Augenentzündungen, die durch den zu langen und häufigen Gebrauch warmer erweichender Breiumschläge, vorzüglich bei schlaffen Subjecten, mifshandelt wurden. Hier werden sie oft im Entstehen durch ein Pulver aus *Alum. ust., Zinc. sulphuric.* und *Sachar. alb.,* (*S. Encanthis,*) oder durch vorsichtigen Gebrauch des trocknen Höllen-

steins, bei torpidern Schwammauswüchsen aber durch *Butyr. Antimon.* beseitigt. Sind hingegen die schwammigten Wucherungen schon gröfser, verhüllen sie die *Cornea*, können sie nicht mehr von den Augenliedern bedeckt werden, oder sind sie zu unempfindlich, als dafs sie den Aetzmitteln weichen könnten; so mufs man sie mit einem Haken oder mit einer Pincette fassen und mit einem gewöhnlichen Scalpell an ihrer Basis wegschneiden, wobei Beer während dem Schneiden immer kaltes Wasser auf das Auge spritzen läfst, damit ihn das häufig ausfliefsende Blut im Operiren nicht hindere. Zurückgebliebene Schwammreste beseitigt man durch obige Aetzmittel und verhütet dadurch auch das leichte Wiedererscheinen des Auswuchses.

Bedingen dyscrasische und cachectische Uebel in schwächlichen Subjecten solche schwammartige Auswüchse, verhärten sich diese hier, widerstehen sie der Heilung selbst dann, wenn man gegen die vorhandene Scrofelkrankheit, Syphilis, u. s. w. zu Felde zog, werden sie vielmehr unter oben erzählten Zeichen krebsartig; so desorganisiren sie den *Bulbus* bald, und man mufs daher wieder zeitig zur Exstirpation des Auges seine Zuflucht nehmen, die hier, laut vielen Beobachtungen der Aerzte, meistens einen weit glücklichern Erfolg hat, als wenn der Krebs ursprünglich aus einem wahren *Scirrhus* hervorgegangen wäre.

Zuweilen entstehen krebsartige Geschwüre aus einzelnen warzenähnlichen, sehr schmerzhaften und dunkelrothen Knötchen der *Conjunctiva Corneae et Scleroticae.* (*Carunculae malignae, rebelles.*) Ueberläfst man diese krebsartigen Geschwüre ihrer eignen Natur, oder mifshandelt man sie wohl gar, so geht das Auge nach und nach verloren, und die ganze *Orbita* liegt zuweilen, mit kleinern oder gröfsern Schwämmchen besetzt, vor den Blicken des Beobachters. Man sieht schon, dafs auch hier die Exstirpation des Auges zeitig vorgenommen werden mufs, wo dann der Erfolg meist glücklich sein wird; vorzüglich wenn das Uebel als ein rein örtliches erkannt worden ist. — Das blofse Ausschneiden des Geschwüres, ohne Ausrottung des

ganzen Augapfels, welches mehrere Wundärzte anrathen und auch mit Glück ausgeführt haben, ist immer unsicher.

Hat man nun den gegebenen Cautelen gemäfs Hoffnung, den Kranken durch Exstirpation seines Augapfels noch zu retten; so mache man die sehr schmerzhafte Operation nach Beer folgendermaafsen. Nachdem man mit einem Haken den Augapfel fest angefafst hat, stellt man denselben nach oben, läfst das untere Augenlied von einem Gehülfen herabziehen, trennt dieses darauf von dem *Bulbus* mit einem Schnitt*) mittelst eines gewöhnlichen Scalpells und dringt mit der Ludwig'schen Scheere schnell und behutsam neben und hinter dem Auge ein. Jetzt sucht der Operateur durch ausgiebige**) und behutsame Schnitte das Auge von seinen Umgebungen, und vorzüglich schnell von dem Sehnerven zu trennen, zieht es nun mehr hervor, (was man früher zu vermeiden hatte) und entfernt es endlich ganz. Während der Operation ist es gut, wenn zwei Gehülfen immerfort kaltes Wasser auf das Auge spritzen, damit die Blutung dem Operateur nicht hinderlich werde. — Ist nun der *Bulbus* entfernt, so bringt man den mit Mandelöl bestrichenen Ohrfinger in die *Orbita*, untersucht diese genau, besonders in der Gegend der Thränendrüse und schneidet die verdächtigen Stellen aus.

Nach beendigter Operation schliefst man die Augenliedspalte mit einem etwa drei Linien breiten englischen Pflaster, legt eine an der Stirn befestigte vierfache Leinencompresse darüber, und bringt den Kranken in's Bett. — Die Behandlung der erfolgenden Ei-

---

*) Wo der Augapfel so enorm grofs und angeschwollen ist, und wo die, zuweilen ebenfalls angeschwollenen, Augenlieder so gespannt am *Bulbus* liegen, dafs man keinen gehörigen Raum zur Operation finden kann; da wird es nöthig, die äufsere Commissur der Augendeckel mit einem Messer zuvor hinreichend zu trennen.

**) Sechs bis acht Schnitte mit der Scheere sind meistens hinreichend, um den ganzen *Bulbus* zu exstirpiren.

terung und Fleischgranulation ist wie an andern Theilen und schon aus der Chirurgie hinreichend bekannt.

Ein künstliches Auge wird man nach Exstirpationen nie gut anbringen können, denn es bleibt — wenn man es auch nach hinten zu konisch einrichten läfst, damit es die, selten von fleischartiger Masse völlig angefüllte, *Orbita* ausfüllt, — dennoch immer unbeweglich und zum Theil mit dem schlaffen, verrunzelten obern Augenliede mehr oder weniger bedeckt, und verursacht demnach einen gröfsern Uebelstand, als wenn man das Auge immer verbunden hält.

Konnte jedoch auch die Ausrottung des Auges nicht helfen, kehren die Geschwüre, Fleischauswüchse und die heftigen Schmerzen wieder, dann suche man jene Mittel zu benutzen, welche die Schmerzen lindern und das Uebel erträglicher machen können. Dahin gehören, äufserlich: Abkochungen von *Cicuta*, *Capit., pavav., hba hyoscyami* mit *Acet. saturnin.* und *Opium.* Aufgüsse von Kirschlorbeerblättern, von *Herba conii maculati*, Umschläge von Leinsaamenabkochungen, von frisch zerriebenen Moorrüben, u. s. w. Innerlich gebe man ebenfalls *Cicuta*, *Opium*, *China* und ähnl. Mittel, und sorge dafür, dafs täglich offner Leib vorhanden ist.

Verknöcherungen des Augapfels, *Ossificatio oculi partium.*

Es scheint, als wenn am Auge alle jene Substanzveränderungen vorkommen könnten, die an den übrigen Theilen des menschlichen Körpers zuweilen erscheinen. Wir finden demnach in einzelnen Fällen auch Verknöcherungen, oder sogenannte Versteinerungen im Auge. So giebt es z. B. Verknöcherungen in der *Sclerotica*, in der *Chorioidea*, welche für sich allein, oder mit ähnlichen Umänderungen anderer Gebilde des Auges vereinigt, beobachtet wurden. Man fand die *Iris*, die *Retina*, den Sehnerven und selbst den Glaskörper in einem erhärteten, erdartigen, verknöcherten Zustande; ja sogar den ganzen *Bulbus* fand man in Knochenmaterie umgewandelt.

Morgagni und Haller sahen Knochenblättchen zwischen der *Chorioidea* und *Retina*. Morand beschrieb eine steinharte cataractöse Linse, welche mit einer *Ossification* des Glaskörpers verbunden war. Pellier de Quengsy, Janin, Haller, Zinn, u. a. sahen ebenfalls verknöcherte Linsen. Wardrop und Walther erzählen Fälle, in denen die Hornhaut verknöchert war. Man fand endlich auch kalkartige Masse in den Thränenröhrchen und in der Thränenkarunkel.

Mehrere andere dergleichen merkwürdige Seltenheiten, beschrieben noch: Haller, (*Observat. patholog. Oper. min.*) Morgagni, (*de Sedibus et Causis morborum*) Pellier, (*Recueil de mémoires et d'observations sur l'oeil ect.*) Morand, (*Mémoires de l'Academie R. de Sciences*, 1730.) Scarpa, (a. a. O. Vol. II.) und andere; letzterer hat auch eine Abbildung einer solchen Desorganisation beigefügt.

Angeborner Mangel und Ueberfluss an Augen.

Man hat Fälle beobachtet, wo dem neugebornen Kinde, bald eines, meistens aber beide Augen fehlten,*) wo bald die *Orbita* vorhanden war, bald aber mangelte. Zuweilen sah man selbst 2—3—4 Augäpfel in einer Augenhöhle. Auch der Sitz der Augen war nicht immer derselbe, denn bald safsen die Augen an der gewöhnlichen Stelle, bald aber an ganz andern Theilen, wie z. B. am Hinterkopfe, auf den Schultern, auf der Brust, ja Schenk (in seinen *Observat. Lib. I.*) erzählt, dafs sie selbst an den Schenkeln ihre Stelle gehabt hätten.**)

Von den neuern bekannt gewordenen Fällen mangelnder Augen, führt Ad. Schmidt***) einen derglei-

*) *S. Act. Erudit. Lips.*, 1726. *Mens. Mart.*

**) Sybel, in seiner *Dissertat. inaugural. de quibusdam materiae et formae oculi aberrationibus a statu normali, Halae*, 1799. Auch in Reil's Archiv für die Physiologie. 5. Band, 1. Heft, hat über diesen Gegenstand Vieles gesammelt und denselben ausführlicher abgehandelt.

***) Ophthalm. Biblioth. von Himly und Schmidt, 3. Bd. 1. H. p. 170.

chen an, wo das Kind 6 Wochen lebte. Bei der Section fand er in der vorhandenen *Orbita* blofs die Thränendrüse, den dritten Hirnnerven, den ersten Ast des fünften Paares und die *arteria ophthalmica;* der Sehnerve fehlte aber völlig und das *foramen opticum* war verwachsen. — In demselben Bande, im dritten Stück desselben Werkes, wird eines von Malacarne beobachteten Falles gedacht, wo das Kind zwei Monat alt geworden war und nichts weiter gefunden wurde, als die Thränendrüse, die Thränenkarunkel, die Augenlieder und die Thränenwege.

Auch einzelne Gebilde des Auges will man allein fehlend gefunden haben, z. B. die *Iris*. Baratta (a. a. O. Vol. II. pag. 349.) berichtet von einem 22jährigen Jüngling, dafs diesem die *Iris* gemangelt habe. Dr. Morison beobachtete ein Kind mit Regenbogenhautlosen Augen; indefs ist es glaubhafter, dafs nur eine sehr bedeutende *Mydriasis* zugegen war, für welchen Zustand der Fall von den begutachtenden Aerzten auch gehalten wurde. Ueberhaupt sind die Beobachtungen, in welchen man die *Iris* angeboren fehlend gefunden haben will, noch sehr unvollständig und nicht hinreichend überzeugend.*)

*) Einen Fall von erworbenem Mangel der *Iris*, der gewifs selten Statt findet und mir selbst vorkam, will ich der Merkwürdigkeit wegen hier erzählen: Ein Landmann aus der Gegend des Klosters Maria-Stern, einige Meilen von Dresden, war im Walde beschäftigt, Reifsholz zu hauen, wobei ihm ein Stück des letzteren in das linke Auge sprang. Der heftige Schmerz veranlafste ihn zu glauben, es stäke noch ein Splitter im Auge, wefswegen er einen seiner Kameraden bat, dasselbe zu untersuchen. Dieser versicherte ihn auch, dafs ein Dorn im Auge festsäfse und suchte diesen mittelst des Kopfes einer Stecknadel auf der Stelle herauszuziehn, welches auch gelang. Eine längere Zeit dauernde, ziemlich schmerzhafte Entzündung und völlige Blindheit dieses Auges, waren die Folge davon. Wegen letzterer suchte der Mann bei mir Hülfe, und mein Erstaunen war nicht geringe, als ich bei völlig normaler Form des Augapfels, und bei Durchsichtigkeit und gehöriger Convexität der Cornea, nur eine kleine Spur einer Regenbogenhaut entdecken konnte, welche wie ein kleiner Flocken am untern Theile der Circonferenz der Hornhaut anhing. Der Kamerad nähmlich hatte, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, den Vorfall der Regenbogenhaut, welchen das Stück Reifsholz nach Durchbohrung der Hornhaut, verursacht hatte, für einen Dorn gehalten, und mittelst der Stecknadel die Iris von ihrem Ciliarbande los- und aus dem Auge herausgerissen. Man sah indefs die Stelle, wo die Hornhautwunde gewesen war, nur durch eine geringe Trübheit bezeichnet. Siehe Tab. I. Fig. 8.

Von

Von den specifischen Augenentzündungen.

Einiges über die specifischen Augenentzündungen im Allgemeinen.

Specifische Augenentzündungen werden solche genannt, welchen specifische Krankheitsursachen zum Grunde liegen, die in einem eigenthümlichen dyscrasischen Zustande des Körpers, oder in einem miasmatischen oder contagiösen Gifte bestehen.

Die verschiedenen Ansichten, welche über das Wesen der Entzündung überhaupt herrschen, beweisen sattsam, dafs wir darüber noch nicht vollkommen aufgeklärt sind. Wenn uns aber die *Autopsie* lehrt, dafs vermehrter Zufluſs des Blutes die erste Folge jedes entzündungerregenden Impulses ist, dafs hierdurch das Blut in Gefäfse dringt, die im normalen Zustande nur gewohnt sind, weifse Säfte zu führen, dafs daher das Capillarsystem der erste Sitz der Entzündung ist; so werden wir wohl nicht irren, wenn wir annehmen, dafs gerade auf dieses System die Causalmomente ursprünglich einwirken, und dafs dasselbe bei allen reinen und specifischen Entzündungen eine vorzügliche Rolle spielt.

So wie nun die Dyscrasien, die miasmatischen und die contagiösen Krankheiten unter sich gewaltig verschieden sind, so sind auch die durch sie veranlafsten Augenentzündungen in ihrem Beginnen, Fortgange und Ausgange wesentlich verschieden, und ebenso differi-

ren sie in ihrer Prognose und in dem zu ergreifenden Heilverfahren.

Es ist dieses eine Wahrheit, die nicht allein von den specifischen Entzündungen der Augen gilt, sondern von den Entzündungen aller Organe, aus welchen unser Körper zusammengesetzt ist, und es würde dem sich nur der sogenannten innern Heilkunde widmen wollenden Mediker höchst ersprieſslich sein, wenn er die Hauptklasse aller Krankheiten, die Entzündungen mit ihren Folgen, am Auge studirte. Er würde sich dann mit der Annahme einer *Hepatitis acuta et chronica*, einer *Peripneumonia vera et notha*, u. s. w. wahrlich nicht begnügen; er würde vielmehr finden, daſs es noch wichtigere, rationellere Unterschiede gebe, als die ihm bisher eingelernten; er würde finden, daſs auch in der Leber, in der Lunge, so wie in den meisten übrigen Organen des Körpers, die Gicht, die Scrofeln, der Rheumatismus, die Menschenblattern, die *Syphilis*, u. s. w. entzündliche Proceſse erregen können, die ihre eignen Symptome haben, und die, wenn sie glücklich behandelt werden sollen, mehr noch zu bedenken geben, als die *Hepatitis acuta et chronica* verlangt; er würde endlich finden, daſs auch die entzündlichen Zufälle des Gehirns bei Scharlachkranken, einen der *Scarlatina* immer angehörenden eigenthümlichen Charakter besitzen, welche bei dem gelind inflammatorischen Scharlach, das seit Jahren in unseren Gegenden herrscht, das rein antiphlogistische Verfahren verspotten und bei denen das heillose örtliche Auflegen nasser Kälte, den natürlichen Verlauf der Krankheit furchtbar stören und Nachkrankheiten verursachen muſs, wenn nicht der geistlose Eingriff den Leidenden schon früher tödtete. Möchten doch meine Worte, welche diese Gelegenheit der überströmenden Brust entriſs, nicht spurlos verhallen, da deren Wahrheit eine reiche Erfahrung verbürgt. Daſs die Semiotik, so wie die Therapeutik der übrigen Entzündungskrankheiten hierin jetzt hinter ihrem Sprößlinge, der *Ophthalmologie* zurück ist, liegt wahrlich nicht allein an der schwieriger zu gewinnenden *Autopsie* der lei-

denden Theile, sondern auch an den Aerzten selbst, die es oft weit edler finden, ein neu erstandenes System zu begreifen, um dann mit den Krankheiten der Menschen systematisch zu spielen, als trockne, zerstreut liegende Erfahrungen zu studiren oder selbst zu machen, die zu ihrer Bekanntmachung weder systematischer Afterweisheit, noch schwülstiger, halb mystischer Redensarten, sondern nur schlichter Worte bedürfen.

Die specifischen Augenentzündungen entwickeln sich entweder aus reinen, gewöhnlich in Folge einer äufsern *Causa excitans* entstandenen *Ophthalmien*, in welchem Falle sie secundaire specifische Augenentzündungen genannt werden müssen, welche daher auch erst später den eigenthümlichen Charakter annehmen; oder sie werden unmittelbar von der *Causa specifica* hervorgerufen, und sind dann gleichsam der Ausdruck des im Körper hausenden Causalübels.

Nicht selten tritt eine *Ophthalmia specifica* auf, obgleich das ursächliche Allgemeinleiden zu fehlen scheint; in solchen Fällen ist wenigstens die Anlage zu letzterem immer vorhanden, und die Idee der Krankheit hat sich dann gleichsam nur im Auge verwirklicht, kann aber nichtsdestoweniger ebenso gefahrbringend werden, als da, wo das Allgemeinleiden überall kräftig ausgesprochen ist.

Die specifischen *Ophthalmien* haben übrigens das Eigne, dafs sie nicht so deutlich wie die reinen Augenentzündungen in ein erstes und in ein zweites Stadium geschieden werden können, denn in der Regel ist der erste Zeitraum, in welchem die *Phlogosis* prädominirt, äufserst kurz, ja oft kaum zu bemerken.

Die specifischen Augenentzündungen zeichnen sich durch ihre gröfsere Neigung zu Recidiven vor den reinen *Ophthalmien* aus; auch pflegen erstere sich weniger gern zu zertheilen, vielmehr hinterlassen sie häufig organische Umänderungen, weswegen sie auch im Allgemeinen eine weit weniger günstige Prognose zulassen, als die letzteren.

Hinsichtlich der Heilung mufs ich im Allgemeinen

bemerken, dafs eines der ersten Mittel, eine zweckmäfsige Diät ist. Wer dieses Mittel als Arzt gehörig anzuwenden weifs, der wird gewifs seltener seinen Zweck verfehlen. Der Einfluſs, welchen eine unzweckmäfsige Geistes- und Körperdiät auf das Sehorgan hat, ist ungemein grofs. Im Allgemeinen ist bei den specifischen Augenentzündungen eine einfache reitzlose Geistes- und Leibesdiät die beste, die zweckmäfsigste; Gemüthsaffectionen deprimirender Art pflegen hier wenigstens ebenso nachtheilig zu sein, als Fehler im Essen und Trinken. Das zuträglichste Getränk für solche Kranke ist im Allgemeinen das Wasser, ja es unterstützt die Kur sogar, wenn es in Menge getrunken wird.

Da die *Phlogosis* im Allgemeinen auch im ersten Zeitraume einer specifischen *Ophthalmie* selten bedeutend ist, so erhellt daraus, dafs wir von der Anwendung des antiphlogistischen Heilapparates seltener Heil zu erwarten haben, als bei den reinen Augenentzündungen, und wo ein erstes Stadium gar nicht bemerkbar wird, da mufs ein antiphlogistisches Verfahren die *Causa specifica* nur begünstigen und die eigenthümliche Entzündung verstärken. Es giebt indefs Ausnahmen von dieser Regel; es giebt Fälle, wo anfangs die *Phlogosis* ungemein über das Specifische prädominirt, wo also auch kräftiger antiphlogistisch verfahren werden mufs; allein auch hier wird man ungestraft nicht zu weit gehen dürfen. In solchen Fällen dienen die Causalmomente der *Ophthalmie*, die Verhältnifse und die Körperconstitution des Leidenden, mit zur Richtschnur.

Im zweiten Zeitraume der Entzündung, in welchem gegen die specifische Krankheit zu Felde gezogen werden mufs, bedenke der Arzt vor Allem, dafs er nur selten im Stande ist, letztere bald aus dem Körper zu entfernen. Er wird nicht glücklich in Behandlung dieser Uebel sein, wenn er damit anfängt, die Gicht, den Rheumatismus, die Scrofeln, u. s. w. aus dem Körper im Allgemeinen zu vertilgen; vielmehr wird hier das Sehorgan schon destruirt sein, bevor auch selbst die besten Mittel im Stande waren, den eigenthümlichen Krankheitsprocefs des Körpers in so

weit zu mindern, dafs das im Auge haftende Leiden hier erlöscht. Es sei daher die erste Absicht des Augenheilkünstlers, den specifischen Krankheitsprocefs aus dem Auge zu locken; selbst dann, wenn es nur auf Unkosten eines unedleren Theiles des Körpers geschehen müfste. Mag er doch übrigens immerhin das Allgemeinleiden heilen oder mindern, je nachdem diefs in den Kräften der Kunst steht; er wird dann Recidive verhüten, und wird so seine Pflichten vollständig erfüllt haben. Aus jenem Grunde äufsern auch zur schnellen Heilung specifisch entzündlicher Krankheiten der Augen die örtlichen Mittel, die Hautreitze, so wie die ableitenden, Purgiren erregenden Mittel einen so mächtigen Einfluſs, und hinsichtlich der letztgenannten Klasse der Medicamente bemerkte schon Hippocrates mit Recht: *in alvi profluviis de capite pituita defluit.*

Von der catarrhalischen Augenentzündung, *Ophthalmia catarrhalis, catarrhosa.*

Zeichen der Krankheit. — Unter einem Gefühl von Brennen, röthen sich die Augenlieder ein wenig, die Augen werden lichtscheu, und scheinen ganz in Thränen zu schwimmen. Die Thränensecretion ist dabei nicht nur abnorm vermehrt, sondern hat auch eine Schärfe angenommen, mit welcher sie die berührten Theile röthet und wohl auch anschwellen macht. Zugleich klagen die meisten Kranken über ein drückendes Gefühl von Sand, welchen sie zwischen dem *Bulbus* und den Augenliedern zu haben glauben, und weſswegen sie die Augen auch öfters wischen. Nach und nach nehmen nun alle diese Symptome ab und die Meibomschen Drüsen fangen an, eine consistente weifse milde Masse abzusondern. Meistens beschränkt sich die catarrhalische Affection auf die Augenlieder; indefs nimmt manchmal auch die *Conjunctiva* des Augapfels Theil an der Entzündung, oder geht auch wohl gleich Anfangs von dieser aus, sie röthet sich ein wenig, die Lichtscheu vermehrt sich und es kommen auch wohl krampfhafte Verschliefsun-

gen der Augenlieder hinzu. Zuweilen pflanzt sich auch die Entzündung auf den Thränensack fort. Mit dieser Augenentzündung sind entweder die Zeichen von Catarrh mit und ohne Fieber vergesellschaftet, oder nicht. Die catarrhalische Ophthalmie exacerbirt übrigens gegen Abend und unterscheidet sich dadurch schon von der scrofulösen Augenentzündung, welche letztere zu dieser Zeit Remissionen macht.

Wenn die ursächlichen Verhältnisse neben dem catarrhalischen Leiden auch Rheumatismus zu begünstigen im Stande sind; so complicirt sich die catarrhalische Affection mit diesem, die *Conjunctiva bulbi* wird dann bedeutend roth, die Lichtscheu nimmt zu, das Auge thränt bei jedem Wechsel der Temperatur und des Lichtes, es stellt sich ein reifsender Schmerz im Auge und in der ganzen Umgegend ein, der sich durch Liegen auf Federbetten verschlimmert und die Remissionen, welche die rein catarrhalische Entzündung macht, fehlen hier fast gänzlich. Diefs sind die Symptome, welche eine catarrhalisch-rheumatische Augenentzündung charakterisiren.

Die Ursachen, sind die des gewöhnlichen Catarrhs.

Nafskalte Witterung, vorzüglich im Herbst und Frühjahr, bringt die Krankheit, bei vorhandener Disposition dazu, leicht hervor. Defswegen findet man sie in Gegenden, wo beständig nafskaltes Wetter herrscht, meistens endemisch. Indefs tritt die catarrhalische Ophthalmie nicht blofs bei schlechtem, sondern zuweilen auch bei warmen trocknem Wetter, und selbst epidemisch auf; woran dann wohl eine eigne, uns unbekannte, Mischung oder Entmischung der atmosphärischen Luft, oder, was im Grunde dasselbe sagen will, ein eigner Stoff Schuld sein mag, welcher fähig ist, die Krankheit hervorzurufen. Wenn neben jenen Causalmomenten rheumatische Anlage vorhanden, oder wenn örtliche oder allgemeine Erkältung vorherging, so entsteht leicht jene catarrhalisch-rheumatische Complication.

Die Vorhersage ist günstig; indefs macht sie bei

Complicationen mit Rheumatismen und bei Vernachlässigung, oder bei schlaffen, kraftlosen Alten, oft einen sehr langwierigen Verlauf, wo sie alsdann Jahre lang dauern und bei cachectischen Subjecten, nachdem die Comissuren der Augenlieder durchfressen worden, ein *Ectropium* hervorbringen kann, welches meist bei alten Leuten vorkommt und dann *Ectropium senile* genannt wird. Dem gemäfs wird auch die Augenentzündung selbst oft unter dem Namen *Ophthalmia senilis* aufgeführt.

Kur. — Bei Entstehung der Entzündung sind Umschläge von kaltem Wasser sehr nützlich. Wird sie sehr heftig, was jedoch seltener der Fall ist, so lege man Blutigel in den innern Augenwinkel. Dasselbe geschehe auch, wo eine Complication mit Rheumatismus zugegen, bei welcher überhaupt immer etwas mehr antiphlogistisch verfahren werden kann. Dabei ist die innere Behandlung wie bei Catarrh und Rheumatismus. Hat die Entzündung schon länger gedauert, sondern die Meibomschen Drüsen einen dicken Schleim ab; so gebe man gelinde diaphoretische Mittel, mit und ohne Kamphor, und lasse zugleich ein allgemeines warmes Verhalten beobachten. Aeufserlich lasse man leichte aromatische Kräuterkissen mit Kamphor*) gebrauchen, z. B.

℞. *Flor. Sambuc.*
— *Chammom.* āā ʒvj.
Camphor. trit. grv — ʒß.
C. M.

Sind Excoriationen der Augenliedränder mit schlechter Eiterung zugegen, was man oft bei alten Individuen und rheumatischer Complication vorfindet, so gebrauche man styptische Mittel, z. B. *Lap. divin.* in Auflösung mit *Opium*, oder

---

*) Bei sehr sensibeln Personen, besonders bei Frauenzimmern, wird der Camphor selten vertragen; in solchen Fällen ist die trockne, nicht aromatische Wärme am rechten Orte.

℞. *Hydr. mur. corr. gr j.*
Muc. Sem. cyd. ʒj.
Tincturae Opii croc. ℈ß — ʒj — ʒjß.
Aquae Rosar. ʒjv. — ʒvj.
M.

oder wenn dieſs nicht vertragen wird, adstringirende Salben, z. B. *Ungt. Janini*, die man dem mehr oder weniger erschlafften Zustande der Augenlieder anpassen muſs. Bei schwachen torpiden Kranken wirkt folgende Salbe vortrefflich: ℞. *Tut. praep. gr xv. Vitriol. alb. gr jß. Merc. praec. rub. gr vj. Butyr. rec. insuls.* ʒjj. *M.* Zugleich ist eine milde nährende Diät nothwendig.

Zuweilen bleibt bei Kindern und Personen weiblichen Geschlechts, nach catarrhalisch-rheumatischen Ophthalmien, eine gar groſse Sensibilität der Augen und Augenlieder zurück; jede Anstrengung des Sehorgans, oder Veränderungen in der Atmosphäre röthen die Augenliedränder, vorzüglich in den Augenwinkeln etwas, bringen geringe Lichtscheu hervor und verursachen manchmal Zucken und Zittern dieses oder jenes Augenliedes. Diese Zufälle dauern nicht selten bei Vernachlässigung Jahre lang. Trockne aromatische Kräuterkissen, mit und ohne Kamphor, adstringirende Salben mit *Opium*, u. s. w. oder *Tinct. Opii*, nützten entweder nichts, oder wurden nicht vertragen. Hier half mir der äuſsere Gebrauch der *Aqu. opii pur.*, oder wenn Feuchtigkeiten nicht vertragen wurden, eine Salbe von einem Theil *Pulv. Opii pur.* und drei Theilen Eidotter, mit welcher ich die Augenlieder oder die Supraorbitalgegend täglich 1 bis 3 mal einreiben lieſs. Auch habe ich hier folgendes Augenwasser höchst nützlich gefunden:

℞. *Zinc. sulphuric. gr jj.*
Aquae rosar. ʒjv.
Acet. saturn. ʒß.
Muc. Gummi arab. ʒjj.
M.

Die Augenlieder werden damit täglich einige Male, aber nur lauwarm gewaschen, und zwar so, daſs etwas

von dem Mittel selbst zwischen die Augenlieder dringt, Bei sensibeln Subjecten, und wo ein ewiges Zucken in dem Orbicularis empfunden wird, lasse ich diesem Wasser noch *Aqu. opii* 3*j*. zusetzen.

Wenn eine catarrhalische *Ophthalmie* sehr inveterirt ist und bei alten Personen sich vorfindet, auch bedeutend heftig ist, da sind *Vesicatoria* hinter den Ohren, und selbst noch kräftigere Hautreitze sehr nützlich, ja der vorsichtige Augenarzt wird diese oft früher anwenden als die Augenwässer und Salben, weil er dann eine wahre Gesichtsschwäche um so weniger zu fürchten hat, welche in Folge der Anwendung sehr styptischer Localmittel, wohl entstehen kann.

Wo eine Complication mit Scrofeln die Heilung der catarrhalischen *Ophthalmie* verzögert, da sind Calomelpurganzen besonders heilsam.

Von der ägyptischen Augenentzündung.

*Ophthalmia Aegyptiaca, Ophthalmia contagiosa, Ophthalmia Asiatica,**) nach Adams; fälschlich auch wohl *Ophthalmia bellica* oder *catarrhalis bellica* genannt.

Sie soll, nach Rust u. a., die gröfste Aehnlichkeit mit der catarrhalischen Augenentzündung haben, was bei geringern Graden des Uebels auch nicht zu verkennen ist.

Eine grofse Anzahl von Aerzten haben sie beschrieben, von denen ich hier nur Larrey, Desgenettes, Power, L. Frank, Assalini, Vetch, Farell, Adams, Helling, Lehmann, Baltz, Briggs, Ware, Laverini, Omodei, Vasani, Rust, Sprengel, v. Walther, Gräfe u. Müller anführe.

Man kann in practischer Hinsicht drei verschiedene Grade des Uebels annehmen. Im ersten Grade findet man die Bindehaut der Augenlieder allein, im zweiten, die Bindehaut der Augenlieder und der *Scle-*

---

*) Weil sie nicht nur in Aegypten, sondern auch in ganz Asien heimisch sein soll.

rotica, im dritten endlich, neben diesen die Bindehaut der *Cornea*, ja die Substanz der letzteren selbst, von der Entzündung ergriffen. Nach Rust soll das Uebel immer zuerst von den äufseren Gebilden des Auges seinen Anfang nehmen, und sich erst von hier aus auf die übrigen Parthien verbreiten. Die inneren Gebilde des Bulbus, als die Iris, die Aderhaut, die Crystalllinse, die Netzhaut und der Glaskörper werden nur höchst selten, nach Vielen niemals, direct von der Entzündung befallen, vielmehr giebt nur zuweilen das schnelle Umsichgreifen der Entzündung den Anschein, als seien diese gleichzeitig ergriffen worden.

Die Erscheinungen, unter welchen das Leiden im ersten Grade auftritt, sind folgende: Der Kranke hat, wie bei einer *Ophthalmia catarrhalis*, das Gefühl, als sei ihm etwas Sand unter das obere Augenlied gekommen, welches von einem leichten Schmerze, besonders in der Gegend des äufseren Augenwinkels begleitet ist; die Thränenabsonderung ist vermehrt und das Auge hat ein eigenes mattes, gleichsam glasartiges Ansehn. In den Rändern der Augenlieder empfindet der Kranke ein Jucken und Brennen, wobei die Bindehaut derselben nur wenig geröthet und angeschwollen erscheint; die gegenwärtige Lichtscheu ist geringe und Kopfschmerzen fehlen in der Regel hier gänzlich. Im späteren Verlaufe dieses leichteren Grades der Entzündung wird ein weifslicher, flockenförmiger Schleim, der sich besonders in den Augenwinkeln lagert, bemerkbar. In den mehresten Fällen ist anfangs nur ein Auge afficirt, meistens das rechte, und nur erst im Verlaufe des Uebels wird auch das andere ergriffen. In günstigen Fällen und bei kräftigen, an keinen Dyscrasien leidenden Naturen, bei möglichster Wegschaffung der ursächlichen Momente und bei zweckmäfsiger Behandlung überhaupt, verschwinden die angeführten Symptome nach 7 bis 14 bis 21 Tagen, und das Sehorgan kehrt zu dem Normalzustande zurück, obgleich auch hier das Wiederkommen der Entzündung zu fürchten steht.

Wo dieser leichtere Grad des Uebels in den zwei-

ten heftigeren übergeht, oder gleich anfangs als solcher auftritt, da sind insgemein beide Augen zugleich entzündet. Die Röthe der äufseren Fläche der Augenlieder, so wie deren Bindehaut, und die Geschwulst und Spannung derselben sind bedeutender, die Lichtscheu viel heftiger und das Jucken und Brennen in den Augen fast unerträglich. Insgemein exacerbirt das Leiden zur Abendzeit, wo besonders ein heftiger Kopfschmerz über der Augenbraunengegend, nach dem Laufe des oberen Augenhöhlennerven hinzukommt, der, immer zunehmend, gegen Mitternacht am stärksten wird, dann aber bei vermehrtem Thränenflusse und verminderter Lichtscheu mit allen angeführten Symptomen nachläfst. Untersucht man am anderen Tage die Augen, so findet man nicht nur die ganze Bindehaut der Augenlieder, sondern auch die der *Sclerotica* gleichmäfsig, aber nur blafs, mehr ziegel- als blutfarbig geröthet, die Augenlieder angeschwollen und hat es das Ansehn, als wenn der Kranke heftig und anhaltend geweint hätte. Dabei erscheint die Röthe selbst fein sammetartig.

Das Uebel bleibt nun entweder längere oder kürzere Zeit bei diesem Grade, in welchem Falle sich mit Abnahme der Lichtscheu eine Blepharoblennorrhoe entwickelt, die zu den hartnäckigsten gehört, mit starker Anschwellung der Bindehaut verbunden ist, und zu organischen Fehlern der Augenlieder Veranlassung giebt, oder es geht zu dem ersten Grade zurück und verschwindet, oder endlich es nimmt zu und schreitet nach einem unbestimmten Zeitraume in den dritten, sogenannten chemotischen Grad der Entzündung über.

Bei der längere Zeit dauernden *Ophthalmie* des zweiten Grades entstehen die so famös gewordenen körnerartigen, dunkelfarbigen Substanzwucherungen in der Bindehaut der Augenlieder, welche Monate, ja Jahre lang dauern können, förmlich habituell werden, und, nach Veränderung der Witterung, bald zu- bald abnehmen, wenig empfindlich zu sein pflegen und dem Arzte stets anzeigen müssen, dafs sein Kranker nicht nur vor schlimmen Recidiven der Entzündung gar nicht

sicher ist, sondern dafs der letztere hier auch das eigne *Contagium* noch im Auge trägt, welches im Stande ist, sich unter übrigens günstigen Bedingungen weiter zu verbreiten.

Der dritte Grad dieser furchtbaren Krankheit entsteht entweder ganz plötzlich, kann dann in wenigen Tagen die *Cornea* zerstören, erscheint wohl gar unter der Form einer bedeutenden *Iritis* mit Delirien, starkem Fieber und Gefahr vor *Encephalitis*, wie Omodei (*Cenni sull' ottalmia contagiosa d' Egitto e sulla sua propagazione in Italia. Milano.* 1816. *p.* 114.) u. a. A. bemerkten, oder er entwickelt sich erst, nachdem das Uebel längere Zeit in dem zweiten Grade stehen geblieben, auch wohl in etwas zurückgeschritten war, indem es nun, bei gegebener Veranlassung, mit grofser Heftigkeit wieder ausbricht und den Augapfel anzugreifen beginnt. Zuweilen kündigt sich dieser Uebergang durch eine leichte schmerzhafte Empfindung an; oft aber, und gewöhnlich immer zur Nachtzeit, geschieht diese Ankündigung unter sehr beunruhigenden Zufällen, ohne das sonstige allgemeine Wohlbefinden zu stören.

Unter den heftigsten Schmerzen, die besonders die Stirn- und Schläfegegend einnehmen und sich bis zum Hinterkopfe erstrecken, unter Lichtscheu und zuweilen unter vollkommenem Unvermögen, die Augenlieder zu bewegen, schwillt die Bindehaut der *Sclerotica* an, erhebt sich mit starken, unförmlichen, wulstartigen Hervorragungen gegen die Spalte der Augenlieder, schliefst wallartig den Rand der Hornhaut ein und schlägt sich auch wohl mehr oder weniger über denselben herüber. Bald, und in den meisten Fällen, wird die Schleimabsonderung aus der entzündeten Bindehaut mehr oder weniger stark; doch ist sie anfangs dünner, sparsamer, später dicker, copiöser und eiterartiger, das Bindehautblättchen der Hornhaut schwillt auf, und diese wird in einem solchen Grade getrübt, dafs das Sehvermögen dadurch sehr beschränkt, nur zum Theil und auf lange Zeit, oder gänzlich aufgehoben wird. Nicht selten wird die Substanz der Horn-

haut selbst angegriffen: ihre Lamellen fangen an zuerst am Rande sich aufzulockern, schwellen an, werden immer trüber, undurchsichtiger, weifser, verwandeln sich in einen Eiterstock und bersten endlich, wodurch Vorfälle der *Iris*, Staphylome, ja noch gröfsere Destructionen des Bulbus verursacht werden, wenn ein progressiver Fortgang des Geschwürs Statt findet, und die Feuchtigkeiten des Auges ausfliefsen. Zuweilen wird auch nur ein Theil der *Cornea* ergriffen und getrübt, oder es bilden sich an einzelnen Stellen derselben Geschwüre, die oft sehr schnell die Hornhaut durchfressen und kleinere oder gröfsere Vorfälle der *Iris* veranlassen. In den schlimmsten Fällen sind die äufseren und inneren Gebilde des Augapfels vereinigt und auf das heftigste von der Entzündung ergriffen, der ganze Augapfel verwandelt sich dann in wenigen Tagen, ja in wenigen Stunden, in ein Schleim und Eiter absonderndes Organ, und das Sehvermögen ist unwiederbringlich verloren. Es ist merkwürdig, dafs auch dann, wenn der ganze Augapfel durch die Entzündung zerstört worden ist, die Zufälle nicht wie nach anderen Augenentzündungen verschwinden: denn immer wird der entzündliche Zustand Monate lang und länger noch in der Bindehaut der Augenlieder hausen, neue Anfälle veranlassen und organische Fehler der Augenlieder erzeugen können, wenn nicht durch ein zweckmäfsiges Verfahren dieses verhindert wird.

Geht auch die Entzündung nach und nach zurück, ohne den ganzen Augapfel mehr oder weniger verwüstet oder die Hornhaut getrübt zu haben, so bleibt doch nicht selten eine *Amblyopia amaurotica* zurück, welche allen Mitteln widersteht und die, wie die Sectionsberichte des Herrn v. Walther (über die contagiöse Augenentzündung in Graefe und v. Walther's Journal, Bd. II.) lehren, in dem partiell entzündlichen Zustande der *Chorioidea*, welche nach ihm theilweise ihres Pigments beraubt, violett und roth gefleckt erschien, auch an einzelnen Stellen mit der *Retina* verwachsen war, begründet ist.

Die Dauer dieser in ihren Folgen so furchtbaren Krankheit ist durchaus nicht zu bestimmen. Sie kann in wenigen Tagen verschwinden, aber auch viele Monate lang fortbestehen. Im ersten Grade ist sie häufig chronisch, nimmt oft auf einmal einen acuten Verlauf an, und wird dann wieder chronisch; oft ist es gerade umgekehrt. Oft tritt die Blennorrhoe sehr bald ein, oft später. Es können Wochen und Monate vergehen, ehe die *Cornea* oder der ganze Bulbus zerstört wird; es kann dieses aber auch in einer einzigen Nacht geschehen.

Uebrigens mufs ich bemerken, dafs sich die verschiedenen Epidemien dieser Entzündung nicht immer auf eine und dieselbe Weise geäufsert haben, welches zum Theil wohl in der Verschiedenheit des Clima, zum Theil aber auch in der Verschiedenheit der Völker, welche davon befallen wurden, seinen Grund gehabt haben mag.

Der Nachübel, welche diese Krankheit hinterläfst, sind viele und mancherlei. Die gewöhnlichsten und häufigsten sind partielle oder totale Hornhautstaphylome, Trübheit der *Cornea*, *Hypopien*, Mifsstaltungen der Augenlieder und anhaltende Lichtscheu, bei chronischer Röthung und körnigter Auflockerung der *Conjunctiva palpebrarum*. Letztere ist, wie bereits gesagt, ein sehr constantes Ueberbleibsel, welches, so lange es vorhanden ist, die Furcht vor Recidiven gar sehr begründet. Zuweilen nur sind cataractöse Linsen, Amaurosen, Nyctalopien und Thränensackfisteln die Folgen dieser Entzündung.

Die nächste Ursache dieser Augenentzündung ist ein *Contagium* eigener Art, welches sich durch einen *Confluxus* ihm günstiger Umstände in Aegypten seit langer Zeit schon erzeugt haben mag; wenigstens schildert die Krankheit im 16ten Jahrhundert schon Prosper Albinus,*) ebenso Avicenna. Welche Umstände dieses aber sind, darüber sind die Aerzte

---

*) *De medic. Aegypt. lib.* 1. *cap.* 7. 13. *et* 14.

noch nicht einig. Afsalini, Vetch, u. m. a. A. sind der Meinung, dafs der Einfluſs des Clima's und die Lebensart der Menschen, unter übrigens begünstigenden Umständen, bei uns eben so gut diese *Ophthalmie* hervor bringen könne als in Aegypten. Larrey*) u. a. glauben, dafs das brennende Sonnenlicht von oben und der Reflex desselben von dem weifsen Boden in Aegypten, in Verbindung mit den kalten neblichten Nächten, die Hautausdünstung zurückgetrieben und dadurch auf die Augen so nachtheilig gewirkt hätten. Ebenso mögen der Mifsbrauch geistiger Getränke und des Beischlafes, in die Augen gerathener Staub, u. s. w. dazu beigetragen haben. Das rechte Auge wurde bei den bivouakirenden Soldaten in Aegypten am leichtesten befallen, weil sie auf der rechten Seite besonders zu schlafen pflegten und daher dieſs Auge den kalten Ausdünstungen des Bodens vorzüglich ausgesetzt wurde. Blonde wurden häufiger befallen als braune.

Larrey, L. Frank, Baltz und einige andere Aerzte erkennen die Contagiosität dieser Krankheit eigentlich nur zum Theil nicht an. Viele Aerzte, unter andern Adams, Omodei, Rust, etc. glauben, dafs das Uebel nur durch Infection entstehe; sie sagen, das Contagium erzeuge sich bei uns niemals, vielmehr sei es nur aus Aegypten durch Soldaten fast nach allen Ländern Europa's geschleppt worden.

Der Glaube an die Contagiosität der Entzündung ist überhaupt nicht allgemein; die Franzosen gestatten sie im Allgemeinen nicht, sondern geben nur zu, dafs sich die Krankheit durch Uebertragung der eitrigen Materie, welche sich während der Entzündung absondert, fortpflanzen könne. Dahingegen sind die meisten englischen, italienischen und deutschen Aerzte von der Contagiosität des Leidens überzeugt, indem dafür eine ungeheure Menge Thatsachen sprechen. Doch scheint das *Contagium* fixer Natur zu sein, und

---

*) *Rélation historique et chirurgicale de l' armée d' Orient, en Egypte et en Syrie etc. à Paris* 1803.

daher fast immer ein engeres Beisammensein zur Uebertragung der Krankheit zu gehören. Es hängt den Kleidungsstücken etc. an, und soll in dem eiterartigen Schleime enthalten sein, welchen die Bindehaut oder das Auge selbst producirt; es soll endlich möglich sein, dafs das *Contagium* durch die Luft fortgepflanzt werde. Wer einmal die Krankheit überstanden hat, ist dadurch vor einer folgenden Ansteckung keinesweges geschützt.

Vielleicht liegt auch hier die Wahrheit in der Mitte.

Im Allgemeinen ist wohl anzunehmen, dafs die Contagiosität dieser Krankheit erwiesen ist; dafs der Ansteckungsstoff anfangs nur in der Bindehaut lagert und dafs er durch die Entzündung reproducirt wird; dafs ferner die contagiöse Natur des Uebels aus einer nicht ansteckenden Epidemie höchst wahrscheinlich auf eine ähnliche Weise sich entwickelt, wie wir den ansteckenden Typhus aus einem gutartigen rheumatisch-catarrhalischen Fieber entstehen und sich verbreiten sehen; dafs die Ansteckungskraft durch das Beisammensein vieler Individuen geweckt und vermehrt wird; dafs endlich nicht das unmittelbare Uebertragen des Augenschleimes, sondern schon das längere Beisammensein von an der *Ophthalmie* Leidenden, hinreichend ist, um bei übrigens vorhandener Disposition zu dem Uebel, dieses auf andere fortzupflanzen, obgleich ein kurzes Zusammensein und Berühren der Augen mit den Fingern, nicht hinreichend zu sein scheint, um Ansteckung zu erzeugen.

Man nennt das Uebel mit Recht ägyptische Augenentzündung, weil es offenbar in Folge der Expedition Bonaparte's nach diesem Lande durch die französischen Truppen nach Europa geschleppt wurde. Zu derselben Zeit brachten es auch die englischen Truppen in ihr Vaterland. Durch die späterhin von diesen Mächten geführten Kriege, wurde das Leiden unter den Soldaten fast aller europäischen Länder und selbst unter viele Nichtsoldaten verbreitet, wodurch eine ungeheure Anzahl Menschen, ganz oder theilweise, das Gesicht verloren. Die Zahl der in der englischen

Armee

Armee erblindeten Soldaten, war, wie Adams berichtet, fast 5000.

Die Prognose ist nach dem Grade der Heftigkeit der Entzündung und der Rein- oder Uebelsaftigkeit der befallenen Personen, verschieden. Leichte Grade werden oft in 7 bis 11 Tagen auch ohne Kunsthülfe gehoben. Heftigere Grade dagegen, sind oft nicht nur weit hartnäckiger und langwieriger, sondern hinterlassen auch gar leicht diesen oder jenen Augenfehler, welcher das gute Gesicht entweder beeinträchtigt oder auch völlig vernichtet. Am schlimmsten ist die Prognose bei dyscrasischen, besonders scrofulösen Subjecten. Die Krankheit kann jedes Alter, jedes Geschlecht, jeden Stand und jede Körperconstitution befallen. Zu den vorzüglichsten Folgen dieser Entzündung gehören: chronische Lichtscheu, chronische Röthe der Augenlieder, abnorme Schleimsecretion derselben, Wucherungen in der Bindehaut, Ectropia, Geschwüre, Abscesse, Verdunkelungen und Vereiterungen der Hornhaut, partielle und totale Hornhautstaphylome, Pupillenfehler, Synechien, Amaurosen, u. s. w. Bei alle dem ist die Vorhersage im ersten Grade des Uebels zwar zweifelhaft, doch günstiger als im zweiten; im dritten Grade aber höchst unsicher und traurig. — Man hat übrigens beobachtet, dafs die Epidemien bei ihrem Beginnen und bei ihrem baldigen Aufhören einen milderen Charakter zeigten, als in der Mitte des Verlaufs derselben.

Da das Uebel contagiöser Natur und vorzüglich den Militärärzten zu behandeln überlassen ist, weil meistentheils nur der Soldat davon befallen wird: so ist auch vor allem die strengste Sonderung der leidenden von den gesunden Individuen und ihrer Effecten, so wie die strengste Reinigung beider, der erste Vorwurf der Behandlung. Dadurch wird fast zugleich auch die erste Indication: nämlich die Beseitigung und fernere Abhaltung der äufsern Schädlichkeiten, unter denen die Krankheit entstand, mit bedungen und erfüllt.*)

*) Zur möglichsten Verhütung der Krankheit hat besonders William Adams ausführlichere Vorschläge gethan,

Ferner muſs die Diät der Kranken gehörig eingerichtet werden und den anzuwendenden Mitteln nicht widersprechen. Licht und Temperatur müssen im Hospitale zweckmäſsig sein. Man sorge deſswegen für ein reines, nicht heiſses Zimmer, welches reine Luft, aber keine Zugluft hat; man sorge für reine Wäsche und hüte sich, das Zimmer mit dergleichen Augenkranken zu überladen; man mäſsige das Licht durch graue oder grüne Vorhänge, gebe den Kranken einen, aus Notenpapier gefertigten, mit grünem Taffet überzogenen Augenschirm und vermeide jede Erkältung, jeden Rauch, Staub und andere Unreinlichkeiten. Die Diät muſs im Allgemeinen mager, antiphlogistisch sein, doch modificirt durch die Gewohnheit und die mehr sthenische oder asthenische Constitution des Leidenden.

Bei dem ersten Grade des Uebels scheint ein mehr passives Verhalten von Seiten des Arztes, Vorzüge zu haben. Umschläge von Quellwasser oder von einem einfachen Augenwasser mit etwas Opium und Schleim, späterhin aber Wasser mit Opiumtinctur und Bleiextract versetzt, alles kalt, niemals warm angewendet, scheinen zur Tilgung dieses Grades hinzureichen. Zuweilen ist auch ein Brechmittel, als Gegenreitz dienend, nützlich befunden worden.

Der zweite Grad des Uebels, welcher sich durch gröſsere Entzündung auszeichnet, und der dritte Grad, welcher diesen darin noch übertrifft, scheinen mit Berücksichtigung des Individui, im Entstehen der Entzündung streng antiphlogistisch behandelt werden zu müssen.*) Daher lasse man kräftig und, wo es angeht, bis zur Ohnmacht, zur Ader. Ebenso ist die *Arteriotomie* von Deutschen, besonders aber von Engländern,

---

in: *A Letter to the right honourable and honourable the Directors of Greenwich Hospital etc. for the Extermination of the Egyptian Ophthalmia etc. London,* 1817.

*) Gegen dieses Verfahren stimmen nur einige wenige Aerzte, unter andern auch Ludwig Frank, der Neffe des verstorbenen berühmten Peter Frank, und neben Rust, Müller und Baltz, einer der neuesten Schriftsteller über

welche gleich ein ganzes Stück aus der Temporalarterie ausschneiden, sehr gerühmt worden. Bei Neigung zu Hämorrhoidalcongestionen versäume man nicht, Blutigel am *Ano* anzulegen. Unmittelbar nach dem Aderlasse reiche man ein Purganz aus 6 bis 10 Granen *Calomel*, 30 Granen Jalappenwurzel mit eben so viel Zucker, welches nach Umständen wiederhohlt gegeben werden kann. Man mache kalte Wasserumschläge auf Kopf und Augen, warme reitzende Senf-Fufsbäder, lege ein *Vesicatorium*, vielleicht auch *Empl. stibiatum*, in den Nacken. Die kalten Umschläge sind bei vielen Kranken 14 bis 21 Tage hindurch ununterbrochen mit dem besten Erfolge angewendet worden.

Nach dem Nachlassen der Entzündung und nach Abnahme der Lichtscheu ist das oben angeführte, kalt anzuwendende Augenwasser mit *Ra opii* und *Aceto saturn.* das einzige, welches vor der Hand vertragen zu werden scheint. Nur bei Complication mit Catarrh oder Rheuma, pflegen die kalten Umschläge nicht vertragen zu werden. Diese Complication mag es auch besonders sein, bei welcher Rust u. a. nach vorgängigem Aderlasse und nach bereits gegebenen Mercuriallaxanzen, schweifstreibende Mittel, z. B. warme Bäder, *Liq. ammon. acet.* mit Thee von *Flor. sambuci etc.* so heilsam fanden, wenn allgemeine Schweifse darauf ausbrachen.

Die Anwendung reitzender Augenwässer hat die Erfahrung in diesem Zeitraume als nachtheilig verworfen.

Wenn aller dieser, nach Vorschrift gebrauchten Mittel ungeachtet, die Entzündung in das blennorrhoische Stadium übergeht, in welchem eine eiterartige Schleimsecretion, ja wahre Eitererzeugung auftritt; so

---

unseren Gegenstand. (De Peste, *Dysenteria et Ophthalmia Aegyptiaca. Viennae*, 1820.) Er sucht die Ursache des Uebels in der, Salzsäure enthaltenden Atmosphäre Aegyptens, und gebrauchte aromatische Dämpfe, Fufsbäder, Vesicatoria, *Ungt. ophthalmic. Sti Yvesii*, reitzende Diät, *China*, *Calomel*, gab das *Opium* in starken Dosen und liefs alles helle Licht vermeiden.

kann die Anwendung der Kälte nicht nur nichts nützen, sondern mehr schaden. Jetzt ist es Zeit, Mittel zu gebrauchen, welche die Schärfe des sich erzeugenden Schleimes abstumpfen, die Menge desselben vermindern und die gesunkene Thätigkeit der Blut- und Saugadern heben. Man reinige daher die Augen vorsichtig von dem Schleime mittelst einer lauwarmen Malven- oder Fliederabkochung.*)

Die Mittel, welche im Stande sind, die übermäfsige Absonderung des Schleimes zu mindern, sind bekannt. Es gehören dahin: die Blei-, die Mercurial-, die Kupferpräparate, die Bolusarten, Alaun, u. v. a.

Obgleich die Zulässigkeit ihrer Anwendung hier nicht von allen Aerzten gebilligt wird; so haben sie sich doch, laut vieler Schriften über diese Krankheit, oft sehr wirksam bewiesen, nur mufs nicht zu zeitig mit ihnen angefangen und die Sensibilität, so wie die Individualität des Subjects überhaupt und die des Sehorgans in's besondere, stets gehörig gewürdigt werden, wenn die Mittel nicht hier zu stark, zu häufig und dort zu schwach und zu selten gebraucht werden sollen. Wo die Salbenform nicht vertragen wird, da mufs die flüssige Form gewählt werden. Ueberhaupt ist hier das gehörig zu berücksichtigen, was Adam Schmidt (a. a. O. B. 3. S. 1. etc.) über die Schleimsecretion der *Conjunctiva* als Krankheit und über deren Heilmittel gesagt hat. Man gehe defswegen von den weniger styptischen zu den mehr styptischen Mitteln stufenweise und vorsichtig über. Besonders heilsam haben sich die Quecksilbermittel erwiesen. Man gebrauche sie entweder in Salbenform, oder, wo fette Dinge nicht gut vertragen werden, in flüssiger Form, z. B. schwache

---

*) Erweichende Umschläge aus Leinsaamen, Mohnköpfen und Safran anzuwenden, wie Larrey u. a. empfohlen, tadelt Vasani (*Storia dell' ottalmia contagiosa dello spedale militare d' Ancona. Verona*, 1816. *pag.* 87.) heftig, indem er von allen *Cataplasmen* im Spitale von Ancona nur Nachtheil gesehen haben will. Ich stimme ihm bei, weil dadurch die Eiterung, und mit ihr die Destruction des Bulbus nur befördert werden mufs.

Sublimatsolutionen mit *Laud. liq. S.* Auch hat man eine Auflösung des *Lap. divin.* mit *Laud. liq.* empfohlen.

Bei Gefahr einer gänzlichen Zerstörung des Auges durch Eiterung, und überhaupt bei Subjecten, bei denen die allgemeine Lebensthätigkeit erschöpft darniederliegt, müssen neben den örtlichen Mitteln auch innere, allgemein wirkende gebraucht werden, unter welchen letzteren *China, Valeriana, Calamus arom.*, Nelkenwurzeln und *Ratanhia*, nach Umständen und bei übermäfsig gesteigerter Sensibilität, mit *Opium* und ähnl. M. als die vorzüglichsten zu nennen sind. Wenn Dyscrasien die Krankheit unterhalten, da wird der anhaltende Gebrauch innerer umstimmender Medicamente nothwendig; zu den in dieser Hinsicht am meisten empfohlenen gehören: *Calomel, Pulv. Plummeri, Guajac, Sulph. praecip., Aethiops. antimon, etc.*, welche, mit Berücksichtigung der Individualität des Subjects, auszuwählen sind.

Die heftigen nächtlichen Kopf- und Augenschmerzen, an denen die Kranken öfters leiden, suche man durch *Extr. hyoscyami* mit *Calomel* innerlich, und durch Einreibungen über die Augenbraunen von *Calomel* und *Opium* mittelst Speichel, so wie durch Brechmittel zu mildern und zu heben. Hornhautgeschwüre erfordern die sorgfältige Anwendung einer Auflösung des *Lapidis divini in aqua* mit vielem *Laud. liquid. Sydenh.*, und mit etwas *Acet. saturninum* versetzt; sarcomatöse Anwulstungen oder Umstülpungen der Augenlieder, den topischen Gebrauch des reinen *Laud. liquid.*, wo dieses unwirksam, das Betupfen mit *Lap. infernal.*, und wo auch dieses nicht hinreicht, das vorherige Scarificiren oder das Wegschneiden der sarcomatösen Granulationen.

Im chronischen Stadio der Entzündung und wenn sonst nichts entgegen steht, empfiehlt Rust*) folgende Salbe:

---

*) Die aegyptische Augenentzündung unter der königl. preufs. Besatzung in Mainz. Berlin, 1820.

℞. *Merc. praec. rubr. gr. vj.*
Butyr. rec. ins. ʒjj.
Acet. Saturnin.
Tinct. opii croc. āā. ʒß.
M. exactissime donec omnis humiditas disparuerit ut f. ungt.

Bei zurückgebliebener habitueller Lichtscheu, leisten starke Auflösungen von Borax oder Alaun als Fomentationen über das Auge, gute Dienste.

Adams befolgte neuerlich bei der *Ophthalm. aegypt.* eine besondere Methode, deren Resultate günstig waren. Nachdem er nämlich tüchtig zur Ader gelassen und dann ein Vomitiv gegeben hat, verordnet er eine Ekelkur durch kleine Gaben *Tartar. emetic.*, welche so lange fortgesetzt wird, bis der Patient in einen Zustand von völliger Schwäche gekommen ist.

Noch ist zu bemerken, dafs nach Ablauf einer Epidemie die während derselben gebrauchten Utensilien auf das sorgfältigste gereinigt, oder, wenn sie ohne Werth sind, lieber gänzlich vernichtet werden müssen; dafs endlich die Krankenzimmer, welche die Soldaten inne gehabt haben, frisch geweifst, so wie auf alle mögliche Art gereinigt werden müssen, um alle weitere Verbreitung des Uebels zu verhüten; aus demselben Grunde ist es auch rathsam, die Reconvalescenten erst 40 Tage nach völligem Erlöschen der Entzündung, mit den gesunden zusammenzubringen. Ueberhaupt mufs man bei Behandlung dieses Uebels immer bedenken: dafs nur nach gänzlicher Beseitigung der sarcomatösen Wucherungen, nach völliger Entfernung aller Röthe in der Conjunctiva, die Gefahr vor Ansteckung und vor Recidiven entfernt zu sein pflegt. Die ängstlichste Vorsicht ist daher bei diesem furchtbaren Uebel niemals zu mifsbilligen.

Von der rheumatischen Augenentzündung, *Ophthalmia rheumatica.*

Zeichen derselben in dem ersten Zeitraume. — Unter einem stechenden, reifsenden, in der Wärme

und in Federbetten sehr auffallend zunehmenden Schmerz des Auges und der ganzen Umgegend, während eines, bei jedem Wechsel der Temperatur erscheinenden, heftigen und scharfen Thränenflusses, *Epiphora*, und unter sehr starker Lichtscheu, röthet sich die *Conjunctiva bulbi* und mit ihr die *Sclerotica*, welche rosenroth unter der, bei dem Verschieben der Augendecken sich bewegenden, gefäfsreichen Bindehaut (deren Blutgefäfse sich an manchen Stellen zu häufen scheinen) hervorschimmert. Die am meisten hervorstechend charakteristischen Symptome dieser *Ophthalmie*, sind der Thränenfluſs und die Lichtscheu.

Die rheumatische Augenentzündung ergreift fast immer nur die äufsern Häute des Augapfels und erscheint also als *Ophthalmitis externa*; zuweilen wird jedoch auch die *Iris* entzündlich afficirt. Die Augenliederdrüsen bleiben meistens verschont; es sei denn, dafs Complicationen zugleich vorhanden wären. Oft ist die Röthe des Auges sehr gering und der Schmerz aufserordentlich heftig.

Symptome des zweiten Zeitraumes. — Die Röthe des Auges nimmt immer mehr zu und die Gefäfsbündel der *Conjunctiva* werden deutlicher. Die Schmerzen verbreiten sich mehr, selbst bis in den Kopf und Kiefer, der Thränenfluſs nimmt zu, obschon die Lichtscheu sich bedeutend mindert und jetzt nur bei plötzlicher Verstärkung des Lichtes auffallend wird. Es entstehen kleine Wasserbläschen, *Phlyctaenulae*, auf der *Cornea* oder auf dem Weifsen des Auges, und die Hornhaut wird etwas glanzlos und trübe. Die Bläschen bersten endlich und verwandeln sich, unter heftigen Schmerzen, in dünne, fressende Flüssigkeit absondernde Geschwüre, welche das Ansehen haben, als sei aus der Oberfläche der *Cornea* ein Stückchen herausgerissen. Sie lassen selten Narben, meistens Grübchen (Facetten) zurück, die sich indefs bei gesunden Subjecten bald ausfüllen. Auch an der innern concaven Fläche der Hornhaut, will man ähnliche Geschwüre gesehen haben, z. B. Mauchart*), wobei dann die wäss-

*) *Disput. chir. selectae Halleri. Tom. I. pag.* 405.

rige Feuchtigkeit in der vorderen Augenkammer getrübt war.

Nicht gar selten ist die rheumatische *Ophthalmie* mit Scrofeln complicirt, welche Complication besonders dann unangenehm ist, wenn sie sich bei schwächlichen, ausgemergelten Menschen, vorfindet. Man vermuthet sie nicht allein, wenn ein scrofulöser Habitus oder wirkliche Scrofelkrankheit vorhanden ist, sondern man bemerkt sie auch im Auge, indem die gegenwärtigen Symptome, theils der rheumatischen, theils der scrofulösen Augenentzündung angehören; bei aufgeschwemmten, pastösen, phlegmatischen Individuen aber, wird diese Complication insgemein dadurch im Auge noch bemerkbar, dafs die Hornhautgeschwüre nicht wie bei der einfachen rheumatischen *Ophthalmie* eine durchsichtige, gauchigte, lymphähnliche Flüssigkeit, sondern eine mehr undurchsichtige, gelbliche, eiterartige Masse, secerniren. Zuweilen zeigt sich diese Complication auch durch ein pannöses Ueberspinnen von Gefäfsen, über einen Theil oder über die ganze Hornhaut, in welchem Falle dann selten Hornhautgeschwüre zu entstehen pflegen. Hier ist der Verlauf der ganzen Krankheit immer langwieriger, und die Trübungen der *Cornea* sind oft nur bei der ausdauerndsten Geduld, nach Beseitigung des dyscrasischen Ausspruches im Auge, durch örtliche Mittel zu heben.

Die Ursachen der *Ophthal. rheum.* kommen mit denen, welche Rheumatismus im Allgemeinen erzeugen können, überein, z. B. Witterungsveränderungen, Erkältungen bei schwitzendem Haupte, ein kalter Luftzug welcher das Auge unmittelbar trifft, u. s. w. Bei rheumatischer Disposition kann sich jede reine Entzündung der *Conjunctiva* und *Sclerotica* in eine rheumatische Augenentzündung umwandeln; vorzüglich sind aber die inflammatorischen Zustände, nach Beer, dazu geschickt, welche einen rosenartigen Charakter haben.

Die Vorhersage im ersten Zeitraum ist günstig, nur darf sich die Entzündung nicht mit Gicht complicirен. Im zweiten Stadio ist die Prognose schon ungünstiger, weil die Grübchen, welche die jauchigten

Geschwüre in die *Cornea* machen, gern zurückbleiben, und das Gesicht beschränken, Doppeltsehen erregen können, oder gar Flecke und Narben der Hornhaut, die zuweilen das Sehen verhindern, hinterlassen. Bei robusten und gesunden Menschen verschwinden jene Facetten aber meistens bald.

Kur. — Im ersten Zeitraume und wenn die Entzündung ziemlich heftig, der Schmerz sehr stark ist, kann man mehrere Blutigel an das Auge, besonders in die Gegend des inneren Augenwinkels, legen; ja bei sehr heftigen Entzündungen, wenn rheumatisches Fieber damit vergesellschaftet ist, und bei robusten, blutreichen Constitutionen wird oft ein Aderlafs nöthig. Umschläge von kaltem Wasser wirken nur beim ersten Beginnen der *Ophthalmie* und bei noch vollkommen trockner Haut, heilsam, wogegen sie späterhin niemals vertragen werden. Bei Scrofelcomplication darf der antiphlogistische Heilapparat niemals so kräftig gehandhabt werden. Innerlich reiche man schweifstreibende Arzneien, unter denen folgende ungefähr die wirksamsten sind: *Ammon. acet.*, *Ammon. muriatic.*, *Tart. stib.*, welche Mittel gegen Ende dieses Zeitraumes mit gelind abführenden Medicamenten verbunden werden können. Besonders heilsam zeigte sich mir gegen Ende des ersten und zu Anfange des zweiten Zeitraumes *Calomel* mit *Sulph. aur. ant.* in Laxieren erregenden Gaben.

Obgleich im zweiten Stadio der *Ophthalmie* jene inneren schweifstreibenden Mittel noch fortgereicht werden können; so sind doch nicht selten stärkere nothwendig. Zu diesen gehören vorzüglich *Guajac*, *Hba aconit.*, *Camphor*, *Arnica*, *Senega* und, wo das *Rheuma* mit Scrofeln verbunden: *Antimonialia*, das *Conium maculat.* und die *Dulcamara*; wo endlich Hämorrhoidalcongestionen das Leiden unterhalten, da ist *Sulph. praecip.* mit *Gummi guajaci* und *Tart. tartar.* angezeigt.

Zu gleicher Zeit verordne man Senffufsbäder, lege *Vesicatoria* oder die, häufig noch besser wirkenden, Senfteige in den Nacken oder hinter die Ohren, und sind die rheumatischen Schmerzen im Auge und dessen Um-

gebungen sehr heftig und anhaltend, so lasse man *Pulv. Opii puri* mit Speichel über die Augenbraunen einreiben. Aeufserlich sind aromatische Kräuterkissen mit Kamphor, welche leicht und gut durchnähet sein müssen, sehr nützlich. Sieht man schon wässrige Geschwüre der Bindehaut, der *Sclerotica* oder *Cornea*; so lasse man ein Augenwasser mit *Lap. divin.* und viel *Laud. liquid.* gebrauchen. Sind die Geschwüre schon bedeutend grofs und deren mehrere auf der *Cornea* vorhanden; dann mufs man reines *Laud. liquid. Syd.* täglich wenigstens einmal, mittelst eines feinen Haarpinsels auf die exulcerirte Stelle streichen, und nach dem jedesmaligen Waschen mit der Auflösung des *Lapis divin.* warme trockne aromatische Kräuterkissen, mit Kamphor bestrichen, fleifsig überlegen lassen, ohne jedoch den Zutritt einer reinen trocknen und warmen Luft zu hindern.

Zeigt die Entzündung grofse Neigung zu Recidiven, so lasse man den Kranken fleifsige Bewegung bei warmer, trockner Luft machen, bewahre ihn vor allen feuchten Wohnungen, verordne demselben Kali- oder Soolbäder, welche nach und nach kühler genommen werden müssen, und lasse ihn längere Zeit hindurch folgende Mischung als Augenwasser lauwarm gebrauchen, die täglich einige Mal angewendet werden kann: ℞. *Zinci sulphuric. gr jj. Aquae rosar.* ℥v. *Aquae opii* ʒß. *Spir. vini gallic.* ℈j. *Muc. gummi mimos.* ʒjj. *M.* In den hartnäckigsten Fällen ist das Tragen eines Fontanelles zu empfehlen.

Von der gichtischen Augenentzündung, *Ophthalmia arthritica.*

Sie zeigt sich, nach Hrn. Prof. Beer, entweder als rosenartige Augenlieder- und Augapfelentzündung, die er immer als vicariirende Thätigkeit des durch nasse Kälte plötzlich unterdrückten Podagra entstehen sah, und welche schnell in eine zerstörende *Blepharoblennorrhoe* und *Ophthalmoblennorrhoe* übergehen kann, oder, wenn sie reines Product der *Arthritis* ist, als eine

Regenbogenhautentzündung, als *Sclerotitis* und überhaupt als eine entzündliche Affection der tiefer gelegenen Gebilde des Auges.

Die rosenartige Entzündung giebt sich durch eine, von den Rändern der Augenlieder unter brennendem Schmerz ausgehende, schwachrothe, blasenartige Geschwulst, zu erkennen, die sich kurze Zeit nach unterdrückter Gicht einstellt, und welche sich bald über beide Augenlieder ausbreitet. Die Geschwulst erhebt sich jetzt in Form einer, von einem Vesicator verursachten, eine gelbe scharfe Lymphe enthaltenden, Blase, welche bald und unter beständigem Brennen auf die Bindehaut des *Bulbus* übergeht. Auch auf den Thränensack pflanzt sich diese Entzündung fort. Ein nur auf wenige Augenblicke erscheinender scharfer Thränenfluſs, verwandelt sich schnell in einen scharfen und dünnen Schleimfluſs, und dieser wieder gar bald in eine *Blepharo-* und *Ophthalmoblennorrhoe*, die jetzt unaufhaltsam rasch fortschreitet und das Auge durch Colliquation vernichtet.

Die reiſsenden eigenthümlichen Schmerzen welche die Kranken, während dieses vorgeht, immer in der Umgegend des Auges fühlen, verlieren sich nach völliger Colliquation des Bulbus keinesweges sogleich, sondern bleiben vielmehr noch lange Zeit zurück und werden besonders heftig, wenn schlechte, stürmische Witterung einfällt.

Die Prognose ist immer sehr ungewiſs; am besten noch, wenn gleich Anfangs die unterdrückte Gicht wieder hergestellt worden. Bei jungen und robusten Menschen verläuft die Entzündung am schnellsten und am heftigsten. Hat sich *Ophthalmoblennorrhoe* ausgebildet, so ist das Auge verloren, wenn auch jetzt das Podagra wieder hervorgerufen wird.

Was die Behandlung anbetrifft, so bringe man vor allen Dingen das unterdrückte Podagra, u. s. w. durch Fuſsbäder mit Senf und groſse Umschläge von reinem, oder mit geriebenem Meerrettig und gepulvertem schwarzen Pfeffer vermischten Senfteig um die Füſse, wieder hervor. Dabei ist anfänglich im Allgemeinen eine an-

tiphlogistische Behandlung nothwendig, ja zuweilen muſs selbst ein Aderlaſs gemacht werden. *Laxantia antiphlogistica etc.* unterstützen die Kur. Charakterisirt sich das Leiden noch als eine erysipelatöse Augenlieder- und Augapfelentzündung, so wende man trockne Luft und Wärme mit Kamphor auf das Auge an und befördere die *Diaphoresis*. Ist aber schon *Blepharo-* und *Ophthalmoblennorrhoe* eingetreten, so gebrauche man *Laudan. liquid. Sydenh.* mit schleimigen Augenwässern gemischt oder rein; und, wenn zugleich die Schmerzen sehr heftig sind, Einreibungen über die Augenbraunen von *Pulv. Opii* mit Speichel u. s. w., und unterstütze die Kräfte durch innere, kräftig wirkende Mittel, z. B. durch *China, Calamus aromatic.* u. s. w.

Antiarthritische Mittel helfen hier so wenig, als bei der in Folge eines unterdrückten Trippers erschienenen *Ophthalmie*, die Mercurialien nützen können.

Ich glaube mit Benedict, (Handbuch der practischen Augenheilkunde, 1823. B. 2. S. 241.) daſs auch andere krankhafte Thätigkeiten, wenn sie schnell unterdrückt werden, als Hautausschläge, Fuſsgeschwüre, Furunkeln etc., eine ganz gleiche Entzündung und Blennorrhoe hervorbringen; wenigstens habe ich sie eben so verlaufen sehen, als Beer seine *Ophthalmoblennorrhoea arthritica* beschreibt. Die unmittelbar nach unterdrückter Gicht entstandene sah ich bis jetzt nur ein einziges Mal bei einer ziemlich bejahrten Frau.

Ophthalmitis und *Iritis arthritica.* — Erscheint eine Augenentzündung als reines Product der *Arthritis*, so wird diese aus folgenden Zeichen erkennbar: — Ein besonderes Prickeln in der Augengrubengegend mit Ameisenkriechen geht dem Anfang dieser Entzündung vorher. Nach und nach verändert sich dieſs Gefühl in einen reiſsenden, unstäten, bis in die Schläfe dringenden, den Verzweigungen des *Nerv. facialis* oft folgenden Schmerz, der bei nasser Witterung und in Federbetten sich verschlimmert, bei trockner warmer Luft aber gemäſsigter wird, und der sich nur auf der einen Hälfte des Kopfes verbreitet, wenn die Entzündung nur ein Auge ergriffen hat. Zugleich schlagen die Au-

genliedränder, beim öftern Schliefsen und Oeffnen des Auges, einen weifsen feinen Schaum, der sich wohl von dem Drüsenschmeere unterscheidet.

Ein scharfer Thränenfluſs stellt sich dabei ein. Die *Sclerotica* färbt sich rings um die Hornhaut mit einer rosigen Röthe, die sich gegen den Umfang des Augapfels zu verwischt und nicht in die *Cornea* übergeht, sondern rings um dieselbe einen schmalen blaulich weifsen Ring übrig läfst, der als charakteristisches Zeichen dasteht, nicht immer aber rings um die Hornhaut ausgesprochen ist, sondern zuweilen nur stückweise sichtbar wird. Bald zeigt sich jene rosige Röthe auch in der *Conjunctiva bulbi*, wodurch der weifsblaue Rand um die Hornhaut noch deutlicher hervortritt. Die *Conjunctiva* wird varikös und die helle Röthe der *Sclerotica* verändert sich in eine schmutzig graue, violette Farbe.

Wird nun die *Iris* in das Leiden gezogen, so zeigt sich die *Iritis arthritica*, bei hagern und sehr empfindlichen Personen, auf folgende Weise: Die *Iris* wird unbeweglich und verändert sich, wenn sie vorher blau oder grau war in eine grünliche, wenn sie aber braun war, in eine röthliche Farbe. Die Pupille wird winklicht, verengert sich und bleibt, wie bei der reinen *Iritis*, in der normalen Stellung hinter der *Cornea*.*) Die Schmerzen nehmen zu, und nach jedem Schmerzanfalle und unter Fieberbewegung, verengert sich die Pupille immer mehr, wobei sich zugleich in derselben ein Anflug von lymphatischem Gewebe einfindet, welches endlich das Gesicht völlig aufhebt. Hat sich die *Iritis* erst ganz ausgebildet, so bemerkt man oft mit freien, besser mit bewaffneten Augen, variköse Blutgefäfse in der *Iris*.

War der Kranke bisher sich selbst überlassen; so wird jetzt der Augapfel atrophisch und zieht sich in die *Orbita* zurück, womit sich denn die arthritischen Schmerzen endigen, bald aber auch das andere, viel-

---

*) Taf. IV. Fig. 4.

leicht noch verschonte, Auge auf dieselbe Weise ergreifen.

Eigenthümlich ist es noch, dafs hierbei weder *Hypopyon* und Hornhautgeschwüre, noch Trübung der *Cornea* beobachtet wird; es sei denn die *Iritis arthritica* wäre mit *Rheuma*, Scrofeln oder mit beiden zugleich complicirt. Diese Art der gichtischen Augenentzündung pflegt in der Regel lange Zeit ihren Hauptsitz in der Regenbogenhaut zu behalten, und erst die öfter wiederkehrenden Recidive veranlassen die Ausbreitung derselben auf die übrigen innern Gebilde des Bulbus, wo sie sich dann, wie die gleich zu beschreibende andere Form, zu einer *Ophthalmitis arthritica* umgestaltet, und gleichwie diese, *Glaucom, Atrophie, etc.* zu Stande bringt.

Werden pastose, wenig empfindliche, mit einer laxen Fiber und gemeiniglich braunen Augen begabte arthritische Individuen von einer dergleichen *Iritis* befallen; so zeigt sie sich wie bei hagern empfindlichen Subjecten, nur entdeckt man dabei folgende Modificationen, die alle auf einen chronisch entzündlichen Zustand nicht blofs der *Iris*, sondern auch der sämmtlichen inneren Gebilde des Augapfels, der *Retina, Chorioidea, Hyaloidea, etc.* hindeuten.

Anstatt dafs sich bei den letztgenannten Kranken die Pupille verengert, wird sie hier immer gröfser und nimmt fast eine ovale Form, wie man sie bei wiederkäuenden Thieren findet, an,*) indem sich die Radialfibern der *Iris* gegen die Augenwinkel, vorzüglich gegen den äufsern hin, sehr contrahiren.**) Dabei stülpt sich der Pupillarrand der *Iris* nach der Linse hin so um, dafs der kleine Ring der Regenbogenhaut völlig verschwindet. Die Schmerzen nehmen nun zu, werden heftiger, reifsend und bohrend, gleichsam als wenn der *Bulbus* gespalten würde; ein Zeichen, dafs die

---

*) Dieses Zeichen kann durchaus nicht unter die constanten gerechnet werden; immer aber ist die Pupille erweitert, und meistens ungleich rund.

**) Taf. IV. Fig. 5.

Glashaut nun auch entzündlich ergriffen worden ist, welches eine bald folgende, concav sich gestaltende Trübheit derselben und der gläsernen Feuchtigkeit hinreichend bezeugt. Diese Trübung, die mit graugrünlicher Farbe in der Tiefe des Auges sich zeigt, kündigt das vorhandene *Glaucom* an. Nimmt auch die Linse Theil an dem krankhaften Processs; so trübt sie sich, bekommt eine meergrüne Farbe und wird dann *Cataracta viridis*, nach Beer besser *Cataracta glaucomatosa* genannt, und scheint für sich oder mit dem Glaskörper aufzuschwellen und sich gegen die *Iris* vorzudrängen. Dabei vergrösern sich die Schmerzen immer mehr, die Varicosität des *Bulbus* nimmt zu, die *Sclerotica* und *Chorioidea* verwachsen oft stellenweise und bilden knotenartige Anschwellungen; die *Cornea* bekommt ein mattes, gleichsam cadaveröses Ansehn, und hiermit ist das Sehvermögen völlig aufgehoben, ungeachtet der Kranke zuweilen Lichtschein zu haben glaubt, der sich jedoch nur im Sehnerven selbst entwickelt, und nicht von der Aufsenwelt ins Auge übergeht.

Merkwürdig ist es übrigens, dafs meinen Erfahrungen zu Folge, fast nur braune Augen von der Krankheit befallen werden, und dafs die Regenbogenhaut sich nicht, wie bei der reinen *Iritis* und *Ophthalmitis*, röthlich färbt, sondern nach und nach aschgrau wird; sie erscheint gleichsam wie ausgewaschen, wobei die der *Iris* eigenthümliche Structur verschwunden ist. Im *Acme* des Uebels ist zugleich der Augapfel auffallend hart anzufühlen, was von der Ueberfüllung desselben mit Feuchtigkeiten herzurühren scheint.

Die arthritische Augenentzündung, welche reines Product der *Arthritis* ist, verläuft übrigens bald langsamer, bald schneller, wird milder bei trocknem Wetter und im Sommer, schlimmer hingegen bei feuchtem Wetter und im Winter, ist bald rein, bald mit Syphilis, Rheumatismus, u. s. w. complicirt und kommt meistens bei offenbar gichtischen Individuen zum Vorschein; nicht selten tritt sie aber auch in Subjecten auf, die nie an Gicht litten, wovon unter vielen an-

dern auch Morgagni*) und Barthez**) Beispiele anführen. — Oefters bildet sich auch aus einer rheumatischen Ophthalmie, bei vorhandener arthritischer Disposition, eine gichtische Ophthalmie.

Die Voraussage ist im Allgemeinen sehr bedenklich; denn oft, wenn der Arzt die Krankheit überwunden zu haben glaubt, tritt, weil die allgemeine Gicht vielleicht noch nicht gehoben war, oder nicht beseitigt werden konnte, ein Recidiv ein, welches hartnäkkiger als die erste Entzündung verläuft, und wozu diese Entzündung überhaupt eine ungemeine Neigung besitzt. Hat die arthritische *Iritis* ihren höchsten Punkt erreicht, so ist an Wiederherstellung des Gesichts nicht zu denken. Bei Armen ist die Prognose ungünstiger als bei Leuten, die sich gehörige Pflege angedeihen lassen können. Wird die Glashaut entzündet, so entsteht *Glaucom* und das Gesicht ist verloren. Complicationen mit andern Krankheiten machen die Vorhersage ungünstig; war aber die Ophthalmie aus einer rheumatischen Augenentzündung hervorgegangen, so ist die Prognose günstiger. Bei hagern empfindlichen Individuen ist die Prognose, weil sich hier nicht so schnell *Glaucom* und krankhafte Affection der Retina entwickelt, günstiger, als bei aufgeschwemmten trägen Gichtkranken, bei denen eine Entmischung des Glaskörpers äufserst schnell vor sich geht.

Da nach den immer wiederkehrenden Schmerzanfällen in und um die Augen, die Pupille sich verengert und die Ausbildung eines *Glaucoms* befördert wird; so mufs vor allen Dingen die Kur gegen diese gerichtet werden. Defswegen lasse man *Opium* mit Speichel, oder *Tinct. Opii croc. c. Linimento volat.* über die Augenbraunen einreiben, verhüte dabei jede auch die kleinste Erkältung, wende trockne gewärmte aromatische Kräuterkissen mit und ohne Camphor, je nachdem

---

*) *Ephem. natur. curiosor.*

**) Abhandlung über die Gichtkrankheiten, übersetzt von Bischoff.

dem das Auge empfindlich ist, äufserlich an, und mache Ableitungen durch Fontanelle, Haarseile und vorzüglich durch eine Brechweinsteinsalbe, die über die Wirbelsäule, bei naher Gefahr aber hinter den Ohren eingerieben wird. Sehr robuste, kräftige Subjecte müssen anfänglich antiphlogistisch behandelt werden, und wo unterdrückte oder aufhörende gewohnte Blutflüsse Schuld an dem Uebel haben, da sind öfter zu wiederhohlende kleine Aderlässe am Fufse nicht zu verachten. Sehr langwierige arthritische Ophthalmien an Subjecten, in denen nie gichtische Beschwerden vorher gewesen waren, und wo die Entzündung keine grofse Neigung hat, die edlen Gebilde des Sehorgans zu destruiren, heilt man oft blofs dadurch, dafs man durch Fufsbäder mit Senf u. s. w. einen, wenn auch nur sehr geringen, Gichtanfall hervorruft, und so gleichsam der schwachen krankhaften Thätigkeit an den Füfsen so viel zu thun giebt, dafs sie an Vertheilung ihrer Kräfte in andere Theile nicht mehr denken kann.

Uebrigens behandle man die Gicht nach den bekannten Regeln, und suche sie wo möglich ganz zu beseitigen, weil sich sonst gelegentlich leicht Recidive einstellen können, die dem Auge gefährlicher sind, als die vorhergegangene Entzündung.

Von der variolösen Augenentzündung, *Ophthalmia variolosa.*

Die variolöse Augenentzündung entsteht entweder während des Verlaufes der Menschenblattern und verläuft dann auch mit diesen, oder sie entsteht als Nachkrankheit in der Abschuppungsperiode und ähnelt dann sehr den scrofulösen Entzündungsformen der Augen.

Sie äufsert sich auf eine dreifache Art: entweder als Augenliederentzündung, oder als äufsere Augapfelentzündung, oder als Augenliederdrüsenentzündung.

Die variolöse Augenliederentzündung, *Blepharophthalmia variolosa*, charakterisirt sich durch folgende Zeichen:

Zu gleicher Zeit mit dem Ausbruche der Blattern

schwellen die Augenlieder an, schliefsen sich und werden mit Blatterpusteln besetzt. Indem die Entzündung nun immer gleichen Schritt mit der Hauptkrankheit hält, bleiben die Augen oft bis zum neunten Tage verschlossen und öffnen sich erst mit dem Abtrocknen der Pocken. Sind die Patienten mit vulnerablem Hautorgan begabt, so schreitet der Reflex der Entzündung leicht auf die Bindehaut des Augapfels über, welchen Uebergang bei geschlossenen Augen, die *Photophobie*, eine Empfindung als wenn Sand oder ein gröfserer Körper im Auge wäre und die Trockenheit desselben, verkündigen; so lange hingegen ein vermehrter Thränenfluſs und keine merkliche Lichtscheu zugegen ist, hat man es noch mit einer Entzündung zu thun, die sich auf die Augenlieder beschränkt.

Die Voraussage bleibt, so lange als die Inflammation nur in den Augenliedern ihren Sitz hat, recht günstig; indessen muſs man darauf achten, daſs keine Verbildungen der Augendecken zurückbleiben, zu welchen das unfeine Untersuchen des Arztes selbst zuweilen Gelegenheit geben kann. Allein auch ohne Schuld des Arztes entstehen zuweilen Miſsbildungen am Augenliede, besonders wenn derselbe zu spät hinzugerufen wurde, oder zusammenflieſsende Blattern vorhanden sind; denn leicht entstehen dann Verschrumpfung des Tarsus und dadurch bedingte *Ectropia etc.* Wenn während des Verlaufes der Blattern die Augenwimpern in Folge der Eiterung ausfallen, so erscheinen diese nie wieder und das Auge muſs für immer dieses Schutzes entbehren; die Stellen, auf welchen die Cilien standen, sind dann mit rothen Narben bedeckt, welche die Blatterpusteln hinterlassen.

Wenn man die Pocken nach den Regeln der Kunst behandelt, und dabei dem Auge wenige Reitze zukommen läſst, vielmehr Ableitungen von den entzündeten Theilen durch Vesicatorien oder *Cort. Mezer.* macht; so hat man, so lange als die Pocken noch nicht in Eiterung stehen, genug gethan.

Füllen sich aber die Blattern mit Eiter, so wende man trockne Wärme auf die Augenlieder mittelst lei-

nener Compressen an, die man bei schwächlichen Kranken mit Camphor bestreicht. Man öffne ferner mittelst einer Staarnadel die Pocken der Augenlieder und lasse den Eiter herausfliefsen, reinige dann die Theile sanft mit lauwarmer Milch oder einem schleimigen Augenwasser in *Laudan. liquid.*, trockne aber die Augen ja recht ab, damit keine oedematoesen Anschwellungen der Augendecken zurückbleiben, und gebe endlich dem Auge die sonst gewohnten Reitze, trockne warme Luft und mäfsiges Licht wieder.

Breitet sich die *Blepharophthalmia variolosa* weiter aus, und geht sie auf den Augapfel über; so entsteht:

Die variolöse äufsere Augapfelentzündung, *Ophthalmia variolosa externa*, die sich im ersten Stadio durch folgende Zeichen offenbart: Anfangs erblickt man Röthe der Bindehaut, bald aber auch der harten Haut, womit heftige Lichtscheu, mit stechenden Schmerzen und Thränenfluſs verbunden, erscheint. Am Ende dieses Zeitraumes bemerkt man auch wohl trübe Stellen der *Cornea*, Fieber, und sogar ein Ergriffensein der *Iris*.

Im zweiten Zeitraume nehmen Röthe und Lichtscheu ab, die Hornhaut wird an den trüben Stellen undurchsichtig, der Schmerz im Auge und die Geschwulst der *Conjunctiva* vermehrt sich, und so bilden sich endlich auf den undurchsichtigen Stellen der Hornhaut Blattern aus, die sich mit wirklichem Eiter füllen, und selten im Weifsen des Auges erscheinen.

Die Prognose ist im ersten und auch im zweiten Zeitraume ziemlich günstig, so lange sich die Pocken auf dem Auge noch nicht völlig mit Eiter gefüllt haben und so lange keine *Iritis* vorhanden ist. Sind die Pusteln aber gefüllt und brechen sie von selbst auf; so öffnen sie sich oft nach aufsen und innen zugleich und lassen dann entweder dem Gesicht hinderliche Narben, oder Staphylome der *Iris* zurück, welche eine Pupillensperre verursachen können. Ebenso bleiben zuweilen Totalstaphylome der Hornhaut, Hydrophthalmien und Traubenstaphylome als Folge der Entzündung zurück.

Wegen des oft so traurigen Ausganges der Krankheit, hat man sich nicht blofs damit begnügt, dieselbe zu heilen, sondern auch wo möglich sie zu verhüten. Zu den defshalb gerühmten prophylactischen Mitteln gehörten vorzüglich mit Camphor bestrichene Compressen, die man vor die Augen hing; ferner eine Auflösung von acht Gran Bleizucker in zwei Unzen Rosenwasser, durch die man die Augen mittelst Compressen öfters anfeuchtet, und endlich auch der Speck, wovon ein flaches Stück auf jedes Auge gelegt werden soll. Indessen wird die Anwendung dieser Mittel, bei der jetzt immer weniger vorkommenden Pockenkrankheit sehr selten nöthig werden.

Im ersten Zeitraume der Entzündung mufs man jederzeit die Ausbildung der Blattern auf dem Auge zu verhüten suchen, denn je weiter diese vorgerückt sind, desto ungünstiger wird die Prognose. Man mache daher auf das Auge Umschläge von kaltem Wasser, rein oder mit etwas Bleiessig vermischt, und lege ein Blasenpflaster oder *Cauterium* hinter die Ohren, um wo möglich den krankhaften Procefs vom Auge abzuleiten.

Im zweiten Zeitraume öffne man die Pocken auf der *Cornea*, ehe sie sich füllen, und gebrauche dann dem Stande der Sensibilität angemessene Augenwässer, z. B. *Solut. Lapid. divin. c. Laud. liquid. Syd.*, oder bestreiche die Geschwüre mit dem *Laudan.* allein,*) und bedecke das Auge mit trocknen warmen aromatischen Compressen; zuletzt gebrauche man äufserlich eine schwache, mit *Opium* gemischte, rothe Präcipitatsalbe, um die hinterbliebene Trübung der *Cornea* nach und nach und so viel es möglich ist, zu heben. Auch Bäder leisten hier oft Nutzen. Weicht aber dennoch,

---

*) Letzteres wird indefs seltener vertragen. Sehr zweckmäfsig aber ist es, ersterm Augenwasser etwas *Extr. saturn.* zuzumischen und dieses so lange zu gebrauchen, bis die Gefahr des Durchdringens des Geschwüres vorüber gegangen. Alle Augenwässer müssen in diesem Zeitraume lauwarm angewendet werden.

nach dem Verlaufe der Blattern, die Krankheit nicht ganz, wird sie vielmehr hartnäckig; so gebe man ohne Aufenthalt *Calomel* mit *Sulphur. aur.* und *hba. cicut,**) welche Mittel die vorzüglichsten Aerzte, von denen ich hier nur Beer, Reil und Scarpa anführen will, sehr dienlich fanden. Ebenso sind *Hb. digital. Stipit. Dulcamar. Hb. Aconit.* u. s. w. empfohlen. Bei alle diesem vergesse man indessen nicht, der Reproductionskraft, wo es nöthig ist, durch *Calamus aromat., Naphthen, China* und *Opium* zu Hülfe zu kommen.

Die variolöse Augenliederdrüsenentzündung, *Blepharophthalmia variolosa glandulosa.*

Weil der entzündliche Zeitraum hier äufserst kurz und meistens vom Arzte unbemerkt, vorüber geht; so ist das erste Zeichen gleich Anfangs eine bald mehr bald weniger heftige *Blepharoblennorrhoe* mit Geschwulst der Augenliedränder, welche gewöhnlich bei schwächlichen scrofulösen Kindern und entweder während des Verlaufes der Ausschlagskrankheit, oder auch später, zuweilen 2 bis 3 Wochen nachdem die Pocken verlaufen sind, auftritt und alsdann als Metastase der Blattern erscheint. Nicht selten geht die *Blepharoblennorrhoe* in *Ophthalmoblennorrhoe* über, und dann kündigt dieses die beginnende Röthe und Anschwellung der Bindehaut der *Sclerotica*, so wie die zunehmende rosenartige Entzündung der äufseren Fläche der Augenlieder und die Trübung der *Cornea* an, welche letztere zusehends trüber wird, sich in einen Eiterstock umwandelt, worauf dann Staphylome jeder Art, oder gar Colliquation des ganzen Bulbus folgen. Die *Blepharoblennorrhoe* pflanzt sich zuweilen auch auf den Thrä-

---

*) Z. B. ℞. *Calomelan.*
Sulphur. aur. ant. āā *grj.*
Hbae cicutae grjj — jv.
Mf. Pulv. S. Für ein zehnjähriges Kind; früh und Abends eine solche Dosis zu geben.

nensack fort, wo alsdann manchmal noch lange eine *Blennorrhoea Sacci lacrymalis* zurückbleibt.

Die Prognose ist sehr verschieden; denn bald dauert die *Blepharoblennorrhoe* sehr lange und geht nicht auf den *Bulbus* über, hinterläfst dann öfters rothe Flecke der Augenliedränder und Verlust der Cilien, bald geht sie in *Ophthalmoblennorrhoe* über, und verursacht dann Staphylome oder völlige Colliquation der Augen. Die *Ophthalmoblennorrhoe* verläuft dann am schnellsten und heftigsten, wenn dieselbe während des Verlaufes des *Exanthems* auftritt, weniger schnell aber, wenn sie als Nachkrankheit erscheint. Bei sehr scrofulösen Kindern und bei zusammenfliefsenden Blattern, ist die Prognose am ungünstigsten.

Die Behandlung stimmt ganz mit der reinen *Blepharo-* und *Ophthalmoblennorrhoe* überein; nur vergesse man nicht die unter der *Ophthalmia variolosa externa* angerühmten innern Mittel, so wie Ableitungen von den Augen zu gebrauchen. Zu letzteren rechne ich auch ein starkes in den Nacken zu legendes *Emplastrum stibiatum*, welches ich bei secundär-variolösen *Ophthalmien* nicht genug rühmen kann. Den secundären Entzündungen dieser Art, welche sich durch ihre Hartnäckigkeit häufig auszeichnen, kann man durch geeignete Mittel wohl zuvorkommen. Dieses bewirken besonders solche Mittel, welche die *Se-* und *Excretionen* des Körpers und die Thätigkeit des lymphatischen Systems vermehren und unterhalten. Man gebe daher gegen das Ende der Abschuppungsperiode den Blatterkranken, Purgantia aus *Calomel* und Jalappenwurzel, reiche sodann den *Aethiop. antimon.*, *Sulph. aur. ant.*, oder *Tart. stib. refracta dosi*, lasse fleifsig Thee aus *Stip. dulcamar. Herba jaceae* u. dergl. trinken, lauwarme erweichende Bäder mit Kleie, Seife, Asche etc. gebrauchen, gebe den Reconvalescenten wollene Kleider, warme trockne Luft enthaltende Stuben, und verhüte auf das sorgfältigste jede Erkältung.

Von der morbillösen und scarlatinösen Augenentzündung, *Ophthalmia morbillosa et scarlatinosa.*

Diese beiden Entzündungen haben das Eigne, dafs sie, wenn sie anders nicht complicirt sind, immer als sogenannte feuchte, seröse, schnell verlaufende äufsere Augapfelentzündungen, und meistens vor Ausbruch des Exanthems auftreten, wo sie denn auch mit den Stadien des letztern gleichen Schritt halten. Nur bei schwächlichen scrofulösen Kindern entwickeln sie sich oft erst am Ende der Ausschlagskrankheit.

Uebrigens handelt man sie, ihrer grofsen Uebereinstimmung und Aehnlichkeit wegen, mit Recht vereinigt ab.

Im ersten Stadio bemerkt man, Anfangs die *Conjunctiva*, bald aber auch die *Sclerotica*, etwas geröthet; damit sind Photophobie, scharfer Thränenfluſs, der bei jedem Temperatur- oder Lichtwechsel zunimmt, und stechender Schmerz im Innern des Auges, partielles Glänzendwerden der *Cornea*, scharfe Schleimabsonderung aus der Nase und fortdauernder Kitzel zum Niesen verbunden.

Im zweiten Stadio vermehrt sich die Röthe des Auges, die Augenliedränder röthen sich nach den Winkeln hin sehr und werden empfindlich, die Lichtscheu mindert sich, die Thränen verlieren ihre Schärfe und aus den früherhin glänzenden, jetzt trüben Stellen der *Cornea* erheben sich conische Wasserbläschen, *Phlyctaenulae*, welche bersten und dünnen, fressenden Eiter absondernde Geschwüre, *Epicaumata*, bilden. Senkt sich der Eiter dieser Geschwüre zwischen die Lamellen dieser Hornhaut; so entsteht eine Augenkrankheit, die man den Nagel der Hornhaut nennt, und welche nicht mit einem *Hypopyon* verwechselt werden darf.*)

---

*) Unter Nagel der Hornhaut, *Onyx*, *Unguis*, *Ungula corneae*, versteht man eine Eiteransammlung zwischen den Lamellen der *Cornea*, die immer eine Entzündung als Ur-

In diesem Zeitraum findet auch ein merkbarer Unterschied zwischen der scarlatinösen und der morbillösen Augenentzündung Statt; denn bei ersterer halten der scharfe Thränenfluſs und die Lichtscheu länger an, die *Sclerotica* wird etwas violett, zeigt Neigung zur Varicosität und dabei breiten sich die vorhandenen Geschwüre leichter aus, und ergreifen auch die

---

sach hat. Solche Eiterniederlagen verschwinden nach verlaufener Entzündung zuweilen, wenn sie nur gering sind, auf den Gebrauch des *Laudanum* oder reitzender adstringirender Augenwässer und Salben, mit oder ohne innern Gebrauch des *Calomel;* sind sie aber bedeutend, so muſs man dergleichen Abscesse mit einer Staarnadel öffnen, damit sie nicht nach innen und von selbst aufbrechen. Hierauf befördert man den Ausfluſs des geöffneten Hornhautabscesses durch in's Auge Tröpfeln von Malvendecoct, wozu man einige Tropfen *Spirit. camph.* mischen kann. Zuletzt sind Auflösungen des *Lap. divin.* oder des schwefelsauren Zinks mit etwas *Laudan. liquid.* zur Heilung hinreichend. — Nicht selten veralten und vertrocknen solche Hornhautabscesse bei Vernachläſsigung, und müssen dann, wie unter den Flecken der Hornhaut angeführt wurde, behandelt werden.

Um nun den *Onyx* nicht mit *Hypopyon* und mit Hornhautflecken zu verwechseln, merke man folgende unterscheidende Zeichen: Bei *Hypopyon* liegt der Eiter auf dem Boden der Augenkammer, und hat mehr eine halbmondförmige Gestalt. Der Nagel der Hornhaut, der Anfangs weiſslich, nach und nach gelblich wird, ist sehr verschieden gestaltet. Der Eiter beim *Hypopyon* verändert, je nachdem er mehr oder weniger consistent ist, bei Bewegungen des Kopfes auch mehr oder weniger seine alte Stelle. Solche Ortsveränderungen des Eiters bemerkt man vorzüglich rein, wenn der Kranke während der Nacht auf einer Seite lag, wo sich dann der Eiter hinneigt. Die *Ungula* ist unbeweglich. Sitzt der Eiter zwischen der *Conjunctiva corneae* und der folgenden Lamelle der Hornhaut, so erblickt man letztere, vorzüglich bei der Seitenansicht, an der kranken Stelle erhaben und fühlt zugleich beim Untersuchen mit der Sondenspitze Fluctuation; weniger findet beides Statt, wenn der Eiter zwischen den innersten Lamellen seinen Sitz hat. — Eine leucomatöse *Cornea* unterscheidet sich von dem Nagel besonders durch ihre saturirte weiſse Farbe, die bei letzterm immer mehr oder weniger in's Gelbliche fällt. Auch giebt die *Genesis* beider Hornhautfehler Fingerzeige.

Bindehaut der *Sclerotica*. Auch nimmt im ersten Zeitraume oft die *Iris* an dem entzündlichen Leiden Theil.

Die einfache Entzündung im ersten Stadio gewährt eine sehr günstige Prognose; wenn aber die Entzündung in einem scrofulösen Subject auftritt, so erblickt man nicht selten sehr bald eine scrofulöse Ophthalmie, gegen welche man dann oft lange kämpfen mufs.

Im zweiten Stadio, und wenn schon Geschwüre zugegen sind, ist die Vorhersage ungünstiger. Leicht bleiben hier Facetten und Gruben in der *Cornea* zurück. Hat sich viel ichoröser Eiter zwischen den Lamellen der Hornhaut gesetzt, und geht die Aufsaugung nur langsam vor sich; so kann eine unheilbare Verschrumpfung der Hornhaut, *Phthisis Corneae, Rhytidosis*, die Folge davon sein. Eine vorhergegangene *Iritis* hinterläfst leicht eine Verengerung der Pupille und partielle Unbeweglichkeit der Regenbogenhaut.*)

Uebrigens pflegt die Entzündung dann nur rein

---

*) In einem sehr merkwürdigen Falle beobachtete ich bei einem fünfjährigen, an *Ophthalmia scarlatinosa* leidenden Mädchen, bei welchem sich eine mäfsig heftige *Iritis* ausgebildet hatte, an der untern Hälfte des Pupillarrandes eine schwache Vertiefung, welche ich bei genauer Untersuchung mit bewaffnetem Auge, für ein Geschwür halten mufste. Die Vertiefung nahm merkbar an Gröfse zu, die *Iris* erlitt an der kranken Stelle Substanzverlust, wurde gleichsam so zerfressen, dafs, nachdem der krankhafte Procefs abgelaufen war, die untere Hälfte des Pupillarrandes ganz gezackt erschien. Uebrigens war während der Dauer der Krankheit der *Humor aqueus* nicht sichtbar getrübt.

Es ist diese Beobachtung um so merkwürdiger, je weniger man über die Geschwüre der Regenbogenhaut in den Schriften der Aerzte verzeichnet findet. Jourdan sagt im *Dictionnaire des sciences médicales*. 26. Band. *Paris*, 1818, *pag.* 82. „*Je passe sous silence les ulcères de l'iris, parceque le diagnostic en est fort obscur, qu'ils résultent presque toujours d'une violente inflammation, que l'hypopion les accompagne ordinairement, et que d'ailleurs il est impossible d'y porter remède.*" Ueberhaupt scheinen sich Viele die Geschwüre der *Iris* ohne *Hypopyon* nicht denken zu können.

dem *Exanthem* anzugehören, wenn sie mit, oder kurz vor Auftreten desselben entsteht, und mit der Hauptkrankheit abläuft. Alle später auftretende *Ophthalmien* oder deren Recidive scheinen mehr in Folge von Diätfehlern, Erkältungen u. dergl. zu entstehen, und den scrofulösen oder scrofulös-rheumatischen Augenentzündungen anzugehören, oder sind doch mit diesen Dyscrasien gemischt.

Die Therapie im ersten Zeitraume gebietet Entziehung der für das Auge gewöhnlichen Reitze; daher mindere man das Licht der Wohnung und verhüte schlechte verdorbene zu heifse u. s. w. Luft, suche aber auch zugleich durch Vesicatorien hinter den Ohren, oder Seidelbast am Arme, die Ausbildung der Geschwüre, welche im zweiten Stadio aufzutreten pflegen, von dem Auge abzuleiten.

Im zweiten Stadio gebe man dem Auge trockne warme Luft, trockne Wärme durch Auflegen von Compressen, und sind die Wasserbläschen geborsten, so benetze man selbige mit schwacher *Solutio Lapid. divin.* mit vielem *Laud. liquid. S.**) vermischt; zugleich sind warme ganze Bäder angezeigt, die jedoch natürlich unterbleiben müssen, wenn bei *Scarlatina* Neigung zu *Anasarra* vorhanden ist. Dauert endlich die Krankheit länger fort, und sind die begleitenden Exantheme schon längst verlaufen; so gebe man innerlich Antimonialien, vorzüglich *Sulph. aur. Antim.*, zugleich *Camphor* und *Sulphur. depurat.*; äufserlich trockne aromatische Umschläge mit *Camphor*, die *Sol. Lapid. divin.* mit Bleizucker und *Laud. liquid. S.* gemischt, oder

℞. *Hydr. mur. corr. grj.*
Mucil. G. mimos. ʒjj.
Aqu. dest. s. rosar. ʒjv. — ʒvj.
M. solvendo.

---

*) Z. B. ℞. *Lap. divini gr. jj.*
Aquae rosar. ʒjjjß.
Laud. liq. S. 3ß. — ℈jj.
Muc. gummi arab. ʒjj.
M.

und zuweilen sehr behutsam eine schwache Janinische Salbe, welche letztere nur auf die Augenlieder gestrichen werden darf.

Entstanden keine Geschwüre auf dem Auge, bleibt aber eine erhöhte Sensibilität mit Thränen des Auges und Röthe der *Conjunctiva* noch lange zurück; so bediene man sich ebenfalls adstringirender Mittel, vorzüglich der eben empfohlenen Sublimatsolution mit *Extr. Hyosc.* oder *Laudan.*

Von der syphilitischen Augenentzündung, *Ophthalmia syphilitica.*

Sie ist bald das Product der *Lues confirmata,* bald aber nur eine anomale Erscheinung des Trippers. Im ersten Falle erscheint sie entweder als *Iritis syphilitica* oder als *Ophthalmoblennorrhoea syphilitico - scorbutica;* im zweiten Falle aber äufsert sie sich immer als *Blennorrhoe* der Augenlieder und des Augapfels und wird *Ophthalmia gonorrhoica* genannt.

Die gonorrhoische Augenlieder- und Augapfelentzündung, *Blepharophthalmia et Ophthalmia gonorrhoica. Iritis medorrhoica.**)

Sie kommt entweder als eine wahre vicariirende Thätigkeit des venerischen Trippers vor, *Ophthalmia gonorrh. vera,* oder von Verunreinigung des Auges mit Trippermaterie, wobei dann der Ausfluſs aus der Harnröhre nicht gestört wird.**)

---

*) So nennt sie Wendt, (die Lustseuche in allen ihren Richtungen und in allen ihren Gestalten, zum Behufe academischer Vorlesungen. Breslau, 1816. S. 79.) Ob mit Recht? wird sogleich aus dem Verlaufe dieser Krankheitsform selbst klar werden.

**) Es giebt indessen Beispiele, wo die Krankheitskraft der durch Verunreinigung entstandenen Entzündung im Auge, so sehr über den Harnröhrenfluſs prädominirte, daſs letzte-

Die wahre gonorrhoische Ophthalmie erscheint vorzüglich bei jungen robusten Subjecten und ist sehr selten. Manche erfahrene Augenärzte und Aerzte (z. B. Ware, Schwediauer u. a.) sahen und behandelten sie nie.

Sie äufsert sich folgendermaafsen.

Einige Stunden, einige Tage und noch längere Zeit, nachdem der männliche oder weibliche Tripper durch Erkältung, adstringirende Einspritzungen, durch Uebermaafs geistiger Getränke, Einnehmen balsamischer Mittel (im entzündlichen Stadio) oder auf andere Weise schnell unterdrückt worden ist, erhebt sich an den Rändern beider Augenlieder eine hochrothe, harte, sehr schmerzhafte, sich schnell über die ganzen Augenlieder ausbreitende Geschwulst, die sich bald auch auf die Bindehaut der *Sclerotica* fortpflanzt und wie bei der reinen *Chemosis,* einen bald mehr bald weniger ziegelrothen Wall um die *Cornea* aufwirft, der jedoch nicht so hart und hochroth ist, als bei der eben genannten *Chemosis.* Dabei findet sich grofse Lichtscheu ein, der Schmerz vermehrt sich im Auge, in der Umgegend desselben und im ganzen Kopfe, aufserordentlich, so dafs der Kranke beinahe wüthet, und damit stellt sich Fieber ein.

Bald, sehr bald fängt die Bindehaut der Augenlieder und des *Bulbus* an, erst weifslichen, dann gelblichen oder gelbgrünlichen Schleim in grofser Menge abzusondern, der dem Ansehn nach mit der Trippermaterie sehr überein kommt; zugleich nimmt die Geschwulst des obern Augenliedes auf eine furchtbare Art zu, wird livide und bedeckt, wie ein Fleischklumpen herabhängend, den ganzen Augapfel. Endlich bildet sich im Auge Eiter, *Hypopyon*, die Lamellen der *Cornea* lockern und werfen sich auf, wie die Blätter eines viel gelesenen Buches, die *Cornea* berstet, und

---

rer von selbst aufhörte, nachdem die Ophthalmie zu Stande gekommen war. Siehe die Anmerkung des Uebersetzers von Benjamin Bell's Abhandlung über den bösartigen Tripper. 1. Bd. S. 43.

es erfolgt, wenn nicht schnelle Hülfe geleistet wird, eine völlige Colliquation des Auges. Auch fängt die Vereiterung der *Cornea* nicht selten an ihrer Peripherie an, bevor noch Eiter in der vorderen Augenkammer zu bemerken ist, die *Cornea* trübt sich schnell gänzlich, verdickt sich, wird breiartig, matsch, bricht an mehreren Stellen durch und veranlafst nicht nur *Staphylomata racemosa etc.*, sondern es erfolgt gleichfalls nicht selten völlige Colliquation des *Bulbus*, nachdem vorher die Crystalllinse, so wie der Glaskörper aus dem Auge getreten sind.

Die Schleimabsonderung beginnt in der Regel schon 24 bis 48 Stunden nach eingetretener Anschwellung der äufsern Häute des Augapfels, und durch diese unverhältnifsmäfsige Schnelligkeit im Uebergange zu der Schleimabsonderung unterscheidet sich dieses Uebel auch von der reinen *Chemosis*. Obgleich man anfangs exulcerirte Stellen auf der Oberfläche des Augapfels nicht entdeckt, so scheint der Schleim doch oft aus allen Punkten der *Conjunctiva* in solcher Menge zu dringen, dafs er zuweilen über die Wange rinnt.

Der Verlauf dieser Ophthalmie ist gewöhnlich in 4 Tagen vollendet; indefs giebt es Fälle, wo die Entzündung längere Zeit, oft Wochen und Monate nach Unterdrückung des Trippers entsteht, oder wo der Tripper noch nicht gänzlich verschwunden ist; hier verläuft die Krankheit immer milder und dauert länger.*)

Die Prognose ist, wenn der Arzt gleich Anfangs hinzugerufen wird, und die bedeutende eiterförmige Schleimabsonderung noch nicht überhand genommen hat, ziemlich günstig, besonders wenn es ihm gelingt, den Tripper sogleich wieder herzustellen. Die Geschwulst mindert sich dann nach und nach, die Entzündung geht im Grade zurück, wird zur *Taraxis*, und es bleiben blofs längere oder kürzere Zeit entzündete Augenlieder übrig. Wenn aber Eiterung in den innern

---

*) Reil, *Memorab. clin. Vol. I. Fasc. I. pag.* 67. Richter, a. a. O. S. 63. u. a. m. nennen sie dann *Ophthalmia gonorrhoica chronica.*

und äufsern Theilen des Auges im hohen Grade eingetreten ist, so geht das Auge schnell verloren.

Noch ist hinsichtlich der Voraussage zu bemerken, dafs zwar gewöhnlich die Krankheit nur ein Auge befällt,*) dafs aber auch oft beide Augen gefährdet werden; wo dann in dem höchsten Krankheitsstand des einen, sich die ersten Erscheinungen der Entzündung in dem zweiten Auge einstellen.

Wird man nun gleich beim ersten Entstehen der Augenentzündung hinzugerufen, und begann die Krankheit kurze Zeit nach unterdrücktem Tripper; so verfahre man sogleich allgemein und örtlich**) antiphlogistisch, suche aber auch, und nach Beer***) vor allen Dingen, den Tripper wieder hervorzubringen.****) Defswegen mache man, wenn noch Schmerzen in der *Urethra* zugegen sind, warme Halbbäder, Cataplasmen von weifsem Brot, Milch und Saffran, oder *Herb. Hyo-*

---

*) Ph. Fr. Walther, Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Medicin u. s. w. 1810. 1. Bd. S. 457.

**) Am besten dadurch, dafs man nach Spangenberg's (Horn's Archiv von 1812, Seite 272.) und Wendt's a. a. O. Rath, das krankhaft Schleim secernirende Organ, nämlich die wulstig hervorgetriebene Bindehaut, untüchtig dazu zu machen sucht, indem man mittelst der Scheere ein Stück aus derselben ausschneidet und stark bluten läfst.

***) a. a. O. 1. Bd. S. 546.

****) Manche, und zum Theil angesehene, Aerzte haben es kaum für nöthig erachtet, die Heilung durch Wiederherstellung des Trippers zu unterstützen, weil sie Beispiele fanden, (wie Bell, a. a. O. 1. Bd. S. 28.) wo ohnedieſs die Entzündung glücklich verlief; indeſs weit öfter und bei heftigen Graden der Entzündung, geht das Sehorgan verloren, wenn der Tripper nicht wieder hergestellt wird. — Ebenso gut wie eine durch unterdrückte Krätze entstandene Paraplegie, eben so gut wie durch unterdrückte Menstruation entstandene *Hepatitis, Metritis, Enteritis*, und wie sie alle heifsen mögen, am allerbesten und schnellsten wieder gehoben werden, wenn die unterdrückten Thätigkeiten gleich wieder hervorgerufen werden können, eben so gut und am besten wird die *Ophthalmia gonorrhoica* verschwinden, wenn die *Gonorrhoe* wieder hergestellt ist.

scyami auf das Mittelfleisch, und erneuere sie alle zwei Stunden; man lasse den *Penis* lauwarm (nicht zu heifs) baden; man spritze öfters lauwarmes Oehl in die Harnröhre,*) setze auch wohl trockne Schröpfköpfe auf das *Perinaeum* und bringe trockne, oder mit Praecipitatsalbe, oder wenn die *Urethra* vollkommen schmerzlos ist, mit Trippergift bestrichene Kerzen in die Harnröhre. Ueberhaupt scheue man keine Mühe, denn jede Minute Verlust kann hier das Gesicht des Leidenden vernichten.

Innerlich reiche man antiphlogistische Mixturen mit *Magnes. sulphuric.*, *Natr. sulphuric.*, und gebe *Calomel* in starken Dosen, nach Umständen alle 2 Stunden 2 Gran. Dabei mufs anfangs der Gebrauch aller reitzenden Augenwässer sorgfältig vermieden werden. Bei beginnender Schleimaussonderung reinige man die Augen häufig, sorgfältig aber sanft mit: ℞. *Decoct. hbae malvae bene filtrat.* ℥iv. *ex* ℥ß. *parat. Extr. opii gr. vj.*, oder statt dessen *Aqu. opii* ℥ß. *M. S.* Lauwarm anzuwenden. Später wähle man dazu: ℞. *Decoct. hbae scordii bene filtr.* ℥iv. *e* ℥jj. *parat. Extr. opii aq. gr vj.*, oder *Laud. liq. S.* ℥ß., *Mucilag. gummi arabici* ℥jj. *M.*, welches gleichfalls lauwarm anzuwenden ist. Jetzt ist auch die örtliche trockne, nicht aromatische Wärme nützlich und wird gut vertragen.

Sobald die *Phlogosis* im Allgemeinen gemäfsigt ist, lege man Senfpflaster auf die Lenden und mache Senffufsbäder. Später lege man ein kräftiges *Emplastrum stibiatum* in den Nacken, wo es nicht nur bis zur völligen Eiterung der Pocken liegen bleibt, sondern letztere auch noch längere Zeit hindurch mit reitzenden Salben verbunden werden können. — Nur zuletzt bei chronisch entzündlichen Rückbleibseln versuche man reitzende Augenwässer, z. B. *Sublimatsolutionen etc.*

Das übrige Verfahren kommt ganz mit dem, bei der reinen *Blepharo-* und *Ophthalmoblennorrhoe* angegebenen überein.

Diejenige gonorrhoische Augenentzündung, welche

---

*) Scarpa, a. a. O. Vol. I. pag. 215.

durch äufsere Berührung der Augenlieder mit Trippergift entsteht, verläuft sehr gutartig, ähnelt der catarrhalischen Augenliederentzündung, macht aber nicht die der letzteren eigenthümlichen *Exacerationen* und *Remissionen*, geht fast nie in *Ophthalmoblennorrhoe* über und weicht den oben angeführten Augenwässern, welchen man allenfalls etwas *Acet. saturn.* zusetzen kann, binnen 8 bis 21 Tagen, besonders wenn man innerlich eine Purganz aus *Calomel* und *Rad. jalappae* nehmen läfst, und sorgfältige Reinlichkeit beobachtet.

Die syphilitische Regenbogenhautentzündung, *Iritis syphilitica.*

Sie erscheint entweder bei Menschen die an einer *Lues confirmata* leiden, oder bei solchen, wo frühere Zeichen der *Syphilis* längst vorüber gegangen sind. — Die Ausbreitung dieser *Iritis* erstreckt sich weniger in die tiefer gelegenen Gebilde des Auges, als vielmehr in die äufsern Theile desselben.

Zeichen der Krankheit. — Blasse Röthe der *Sclerotica*, die um die ganze Hornhaut einen ziemlich breiten, gegen die *Cornea* hin mehr, nach der Peripherie des *Bulbus* hin aber weniger sichtbaren Ring bildet, Mattwerden der Hornhaut, Trübwerden der wässrigen Feuchtigkeit, Unbeweglichkeit der *Iris*, Verengerung der Pupille, welche zu gleicher Zeit gegen den innern Augenwinkel und gegen die Nasenwurzel zu, nach aufwärts weicht und dabei winklicht wird, Anschwellung der Regenbogenhaut, Umstülpung dieser Membran nach der innern Augenkammer und wulstige Hervordrängung derselben nach der *Cornea* hin, Lichtscheu und Thränenfluſs, gehören zu den ersten Symptomen der Krankheit. — Endlich stellen sich auch *dolores osteocopi* ein, die an der Nasenwurzel anfangen und sich nach dem Verlaufe des Oberaugenhöhlenbogens bis zum äufsern Augenwinkel erstrecken. Sie treten nach Sonnenuntergang Abends um 5 — 6 — 7 Uhr ein, erreichen um Mitternacht ihren höchsten Grad, so dafs die

die Kranken schreien und jammern, und lassen gegen Morgen um 4 oder 5 Uhr nach.

Nach jeder solchen Schmerzensnacht, findet man die Pupille mehr verengert, nach oben und innen hingestellt, die Farbe der *Iris* verändert, und hinter der Pupille Fäden aus coagulabler Lymphe erzeugt, die das Sehvermögen immer mehr beschränken. Wird jetzt noch keine Hülfe geschafft, so zeigen sich sowohl am Ciliarrande als am Pupillarrande der Regenbogenhaut kleine höckrigte Knötchen von röthlicher oder grau gelblicher Farbe, die man Hahnenkämme, *Condylome*, genannt hat*) und welche öfters die ganze vordere Augenkammer ausfüllen und die *Cornea* hervordrängen können. Zuweilen entstehen zugleich auch auf der Hornhaut und im Weifsen des Auges speckigte Geschwüre, und in der Umgegend des Auges entwickeln sich *Gummata* und *Tophi*, die schnell exulceriren.

Wenn der Körper an allgemeiner *Lues* leidet, so geben oft catarrhalische, rheumatische oder auch traumatische Augenentzündungen Gelegenheit zum Uebergange in eine syphilitische *Iritis*, ja diese Entstehungsart scheint sogar die häufigste zu sein; demohngeachtet verändern solche Complicationen die weiter unten angegebene Heilmethode nicht.

Prognose. — Ist das Uebel erst entstanden und kann der Arzt den *Mercur* in hinreichender Gabe nehmen lassen, ist die Exsudation von coagulabler Lymphe in der Pupille nicht grofs; so ist die Voraussage günstig. Wenn aber das Sehvermögen durch ein dichtes lymphatisches Netz in der hintern Augenkammer und in der Pupille ganz aufgehoben ist, so darf man keine völlige Wiederherstellung des Gesichts hoffen. Sind schon Condylome, Geschwüre der Hornhaut und Knochengeschwülste in der Augengrubengegend zugegen; so ist an Wiederherstellung des Gesichts nicht zu denken, und gesellt sich dazu noch eine Entmischung der Glasfeuchtigkeit, *Synchysis*, die selbst der übermäfsige Gebrauch des Quecksilbers hervorbringen kann;

*) Taf. IV. Fig. 6.

so behält der Geheilte auch nicht die geringste Lichtempfindung. Sind mit der *Syphilis* zugleich syphilitische Ausschläge oder Geschwüre an der Stirn und den Augenliedrändern verbunden; so können leicht die Wurzeln der Cilien und Augenbraunen zerstört werden, wodurch dann ein unheilbarer Verlust dieser Haare, *Alopecia, Madarosis*, entsteht. Indefs fallen diese Haare bei allgemeiner *Syphilis* zuweilen ohne anderes sichtbares örtliches Leiden aus.

Heilung. — Vor allen Dingen ist es hier nöthig, die nächtlichen Knochenschmerzen schnell zu beseitigen, weil nach jedem Schmerzanfalle die Pupille kleiner und durch die in derselben angelegte Lymphe, immer undurchsichtiger wird. Um diese Anzeige zu erfüllen, lasse man Abends eine Erbse grofs von der grauen Mercurialsalbe mit *Opium* vermischt*) in die Augenbraunengegend einreiben und das Auge mit einer durchwärmten leinenen Compresse bedecken. Scheint der nächtliche Knochenschmerz dennoch heftig wer-

---

*) Z. B. ℞. *Ungt. Hydrarg. cin.* ℥jj.
Tincturae Opii cr. gtt xv—xx.
M. — Für die *Tinct. Opii* kann man auch ☥ *Opii pur.* nehmen; nur mufs die Salbe alsdann sehr lange gerieben werden. Auch ist folgende Salbe sehr zweckmäfsig:
℞. *Opii puri gr vjjj.*
Extr. hyoscyami ℈j.
Ungt. hydr. cin. ℥jj.
M. exactissime.

Ueberhaupt ist das Quecksilber sowohl äufserlich, als auch besonders innerlich, theils in getheilten Gaben, theils in grofsen, als Laxans, bei mehreren anderen specifischen Regenbogenhautentzündungen und im 2ten Stadio der reinen *Iritis*, ein vortreffliches Mittel. Zuweilen geschieht es, dafs nach häufigem Gebrauch des Quecksilbers bei allerlei Krankheiten, das Auge, wenn es nur etwa einem Luftzug ausgesetzt wurde, so empfindlich wird, dafs eine Entzündung der Regenbogenhaut entsteht. Auch hier ist das Quecksilber mit *Opium* Heilmittel, indem sich die Regel: *Similis simili curatur*, geltend zu machen scheint. Hierüber hat besonders Travers (*Surgical Essays by Astley Cooper and Benjam. Travers. Part. I. London*, 1818. merkwürdige Beobachtungen mitgetheilt.

den zu wollen, so lasse man das Einreiben Nachts wiederholen. Zugleich behandle man die allgemeine *Syphilis*, gebe innerlich *Sublimat*, oder *Calomel* mit *Opium*, wenn für die Lunge des Kranken zu fürchten ist, verhüte Durchfall und Salivation, und heile sie übrigens nach den allbekannten Regeln.

Ist die Entzündung aus einer sehr inveterirten Syphilis hervorgegangen, so leisten oft folgende Pillen treffliche Dienste:

℞. *Hydr. mur. corr. gr. jv.*
Opii puri grjjj.
M. terendo aqu. gutt. aliq. tunc admisc.
Succ. liquirit. dep. ʒjj.
f. l. a. pil. No. 100. *consp. ℥re lycopod. D. S.*
Früh nüchtern und Abends 3 Stück zu nehmen.

Man kann nach und nach bis auf das Dreifache Früh und Abends steigen, und dabei einen verdünnenden schleimigen Thee trinken lassen. Dabei ist ein warmes Verhalten unerläfslich. Ebenso mufs der Kranke eine magere und reitzlose Diät beobachten: es sei denn, dafs seine schwächliche kraftlose Constitution, eine nahrhafte Diät durchaus verlangte.

Wenn erst der entzündliche Charakter im Auge gehoben ist, so lasse man auch örtlich eine schwache Sublimatsolution mit Schleim und *Opium* als Augenwasser bei trockner Wärme gebrauchen. Zuletzt wirkt das Bestreichen mit schwacher rother Praecipitatsalbe vortrefflich, indem diese das Verschwinden der Ausschwitzungen in der Pupille befördert. Bei grofser Reitzbarkeit des Auges thut man wohl, statt der rothen Präcipitatsalbe lieber folgende auf den Augapfel anzuwenden: ℞. *Hydr. oxydulat. nigr. gr. v — vjjj. Axung. porc.* ʒj. *M. exactssme.* Ichoröse Geschwüre werden mit einer *Solutio lapidis divini* lauwarm ausgewaschen und das Auge nachher jedesmal sorgfältig abgetrocknet. Der Gebrauch der rothen Salbe soll, nach Beer, erst nach Heilung dieser Geschwüre Statt finden.

Nicht selten findet man die syphilitische *Iritis* mit *Arthritis* complicirt. Die Symptome sind hier, wie zu erwarten, aus den Zeichen der syphilitischen und gich-

tischen *Iritis* zusammengesetzt; nur merke man, dafs wenn die Gicht über die *Syphilis* im Auge nur einigermafsen vorherrscht, der weifsblaulichte, der *Iritis arthritica* eigene, Rand hier fast eben so deutlich ausgedrückt ist, als in der rein gichtischen Regenbogenhautentzündung. *) Obgleich ableitende Hautreitze während dem Bestehen einer *Iritis syphilitica* meistens unnütz, ja schädlich sind; so können sie doch bei Complication mit Gicht, nach bereits gemäfsigter Entzündung versucht werden.

Die syphilitisch-scorbutische Ophthalmoblennorrhoe, *Ophthalmoblennorrhoea syphilitico-scorbutica.*

Sie entsteht, nach Beer, bei syphilitischen Subjecten, die nicht blofs ihre Krankheit vernachläfsigt haben, sondern auch durch andere Ausschweifungen und Schmutzigkeiten so ausgemergelt sind, dafs sich Spuren einer scorbutischen Cachexie zeigen. Bei solchen Subjecten kann eine geringe Ursache, z. B. eine catarrhalische Augenentzündung, die Krankheitsform hervorrufen, deren Namen die Ueberschrift dieses Kapitels nennt.

Symptome. — Ohne vorhergegangenen oder unterdrückten Tripperfluss, erhebt sich schnell von den Augenliedrändern her, eine ungeheure, blaulichtrothe, wenig empfindliche Entzündungsgeschwulst, wobei blofs ein lästiges Jucken und Brennen der Augenlieder gefühlt, aber jeder Lichtreitz ertragen wird. Zugleich wird jetzt die Bindehaut des Augapfels ganz violett, und schwillt blasenartig in mehreren gröfseren und kleineren Wölbungen, rings um die Hornhaut so auf, dafs die unbeweglichen Augenlieder sie nicht mehr bedecken können und das untere Augenlied oft ein violettes, schwammigtes, leicht blutendes Ectropium bildet; damit ist starker Schleimfluss des obern Au-

---

*) Siehe Taf. IV. Fig. 7.

genliedes und schwacher, oft intermittirender Puls verbunden.

Bei dergleichen Kranken zeigen sich immer auch Spuren der vorhandenen *Syphilis* und des *Scorbuts;* welcher letztere sich besonders durch bleiche Lippen, livides, leicht blutendes Zahnfleisch, stinkenden Athem, und schwarze angefressene Zähne äufsert. — Uebrigens geht das Auge, nachdem sich die *Ophthalmoblennorrhoe* ausgebildet hat, in sehr kurzer Zeit, oft in 12 bis 24 Stunden, durch Colliquation verloren.

Die Vorhersage ist äufserst schlecht; oft erfolgt der Tod.

Heilung. — Man soll hier ganz so verfahren wie im zweiten Stadio der reinen *Ophthalmoblennorrhoe* angegeben ist, aber gegen die vorhandene *Syphilis* keinen *Mercur* geben, weil die kleinste Gabe furchtbare Salivation, oder colliquative Diarrhoe hervorbringt.

Von der psorischen Augenentzündung, *Psorophthalmia.*

Kaum giebt es eine Augenentzündung, welche noch vor Kurzem so wenig bestimmt war und zum Theil noch ist, als die hier zu beschreibende. Wahrscheinlich lag diefs an der mangelhaften Kenntnifs der chronischen Hautkrankheiten selbst; was indefs bei dem jetzigen Bemühen der Aerzte, diesen Theil der Heilkunst mehr auszubilden, für die Zukunft nicht mehr gelten wird.

Man nannte in frühern Zeiten alles *Psorophthalmie*, wo man bei einem juckenden Schmerz der Augenlieder, diese mit Krusten oder Geschwüren bedeckt fand; man verwechselte sie mit reinen und gemischten *Blepharoblennorrhoen;* man handelte sie unter den exanthematischen Augenentzündungen ab, und unterschied sie, je nachdem ihr *Herpes, Crusta lactea et serpiginosa, Tinea capitis, Favus, Scabies* u. m. a. zum Grunde lagen.

Jetzt weifs man, nachdem die Forschungen des Rob. Willan und Th. Bateman die charakteristi-

schen Verschiedenheiten auch der chronischen Hautkrankheiten genauer auseinander gesetzt haben, dafs vorzüglich die 2te und 5te Ordnung nach Eintheilung der eben genannten Aerzte, nämlich die schuppigten und pustulösen Ausschläge, vorzüglich Neigung haben, die Augenlieder zu ergreifen.

Hier sollte zwar nur von der *Psorophthalmie* die Rede sein, deren Entstehen ganz allein das Krätzgift herbeiführen kann und welche diese Benennung also wirklich verdient; indessen werde ich am Schlufs des Capitels von den aus andern Ausschlagsarten entstehenden sogenannten *Psorophthalmien* noch einiges hinzufügen.

Da die Krätze, wie bekannt, die Haut des Gesichts verschont; so erscheint die eigentliche *Psorophthalmie* entweder nach plötzlich unterdrücktem Ausschlage, auf welche Art sie aber nicht oft vorkommt, oder sie entsteht durch Verunreinigung der Augenlieder mit psorischem Gifte. Diese wahre psorische Augenentzündung tritt, nach Beer,*) immer nur als Augenliederentzündung auf.

Symptome dieser Entzündung. — Unter heftigem Jucken der Augenliedränder, zeigt sich eine dunkelrothe Geschwulst an denselben, an welcher sich allenthalben kleine Pusteln erheben, die endlich bersten, sich mit einem brennenden juckenden Schmerz in jauchigte Geschwüre verwandeln, welche, nachdem sie sich mit Krusten bedeckt haben, immer mehr unter sich greifen. Nachdem immer mehrere neue Pusteln erschienen, findet man in kurzem die jetzt vergröfserte Geschwulst davon bedeckt, wodurch den Augenliedern das Ansehn einer aufgeschnittenen Feige gegeben wird, welche Erscheinung man Augenliederrauhigkeit, *Dasyma, Sycosis, Palpebra ficosa,* nennt. Wenn nun die ichorösen Geschwüre sehr tief in die Augenliedränder eingreifen; so gehen die Zwiebeln der Cilien verlo-

---

*) a. a. O. 1. Bd. S. 565.

ren, *Madarosis*, *Alopecia*,*) und es bleibt endlich wohl gar *Trichiasis*, oder ein unheilbares *Entropium* zurück. Uebrigens geschieht es bei Kindern nicht selten, dafs sie die am Morgen fest verklebten Augenlieder mit Gewalt öffnen, eine Blutung ihrer Ränder herbeiführen, und dadurch zu einer partiellen Verwachsung der Augenliedränder Gelegenheit geben.

Vorhersage. — War die *Psorophthalmie* die Folge einer Verunreinigung der Augenlieder mit Krätzgift, hat die Entzündung noch nicht lange gedauert und hält sich der Kranke reinlich; so ist die Prognose ziemlich günstig. Findet aber das Gegentheil Statt, hat sich schon ein Trachom ausgebildet, oder ist wohl gar die *Conjunctiva bulbi* ergriffen; so ist die Voraussage sehr ungünstig. Nach, durch Bleisalben unterdrückter *Psorophthalmie*, folgt oft eine Verdunkelung der Glasfeuchtigkeit, *Glaucoma*, wodurch der Patient für immer des Lichtes beraubt wird.

Kur. — Ist die *Psorophthalmie* die Folge einer örtlichen Ansteckung, so kommt man bei der Heilung mit einem topischen Verfahren aus. Man beobachte also Reinlichkeit, indem man die leidenden Stellen oft mit einem warmen Aufgufs von *Hba Scord.* oder von *Hba millefolii* und *Rad. Enulae* wäscht; anfangs *sine*, wenn aber Schmerz und Spannung nachgelassen haben, *cum Hepat. sulphur. kalin. quant. sufferre. p. oculi sensibilitas*, und nachher jedesmal wohl abtrocknet. Sollen diese Mittel kräftig wirken, so müssen die vorhandenen Krusten natürlich erst erweicht und möglichst beseitigt werden, was theils durch milde Oehle:

---

*) Beide Ausdrücke gelten im Allgemeinen von jedem Ausfallen und Kahlwerden besonders der Haare am Kopfe. Wenn nach mehr verbreiteten *Psorophthalmien*, nach Verbrennungen, Wunden, nach Pocken, oder nach andern schweren innern Krankheiten, die Augenbraunenhaare ausfallen und dauernd verloren gehen; so kann man, um die Entstellung, welche dadurch das Gesicht häufig erleidet, zu heben, künstliche Augenbraunen anwenden, zu deren Fertigung ein geschickter Haarkräusler seine hülfreiche Hand bieten mufs.

Ol. amygdal., Ol. nuc. jugl. etc. theils durch obige Aufgüsse oder durch Chamillenthee geschehen wird. Trocknen nun die Geschwüre, bleibt aber die darunter liegende Haut noch roth, empfindlich und feucht; so streiche man alle Abende eine Linse grofs von folgender Salbe in die Augenlieder: ℞. *Butyr. recent. insuls.* ℥ß. *Vitriol. cypr. grx., Camphor grjv. Tutiae praep. grvj. M. exacte f. Ungt.* Bleibt die Erscheinung dennoch, so vertausche man diese Salbe mit folgender: ℞. *Merc. praec. rubr., Butyr. rec. ins., Cerae flavae M. exactissm.*

Weichen auch nach Anwendung dieses Mittels jene Erscheinungen nicht; so mufs man endlich zur Janinischen Salbe seine Zuflucht nehmen, die man aber selten öfter, als alle 2 Tage anwenden darf.

Ist die entstandene *Psorophthalmie* aber die Folge einer unterdrückten *Psora;* so mufs man bei örtlicher Behandlung auch allgemein verfahren. Man gebe defshalb Antimonialien, Schwefel oder Camphor, lasse Schwefelbäder gebrauchen und reibe vor allen eine Brechweinsteinsalbe an den Stellen des Körpers ein, wo früher der Ausschlag unterdrückt worden war; oder sind diese Stellen zu entfernt vom Auge, so mache man dieselben hinter dem Ohre. Widersteht sie aber hartnäckig allen Heilmitteln; so mufs die unterdrückte Hautkrankheit wieder hervorgerufen werden. *)

Die Anwendung bleihaltiger äufserer Mittel mufs man sowohl bei der von unterdrückter *Psora* als auch bei der von Verunreinigung der Augenlieder mit Krätzgift entstandenen Augenliederentzündung, immer sorgfältig vermeiden.

Diejenigen sogenannten *Psorophthalmien*, welche irgend einen andern chronischen Hautausschlag, als die Krätze, begleiten, oder bald längere bald kürzere

---

*) Callisen (System der neuern Wundarzneikunst 1. Theil, S. 293) und mehrere andere sagen: Die von zurückgetriebener Krätze entstandene Augenentzündung, welche allen Mitteln widersteht, wird schwerlich geheilt, wenn der Ausschlag nicht wieder hergestellt worden.

Zeit nach dessen Unterdrückung erschienen sind, können bei genauer Untersuchung der Form des Ausschlages richtig diagnosticirt und der Ausschlagsform gemäfs behandelt werden. Was die Prognose dieser Krankheiten im Allgemeinen betrifft, so ist sie, wenn sie gehörig erkannt wurden, und nicht inveterirt und vernachläfsigt worden sind, in den meisten Fällen nicht ungünstig. Indessen giebt es Ausschläge, welche, wenn sie auf das Auge übergehen, schnell zerstörend werden können.*) Hautreitze und Ableitungen, innerlich öftere Abführungsmittel, neben der gröfsten Reinlichkeit, kann man hier als allgemeine, selten Gegenanzeigen findende Heilmittel rühmen; wobei indefs die krankhafte Hautthätigkeit so viel als möglich ihrer eignen Form gemäfs behandelt werden mufs.**)

Psoriasis, *Porrigio* und die impetiginösen Hautkrankheitsarten, gehen vorzüglich gern auf die Augenlieder über.

Die örtliche Behandlung ist nach dem Grade der Hartnäckigkeit der Krankheit und der Empfindlichkeit des Leidenden verschieden; oft kommt man mit den topischen Mitteln, welche bei der eigentlichen *Psorophthalmie* vorher angegeben wurden, aus, nachdem man zuvor die Krusten, welche die Augenlieder bedecken, durch Bestreichen mit Mandelöhl oder durch Bähen mit warmem Wasser oder Milch erweicht hat.

---

*) So behandelte ich vor Kurzem ein zweijähriges Kind, welches an der von Wichmann so benannten *Crusta serpiginosa* litt; der Ausschlag war erst vor 9 Tagen erschienen und hatte sich den zweiten Tag über die Augenlieder, vorzüglich des rechten Auges, verbreitet. Als ich das verklebte Auge vorsichtig öffnete, fand ich ein vollkommen ausgebildetes Hornhautstaphylom. Am andern Auge war die *Conjunctiva bulbi* wenig geröthet, indefs hatte sich der Ausschlag seit zwei Tagen auch diesem Auge mehr genähert; jedoch wurde die weitere Ausbreitung desselben noch verhindert.

**) Siehe Th. Bateman, pract. Darstellung der Hautkrankheiten nach Willan's System bearbeitet. Uebersetzt von Abraham Hanemann, mit Vorrede und Anmerkung. begleitet von Kurt Sprengel. 1815.

Wenn hartnäckige Excoriationen und Geschwüre der Augenlieder, vorzüglich bei torpiden Subjecten, zugegen sind; so mufs man zu stärkern Mitteln, z. B. zu dem Gebrauch des *Ungt. citrin.* oder gar zu der behutsamen Anwendung des *Lapis infernalis* übergehen; indefs sind diese Mittel bei Kindern selten anwendbar. Zuweilen hat man auch von dem Gebrauch der Zinksalbe, oder des *Ungt. Hydr. alb.* einen heilenden Erfolg zu erwarten.

Noch finde ich mich besonders veranlafst, der sogenannten Milchkruste zu erwähnen, welche, wenn sie sich kräftig ausspricht, auch die Augenlieder befällt. Die Krankheit, welche sich am Auge als einfache *Blennorrhoe* zeigt, verläuft langsam und geht nur in den schlimmeren Fällen bei schwächlichen, schlaffen, scrofulösen Kindern, bei Vernachlässigung und unzweckmäfsiger Behandlung, auf den Augapfel selbst über, in welchem Falle sich die *Conjunctiva bulbi* röthet; zuweilen entstehen dann Geschwüre auf der *Cornea*, welche durchbrechen oder wenigstens Hornhautflecke zurücklassen können. Es ist fast immer anzurathen, die Kur mit einem Abführungsmittel aus *Calomel* mit Rhabarber oder Jalappenwurzel zu beginnen, ja selbst, wenn etwas Durchfall zugegen, ist bei Kindern unter einem Jahr 1 Gran *Calomel* mit 8 Gran Rhabarber empfehlungswürdig, und in keinem Falle darf ein vorhandener gutartiger Durchfall unterdrückt werden. Nach gegebener Laxanz ist der Aufgufs von *Hba jaceae* als gewöhnliches Getränk mit oder ohne Milch, aber mit Zucker, von grofsem Nutzen, indem sich das Uebel nach dessen Gebrauch bald mindert und heilt. Aeufserlich ist eine lauwarme Bähung aus filtrirtem Aufgufs der *Hba jaceae* mit *Hba scordii* zu empfehlen, wobei die gröfste Reinlichkeit nicht verabsäumt werden darf. Befinden sich auf der *Cornea* Geschwüre, welche dem Auge gefährlich zu werden drohen, so reibe man *Ungt. tartar. stib.* in den Nacken ein und tröpfle von folgendem Augenwasser 4 Mal täglich etwas lauwarm zwischen die Augenlieder: ℞. *Decoct. hbae mal-*

vae bene filtr. ℥jv. ex ℥ß. parat., Laud. liquid. Syd. ℥ß. Lap. divini grjj. S. M.

Es giebt nun noch eine nicht unbedeutende Menge von Ausschlägen, die, in den meisten Fällen, zwar dem Gesichte allein nicht angehören, aber doch gerade hier am ersten beachtet werden, und welche fähig sind, theils auf die Augenlieder, theils auf den Augapfel selbst überzugehen. Ich will diese Hautausschläge hier nicht speciell zu definiren suchen, weil dieses in practischer Hinsicht bis jetzt doch noch ein unnützes Geschäft sein würde, sondern will nur im Allgemeinen über diese Art der specifischen Entzündungsübel reden, wobei ich aber stets die practische Tendenz dieses Buches im Auge behalten werde. Die bedeutende Anzahl von Krankheitsfällen dieser Art, welche mir täglich vorkommen, scheint mir es zu erlauben, diese noch ziemlich im Dunkeln ruhenden Uebel im Allgemeinen zu beleuchten, und die zweckmäfsigste Heilmethode anzugeben, die mich bis jetzt (ich kann es wohl sagen) nur dann verlassen hat, wenn die Leidenden mir erst vor Gesicht kamen, nachdem bereits bedeutende organische Verwüstungen der Gebilde des Augapfels entstanden waren, wo ich dann freilich nur die Entzündung, nicht aber die Producte derselben, wohl beseitigen konnte.

Wenn ich Ausschläge ausnehme, welche in *Syphilis* ihren Grund finden, so kommen mir fast alle Fälle bei Kindern vor, welche das 15te Jahr noch nicht zurückgelegt haben. Bei den meisten läfst sich wenigstens scrofulöse Anlage nachweisen. Am hartnäckigsten sind sie da, wo die Kleinen im Schmutze und in feuchten, dumpfigen Wohnungen geboren und erzogen werden, wo die Aeltern an dyscrasischen Krankheiten leiden und in Armuth und Dürftigkeit leben. Am gefährlichsten und gesichtverwüstendsten werden sie, wenn eine partielle oder totale Unterdrückung des Hautausschlages vorhergegangen, und die Entzündung im Auge offenbar daher entstanden ist. In vielen Fällen scheint den Ausschlägen nicht allein die Scrofelsucht, sondern mehrere dyscrasische Uebel, die

wir Aerzte von dieser unterscheiden, z. B. Rhachitis etc. zum Grunde zu liegen, ja es scheint, als wenn in der Mehrzahl der Fälle, die Hauteruption gleichsam die Crisis des Allgemeinleidens darstelle, und aus diesem Grunde auch sehr behutsam behandelt sein wolle. Als solche, und als eine Bemühung der Natur, das Uebermaafs der inneren Krankheit, den edleren Organen zu entziehen, betrachte ich auch gewöhnlich solche Ausschläge, welche meistens nur durch ein unglückliches Zusammentreffen günstiger Umstände auf den Augapfel selbst überzugehen pflegen. Die daraus hervorgehenden Entzündungen beginnen insgemein nicht auf dem Augapfel zuerst; es sei denn, sie zeigten sich als metastatische Proceſse, oder als wahrhaft scrofulöse Augenentzündungen, in welchen Fällen das Leiden allerdings, vom Auge ausgehend, sich auf die übrigen Parthien der Gesichtsoberfläche fortpflanzen und dann oft ominöse Erscheinungen im Auge hervor bringen kann, die zuweilen auch Ausschläge, welche von dem Gesichte aus auf den Bulbus schleichen, zu verursachen im Stande sind.

Insgemein zeigen sich Anfangs im Gesichte allein, oder an mehreren Theilen des Körpers einzelne Pusteln, die mehr oder weniger jucken, früher oder später bersten und Krusten zu Stande bringen, welche nach und nach sich verbreiten, ja oft zusammenflieſsen. Nach und nach extendiren sie sich auf die Augenlieder, diese schwellen an, röthen sich und fangen bald an, durch einen mehr oder weniger dicklichen Schleim zusammen zu kleben, wodurch dann die Natur die Oberfläche der Augen selbst vor gröſserem Uebel bewahren zu wollen scheint. Indeſs darf sich dadurch der Arzt von der genauesten Untersuchung des Augapfels nicht abhalten lassen. Geht nun der Ausschlag dennoch auf die *Conjunctiva bulbi* über, woran oftmals ganz allein das beständige Reiben der Kinder Schuld zu sein scheint, so empfinden die Kleinen Stiche in dem Auge, dieses thränt, wird lichtscheu und ist bei der Untersuchung mehr oder weniger geröthet. Wird jetzt das Leiden sich selbst überlassen, vernach-

läfsigt, und unterhalten dasselbe unzweckmäfsige Lebensart, feuchte Wohnungen und Unreinlichkeit, so können sich auf der *Cornea* Geschwüre bilden, welche diese mehr oder weniger schnell durchfressen und das Gesicht vernichten; ebenso können die Augenlieder geschwürig werden, ja der jauchigte Eiter kann selbst die Augenliederknorpel angreifen, die dann nicht selten verschrumpfen und *Ec-* und *Entropia* hinterlassen. In den schlimmeren Fällen dieser Art pflegt fieberhaftes Allgemeinleiden nicht zu fehlen.

Die Kur für diese Art des Augenleidens ist, obgleich etwas langsam vorwärtsschreitend, doch sicher, sobald die Geschwüre der Hornhaut oder der Augenlieder noch im Beginnen und die Kinder nicht gar zu schwächlich sind, oder wohl gar an *Atrophia completa* leiden.

Vor allen Dingen reinige man die Augen sorgfältig mittelst lauwarmen Chamillenthee, öffne sie, untersuche sie genau und tröpfle täglich 4 bis 6 Mal von folgendem Wasser etwas lauwarm zwischen die Augenlieder: ℞. *Hydrarg. mur. corr. gr.* ß. *Aqu. rosar.* ℥vj. *Mucilag. gummi mimos.* ʒjjj. *Laud. liquid. S.* ℈jj. *S. M.* Zugleich reiche man ein Purganz aus 2 bis 4 Granen *Calomel* und 10 bis 20 Granen Rhabarber oder Jalappenwurzel. Auch nach diesem können *Calomel* in Verbindung mit *Hba cicutae* und *Rad. jalapp.* oder mit *Sulph. aur. ant.* einige Tage hindurch gegeben werden. Späterhin kann man zu dem Gebrauch des *Aethiop. antimon., Sulphur, Tart. tartar., Stip. dulcamar., Hba jaceae, Rad. lapat. acut. etc.* übergehen. Gelind auflösende Mixturen scheinen um so wohlthätiger zu wirken, wenn darauf täglich 3 bis 4 breiartige *Sedes* erfolgen.

Unter dieser Behandlung und in trocknen, reinlichen Wohnungen, bei Vermeidung aller fetten, sauren und scharfen Speisen und Getränke, verschwindet nicht nur bald die Entzündung in den Augen, sondern auch der Hautausschlag. Nie lasse man sich verleiten, äufsere adstringirende oder gar bleihaltige Mittel gegen den Ausschlag zu gebrauchen, und nur

durch lauwarm anzuwendenden Chamillenthee oder durch diesem ähnliche Dinge, darf man die äufsere Reinigung des Auges bewirken. Wo aber jenes Sublimat enthaltende Augenwasser nicht wohl vertragen wird, da kann, besonders bei Hornhautgeschwüren, eine schwache *Solut. lap. divini c. Laud. liquido Syd.* lauwarm in Anwendung gebracht werden.

Ganz anders pflegen sich die *Ophthalmien* zu verhalten, welche man nach partiell oder total unterdrückten Ausschlägen des behaarten Theils des Kopfes, des Gesichts oder auch anderer Stellen des Körpers bei Kindern beobachtet; indefs sind die heftigern Grade solcher Entzündungen, wie ich sie gleich beschreiben werde, zum Glück selten. Im Allgemeinen sind die Zufälle um so heftiger und gefahrbringender, je länger der Ausschlag gestanden hat und je plötzlicher derselbe, an manchen Stellen, oder überall, abzutrocknen und zu heilen anfängt.

Plötzliche Lichtscheu, Thränenfluſs, besonders des einen Auges, heftig stechende Schmerzen in demselben und eine blasse rosenfarbene, bald in das Bläuliche schillernde Röthe besonders in der *Sclerotica*, sind die ersten Zeichen dieses gesichtverwüstenden Uebels. Bald darauf fühlen die Kranken Schmerzen in der Supraorbitalgegend, welche mehr drückend als reifsend sind und in der Regel gegen Abend einzutreten pflegen. Dabei Eingenommenheit des ganzen Kopfes, Symptome von Regenbogenhautentzündung. Die Pupille wird träge, endlich unbeweglich, verengert und verzieht sich winklicht, wird auch trübe, aber nicht so, als wenn nur ein Faserstoffgewebe in derselben ausschwitze, sondern als wenn in ihr sich eine homogene Eitermasse bilde und befinde. Auch die Farbenumänderung der *Iris* fehlt dabei nicht, ja die Structur derselben scheint gleichsam verloren zu gehen, indem sie ein gleichförmiges aus[illegible]aschenes Ansehen annimmt. Selbst die wässrige Feuchtigkeit erscheint getrübt, allein nur selten beobachtet man Eiter in der vorderen Augenkammer. Alles dieses pflegt man am besten bei Kindern von 7 bis 15 Jahren zu entdecken,

und wenn die Augenlieder nicht gar zu arg angeschwollen sind.

Die Kopfschmerzen, welche sich Anfangs nur in der Supraorbitalgegend des leidenden Auges befanden, werden nach und nach allgemeiner. Das Kind fiebert, schläft nicht, delirirt Abends, hat vielen Durst, ist appetitlos und oft im höchsten Grade unruhig.

Die höhern Grade dieser Entzündung verlaufen sehr rasch, und kann nicht schnell vorgebeugt werden, so ist das Gesicht unwiederbringlich verloren; denn auch eine in Zukunft gefertigte Pupille kann dasselbe nicht wieder herstellen, weil solche *Ophthalmien* fast niemals sich begnügen, in dem Bereiche der *Iris* allein Verwüstungen zu hinterlassen. Die Prognose ist nur dann günstiger, wenn der zeitig hinzugerufene Arzt auch schnell genug die Ursache des Uebels vermuthet, und schnell und kräftig eingreifen kann. Der erfahrene Augenarzt, der geübte Beobachter erkennt die Intensität des Uebels gleich bei dessen Entwickelung, denn das Auge gewährt einen ganz eigenen Anblick, den man nicht gewohnt ist bei einem Kinde zu finden, sondern bei dyscrasischen Individuen des höhern Alters.

Die Kur ist von derjenigen *Ophthalmie*, welche von in das Auge kriechenden Hautausschlägen entsteht, im ersten Stadio ganz verschieden. Vor allen Dingen und bei schon eintretendem Drücken über den Augenbraunen, lege man, nach Verhältnifs der Jahre der Kleinen, 3 bis 10 Blutigel in die Schläfegegend, reiche *Calomel* in so grofsen Dosen, dafs recht bald ein heftiger Durchfall entsteht, den man allenfalls durch gelind laxierende *Antiphlogistica* unterstützen kann, und stand der Ausschlag früher auf dem behaarten Theile des Kopfes, so scheere man die Haare rein ab und reibe hier täglich 4 bis 6 Mal eine kräftige Brechweinsteinsalbe so ein, dafs schon nach 24 Stunden in dem Umkreise eines Handtellers Pocken erscheinen; doch hüte man sich, den künstlichen Ausschlag dem Auge nahe zu bringen. Um die Schmerzen über den Augenbraunen schneller zu tilgen und den organischen

Verwüstungen im Auge zuvorzukommen, ist es gut, eine Mischung aus *Ungt. hydr. cin.* und *Opium* dahier einreiben zu lassen. Wenn auf der *Cornea* Geschwüre entstehen, oder ein *Hypopyon* sich bildet, so müssen auch die äufsern Mittel nach den bekannten Regeln angewendet werden; aufserdem ist es bei dem heftigen Grade dieser *Ophthalmie*, besonders im Anfange derselben, nicht rathsam, äufsere örtliche Mittel anzuwenden, am wenigsten aber werden sehr reitzende Augenwässer vertragen. Warme allgemeine Bäder dienen nur zur Nachkur, denn so lange die Entzündung noch heftig ist, scheinen sie, meinen Beobachtungen zu Folge, mehr zu schaden als zu nützen. Uebrigens dürfen aufser der Pockensalbe, auch Ableitungen anderer Art keinesweges vernachläfsigt werden.

Von der scrofulösen Augenentzündung, *Ophthalmia scrofulosa.*

Es giebt keine häufiger vorkommende Augenentzündung als diese. In Wien zählt Hr. Prof. Beer im Durchschnitt unter hundert *Ophthalmien* neunzig scrofulöse.*)

Diese so allgemein verbreitete, dem Kindesalter besonders angehörende Entzündungsart, welche bald primär, bald secundär sein kann, verdient mit Recht die gröfste Aufmerksamkeit der Aerzte; denn obgleich sie bei zeitiger und zweckmäfsiger Behandlung, selten Blindheit zu verursachen pflegt, so hinterläfst sie dennoch nicht selten Flecken und Narben auf der Hornhaut, welche das Gesicht beeinträchtigen, und trüben, und die

*) Im nördlichen Deutschland scheint das Verhältnifs der scrofulösen Augenentzündungen zu den übrigen fast eben so grofs zu sein. In Italien hingegen, und vorzüglich in den südlichern und vom Meere entfernten Gegenden des Landes, bemerkte ich Scrofeln und scrofulöse Ophthalmien, auch unter der ärmsten Menschenklasse, welche fast bei jeder Mahlzeit ihre unverdauliche *Polenta* genieſsen, nur sehr selten.

die nicht selten zeitlebens zurückbleiben, weil die Angehörigen diese Trübungen theils für unbedeutend halten und die Hebung derselben von der Natur erwarten, theils auch die Langwierigkeit der Kur scheuen, oder überdrüfsig werden.

Obgleich im Allgemeinen die Scrofelkrankheit immer dieselbe bleibt, und nur dem Grade und der Form nach verschieden erscheint, so verdient doch ein Unterschied angeführt zu werden, welcher in der Individualität der Kranken begründet ist, und der sowohl den Verlauf des Uebels, als auch die Prognose und Heilmethode modificirt. Wir finden nämlich im Allgemeinen zwei Hauptklassen von dergleichen Kranken, einmal solche: welche unempfindlich, stupide sind, die sich durch ein blasses, gedunsenes Ansehn, breite Unterkiefer, geschwollene Oberlippe und Nasenflügel, mehr stämmigen, gedrungenen Körperbau bei schwammigem Fleische auszeichnen, und zweitens solche: welche einen gracilen, schmächtigen Körperbau, langen Hals, schmale, flache Brust, blonde Haare, blaue Augen, so wie umschriebene schöne lebhafte Röthe der Wangen besitzen, und welche sehr reitzbar und sensibel sind. Erstere leiden nicht selten zugleich an scrofulösen Hautausschlägen, Gelenkentzündungen, Knochenfrafs, Drüsenverhärtungen und Schleimflüssen, und haben häufig schmutzige, in's gelbliche fallende Zähne. Letztere leiden dagegen häufiger an catarrhalischen Beschwerden, Brufstichen, Nasenbluten, Stuhlverstopfung, wobei jede kleine Aufreitzung den Puls zu beschleunigen pflegt, und besitzen in der Regel sehr weifse schöne Zähne. Obgleich nun bei beiden Klassen von Kranken die allgemeinere Diät so wie die Behandlungsweise sich ähnlich ist, indem beide, Mäfsigkeit, Reinlichkeit, den Genufs trockner warmer Luft und angemessene Bewegung des Körpers, zu beobachten haben, auch alle schwerverdauliche Speisen, Mehlspeisen, worunter Brod, besonders fettes Butterbrod, Hülsenfrüchte, fette Fleischarten, Säuren und sehr gesalzene Speisen etc. vermeiden müssen; so ist doch der ersteren Klasse nur ein kürzerer Schlaf, eine kräfti-

gere Körperbewegung und eine reitzendere Diät zuträglicher, als der letzteren Klasse, welcher zur Befestigung der beendeten Kur wohl etwas weniges gut gehopftes Bier gegeben werden kann, dahingegen der ersteren Klasse, sowohl während als nach der Kur, Bier, Kaffee, und selbst etwas Wein zuträglich ist. Ueberhaupt hat man im Allgemeinen darauf zu sehen, dafs der Kranke der ersten Klasse eine reitzendere, nahrhaftere Diät führt, als der Kranke der zweiten Klasse, welchem daher auch während der Behandlung die Milch das sein wird, was dem ersteren das Bier ist. Nach diesem Maafsstabe ist auch hinsichtlich der arzneilichen Behandlung die Auswahl der Mittel zu treffen, was ich bei dieser selbst, angeben werde. Uebrigens denke man sich diese beiden Klassen von Kranken nicht immer streng geschieden: sie kommen oft in einem Subjecte vereinigt vor, und müssen dann nach Maafsgabe des Vorherrschens der Zeichen der ersten oder der zweiten Klasse behandelt werden.

Selten wird der Arzt so früh herbeigerufen, dafs er einen activ entzündlichen Zeitraum zu behandeln hätte; denn dieser verläuft aufserordentlich schnell.

Die scrofulöse Augenentzündung ist in Hinsicht ihres Sitzes verschieden; denn bald sind nur die Augenlieder ergriffen, und dann nennt man sie *Blepharophthalmia glandulosa scrofulosa*, oder auch der vordere Theil des *Bulbus* ist entzündet und dann heifst sie *Ophthalmia scrofulosa externa*, bald aber ist der Thränensack der leidende Theil, und hier belegt man sie mit dem Namen *Blennorrhoea sacci lacrymalis scrofulosa*, auch *Dacryocystalgia cacochymica*, *Dacryoblennorrhoea*. Scrofulöser Thränensacktripper. Gewöhnlich besteht die zweite Form mit der erstern, oder erscheint wenigstens gar leicht in der Folge, weswegen hier beide füglich vereinigt abgehandelt werden können.

Zeichen derselben. — Unter einer Empfindung von Brennen werden die Augenliedränder wenig geröthet und schwellen an; zugleich finden sich Thränenflufs und Lichtscheu ein, indefs stärker bei empfindlichen lebhaften sensiblen Individuen, als bei un-

empfindlichen und schwammigten. Eine abnorme Schleimsecretion der Meibomschen Drüsen ist schon anfänglich vorhanden, wodurch die Augenlieder gar leicht zusammenkleben. Dabei sind die zugleich aus dem Auge laufenden Thränen so scharf, dafs sie die von ihnen berührten Theile excoriiren und öfters ödematöse Anschwellungen der Umgebungen der Augen hervorbringen.

Nach und nach nimmt nun die *Conjunctiva bulbi* Theil an der Entzündung, indem man eine zerstreute Röthe derselben bemerkt. Blutgefäfsbündel, die alle concentrisch gegen die *Cornea* hinlaufen, und deren einige sich über den Rand der Hornhaut, bis in die Mitte derselben verlängern, werden bemerkbar. Die *Sclerotica* röthet sich, und es erscheinen am Ende der Gefäfsbündel, bei torpiden Subjecten, — Eiterpusteln, die sich bald in Geschwüre verwandeln,*) öfters Fleischwucherungen zeigen, die Hornhaut durchbohren, und nachdem die *Iris* in die Oeffnung gefallen ist, ein Staphylom, u. s. w. zu Stande bringen; bei lebhaften sensiblen Scrofulösen hingegen, — entstehen Wasserbläschen, *Phlyctaenulae*, welche bersten und öfters einen wahren Hornhautbruch, *Ceratocele*, hervorbringen. Zugleich ist bei letzteren nicht nur weit mehr Lichtscheu und öfterer anhaltender schmerzhafter Krampf der Augenlieder vorhanden, sondern man bemerkt auch bei scrofulösen Augenentzündungen sensibler Individuen weit öfter einen Uebergang in *Iritis* und in ein dadurch gesetztes Totalstaphylom der Hornhaut, als bei den Entzündungen torpider Subjecte. Auch zeigt sich die *Ophthalmie* hier mehr der rheumatischen ähnlich, indem dafür nicht allein der eigenthümliche Schmerz, die grofse Lichtscheu und der Thränenfluſs sprechen, sondern auch die Röthe in der Conjunctiva und Sclerotica, welche nur erst nach einigen Tagen, nachdem die Schmerzen nachgelassen haben, die Bündelform der Blutgefäfse in der Bindehaut

*) Taf. IV. Fig. 8.

des Bulbus zu erkennen giebt, welche der scrofulösen Augenentzündung eigenthümlich angehört.

Uebrigens erscheint die scrofulöse *Ophthalmie* Anfangs häufig wie ein entzündlich catarrhalisches Augenliederleiden. Die Kranken niesen, weil sich die Schleimhaut der Nase in einem consensuell gereitzten Zustande befindet, die Nase secernirt einen dünnen scharfen Schleim und zeigt überhaupt, dafs sie vom Schnupfen befallen. Allein obgleich die scrofulöse *Ophthalmie* hierin vieles mit der catarrhalischen gemein hat, so unterscheidet sie sich doch dadurch wesentlich von der letzteren, dafs sie gegen Abend Remissionen macht, indem zu dieser Zeit die Schmerzen, so wie die *Photophobie* etwas nachlassen, die Kranken selbst aufsehen können, wogegen die catarrhalische hier exacerbirt. Neben jenen Symptomen sind entweder die Zeichen der allgemeinen Scrofelkrankheit vorhanden, wenn letztere mehr ausgebildet ist, oder sie sind nicht so zu bemerken, wenn der Kranke nur geringe Anlage zur Krankheit besitzt.

In *Blepharoblennorrhoe* und *Ophthalmoblennorrhoe* geht die scrofulöse Augenentzündung selten über; desto öfter bleiben aber Schwielen der Augenliederränder, *Tylosis*, und mit derselben zuweilen ein Verlust der Cilien, *Milphosis*, *Ptilosis*, zurück, welcher jedoch meist vorübergehend ist, weil die Wurzeln der Augenliedhaare nicht zerstört sind. Die *Tylosis* entsteht entweder in Folge des unvollkommenen Verlaufes mehrerer nebeneinander liegender Gerstenkörner, wo denn die Augenliederränder gleichsam knotig anzufühlen sind, oder sie entsteht in Folge einer chronischen Entzündung der sämmtlichen an den Augenliedrändern liegenden Drüschen und des Knorpelhäutchen des Tarsus, wo dann die Schwiele glatt und gleichförmig erscheint. Werden solche Tylosen ganz vernachläfsigt, bestehen sie bald gröfser bald kleiner werdend, viele Jahre hindurch, compliciren sich damit im höhern Alter, im Körper hausende Dyscrasien verschiedener Art, so entsteht zuweilen aus solchen scrofulösen Remanenzen, der sogenannte Augenliedkrebs.

In Hinsicht der Prognose ist folgendes zu merken: Im Allgemeinen ist die scrofulöse Augenentzündung sehr langwierig und macht, so lange die Scrofeln noch nicht gehoben sind, gar leicht, vorzüglich im Herbste und bei feuchter Witterung, Rückfälle. Wenn indefs die Leidenden gleich Anfangs zweckmäfsig behandelt werden, so verschwinden die scrofulösen *Ophthalmien* nicht selten binnen wenigen Tagen, ohne Recidive zu machen; dieses letztere gilt bei den sensiblen Subjecten häufiger, als bei den torpiden, vorausgesetzt: dafs die nöthigen diätetischen Bedingungen vollständig erfüllt werden können. Sind nur die Augenlieder entzündet, hat die Krankheit noch nicht lange gedauert und ist die scrofulöse Diathesis nicht grofs; so ist die Voraussage ebenfalls günstig. Wenn aber schon öftere Recidive erfolgten, die Augenliedränder schon verhärtet sind, oder *Blepharoblennorrhoe* zugegen ist; so wird die Prognose viel ungünstiger. Noch ungünstiger ist letztere, wenn bei sehr scrofulösen Subjecten auch die *Conjunctiva Scleroticae* und *Corneae* entzündet und mit Geschwüren besetzt ist. Am ungünstigsten aber wird sie sein, wenn dergleichen Geschwüre bei zarten sensiblen Kranken vorkommen, wo die Krankheit weit schneller vorschreitet als bei torpiden, und wo bei schon entstandenem Hornhautbruch die *Iris* sich in diesen legt, mit demselben verwächst und so eine complicirte *Ceratocele* darstellt, oder wenn die *Iris* wohl gar entzündet ist, mit der ganzen Hornhaut verwächst und ein Totalstaphylom der *Cornea* zu Stande bringt.*) Solche böse Verwüstungen können aber kaum

---

*) Es sei mir erlaubt, hier Einiges über die Schwierigkeit der Vorhersage bei Augenentzündungen im Allgemeinen und bei der scrofulösen in's Besondere, einfliefsen zu lassen. Da von der richtigen Prognose der Ruf des Augenarztes grofsentheils abhängt; so ist auch vor Allen die genaue Untersuchung der kranken Augen, unerläfslich. Diese aber ist bei grofser Lichtscheu schwierig; am schwierigsten aber bei sehr lichtscheuen entzündeten Augen kleiner scrofulöser Kinder, um so mehr, da hier oft weder Zureden noch Gewalt über das krampfhafte Zudrücken der Augenlieder und über

ohne grofse Vernachläfsigung der Kranken entstehen, es sei denn, dafs dieselben in Feuchtigkeit, Schmutz und Armuth leben, wo dann, doch nur in einzelnen Fällen, die Scrofelkrankheit nicht allein im Körper überhaupt üppig wuchert, sondern auch im Auge einen sehr hartnäckigen, fast bösartigen Charakter annimmt.

Diejenigen Geschwüre, welche sich auf der Bindehaut der *Sclerotica* zeigen, sind gröfser, breiter, flacher, weit schwieriger zu entdecken als auf der Hornhaut; allein sie durchdringen die *Sclerotica* äufserst selten und sind mithin schon darum gefahrloser, als die Geschwüre der *Cornea*.

Wenn sich bei der scrofulösen Augenentzündung keine Geschwüre, dafür aber flügelfellartige Excreszenzen oder pannöse Trübungen auf der Hornhaut zeigen; so verläuft die *Ophthalmie* zwar gefahrloser, allein auch ungemein langwierig und hinterläfst wenigstens Trübungen auf der Hornhaut, welche die andauerndste Sorgfalt zu ihrer Beseitigung erfordern.

Wenn sich bei einer scrofulösen *Ophthalmie* aufser dieser noch ein krankhafter bedeutender Procefs,

---

den Eigensinn der Kleinen etwas vermögen. Man merke sich daher folgende practische Regeln: Scheint der Fall nur einigermaafsen wichtig zu sein und ist die genaue Untersuchung der Augen bei'm ersten Besuche nicht möglich; so gebe man das weiter unten angeführte Purgans und lasse die vielleicht vorhandenen Augenliedkrusten durch lauwarme Milch von den Angehörigen erweichen und entfernen. So lange enthalte man sich jeder Vorhersage. Am folgenden Tage wird es in der Dämmerung gegen Abend leicht sein, das Auge zu untersuchen; denn zu dieser Zeit remittirt die Lichtscheu und Entzündung, das Kind ist weniger mürrisch und blickt freier und leichter auf. So entdeckt dann der untersuchende Arzt oft ohne Mühe den Grad und die Producte der Entzündung, die der sorglose, nachläfsige, weder sieht, noch mit Bewufstsein heilen kann; so vermag der erstere auf die vielleicht vorhandene Gefahr aufmerksam zu machen, indefs der letztere die gemeinhin günstig lautende Prognose, bei Ablauf der Entzündung, durch Vorfälle der Regenbogenhaut oder gar durch gröfsere Staphylome, zum Nachtheile seines Rufes, vernichtet sieht.

der seinen Grund gleichfalls in den Scrofeln findet, an irgend einem Theile des Körpers, entwickelt; so verschwindet die erstere. Defshalb wird die Prognose da günstig, wo Kopfausschläge, entzündete Hals- oder Inguinaldrüsen, wo Knochenkrankheiten oder Durchfälle etc. plötzlich auftreten.

Kur. — Diese ist theils allgemein, theils örtlich. Obgleich die innere Behandlung gegen die Scrofelkrankheit im Allgemeinen hier unerläfslich ist, so hat der Augenarzt doch zuvor zu bedenken, dafs er sowohl bei der scrofulösen *Ophthalmie*, als auch bei den übrigen Entzündungen des Sehorgans, Rücksichten beobachten mufs, welche der nur sogenannte innere Krankheiten heilende Medicus, bei weitem seltener zu berücksichtigen braucht. Ersterer bedenke nämlich, dafs: obgleich die Entzündung im Auge grofsentheils ein Ausdruck, ein Symptom der im Körper weilenden Dyscrasie ist, dieses Symptom doch an einem Orte haftet, welcher durch langes Verweilen desselben, bedeutend gefährdet werden kann. Dem gemäfs sei seine erste Absicht, das Leiden aus dem Auge zu verjagen oder wenigstens zu mindern und das Fortschreiten desselben zu brechen, ohne viel zu fragen, ob sich dadurch das Allgemeinleiden des Körpers, auch wohl viel oder wenig vermindere. Nur dann erst, wenn die gröfste Gefahr, worin das Auge etwa schwebte, beseitigt worden, treten die Indicationen ein, welche die Dyscrasie im Allgemeinen erfordert.

Nachdem ich dieses vorausgeschickt habe, wird nun auch klar, warum wir beim Beginnen der Kur der scrofulösen *Ophthalmie*, fast durchgängig, ein, der Individualität des Kranken angemessenes *Laxans mercuriale* vorausschicken müssen, und warum ferner bei gefahrdrohenden oder bei höchst inveterirten Entzündungen, ein in den Nacken zu legendes *Emplastrum stibiatum*, vor allen indicirt ist, denn beide wirken als kräftige *Antagonistica* und bringen in kurzer Zeit einen heilsamen Effect zu Stande.

Daher pflege ich denn auch fast in allen Fällen die Kur mit einer starken Gabe *Calomel*, bei sensiblen

Subjecten 2 bis 5 Gran, bei torpiden, gedrungenen Subjecten aber 3 bis 7 Gran, den ersteren mit Rhabarber und Magnesia, den letzteren mit Jalappenwurzel und etwas Zimmet, früh nüchtern auf einmal zu reichen, und wo ich Kranke finde, welche einen auffallend starken, hart anzufühlenden, doch schmerzlosen Unterleib haben, denen gebe ich den *Calomel* mit *Resin. jalapp.* und *Sap. medicat.* in Pillenform.

Hierauf erst kann man zu den übrigen Mitteln übergehen, wobei indefs wohl zu berücksichtigen ist, dafs für die unempfindlichen, trägen und stupiden Scrofelkranken, mehr die eigentlichen *Antiscrofulosa* in Verbindung mit Wein und reitzend-stärkenden Mitteln passen, für die sensiblen, zartgebauten Subjecte hingegen, mehr die gelind flüchtig stärkenden Arzneien, bei Weglassung der geistigen Getränke, geeignet sind.

Zu den vorzüglichsten gehören gelind auflösende Mixturen, milde Extracte, *Liquor terrae fol. tart.*, *Tartar. tartar.*, *Infus. senn. comp.*, die milderen Antimonialpräparate nach Scarpa (a. a. O. pag. 227.) den *Aethiops antimonialis*, Anfangs zu $\frac{1}{2}$, nach und nach bis zu 20 Gran im Tage, welchen man bis 50 und mehrere Tage hintereinander nehmen lassen soll. Den *Tart. stib.* in kleinen Dosen, die *Baryta muriatica*, *Guajac*, mehrere Schwefelpräparate, die *Dulcamara*, welche besonders bei gegenwärtigen Hautausschlägen zu empfehlen ist. Ich erinnere nochmals, dafs diese Mittel der Individualität des Kranken gemäfs, gewählt werden müssen.

Die scrofulöse Augenentzündung ist übrigens selten so heftig, dafs sie den antiphlogistischen Heilapparat zum Eingange der Kur erforderte. Ich wenigstens habe da, wo ich ihn der Intensität der Entzündung wegen für nöthig hielt, und z. B. Blutigel legen liefs, keine Besserung gesehen.

Endlich, nachdem die Entzündung im Auge vorüber gegangen und das Allgemeinleiden durch zweckmäfsige Vorausschickung der angeführten Medicamente gemildert worden, oder wo inveterirte *Blepharoblennorrhoe* oder *Ophthalmoblennorrhoe* zugegen ist, gehe man

zu dem inneren Gebrauch der *China* in Verbindung mit *Valeriana*, *Angelica*, *Serpentaria virg.*, *Calam. ar.* und *Dulcamara* über. Aehnliche Mittel sind bei Neigung zur *Atrophie* empfehlungswürdig, z. B. ℞. *Infus. calam. ar.* oder *valerian.* ℥jj. *e* ℥jjj. *Mellag. gramin.* ℥j. *Extr. chinae cort.* ʒj. *Liq. terr. fol. tart.*, *Rae rhei aq.* āā ℥ß. *Spir. nitrico aeth.* ʒj. *M. D. S.* Alle 2 Stunden 1 bis 2 Theelöffel voll zu geben.

Man hüte sich, das angezeigte Verfahren zu zeitig auszusetzen, damit die Neigung zu Recidiven desto besser vertilgt werde.

Nicht selten bleibt eine hartnäckige *Photophobie* zurück, wenn auch die übrigen Symptome der Entzündung längst verschwunden sind. Diese zu beseitigen, hat Prof. Dzondi (Aesculap, I. 1.), das *Extractum conii maculati* sehr empfohlen. Er giebt davon innerlich täglich 3 Mal 2 bis 3 Gran, steigt damit täglich jedesmal um 1 Gran, bis nach 7 — 9 oder 14 und 21 Tagen Wirkung erfolgt. Mich hat dieses Mittel weit öfter verlassen, als das *Extractum Belladonnae* zu $\frac{1}{16}$ bis $\frac{1}{12}$ Gran alle 3 Stunden, in Verbindung mit *Hydr. mur. mit.* und *Tart. tartar.*

Eine Hauptsache bei Heilung der scrofulösen Entzündungen der Augen ist die Anordnung einer zweckmäfsigen Diät. Wo diese nicht befolgt wird oder nicht befolgt werden kann, da hat man die hartnäckigsten Recidive stets zu fürchten. Geräucherte und gepöckelte Fleischarten, saure, fette oder scharf gesalzene Speisen oder schwere Mehlspeisen, Hülsenfrüchte, frisches Brod oder fettes Butterbrod, Kartoffeln, fettes Backwerk müssen streng verboten, so wie alle scharfe oder zu einer sauren Verderbnifs geneigte Nahrungsmittel, die wahres Gift für Scrofelkranke sind, gänzlich untersagt werden. Milde, wenig nährende Speisen in kleinen Portionen und lieber öfter gereicht, sind im Allgemeinen zu empfehlen. Eine reine, trockne, warme Luft ist die beste für dergleichen Kranke; feuchte Wohnungen sind vor allen zu fliehen, denn sie sind es, welche die hartnäckigsten scrofulösen *Ophthalmien* bergen.

Obgleich Reinlichkeit in jeder Hinsicht zu empfeh-

len ist, so kann ich doch während des Bestehens einer scrofulösen Augenentzündung allgemeine warme Bäder, gleichviel ob sie rein, oder mit Malz, Chamillen, Feldkümmel, Schwefelleber etc. genommen werden, keinesweges rühmen, vielmehr habe ich bei ihnen in der Mehrzahl der Fälle Verschlimmerung eintreten sehen. Ich lasse dem gemäfs während der *Ophthalmie* nicht baden, dafür aber die Haut oft mit durchwärmten trocknen Flanelltüchern reiben.

Die örtliche Behandlung richtet sich, wie die allgemeine, nach dem Zeitraume der Entzündung; denn obschon das eigentlich active Stadium selten bedeutend ist und gewöhnlich so schnell verläuft, dafs es vom Arzte nicht mehr bemerkt werden kann, so erfordert doch die scrofulöse Ophthalmie auch nach dem Verlauf jenes Zeitraumes, wenn sie noch nicht lange entstanden ist, gelindere Mittel als späterhin.

Man mache also Anfangs, so lange Schmerzen, Lichtscheu und Trockenheit des Auges zugegen sind, warme Umschläge oder Bähungen, von *Hba. Cicut.* oder Mohnköpfen mit etwas Bilsenkraut, welche man öfters erneuert; vorzüglich wenn sich krampfhafte Verschliefsungen der Augenlieder, *Blepharospasmus*, einstellen, in welchem Falle man auch Salben aus *Narcoticis* mit *Ungt. Hydrarg. ciner.* in die Umgegend der Augen einreiben lassen kann, oder, wenn die Salben nicht von der Haut vertragen werden, nach Graefe*) von folgenden:

℞. *Pulv. Extr. Belladonn. ad aër. siccat.* ʒß.
— — *hyoscyam. ad aër. siccati.*
— *Opii pur.* āā ʒj.

M. D. S. Mit Speichel vermischt in die Umgegend der Augen einzureiben.

Nach und nach gehe man nun zu leicht adstringirenden Augenwässern über, wozu Anfangs, nach Scarpa,**) ein Decoct von *Herb. hyoscyam.* mit einigen

---

*) *Repertorium* augenärztlicher Heilformen, 1817. S. 52.

**) a. a. O. Vol. I. S. 228.

Tropfen *Aqu. veget. miner.* und etwas *Tinct. Thebaica Pharm. Londin.* sehr zu empfehlen ist; oder, wo man Bleimittel fürchten mufs, filtrirte Abkochungen von Malvenblättern mit 1 Gran *Lap. divin.* auf 4 Unzen und etwas *Laudanum.*

Im Uebrigen stimmt das topische Verfahren bei der scrofulösen Augenliederdrüsenentzündung, ganz mit dem des passiven Zeitraumes der *Blepharophthalmitis glandulosa pura* überein.

Wenn *Blepharo-* oder gar *Ophthalmoblennorrhoe* eingetreten ist; so wird die örtliche Behandlung nach denen, bei der *Ophthalmia neonatorum* entwickelten Grundsätzen, vorgenommen.

Bei etwa gegenwärtigen Excoriationen der Augenliedränder und bei grofser Neigung derselben zu scirrhösen Verbildungen, vermeide man ja jeden Gebrauch von Bleimitteln. Zuletzt bediene man sich sogleich einer rothen Präcipitatsalbe, um eine entstehende *Tylosis* zu verhüten.

Wenn aber die Präcipitatsalbe nicht wirken will und die Augenliedränder sich in einem sehr callösen Zustande befinden; so soll man, nach Wardrop, die innere Fläche der Augenlieder scarificiren, stark bluten lassen und dann erst die obige Salbe mittelst eines Pinsels appliciren, worauf sie, nach jenem englischen Augenarzt, in kurzer Zeit den auffallendsten Nutzen schafft.*)

Wo auch die *Conjunctiva* des Augapfels entzündet ist, und wo bei unempfindlichen stupiden Subjecten Eiterpusteln erscheinen; da befördert man die Oeffnung der letztern durch eine schwache schleimigte Sublimatsolution mit *Laudanum***) und heilt die offnen Geschwüre durch trockne Wärme und eine *Solut.*

---

*) Siehe Bibliothek f. Ophthalm. 1. Bd. 1. St. S. 58.

**) z. B. ℞. *Hydr. mur. corr. gr.* ß.
Aquae rosar. ℥jv.
Laud. liquid. S. 3ß.
Muc. gummi arab. ℥jjj.
M. D. S. Täglich 4 bis 5 Mal, lauwarm anzuwenden.

Lapid. divin. mit *Laudan.* vermischt. Zeigen sich Wucherungen um die Geschwüre, oder ein *Staphyloma Iridis;* so mufs täglich zwei Mal *Laudan. liquid. Sydenh.* in das Auge gestrichen werden. Entstand aber ein *Onyx;* so mufs man nicht nur *Laud. liquid. S.* in's Auge streichen, sondern auch innerlich starke Dosen *Calomel* geben, damit die Aufsaugung desto schneller und stärker vor sich gehe.

Sind die Kranken sehr lebhaft und sensibel; so müssen alle reitzende und mischungsändernde Arzneimittel entfernt werden. Man gebe dem lichtscheuen Auge einen grünen Schirm und reibe *Ungt. Tart. stib.* über die Wirbelsäule, oder hinter den Ohren ein. Entstehen Wasserbläschen; so lasse man ein schleimiges Augenwasser mit etwas *Laudan.* ohne *Sublimat.* u. s. w. lauwarm gebrauchen. Bersten die Bläschen aber; so ist eine *Solut. Lapidis divini* mit vielem *Laudan. liquid. Syd.* nützlich. Drohen sie einen Hornhautbruch hervorzubringen; so setzt man dem letztern Augenwasser noch etwas *Plumb. acetic.* zu und bestreicht den vorhandenen Hornhautbruch täglich wenigstens einmal mit *Laudan. liquid. S.*

Entsteht *Pannus* mit heftiger Entzündung; so lege man in den innern Augenwinkel einen Blutigel, und in den Nacken ein kräftiges *Emplastrum stibiatum,* dessen Wirkung unterhalten werden mufs. Bildet sich aber ein wahres Staphylom aus; so ersticke man dasselbe nach der von Beer bei der reinen *Iritis* angegebenen Methode.

Der zuweilen rings um die Augenlieder erscheinende juckende, oft nässende Ausschlag, weicht meistens einer Auflösung der Schwefelleber in einem Decoct von *Hb. Scord.* Bei immer wiederauftretenden Recidiven scrofulöser Augenentzündungen oder bei hartnäckiger Lichtscheu sind *Ulcera artific.* im Nacken, (durch *Empl. stib.*) welche offen zu erhalten sind, oder endlich Fontanelle auf den Armen zu empfehlen.

Das Gerstenkorn, *Hordeolum scrofulosum,* welches man nicht selten antrifft, und das sich durch seine grofse Neigung in Verhärtung, Chalazion, Hagelkorn,

überzugehen, vor den übrigen auszeichnet, kann wie dieses behandelt werden; nur mufs man hier alles anwenden, um Eiterung zu Stande zu bringen, wozu die Ueberschläge von *Cicuta*, *Saponaria* mit *Camphor* am trefflichsten sind. Wenn sich das Gerstenkorn zuweilen bei schlechter Behandlung und bei sensiblen Individuen in eine wahre Karbunkel verwandelt; so ist die Behandlung wie bei Gangrän.

Der scrofulöse Thränensacktripper, *Blennorrhoe Sacci lacrymalis scrofulosa, Dacryocystalgia cacochymica, Dacryoblennorrhoea.* — Bei unempfindlichen Subjecten zeigen sich keine auffallenden Symptome; bei empfindlichen lebhaften hingegen äufsert sich die Entzündung des Thränensackes, bei nur oberflächlicher Untersuchung, unter dem täuschenden Bilde einer rosenartigen Nasenwinkelgeschwulst. Untersucht man aber genauer, so findet man in der Gegend des Thränensackes eine harte, bohnenförmige Geschwulst, welche bei'm Drucke Schleim durch die Thränenpunkte, niemals aber durch den Nasenschlauch, von bald dünnerer bald dickerer Consistenz absondert, wobei die Nase der leidenden Seite trokken ist. Diese *Blennorrhoe* wird leicht habituell, oder war sie verschwunden, so macht sie leicht Recidive, vermindert sich übrigens bei trockner warmer und vermehrt sich bei feuchter kalter Witterung.

Die Voraussage ist nach der Dauer und dem Grade der Krankheit verschieden.

Machte die *Blennorrhoe* schon öftere Rückfälle, oder ist sie habituell geworden; so wird höchst selten eine Heilung möglich sein. Dennoch verschwindet sie oft bei herannahender Mannbarkeit und nach der ersten Schwangerschaft, ohne Hülfe des Arztes von selbst. Geht die Krankheit in eine Thränensackfistel über; so verwächst nicht blofs der Nasenschlauch, sondern meistens auch der Thränensack selbst. Oft bleibt auch ohne entstandene Thränensackfistel eine Unwegsamkeit des Nasenschlauches und ein dadurch bedingtes Thränenträufeln zurück. Wird der angehäufte Schleim des Thränensackes nicht öfters behutsam ausgedrückt; so

erfolgt oft ein Thränensackbruch, *Hernia Sacci lacrymalis.* Werden die Thränenkanälchen und der Nasenschlauch durch im Thränensack zurückgebliebenen festen Schleim undurchgängig gemacht; so ist oft eine Wassersucht des Thränensackes die Folge davon.

Heilung. — Man bediene sich hier zum Einbringen der Medicamente ja nicht der Anel'schen Spritze und sondire nicht durch die Thränenpunkte; mindere hingegen die scirrhöse Anschwellung des Thränensackes durch Einreiben grauer Mercurialsalbe auf denselben und durch Einstreichen von bald stärkerer bald schwächerer Präcipitatsalbe in den innern Augenwinkel, wo dann dieselbe von den thätigen Thränenpunkten von selbst aufgesogen und in den kranken Thränensack gebracht wird. Uebrigens stimmt die Behandlung ganz mit derjenigen der reinen Thränensackentzündung überein.

Von der scorbutischen Augenentzündung, *Ophthalmia scorbutica.*

Eine violette Röthe der *Sclerotica*, die sich bald auch in die *Conjunctiva* erstreckt und diese varikös macht, nimmt den weifsen Theil des Augapfels ein.*) Dabei zeigt sich eine ganz eigne Lichtscheu, und Empfindlichkeit gegen glänzende Gegenstände. Die Hornhaut wird trübe, cadaverös; ebenso die wässrige Feuchtigkeit, die Regenbogenhaut drängt sich wulstig nach der Hornhaut vor, und in der erstern zeigen sich variköse concentrisch laufende Blutgefäfse, bei deren Entstehung die *Iris* unbeweglich wird, ohne dafs sie bedeutende Expansion oder Contraction zeigte. Zugleich werden die Bewegungen des Auges langsamer und in der varicösen *Conjunctiva* zeigen sich freiwillig Blutextravasate; selbst in der vordern Augenkammer erscheint Blut. Jetzt verschwindet das bisher noch schwache Sehvermögen gänzlich, die *Sclerotica* erhebt sich rings

*) Siehe Taf. IV. Fig. 9.

um die *Cornea* in dunkelblauen Wülsten, die man *Staphylomata Scleroticae* nannte, und zuweilen stellt sich mit Nasenbluten ein Abfluſs von Fleischwasser ähnlichen Thränen ein, womit denn gewöhnlich alle andere bekannte Merkmale des Scorbuts vereinigt sind.

Vorhersage. — Völlig ausgebildete, in einem scorbutischen Subjecte vorhandene *Ophthalmitis*, läſst keine Genesung hoffen. Ist aber nur geringe scorbutische *Diathesis* zugegen; so ist die Prognose weniger ungünstig. Uebrigens kommt sie sehr selten vor und greift, wenn das Subject selbst völlig scorbutisch ist, beide Augäpfel in ihrer Totalität an.

Die Heilung dieser Augenentzündung geht nur aus einer Heilung des allgemeinen Scorbuts hervor, denn örtliche Mittel verträgt das Auge, wenn man die trockne Wärme ausnimmt, hier gar nicht. Doch darf man, nach Beer, keinesweges sogenannte antiscorbutische Mittel zur allgemeinen Kur des Scorbuts anwenden; vielmehr soll man bloſs durch ein allgemein reitzend stärkendes Verfahren die Kräfte des Kranken zu heben und so nach und nach den Scharbock zu beseitigen suchen.

Anhang.

Ueber die Art und Weise, die örtlichen Heilmittel bei Augenkrankheiten richtig zu bereiten und zweckmäfsig anzuwenden.

Für kein erkranktes Organ des menschlichen Körpers werden so viele äufsere Arzneien angepriesen, als für das Auge. Obgleich man nun in der Zahl derselben, besonders in den verflossenen Jahrhunderten, offenbar zu freigebig war; so ist es doch auch nicht zu läugnen, dafs gerade die Krankheiten dieses Organs, auch eine äufserst sorgfältige äufserliche Behandlung erfordern. Die Gründe, warum gerade am Auge so mancherlei *Externa* nothwendig werden, sind verschieden. Im Allgemeinen müssen wir schon defswegen dergleichen Mittel besonders in Anspruch nehmen, weil Krankheitszustände an und für sich klein, wenn sie am Auge auftreten die Function des letzteren schmälern, ja vernichten können, wenn der Medicus es nicht versteht, sie im Zaume zu halten. Es sind dieses häufig Krankheiten, welche, wenn sie an anderen Organen in gleicher Qualität und Quantität erscheinen, nicht besonderen Schaden anzurichten im Stande sind. Was werden lymphatische Ausschwitzungen zwischen der *Pleura pulmonalis* und *costalis* viel Anderes hinterlassen als Adhäsionen zwischen beiden Membranen, welche höchstens fähig sind, die Exspiration einigermaafsen zu beschränken, wogegen sie die Pupille anihiliren, wenn sie hier, und wenn auch zehnmal geringer erscheinen!? etc. etc. Sind wir daher nicht gezwungen, alles aufzubieten, um

um die Krankheit im Auge, im Zaume zu halten oder besser noch, sie ehemöglichst zu heilen? Der Augenarzt hat deſswegen auch mehrfach andere Indicationen zu erfüllen, als der innere Krankheiten behandelnde Heilkünstler; ich möchte fast behaupten, daſs der erstere nicht selten symptomatisch handeln müsse, obgleich er die Ursache und das Wesen des Uebels recht gut kennt, welches er im Auge erblickt; er ist oft gezwungen, den im Auge existirenden Ausspruch des Allgemeinleidens unbedingt von hier zu entfernen, wenn auch das qualitative und quantitative Verhältniſs des Ursächlichen dabei ganz dasselbe bleibt, denn wollte er immer damit anfangen, das Uebel im Allgemeinen zu behandeln, so würde nicht selten die Function des Auges bereits vernichtet sein, bevor noch die allgemeine Behandlung allein, das im Auge befindliche Leiden zu mindern oder zu heben im Stande ist.

Aus diesen und aus manchen anderen Gründen läſst sich die groſse Zahl der äuſsern Mittel bei Augenkrankheiten erklären und die Nothwendigkeit des Gebrauches vieler derselben rechtfertigen.

Die Erfahrungen über die Art der Anwendung und der zweckmäſsigsten Bereitung der verschiedenen äuſserlichen Augenarzneiformen, müssen aber dem beginnenden Heilkünstler mitgetheilt werden, damit Unbekanntschaft mit derselben die vortheilhafte Wirkung sonst glücklich gewählter Mittel nicht behindere und derselbe solche Erfahrungen nicht erst durch Opfer und Schaden erlange.

Die Aetzmittel.

Diese bedürfen bei ihrer Anwendung stets der gröſsten Vorsicht; daher ist es auch in der Regel besser, sie schwach und mehrere Male anzuwenden, als zu stark und zu heftig auf einmal, besonders da die Nachwirkung aller Aetzmittel entzündungerregend ist.

Will man nun an der innern Fläche der Augendeckel Aetzmittel appliciren, so wälzt man das Augenlied so viel als möglich nach auſsen, und ist es das

untere, welches geätzt werden soll, so bewegt der Kranke den Augapfel, so viel er kann, nach oben; ist es aber das obere Augenlied, so bewegt derselbe den Bulbus so viel als möglich nach unten. Nach der Anwendung läfst man das Augenlied nicht sogleich, sondern erst dann los, wenn man die geätzte Stelle mit etwas Mandelöhl benetzt hat.

Die vorzüglichsten solcher Aetzmittel sind: *Argentum nitricum fusum, Kali causticum, Hydrargyrum oxydatum rubrum, Arsenicum album, Alumen ustum, Butyrum antimonii* und die reinen Mineralsäuren, alles Mittel, deren Wirkung auf den Organismus gar sehr verschieden ist.

Der Höllenstein scheint nur beschränkt und oberflächlich zerstörend zu wirken und dient am sichersten in trockner Gestalt, indem man ein Stückchen davon wie einen Bleistift zuspitzen läfst. Bei Anwendung desselben am Augapfel selbst oder an der inneren Pagina der Augenlieder, gebrauche man die Vorsicht, den betupften Theil nicht unmittelbar nachher mit den umgebenden Parthien in Berührung zu bringen, weil die Thränen denselben sonst zu sehr abwaschen, wodurch statt der gewünschten örtlichen, eine allgemeiner verbreitete Wirkung erfolgt.

Noch vorsichtiger als mit dem *Lapis infernalis* mufs der Arzt mit dem *Lap. caust.* umgehen, wenn er denselben bei Augenkrankheiten örtlich anwenden will. Seine Wirkung auf den Organismus ist schnell zerstörend, und er verschont in dieser Hinsicht keinesweges die höher stehenden Gebilde, z. B. die Blutgefäfse, die Nerven etc., was doch von den übrigen Aetzmitteln gröfstentheils zu rühmen ist. Man darf ihn daher auch niemals am Augapfel selbst gebrauchen, sondern mufs sich begnügen, von ihm da zu profitiren, wo in der Umgegend des Auges oder an der äufsern Fläche des Augenliedes, fehlerhafte Gebilde, z. B. Chalazien, Warzen, Balggeschwülste u. dergl. förmlich zerstört werden sollen. Auch den *Lapis causticus* wendet man trocken an, indem man ein zugespitztes Stückchen davon mit einer Pincette fafst und damit das Krankhafte

berührt. Bei Balggeschwülsten der Augenlieder kann man auch ein kleines Stückchen Aetzkali in die gemachte Oeffnung einschieben, um so den Balg zu vernichten; es ist aber besser, dasselbe lieber etwas sehr klein und öfter anzuwenden, damit nicht mehr zerstört werde, als nothwendig ist. Wo man eine zu heftige oder zu weit verbreitete Wirkung bemerkt, da benetze man den *Lap. caust.* mit etwas *Acet vini*, wodurch der entstehende Neutralisationsprocefs die weitere Zerstörung hemmt. Niemals darf der *Lap. caust.* dem Tarsus so nahe kommen, dafs er die Substanz des letzteren angreift, weil darauf Verschrumpfung desselben kaum ausbleiben dürfte.

Das *Hydrargyrum oxydatum rubrum subtilissime praeparatum*, wird seltener als Aetzmittel bei Augenkrankheiten gebraucht; wohl aber bedient man sich desselben in Salbenform und erlangt dadurch eine doppelte Wirkung, denn einmal wirkt eine solche Salbe, wenn sie nur hinreichend stark ist, gelind ätzend, zweitens aber befördert sie auch den Resorptionsprocefs der dadurch berührten Stelle.

Den Arsenik hat man besonders bei krebshaften Geschwüren empfohlen, bei denen seine Wirkung eben so wenig eine rein ätzende, sondern wie die des rothen Präcipitats, eine auch qualitativ eingreifende ist. Man mufs mit der Anwendung des Arseniks oder dessen Präparate in Pulverform, besonders bei nervenreichen Theilen äufserst vorsichtig sein, denn es ist kaum zu sagen, welchen ungeheuern Schmerz die Kranken darauf mehrere Tage hindurch behalten. Wenn nichts entgegen steht, so wähle man defshalb lieber schwache Salben, z. B. ℞. *Arsenici albi gr. v. — x. Axung. porc.* ℥ß. *M.* Auch ist es häufig gut, dieser Salbe *Opium* zuzusetzen. Am Augapfel selbst wendet man den Arsenik nicht wohl an. Man kennt denselben in der Augenheilkunde noch viel zu wenig; er bietet daher dem fleifsigen und sinnigen Beobachter noch ein weites und wahrscheinlich höchst fruchtbares Feld zu Versuchen dar.

Alumen ustum wird in Pulverform angewendet, und

wo dessen Wirkung gemildert werden soll, mit dem feinsten Zucker vermischt. Er ist zur Wegschaffung grofser, fungöser torpider oder nicht torpider Excreszenzen den übrigen Aetzmitteln oft vorzuziehen. Uebrigens ist er sowohl am Augapfel, als in der Umgegend desselben zu gebrauchen. Soll er am Augapfel nicht mehr mechanisch reitzend als ätzend wirken, so mufs er höchst fein pulverisirt und gebeutelt sein.

Butyrum antimonii, so wie die reinen Mineralsäuren, haben neben der ätzenden eine höchst reitzende Wirkung, auch wenn sie verdünnt werden; sie sind defshalb wenigstens zum Theil da wohl anzuwenden, wo man eine bedeutende Reitzung wünscht, z. B. bei Verdunkelungen der Hornhaut. Im concentrirten Zustande wirken sie dem Aetzkali ähnlicher und sind stets mit Vorsicht anzuwenden.

Die schwächeren flüssigen Aetzmittel können recht gut mittelst eines feinen Haarpinsels angewendet werden, welcher mehrere Male brauchbar bleibt, wenn man ihn gleich nach Application des Mittels in warmem Wasser auswäscht. Starke, schnell zerstörende Fluida aber applicirt man mittelst eines dünnen wohl geglätteten Besenreises; *Acidum sulphuricum* dagegen, welche am Bulbus selbst nicht anzuwenden ist, mittelst einer Bleisonde.

Asbestpinsel zu diesem Behufe zu wählen, ist unnöthig, auch reitzen sie den zu berührenden Theil durch ihre Rigidität und zerbrechen sehr leicht.

Man mufs wohl Acht haben, dafs die Pinsel und Sonden, womit die flüssigen Aetzmittel applicirt werden, nicht damit überladen sind, und mufs sie defshalb lieber vor der Anwendung am Rande des Gläschens wohl abstreifen, damit nicht zu viel des Mittels auf den leidenden Theil kommt.

Die Augenbäder,

welche man mittelst kleiner Augenwännchen von Glas, Porzellan oder anderer Masse gefertigt, anzuwenden pflegt, sind meiner Meinung nach, nur dann mit

Nutzen zu gebrauchen, wenn vieler und leichter auf das Auge gefallener Staub, durch reines Wasser aus demselben zu entfernen ist, und auch in solchen Fällen sind sie füglich zu entbehren oder vielmehr durch eine andere Verfahrungsart zu ersetzen.

Die Augendämpfe,

welche flüchtiger Natur sind und die insgemein den ätherischen Oehlen und den flüchtigen Geistern und Naphthen angehören, brauchen nur in kleinen Quantitäten verschrieben zu werden. Man bedient sich derselben, indem man 3 bis 10 Tropfen davon in die hohle Hand tröpfelt, diese Flüssigkeit mit der anderen verreibt, sitzend die Ellenbogen auf einen Tisch stützt und den Dampf aus den hohlen Händen gegen die geöffneten Augen dringen läfst. Wenn dergleichen Mittel auf die Haut in der Nähe der Augen eingerieben werden sollen, so hüte man sich wohl, dieselben auf die Conjunctiva zu bringen, damit nicht Entzündung im Auge entstehe. Zarte, sensible, blonde, mit sehr feiner Oberhaut begabte Individuen, vertragen das Bestreichen, z. B. der Augenlieder, nicht immer, vielmehr folgt nicht selten eine rosenartige Röthe, welche die Kranken wenigstens erschreckt.

Der feuchten Dämpfe bedient man sich zuweilen um zu erschlaffen und zu besänftigen. Man läfst den aus einem Topfe aufsteigenden warmen Dunst an das Auge und dessen Umgebungen gehen, indem man den Kopf des Kranken und das Gefäfs mit einem Tuche bedeckt. Nie dürfen solche Dämpfe das Auge zu heifs treffen, und nie sollte man sie im Winter in einem kalten Zimmer anwenden, oder gar mit dem noch feuchten warmen Angesichte sich einem kühlen Luftzuge aussetzen, weil dadurch die beste Gelegenheit zur Entstehung rosenartiger Augenliedentzündungen gegeben wird; vielmehr müssen nach jeder Dampfanwendung, die Augenlieder so wie das ganze Gesicht mit einem feinen gewärmten leinenen Tuche wohl abgetrocknet werden.

Die Augen-Douche.

Gewöhnlich wird zu derselben das kalte Wasser genommen, welches, je kälter es ist, desto wirksamer zu sein pflegt; je höher dasselbe herabfällt, desto kräftiger ist der dadurch erzeugte Reitz. Das Wasser kann auf die Supraorbitalgegend und selbst auf das geschlossene Auge herabfallen. Die Wirkung der Douche ist höchst reitzend, belebend. Findet man dieselbe angezeigt, so ist die dem verstorbenen Beer von Sallaba mitgetheilte, von ersterem beschriebene und abgebildete Augen-Douche-Maschine, (Siehe Beer's Pflege gesunder und geschwächter Augen etc.), weil die Flüssigkeit aus dieser sich in einem Strahle, ohne abzusetzen, fortbewegt, zweckmäfsig, deren Einrichtung so beschaffen ist, dafs noch Eis hineingebracht werden kann, um, wo es nöthig, den Kältegrad zu verstärken.

Die Augengläser.

Es ist diefs ein Kapitel, welches in den Handbüchern der Chirurgie und Augenheilkunde bisher zu wenig beachtet wurde; worüber man sich um so mehr wundern mufs, da Niemand läugnen wird, dafs eine nähere Kenntnifs der Augengläser dem Augenarzte unentbehrlich ist.

Des Raumes wegen und weil ich an einem andern Orte*) weitläufiger über diesen Gegenstand gehandelt habe, werde ich mich hier möglichst kurz fassen, indem ich den Wifsbegierigen auf ersteren verweise.

Die gewöhnlichen Brillenarten gebrauchen wir in zweierlei krankhaften Zuständen der Augen; einmal nämlich: wenn sie kurzsichtig, das andere Mal, wenn sie weitsichtig sind. Die Gläser für Kurzsichtige sind hohl, (*concav*) diejenigen für Weitsichtige hingegen gewölbt (*convex*) geschliffen.

---

*) Diätetik für gesunde und schwache Augen u.s.w. Berlin, 1821. S. 188. *et seq.*

Es giebt aber aufserdem noch zwei Fälle, in welchen die Brillen wirklich Nutzen schaffen können: nämlich bei einer Abnahme des Sehvermögens, wo die Kraft der Nervenhaut gleichsam etwas abgestumpft und auf keine Art von dem Arzte wieder herzustellen ist. Solche Stumpfheit der Sehkraft bleibt zuweilen nach langwierigen kräfteerschöpfenden Krankheiten des ganzen Körpers zurück; begleitet aber ganz vorzüglich das hohe Alter, und ist fast immer mit einem höhern oder geringern Grade von Weitsichtigkeit verknüpft. Endlich können auch da Brillen von Nutzen sein, wo der Grund der Schwachsichtigkeit in einer Trübung und Unreinheit der brechenden Medien des Augapfels liegt. Wie bei jeder Schwachsichtigkeit, sieht auch hier das fehlerhafte Auge in keiner Entfernung recht deutlich; da aber mit der Trübung der lichtstrahlenbrechenden Feuchtigkeiten im höhern Alter insgemein wiederum ein höherer oder niederer Grad von Fernsichtigkeit verbunden zu sein pflegt, so sieht die bejahrte Person auch in der Regel etwas besser in die Ferne, als in die Nähe. Obgleich nun bei der Weitsichtigkeit der Wunsch nach einer starken Beleuchtung der zu sehenden Objecte immer rege ist; so leiden doch diejenigen Subjecte, welche in einem der beiden eben angegebenen Fälle sich befinden, ganz besonders an einem wahren Lichthunger, weil sie wohl fühlen, dafs ihre Augen nur dann ihre Schuldigkeit thun können, wenn die zu betrachtenden Gegenstände in klarem Lichte erscheinen.

Die Leidenden beider Art, bedürfen der Plan — oder sogenannten Flachgläser, von 100 bis 140 Zoll Brennweite, welche kaum vergröfsern, weil hier nur ein concentrirteres Licht auf die Nervenhaut fallen und die Objecte zweckmäfsig erhellt und deutlicher gemacht werden sollen. Indefs gilt dieses nicht als allgemeine Regel; vielmehr mufs sich die Wahl der passenden Brille besonders mit nach dem zu gleicher Zeit gegenwärtigen Grade der Fernsichtigkeit richten.

Auf welche Art und Weise die Augengläser im

Stande sind, die Weit- und Kurzsichtigkeit aufzuheben, will ich in Folgendem klar zu machen suchen:

Denkt man sich eine gerade Linie, welche rechtwinklicht mit dem Brillenglase durch den Mittelpunkt desselben geht, so hat man einen Begriff von dem, was man die Axe des Glases nennt. Der Lichtstrahl, welcher in der Richtung der Axe des Glases durch dasselbe fällt, wird niemals gebrochen, sondern geht in gerader Linie hindurch. Alle Strahlen, welche parallel mit der Axe auf gewölbte Gläser einfallen, werden so gebrochen, dafs sie sich hinter dem Glase in einen Punkt vereinigen, welcher — der Brennpunkt — so wie die Entfernung zwischen dem Glase und dem Brennpunkte — die Brennweite genannt wird.

Lichtstrahlen, welche parallel mit der Axe auf hohl geschliffene Gläser einfallen, werden zwar auch gebrochen, allein in einer der vorigen gerade entgegengesetzten Richtung; denn diese vereinigen sich jenseits des Glases nie, gehen vielmehr immer weiter von einander und werden also zerstreut. Verlängert man aber die Strahlen in Gedanken diesseits des Glases, in derselben Richtung, in welcher sie sich jenseits desselben zerstreuen; so vereinigen sie sich natürlich auch in einen Punkt diesseits, welcher auch hier der Brennpunkt, so wie der Raum zwischen letzterm und dem Glase, die (negative) Brennweite heifst. — Je weniger hohl oder convex das Glas ist, um so gröfser; je hohler oder convexer dasselbe, um so geringer ist die Brennweite.

Man sieht aus diesem, dafs die gewölbten Gläser eine Kraft besitzen, welche die Brechungsfähigkeit der Augenfeuchtigkeiten und Häute, die bei dem weitsichtigen Auge zu gering ist, ersetzt; denn die Lichtstrahlen, welche von den zu sehenden Objecten ausgehen, fallen durch die gewölbte Brille so concentrirt auf die Hornhaut, dafs die brechende Kraft der letzteren, so wie die der übrigen Medien des Augapfels, jetzt hinreicht, das genaue Bild der Objecte schon auf der *Retina* zu vereinigen. Die gewölbten Gläser schaffen

dem Weitsichtigen um so reellere Hülfe, weil sie die Gegenstände zugleich heller und deutlicher darstellen.

Es wird nun auch leicht einzusehen sein, warum hohlgeschliffene Gläser dem Kurzsichtigen zusagen; denn da die Brechungsfähigkeit der durchsichtigen Medien des Augapfels bei ihnen zu stark ist und das Bild der Objecte schon vor der Nervenhaut zu Stande kommt; so kann auch, weil das Hohlglas die Lichtstrahlen zerstreut auf die *Cornea* hinleitet, die allzugrofse Brechungskraft der letzteren, so wie die der übrigen durchsichtigen Theile, nicht in Wirkung treten; vielmehr wird nun das Bild des Objects auch hier nur erst auf der Nervenhaut zu Stande kommen.

Ich übergehe die allgemeinen Fehler der Brillen an sich, indem ich darüber meine schon angeführte Schrift nachzusehen bitte und bemerke nur, dafs die Gläser vom besten, völlig blasen- und farbenlosen Glase höchst richtig geschliffen und trefflich polirt sein müssen.

Dafs die Gläser nach dem Grade der Kurz- oder Weitsichtigkeit sehr verschieden und der individuellen Beschaffenheit der Augen anpassend sein müssen, wird man aus dem Gesagten schon geschlossen haben; daher man denn auch Brillen mit den verschiedensten Brennweiten findet. Die gewöhnlichsten Augengläser für Weitsichtige, haben zwischen 15 bis 70 und 80 Zoll Brennweite; die für Kurzsichtige zwischen 4 bis 8 bis 30 und mehrere Zolle.

Obgleich nun alle brauchbare Brillen entweder zu den concaven, oder zu den convexen gehören müssen; so giebt es doch noch untergeordnete Verschiedenheiten hinsichtlich der Form der Fläche, welche ich nicht unberührt lassen will.

Für Myopen hat man sphärische bi- concav, plancancav, concav-convex oder dergleichen cylinderförmig geschliffene. Für *Presbyopen* hingegen giebt es sphärische bi-convexe, plan-convexe, oder convex-concave Gläser. Die concav-convex, oder convex-concav geschliffenen Brillen, sind vorzüglich von dem Engländer Wollaston empfohlen und werden unter dem Namen pe-

riscopische Gläser aufgeführt; indefs waren sie in der Optik längst bekannt und sind daher durchaus nicht als eine neue Bereicherung der Kunst anzusehen. Die vollkommne Zurichtung derselben soll fast unmöglich sein. Die Gläser mit cylinderförmiger Oberfläche sind neuerlich von Galland v. Cherveux erfunden worden und in Deutschland erst vor Kurzem in Umlauf gekommen. Sie scheinen in mehrerer Hinsicht vorzüglicher zu sein, als die gewöhnlichen sphärischen Gläser.

Aufser den verschieden geschliffenen Flächen der Brillengläser, finden wir auch ihre Peripherie verschiedenartig geformt. Die ovalen Gläser, welche ein sehr gefälliges Ansehn haben, sind zuerst von England zu uns gekommen, aber keinesweges anzuempfehlen; denn wegen ihrer Kleinheit, bieten sie nicht nur ein zu geringes Sehfeld dar, sondern lassen auch zu viel Nebenlicht auf's Auge fallen, wodurch der Zweck der Lichtstrahlenbrechung nur minder vollkommen erreicht werden kann. Die runden, nicht zu kleinen Brillengläser, welche in einer ganz schmalen Fassung getragen werden, sind offenbar die besten. Eine eckige Peripherie der Augengläser findet man bei den cylinderförmigen, welchen man grofsentheils nur darum eine achteckigte Form gab, um sie von den bis dahin gebräuchlichen zu unterscheiden und das Publicum durch den Reitz der Neuheit anzuziehen.

Gehen wir jetzt zu den Zeichen über, deren Gegenwart das Tragen einer Brille nöthig macht. Zuerst von diesen Zeichen bei Kurzsichtigen; dann von denen bei Weitsichtigen.

Ist die *Myopie* in einem angeborenen zu convexen Baue des Augapfels gegründet, oder ist sie überhaupt schon so weit gediehen, dafs bei gröfsern, einige Schritte entfernten Gegenständen, die Augendeckel fast ganz geschlossen werden müssen, um sie zu sehen, erkennt der *Myope* einen Menschen kaum auf zwei Schritte, bringt er bei'm Lesen das Buch so nahe an das Gesicht, dafs er nur mit einem Auge lesen kann, liest er in der Dämmerung die kleinsten Buchstaben ohne

Mühe, liebt er vorzugsweise den kleinen Druck und pflegt er auch sehr klein und compreſs zu schreiben, so ist unter solchen Umständen eine völlig passende concave Brille anzurathen.

Die Symptome, welche bei Fernsichtigen den Gebrauch convexer Gläser gebieten, sind fast noch bestimmter und in allen Fällen dringender, als die angeführten Zeichen bei Kurzsichtigen.

Man hat demnach ohne Säumen eine convexe Brille anzurathen:

Wenn der Weitsichtige kleine Gegenstände in einer beträchtlichen Entfernung vom Auge halten muſs, um sie deutlich zu sehen; wenn er bei'm Lesen und bei'm Arbeiten überhaupt immer nicht Licht genug bekommen kann, welcher Lichthunger, vorzüglich bei Betrachtung naher Objecte bei Presbyopen charakteristisch und immer zugegen ist: auch dann, wenn die Leidenden besser als jemals früher sehen können. Wenn er ferner nur eine recht groſse Druckschrift liebt und die Buchstaben auch hier bei länger oder kürzer anhaltendem Lesen gleichsam in einander flieſsen und sich zu verwirren und durch einander zu laufen scheinen, was besonders leicht bei'm Betrachten kleiner und glänzender Objecte bemerkt wird. Wenn ein naher Gegenstand bei genauer langer und aufmerksamer Betrachtung undeutlich wird, und sich wie mit einem Nebel zu überziehen anfängt, zugleich Gefühl von Spannung, Kopfschmerzen und Thränen der Augen entstehen, wobei letztere ermüden und die Objecte gleichsam vergehen. Endlich: wenn das Gesicht gleich nach dem Erwachen ziemlich schwach ist, und erst nach Verlauf einiger Stunden den gewöhnlichen Grad der Schärfe wieder erhält.

In beiden Fällen also muſs dem Leidenden eine völlig passende zweckmäſsige Brille gereicht werden.

Daſs ein Augenglas völlig passend ist, wird im Allgemeinen erkannt, wenn man durch dasselbe so lesen, schreiben und mit den Augen überhaupt arbeiten kann, als ob man ein ganz gesundes Gesicht hätte; wenn auch bei längerem Gebrauch der Brille, die Au-

gen nie angegriffen werden, nie ein Drücken über den Augenbraunen, ein Stechen und Thränen der Augen, keine leicht eintretende Ermüdung, kein Schwindel und überhaupt keinerlei unangenehme Gefühle in dem Auge oder dessen Umgebung entstehen; dieses vielmehr bei dem Gebrauch der Brille eine gewisse Behaglichkeit und Ruhe empfindet, wobei weder eine Verkleinerung noch Vergröfserung der Objecte durch dieselbe Statt finden darf. Endlich ist es ein Zeichen des zweckmäfsig passenden Augenglases, wenn man die zu sehenden kleineren Gegenstände nur in der Entfernung vom Auge zu halten braucht, in welcher gewöhnlicherweise auch das gesunde Gesicht deutlich sehen kann: wenn man also in einer Entfernung von 12 bis 16 Zollen vom Auge, ohne alle Beschwerde noch deutlich zu sehen und mittleren Druck zu lesen im Stande ist.

Sind die Gläser schlecht, oder was hier dasselbe ist, der individuellen Beschaffenheit des Bedürftigen nicht ganz angemessen: sind sie zu scharf, d. h. zu concav bei Kurzsichtigen und zu convex bei Weitsichtigen, verkleinern oder vergröfsern sie daher bedeutend: so nimmt die *Myopie* zu und der Fernsichtige, obwohl ihm die zu scharfe Brille anfangs sehr erleichtert, verdirbt sich seine Augen immer mehr. Beide sehen sich bald genöthigt, zu noch schärferen Gläsern ihre Zuflucht zu nehmen, bis sie am Ende keine mehr finden, die scharf genug wären, um den höchsten Grad ihres Uebels erträglich zu machen; wo dann der *Myope*, wie der *Presbyope*, fast so gut als blind ist.

Giebt man dem Kurzsichtigen nicht zu scharfe Gläser und läfst man ihn ökonomisch mit denselben umgehen; so kann er oft bald zu schwächern übergehen, weil seine Gesichtsweite zugenommen.

Giebt man dem Weitsichtigen eine Brille, welche ihm nicht vergröfsert, aber auch nicht zu schwach ist; so kann er dieselbe sehr lange tragen, ehe er gezwungen ist, zu einer schärferen seine Zuflucht zu nehmen.

In diesem Sinne kann man auch von den Augengläsern behaupten, dafs sie im Stande sind, das Ge-

sicht zu erhalten, und so mufs auch der Begriff einer Conservationsbrille verstanden werden.

Um nun zu einer passenden Brille zu gelangen, wird man wohl thun, den Bedürftigen zu einem geschickten Opticus zu schicken, um von demselben mehrere Brillen gegen Sicherstellung des Werthes zu leihen und zu Hause die passendste durch mehrstündigen Gebrauch ausfindig zu machen. Zuvor mufs indefs der Arzt untersuchen, ob auch beide Augen des Leidenden an demselben Fehler, oder auch nur an demselben Grade des Fehlers leiden; denn es giebt Personen, deren Augen einen ganz verschiedenen Focus haben, bei welchen ein jeder Augapfel einen verschiedenen Grad von Weit- oder Kurzsichtigkeit besitzt: wo das eine Auge weitsichtig, das andere aber weit- und schwachsichtig zugleich ist, oder wo das eine gar an Kurzsichtigkeit, das andere an Fernsichtigkeit leidet. Hier passen alle gewöhnlichen Brillen natürlich niemals, weil diese für beide Augen gleichgeschliffene Gläser enthalten und also auch bei der besten Wahl immer wenigstens ein Glas, entweder zu schwach, oder zu stark, oder völlig unpassend für ein Auge sein mufs.

Zuweilen ist die Sehkraft oder die Sehweite in beiden Augen eines Menschen von Jugend auf verschieden. Manchmal verändert eine Entzündnng, die nur einen Augapfel allein betraf, die Gleichheit des Sehvermögens. Häufig hebt der beständige Gebrauch eines Perspectivs, eines Leseglases, einer einfachen Lorgnette u. s. w., wobei immer nur ein Auge allein in Anspruch genommen wird, das Gleichgewicht der Sehkraft und der Sehweite auf. Oefters wird der Gebrauch des einen Auges, durch irgend einen Umstand, auf eine Zeitlang unterbrochen oder vernachlässigt; wo dann ebenfalls eine Ungleichheit des Sehvermögens eintritt. Dasselbe geschieht auch, wenn sich bei dem Arbeiten das eine Auge stets im Schatten, das andere aber im Lichte befindet.

Unter allen diesen Umständen mufs also der Brillenbedürftige für jedes Auge ein eignes Glas auswäh-

len und in die entsprechenden Brillenringe fassen lassen.

Zuweilen werden blofs bei den Beschäftigungen im künstlichen Lichte Augengläser nothwendig. Manchmal bedarf man für Tages- und Abendarbeiten besonderer Brillen, die aber nur graduell verschieden sein können. Dieses ereignet sich vorzüglich bei Weit- und Schwachsichtigen, deren Nervenhautkräfte an einer Erschlaffung, an einer Stumpfheit leiden, die durch ein stärkeres Licht angespornt sein wollen, wenn sie ihre Functionen gehörig verrichten sollen. In solchen Fällen mufs für die Abendarbeiten eine besondere Brille gewählt werden, welche die Objecte in ein deutlicheres Licht setzt und dieselben etwas mehr vergröfsert, als die Tagesbrille. Man sieht daraus, dafs die Abendbrille immer etwas schärfer sein mufs als die Gläser, deren man sich am Tage bedient. Natürlich dürfen beide Brillen nie mit einander verwechselt werden.

Auch die zweckmäfsigste Brille sagt indefs nach langem Gebrauche nicht mehr ganz zu; was denn, besonders hinsichtlich der Sehweite, eine Verbesserung oder Verschlimmerung ankündigt.

Dafs ein Augenglas endlich nicht mehr pafst, sieht man aus denselben Symptomen, welche nicht passende Brillen überhaupt zu bezeichnen pflegen. Vorzüglich bemerkt man Kopfweh, Drücken über den Augenbraunen, Röthe, Hitze und eine drückende Empfindung in den Augen, wobei man ihnen Erhohlung gönnen mufs, bevor man wieder eine kurze Zeit mit ihnen fortarbeiten kann, und hat man dann eine Zeitlang damit gearbeitet, so kann man bei'm Abnehmen des Glases nicht gleich deutlich und mit Wohlbehagen sehen. Man kann im Anfange nur wenige Minuten lang durch die Brille scharf und deutlich sehen, dann fühlt man die Augen schon angegriffen, so dafs die Schrift undeutlich und in einander fliefsend erscheint; dabei macht eine unpassende Brille leicht schläfrig. Endlich erscheinen die Objecte, bei näherer Untersuchung durch die Gläser, in der Entfernung, für welche sie

bestimmt sind, etwas gröfser oder kleiner als den blofsen Augen.

Entdeckt nun der *Myope* neben diesen Zeichen, dafs er die Schrift von dem unbewaffneten Auge bei'm Lesen mehr entfernen darf als sonst, und bemerkt der Weitsichtige, dafs er die Buchstaben mit blofsem Auge schon in gröfserer Nähe deutlicher erkennen und lesen kann, als vormals; dann kann man sicher sein, dafs die *Myopie* und die *Presbyopie* wirklich abgenommen haben, und also jetzt eine schwächere Brille dienlich und passend wird.

Mifsversteht man die angegebenen Zeichen, hält man sie, wie dieses nur gar zu oft zu geschehen pflegt, für Winke, eine noch schärfere Brille herbeizuschaffen: so kann man den Augen dadurch ungemein schaden, sie wahrhaft schwächen und die Kurz- oder Fernsichtigkeit bedeutend vermehren.

Das Auge des Weitsichtigen plattet sich indefs mit dem zunehmenden Alter immer mehr ab, der *Bulbus* trocknet immer mehr und mehr ein, die Weitsichtigkeit nimmt zu, und dann kündigen obige Zeichen freilich an, dafs es Zeit sei, sich einer etwas schärferen Brille zu bedienen.

Noch hat man Brillen, die bei einer Weitsichtigkeit erfordert werden, welche die Kunst hervorzubringen pflegt. Dieses sind die Staarbrillen, so genannt, weil sie das deutliche Erkennen naher Gegenstände bei Augen, welche am grauen Staare mit glücklichem Erfolge operirt wurden, befördern. Diese Gläser sind ungleich schärfer, als die gewöhnlichen Brillen für Weitsichtige, denn ihre Brennweite pflegt zwischen 6 und $1\frac{1}{2}$ Zollen zu liegen, wodurch sie im Stande sind, die brechende Kraft der removirten Krystalllinse zu ersetzen. Ohne optische Hülfe können nur solche glücklich Operirte zuweilen feinere Objecte deutlich in der Nähe erkennen, welche vor der Operation kurzsichtig waren. Alle übrigen bedürfen dazu der convexen Brillen, und manche, welche in Folge der Operation nur ein schwaches und kein so vollkommenes Gesicht erhalten haben, wie es sein sollte,

müssen meistens zwei Staarbrillen haben; nämlich eine, mit welcher sie recht deutlich in die Ferne und eine andere, mit welcher sie recht deutlich in die Nähe zu sehen fähig werden. Sind die Kranken auf beiden Augen operirt worden, so brauchen sie oft für jedes Auge ein besonderes Glas. Nie dürfen sie aber früher eine Staarbrille tragen, bevor nicht alle Empfindung in den Augen, welche die Operation zurückliefs, völlig und längere Zeit hindurch verschwunden ist und gänzliche Erhohlung derselben Statt findet; wozu besonders nach der *Extractio cataractae*, zwei und mehrere Monate gehören können.

Kann sich der Kranke die Gläser selbst aussuchen; so hat man nur zu erinnern, dafs er nicht gar zu scharfe auswähle. Lebt er aber entfernt vom Arzte und Opticus, und soll ersterer ihm eine taugliche Brille besorgen; so ist es nöthig, dafs der Operirte irgend ein grofs gedrucktes Titelblatt in verschiedener Entfernung vor das operirte Auge bringt und versucht, ob er nicht einen oder den andern Buchstaben ohne Bewaffnung seines Auges recht deutlich unterscheiden kann. Findet er einen solchen, so läfst er jemand die Entfernung des Auges von dem Buchstaben und die Gröfse des letzteren selbst messen, und schickt diefs doppelte Maafs seinem Operateur; der dann ohne Weiteres von einem geschickten Optiker eine zweckmäfsige Staarbrille erhalten, und diese dem Operirten zusenden kann. Bedient sich letzterer der Brille zu zeitig; so reicht er alsdann nicht lange damit aus, sondern bedarf einer immer schärfern, bis endlich keine mehr passend genug für das zu zeitig bebrillte Auge ist.

Aufser den gewöhnlichen Brillen für *Myopen* und *Presbyopen*, giebt es nun noch andere Augengläser, die ich hier nur mit wenigen Worten berühren will.

Lorgnetten werden besonders von Kurzsichtigen getragen, und enthalten daher concave Gläser. Weitsichtige sollten sich der Lorgnetten mit convexen Gläsern gar nicht bedienen; denn weil sie niemals in einer festen und bestimmten Entfernung von den Augen gehalten werden, so vergröfsern und verkleinern

sie

sie auch die feinen Objecte nach Maafsgabe der Unsicherheit und Unruhe der haltenden Hand.

Einfache Lorgnetten, bei welchen also nur ein einziges Auge gebraucht wird, sind durchaus zu verwerfen; denn wo nur ein Auge allein benutzt wird, da differiren gar bald die vorher gleichen Kräfte beider Augen, indem sie nicht nur hinsichtlich ihrer Sehweite, sondern auch nicht selten hinsichtlich der Sehkraft selbst in Disharmonie gerathen. Dadurch aber schläft die Kraft des einen Augapfels nach und nach immer mehr ein, und wird zuweilen fast gänzlich unwirksam.

Noch nachtheiliger sind die Lesegläser für Weit- und Schwachsichtige, indem sie, aufser den bei den einfachen Lorgnetten gerügten Fehlern, auch noch den besitzen, dafs sie durch ihre grofse Schärfe das Auge verderben und hernach convexe Brillen nöthig machen, welche weit stärker sein müssen, als es ohne den frühern Gebrauch des Leseglases, nothwendig gewesen sein würde.

Die doppelten Lorgnetten sind, wenn sie für die Augen nach den schon angezeigten *Cautelen* passend gewählt wurden, gar nicht zu verwerfen; vielmehr besonders da sehr bequem, wo man Willens ist, bei einem nicht gar zu hohen Grade der *Myopie*, nur dann das Glas vor die Augen zu halten, wenn es der höchste Nothfall erfordert: weil man die Lorgnette mit weit weniger Umständen vor die Augen bringen und von denselben entfernen kann, als die gewöhnlichen Brillen. Aufserdem sind die Bügelbrillen den Lorgnetten jederzeit vorzuziehen.

Ganz flache Gläser können nichts nützen, wohl aber schaden.

Der grün gefärbten Brillengläser pflegen sich diejenigen zu bedienen, welche an Lichtscheu und übermäfsiger Empfindlichkeit der Augen leiden; ihr Gebrauch ist dem Gesichte indessen mehr nachtheilig als nützlich, denn sie verdunkeln die Gegenstände und lassen von diesen nur wenigere und undeutlichere Lichtstrahlen in das Auge fallen, und zwar

um so mehr, je mehr sie färbenden Stoff enthalten und je dunkler sie mithin sind. Vermöge dieser Eigenschaft lassen sie zwar ein milderes Licht in das lichtscheue und empfindliche Sehorgan einfallen, und schaffen diesem eine scheinbare Beruhigung, vernichten diese Beruhigung aber wieder dadurch, dafs sie das genauere Beobachten der Objecte erschweren; denn es gehört in der That kein unbedeutender Aufwand von Sehkraft dazu, durch grüne Gläser kleine und sehr feine Dinge deutlich zu erkennen. Dadurch wird aber das Gesicht nicht allein geschwächt, sondern auch von dem natürlichen hellen Lichte entwöhnt: und so wird letzteres die Lichtscheu und die allzu grofse Reitzbarkeit der Augen, eben so gut unterhalten, wie der ungewohnte Eindruck desselben bei Subjecten, die stets in finsteren Wohnungen arbeiten müssen, eine Kränklichkeit des Gesichts verursachen kann. Solche Personen, welche lange Zeit grüne Brillen getragen haben, finden sie am Ende eben darum sehr passend, weil sie das natürliche Licht nicht mehr ertragen können, indem sie durch die verdunkelnde Brille von demselben entwöhnt worden sind. Plattet sich bei ihnen in Zukunft der Augapfel immer mehr ab, werden sie weitsichtiger, dann bedürfen sie auch noch mehr gewölbter grüner Gläser; diese sind aber auch wiederum desto dicker und mithin desto undurchsichtiger, und verlangen einen noch bedeutendern Aufwand von Sehkraft, um deutlich zu sehen, wodurch denn die Schwäche der Augen nur noch vermehrt wird.

Die Meinung, welche manche hegen, dafs die grünen Gläser die gesunden Augen stärken, oder wenigstens bei guter Gesundheit erhalten, ist übrigens völlig unrichtig.

Wer sich derselben lange Zeit bedient hat, der mufs stufenweise in der Farbe zurückschreiten, immer weniger verdunkelnde gebrauchen, bis er endlich im natürlichen Lichte ohne Beschwerde zu sehen im Stande ist.

Die Staubbrillen, welche man trägt, um sich gegen Wind und Staub, besonders auf Reisen, zu sichern, erfüllen zwar den beabsichtigten Zweck, können aber unendlich mehr schaden als nützen; denn indem durch ein solches Einschachteln der Augen, diese, so wie die Umgegend derselben, in vermehrte Transpiration gesetzt worden, ist ein schnelles Unterdrücken dieser Hautthätigkeit bei Abnahme der Brille nicht immer zu vermeiden, wodurch denn rheumatische, catarrhalische, und bei arthritischer Anlage, selbst gichtische Beschwerden, in den Augen herbeigeführt werden, welche dem Gesichte sehr leicht gefährlich werden können.

Die Augenpulver.

Die Anwendung der Augenpulver bei Flecken und Trübungen der Hornhaut, welche sonst sehr häufig geschah, weil unsere Vorfahren über die Wirksamkeit derselben triftige Erfahrungen aufweisen konnten, ist bei den neueren Aerzten, wohl nicht mit Recht, gänzlich in Verfall gekommen, denn der Nutzen ihrer Anwendung läfst sich theoretisch und practisch sehr wohl begreifen.

Der Effect, welchen sie machen, sie mögen nun in der Thränenfeuchtigkeit auflöslich oder unauflöslich sein, sie mögen chemisch eingreifen können oder nicht, ist folgender: sie rasiren auf eine kräftige Weise die sulzige Schicht, welche sich immer, bei Kindern mehr als bei Alten, auf der Oberfläche der *Cornea* befindet, mehr oder weniger weg, reitzen die fast immer unter dieser Schicht ihren Sitz habende trübende Masse, welche den Flecken constituirt, auf eine weit kräftigere Weise, als die gewöhnlich gebräuchlichen Externa, befördern die Resorption, so wie die Durchschwitzung des *Humoris aquei* durch die *Cornea* mächtig, und müssen somit nothwendig auf die mögliche Beseitigung der Trübung einen trefflichen Einfluss zeigen.

Sie schaden aber bei empfindlichen, gerötheten oder zu specifischen Entzündungen Neigung habenden Augen; sie schaden, wo sie zu oft, zu kräftig und zu grob pulverisirt applicirt werden, weil dann der durch sie verursachte Reitz sich bis zur dauernden Entzündung steigern kann.

Immer müssen sie daher auf das sorgfältigste alcoholisirt und gebeutelt angewendet, und niemals mit einem feuchten Pinsel auf das Auge gebracht, sondern am besten mittelst einer Krähenfederspule in geringer Quantität auf die Hornhaut geblasen werden.

Ich habe die Augenpulver in den geeigneten Fällen wirksamer gefunden, als die meisten der gerühmten Externa, und ich glaube, dafs sie zu denjenigen Mitteln der Alten gehören, welche der Vergessenheit entrissen zu werden verdienen. Das mildeste unter ihnen, ist der sogenannte Kanarienzucker.

Die Augensalben.

Das gebräuchlichste Constituens zu denselben, ist das Schweinefett oder die ungesalzene Butter, unter denen das erstere Vorzüge besitzt, weil es immer frisch zu haben und das Entsalzen der letzteren unsicher ist. Aufserdem bedient man sich auch zuweilen dazu des Wachses mit milden Oehlen vermischt, oder der Cacaobutter, welche am wenigsten ranzig wird.

Man wendet die Augensalben theils da an, wo man eine anhaltendere Wirkung auf den Augapfel wünscht, wenn flüssige Medicamente nicht wohl vertragen werden, oder wenn man Mittel vorzieht, welche nicht wohl in einer anderen Form zu appliciren sind.

Die Bereitung der Augensalben gehört zu denen, der gröfsten Sorgfalt des receptirenden Apothekers bedürfenden Präparaten, und leider pflegt davon Niemand weniger überzeugt zu sein, als gerade dieser, denn häufig wird die Bereitung derselben der Willkühr des Lehrlings überlassen, welcher oft nicht ansteht, *Hydrargyrum oxydatum rubrum*, *Zincum oxyd. alb. etc.* mit einem Spatel unter das Fett, unter die

Butter, in der Büchse selbst zusammenzurühren, oder die gewärmte und daher zerflossene Fettigkeit mit denen in Pulverform zuzumischenden Dingen nicht einmal bis zum völligen Erkalten zu rühren, wo denn die Hauptsache der Salbe, ihrer specifischen Schwere wegen, natürlich zu Boden sinkt. Der geringe Preis einer Augensalbe, der oft kaum $1\frac{1}{2}$ bis 2 Groschen beträgt, dient solchen Unwissenden nicht selten gleichfalls zur Aufforderung, das ja nur äufserlich zu brauchende Mittel obenhin zu fabriciren. Es hilft oft nichts, sein *M. exactissime etc.* auf der Formel zu bemerken; man mufs es den Pharmaceuten selbst sagen, wenn man hoffen will, sorgfältiger bedient zu werden.

Wie viel auf die zweckmäfsige Bereitung einer auf den Augapfel anzuwendenden Salbe ankommt, sieht wohl jeder Kundige ein, und ich bemerke daher hier nur noch, dafs dabei vor allen auf Folgendes gesehen werden mufs. 1) Alle zu einer Augensalbe zu nehmenden pulverichten Theile müssen in einem kleinen gläsernen Mörser auf das feinste gerieben, alcoholisirt werden, bevor sie der Fettigkeit beizumischen sind, und dann mufs letztere erst nach und nach unter beständigem Reiben dazu gebracht werden, wobei dieselbe niemals gewärmt zu werden braucht; es müfste denn sein, dafs das *Constituens* sehr hart und fest wäre. Das völlige Liquidmachen durch Wärme ist auch hier selten nöthig, wohl aber ist es gut, wenn man die Pulver mit einigen Tropfen Mandel- oder Nufsöhl stark abreiben läfst, ehe man die gewärmte Fettigkeit hinzumischt. Die Mischung selbst mufs in solchen Fällen immer bis zum völligen Erkalten fortgesetzt werden, und niemals sind die Augensalben in unreinen, nicht ausgewaschenen und ausgetrockneten Kruken an die Leidenden abzugeben. Kleine Porzellanbüchsen sind hierzu die besten Behältnisse. 2) Müssen die in Wasser auflösbaren Bestandtheile, welche etwa zu den Augensalben kommen sollen, zuvor mit einigen Tropfen Wasser auf das genaueste zusammen gerieben werden, ehe man die übrigen Ingredienzen zumischt.

Dafs eine Augensalbe sorgfältig gemischt sei, fühlt

man theils, wenn man etwas davon zwischen den Fingern reibt, theils aber entdeckt man die ungleiche Mischung unter einer guten Lupe.

Die Anwendung der Augensalben geschieht am besten folgendermaafsen: Man nimmt etwas davon auf einen feinen Haarpinsel, zieht das untere Augenlied mit dem Zeigefinger der linken Hand so abwärts, dafs es halb umgestülpt erscheint und streicht nun auf dieser inneren Fläche des Augenliedes die Salbe von dem Pinsel ab. Dasselbe Manöuvre kann man auch ohne Pinsel, mittelst des kleinen Fingers vornehmen, indem man die auf diesem sich befindende kleine Quantität Salbe auf die innere Fläche des halbausgestülpten unteren Augenliedes streicht, ein Verfahren, welches besonders bei Kindern zweckmäfsig ist. Nachdem nun die Salbe applicirt worden, schliefsen die Kranken die Augenlieder sogleich, worauf man nichts weiter zu thun hat, als den Augapfel durch das ihn bedeckende obere Augenlied mit einem Finger sanft zu reiben, um die gleichförmigere Verbreitung der Salbe auf dem Bulbus zu befördern.

Allein nicht immer werden die Augensalben gebraucht, um die *Conjunctiva bulbi* zu berühren, vielmehr giebt es mehrere Uebel, wo sie niemals unter die Augenlieder gebracht werden dürfen, z. B. bei chronischen Augenliederdrüsenentzündungen etc. In solchen Fällen sind sie äufserlich zu appliciren, und zwar bei der genannten Krankheit am besten: indem man eine Stecknadelknopf- bis linsengrofse Quantität davon auf den kleinen Finger bringt und dieselbe bei sanft geschlossenen Augenliedern an die Einmündungspunkte der Cilien streicht und einige Male leicht über diese linienförmigen Stellen hinstreicht oder reibt. Dasselbe Manöuvre kann aber auch mittelst eines feinen Haarpinsels vorgenommen werden, was besonders dann zu empfehlen ist, wenn das Metier des Leidenden die Haut seiner Finger rauh und hart gemacht hat.

Die Augensalben haben in der Regel eine dauerndere Wirkung, als die Augenwässer, und werden dem gemäfs seltener anzuwenden sein, als letztere.

Eine schlecht bereitete Augensalbe kann die Krankheit ebenso sehr verschlimmern, als dieselbe Salbe, wenn sie sorgfältig gemacht wurde, das Uebel heilen mufs.

Wenn die Salben auf den Augapfel selbst gebracht wurden, so mufs derselbe unmittelbar nach Application der ersteren, einige Zeit hindurch vor Licht und anderen Reitzen geschützt werden; daher ist auch die beste Zeit ihrer Anwendung unmittelbar vor dem Schlafengehen.

Wo Salben gebraucht werden, da mufs man das Auge täglich sehr sanft mit lauem Wasser reinigen, damit sich nicht die Salbe zwischen den Cilien häufe und dem Staube der Atmosphäre zur Unterlage diene.

Die Augenschirme.

Diese sind ein zweckmäfsiges Mittel, wo das Auge ruhen und den Reitz des Lichtes mehr entbehren soll. Sie dienen ferner, den stets, auch in der reinsten Atmosphäre vorhandenen Staub vom Auge besser abzuhalten. Als die zweckmäfsigsten kann ich diejenigen rühmen, welche aus, mit grünem Taffet überzogenem, Notenpapier gefertigt sind, wozu man insgemein eine halbe Elle des ersteren bedarf. Sie können viereckig, oder halbrund, halbmondförmig sein, und müssen an ihren oberen beiden Ecken Bänder bekommen, mit denen sie nach Bedürfnifs fester oder lockerer um den Kopf befestigt werden können.

Die gewöhnlicher gebräuchlichen von Drath und Pergament, Wachsleinewand und dergleichen, sind theils unzweckmäfsig, theils unbequem und sind nicht einmal überall zu bekommen.

Die Augenwässer.

Die Apotheker verfertigen alltäglich Augenwässer und verstehen sie wahrlich nur selten gut zu bereiten; die Aerzte verschreiben alltäglich die letzteren, und wissen sie nur selten richtig anzuwenden. Aus sol-

chen Gründen sei es mir erlaubt, bei diesem Kapitel etwas länger zu verweilen.

Soll ein Augenwasser vollkommen richtig bereitet werden, so dürfen die hinzukommenden Salze nicht erst jetzt abgewogen und aufgelöst werden, sie müssen vielmehr in den Apotheken in reinem destillirten Wasser aufgelöst, schon existiren. Weifs dann der Pharmazeut, wie viel Tropfen seiner Auflösung einen Gran des Salzes enthalten, so kann er ohne Mühe ein Augenwasser bereiten, unter welches $\frac{1}{6}$ bis $\frac{1}{4}$ Gran Sublimat etc. zu mischen, verordnet wurde, und ist obenein sicher, dafs er die kleine Dosis vollkommen richtig getroffen hat.

Augenwässer, welche Salze, Schleime, Auflösungen des *Opii* und andere Tincturen vereinigt enthalten, werden am besten bereitet, wenn die eine Hälfte des Wassers, womit jene Ingredienzen gemischt werden sollen, mit dem Salze, die andere Hälfte aber mit dem Schleime und den Tincturen gemischt, und alsdann erst beide Mischungen zu einer gemeinsamen zusammengegossen und nun filtrirt werden. Doch mufs diefs mit der Vorsicht geschehen, dafs, wenn mehrere sich einander theilweise zersetzende Salze etc. hinzukommen, diese so gemischt werden, dafs die Zersetzung so wenig und so langsam als möglich vor sich gehe. So wird sich folgendes antichemische Augenwasser mehrere Tage hindurch ohne bedeutende Zersetzung bewahren lassen, wenn man es auf die gleich anzugebende Weise bereitet. Ich nehme an, es soll eine Mischung bereitet werden aus *Zinc. sulphuric. gr. jj.*, *Aqu. rosar.* ℥iv., *Acet. saturn.* ʒß. und *Mucilag. gummi arab.* ʒjj. Nachdem man 40 Tropfen von einer *Solut. Zinci sulphurici*, von welcher besagte Tropfenzahl 2 Gran des Salzes enthält, mit der Hälfte des vorgeschriebenen Rosenwassers gemischt hat, mischt man die halbe Drachme *Acet. saturn.* mit der anderen Hälfte des zu nehmenden Rosenwassers, welchem letzteren man zuvor bereits die *Mucil. gummi arab.* zugesetzt hat, bringt nun erst beide Hälften zusammen und filtrirt das ganze Wasser. Eine solche Mischung opali-

sirt zwar ein wenig, ähnlich der reinen süfsen Molken, hält sich aber mehrere Tage ohne bedeutende Zersetzung. Schüttet man dagegen das *Acet. saturn.* zuerst in das Glas, den Schleim dazu und dann den erst trocken abgewogenen und in wenig Wasser im Mörser aufgelösten schwefelsauren Zink hinzu und verdünnt nun erst das Ganze mit dem übrigen Rosenwasser, so präzipitirt sich das schwefelsaure Blei, so wie der Schleim, ohne Zögern, und es entsteht ein *Mixtum compositum*, welches fast wie Milch aussieht. — Allein, wie gesagt, auch solche Mischungen, welche der Chemie nicht gerade entgegen stehen, müssen auf das sorgfältigste und nach den bereits angegebenen Cautelen bereitet werden. Ich will versuchen, auch dieses durch ein Beispiel anschaulich zu machen.

Ich nehme an, es soll ein Augenwasser bereitet werden aus: *Lap. divin. gr. jj.*, *Aqu. rosar.* ℥iv., *Laud. liquid. Syd.* ʒj. und *Mucil. gummi arab.* ʒjjj. Der unwissende Apotheker bereitet dieses häufig folgendermaafsen: er wiegt den göttlichen Stein trocken ab, zerreibt denselben in einem Serpentinmörser, gieſst etwas von dem nur gemessenen Rosenwasser darauf, und nachdem er dieſs gerieben hat, läſst er es stehen, um in dem tarirten Glase eine Drachma *Laud. liquid.* und 3 Drachmen Schleim unterdessen abzuwiegen. Ietzt gieſst er die noch mehr concentrirte Auflösung des göttlichen Steins zu den im Glase bereits vorhandenen beiden Ingredienzen, und verdünnt das Ganze mit dem übrigen Rosenwasser, womit er allenfalls den Mörser ausspühlte.

Abgesehen davon, daſs von den zwei Granen *Lap. divin.*, wenn sie richtig gewogen wurden, leicht der vierte Theil davon, aufgelöst oder nicht, im Mörser bleiben kann, so wird auch durch das Eingieſsen der concentrirten *Sol. lap. divin.* zu dem *Laud.* und zu dem Schleime, augenblicklich das *Opium* in Form eines Pulvers, der Schleim aber in Form von Flocken und Fasern präzipitirt, und mischt sich das Ganze hernach auch mit dem übrigen Rosenwasser, so bleibt ein so bereitetes Collyrium doch kaum einige Stunden

klar, denn bald zeigt sich das *Opium* auf dem Boden des Glases mit dem flockigen Schleim. Schüttet man es nun umgeschüttelt in das vielleicht entzündete Auge des Kranken, so steigert man die Entzündung, und separirt man den Satz, so fehlt dem Wasser oft das, wovon der Medicus besonders Hülfe erwartet.

Allen Augenwässern pflegt man gern etwas Schleim hinzuzusetzen, um einmal: die reitzende Kraft derselben zu mildern, und zweitens: den Wink der Natur zu beherzigen, welche auch ihre Thränen mit Schleim mischt, um das Auge besser vor den in jenen vorhandenen salzigen Theilen zu schützen; nur glaube ich, die Aerzte würden wohl thun, wenn sie statt der vegetabilischen Schleime den Augenwässern einen klaren Schleim von Hausenblase hinzufügen liefsen.

Niemals sollte man die Augenwässer auf längere Zeit vorräthig bereiten lassen, weil sich die meisten bald zersetzen und somit ihre Wirksamkeit verlieren; so z. B. wird nur der unkundige Arzt oder Apotheker Augenwässer, welche Sublimat und Schleim enthalten, wie das Conradische, vorräthig halten, denn in kurzer Zeit ist in denselben kein Atom *Sublimat* übrig, vielmehr hat sich dieser in *Calomel* verwandelt.

So weit die Bereitung der Augenwässer. Was deren Anwendungsart betrifft, so ist diese gar sehr verschieden und richtet sich ganz nach dem Zwecke, welcher durch dieselben erreicht werden soll.

Man bedient sich erstens mancher Augenwässer ganz allein zum Eintröpfeln in das Auge; dieses geschieht z. B. bei Geschwüren der Hornhaut und der inneren Fläche der Augenlieder etc. In diesem Falle läfst man den Leidenden am besten horizontal auf ein Sopha oder auf Stühle legen, und nachdem man in ein Quentchenglas etwas Augenwasser geschüttet hat, welches, wenn es warm gebraucht werden soll, in der Hand erwärmt werden kann, tröpfelt man 4 bis 5 Tropfen davon in den inneren Augenwinkel, wobei während des Aufgiefsens die Augenlieder sanft geschlossen sein können, und nun erst blinzelt der Kranke einige Male mit letzteren, wodurch das Wasser dann ohne Aufenthalt den

Bulbus überschwemmt. Sind es Kinder, die man zu behandeln hat, so können der Arzt oder die Angehörigen die Augenlieder sanft öffnen; der Eintritt des Wassers in das Auge wird so auch bei den ungezogensten gelingen. Nachdem man nun das in dem Nasenwinkel noch stehende Fluidum mittelst eines spitzig gefalteten leinenen Tuches sanft aufgetupft hat, läfst man den Kranken wieder aufstehen.

Zweitens gebraucht man die Augenwässer auch blofs zum Waschen der Augenlieder. Dieses geschieht besonders in denen Fällen, wo das Leiden allein in den Augenliedern, besonders in deren Rändern etc. haust, z. B. bei catarrhalischen Augenliederentzündungen. Man verfährt dabei am besten, indem man etwas von der Flüssigkeit in eine Obertasse schüttet, ein feines leinenes, doch nicht zu sehr abgenutztes Läppchen gänzlich hineintaucht, und mittelst desselben die geschlossenen Augenlieder sanft wäscht, wobei es jedoch rathsam ist, während des Waschens mit den Augenliedern öfter zu blinzeln, indem dadurch nicht nur die Ränder, sondern auch die innere Pagina derselben etwas befeuchtet werden. Gemeiniglich läfst man das Wasser an den Augenliedern trocknen, verhütet dann aber bis zum gänzlichen Eintrocknen sorgfältig den Zutritt der kalten Luft, besonders der Zugluft. Das in der Tasse übrig bleibende Augenwasser kann weggegossen werden. Wo dasselbe warm angewendet wird, mag vorher die Tasse in warmem Wasser oder auf dem Ofen erwärmt werden.

Drittens endlich werden die Augenwässer auch als Umschlag kalt oder warm angewendet, indem 4 oder 6fach zusammengelegte leinene Compressen damit befeuchtet und durchnäfst werden. Es ist gut, wenn man dabei das Vorwärtsbeugen des Kopfes, so wie alle Erkältung vermeidet. Wo hauptsächlich die Kälte nützen soll, da dürfen die Compressen nicht auf dem Auge liegen bleiben, wenn sie schon warm geworden, sondern müssen immer von neuem mit dem kalten Fluidum durchnäfst und wenigstens halbe Stunden lang immer erneuert und ununterbrochen aufgelegt werden.

Laudanum liquid. Sydenhami und ähnliche concentrirte Flüssigkeiten, werden nur tropfenweise und meistens mittelst eines Pinsels auf das Auge gebracht.

Wenn harte Krusten die Augenlieder verkleben, so muſs man erstere durch lauwarme Umschläge aus Wasser und Semmelkrume erweichen und dann mit lauem Wasser sanft abwaschen, bevor man das nöthige Augenwasser anwendet.

Bei der Application aller äuſsern Augenmittel, also auch bei der der Wässer, ist stets die gröfste Zartheit und Sauberkeit zu beobachten.

Die künstliche Ausleerung des *Humoris aquei* durch die Hornhaut,

welche bei gewissen Fällen von innern Entzündungen des Augapfels von hoher Bedeutung zu sein scheint, ist bereits unter den Krankheiten der Hornhaut etc. erwähnt worden, so daſs ich hier nur noch hinzuzufügen brauche, daſs die Eröffnung der *Cornea* an ihrem untersten Theile und am besten durch einen kleinen Schnitt mit einem Staarmesser geschieht, was besonders dann rathsam sein wird, wenn auſser wässriger Feuchtigkeit auch Eiter aus der vorderen Augenkammer ausgeleert werden soll, der durch einen bloſsen Einstich mittelst einer Staarnadel schwerlich ausflieſsen wird. Die kleine Operation ist nach Umständen zu wiederholen.

Die Blutigel.

Sie dürfen fast niemals an die Augenlieder gesetzt werden, weil sich in dem lockeren Zellgewebe derselben, nach Abfallen der Igel, das Blut leicht ergieſst und jene zuweilen enorm anschwellen macht, wodurch nicht selten mehr geschadet als genützt wird.

Die Stellen, an welchen sie vorzugsweise bei entzündlichen Augenkrankheiten anzulegen, sind die Schläfegegend, die Gegend neben dem äuſseren Augenwinkel und der innere Augenwinkel auf der sogenannten

Vena angularis. Auf letztere werden sie mittelst eines cylinderförmig zusammengerollten Kartenblattes gelegt; auch kann man einen Blutigel mit einem Tuche fassen und so appliciren. Sollen Blutigel auf der Schläfegegend etc. saugen, so applicirt man sie entweder auf dieselbe Art, oder bringt sie in ein Liqueurgläschen, dessen Mündung so lange leicht auf die Haut gedrückt wird, bis die Thiere saugen. Nachdem sie abgefallen sind, läfst man die Wunden ausbluten, welches ein mit warmem Wasser durchfeuchteter Schwamm befördert.

Niemals darf das Blut zwischen die Augenlieder dringen, weil es schon nach dem Gerinnen, noch mehr aber nach der Vertrocknung desselben, gleich wie ein in das Auge gefallener fremder Körper wirkt, und ohne grofse Reitzung dieses Organs, nicht leicht wieder zu entfernen ist. Immer müssen die Stellen, an denen die Blutigel saugen sollen, sorgfältig gereinigt werden, bevor man sie applicirt; auch ist es zweckmäfsig, diese Stellen mit etwas Milch, in welcher Zucker gelöst worden, zu bestreichen, weil das baldige Ansaugen der Thiere dadurch insgemein befördert wird.

Die *Cataplasmata.*

Wo man die Absicht hat, die Wirkung gewisser Mittel durch andauernde Feuchtigkeit und Wärme zu unterstützen, da bedient man sich der warmen Breiumschläge. Sie können daher zertheilend, erweichend, die Eiterung befördernd, schmerzlindernd, reinigend, zusammenziehend, stärkend, der Fäulnifs widerstehend u. s. w. wirken, je nachdem sie bei diesem oder jenem Uebel gebraucht und aus diesen oder jenen Ingredienzen bereitet werden. Die gewöhnlichsten Mittel sind: Semmelkrume, Safran, Mehl, Leinmehl, Malvenblätter und Blüthen, Altheewurzel, Chinarinde, Camphor, Myrrhe, Schierlingskraut u. v. a. Dinge, welche alle und stets pulverisirt sein müssen, wenn sie zu Breiumschlägen benutzt werden sollen.

Sie können, am rechten Orte und sorgfältig ange-

wendet, ebenso sehr nützen, als sie bei dem Gegentheile schaden können. Im ersten Falle sind sie den Fomentationen fast immer vorzuziehen.

Man bereitet sie, indem man den Brei auf die Mitte eines reinen, feinen, zwar gebrauchten aber nicht durchlöcherten leinenen Läppchens bringt, und die Seitentheile über den Brei gleichförmig wegschlägt. Niemals darf man den Umschlag bis zur völligen Erkaltung auf dem Auge liegen lassen, sondern mufs dafür sorgen, dafs schon früher wieder ein neuer und wärmerer bereit liegt. Der Umschlag mufs ferner nur breiartige nicht flüssige Masse enthalten, darf nur angenehm warm, niemals zu heifs aufgelegt werden, er darf das Auge weder drücken, noch sonst belästigen, sondern mufs nur locker und leicht auf demselben liegen und darf defswegen nicht zu klein sein, vielmehr mufs derselbe wenigstens einen Finger breit allseitig über die Augenhöhle hinausreichen, weil er so am besten auf den das Auge umgebenden Parthien eine sichere Stütze findet. Nur da, wo der Augapfel selbst des Umschlages nicht bedarf, sondern allein ein nahe liegender Theil, z. B. die Thränendrüse, der Thränensack, ein Augenlied etc., ist es gut, wenn der Umschlag nicht viel gröfser gefertigt wird, als die erkrankte Parthie ist, um so den Augapfel selbst besser zu verschonen.

Die Electricität.

Es ist bekannt, dafs die Electricität die Verrichtungen des animalischen und vegetativen Lebens steigert und das dieselben vermittelnde Gefäfssystem zur vermehrten Lebensäufserung antreibt; nur scheint die Wirkung der Electricität dynamischer und weniger anhaltend zu sein, als die des Galvanismus.

Man bedient sich der Electricität besonders bei chronischen Augenentzündungen, vorzüglich der rheumatischen und scrofulösen, bei dem *Pannus*, bei beginnender *Cataract*, bei *Amaurose* und amaurotischer *Amblyopie*; wobei indefs wohl zu erinnern ist, dafs hierbei niemals Vollblütigkeit oder Blutcongestionen Statt

finden dürfen, wenn dieselbe nicht mehr schaden als nützen soll. Man bedient sich der Electricität ferner gegen *Glaucom*, wo sie, meinen Beobachtungen zu Folge, aber niemals nützte, gegen *Mydriasis*, gegen Lähmungen der Augenlieder, gegen das convulsivische Blinzeln derselben, gegen Augenwassersuchten und Flecke der Hornhaut und endlich: gegen manche chronische Krankheiten der die Thränen ableitenden Organe.

Die beste Art der Anwendung dieses Mittels scheint das electrische Bad zu sein, wozu man sich am zweckmäfsigsten eines durch eine gläserne Handhabe isolirten metallenen Hakens von starkem Drathe bedient, an dessen Spitze sich eine hölzerne Birne befindet, durch welche, selbst dem geöffneten Auge, der electrische Strom zugeführt werden kann, nachdem die Leitungskette in der Gegend der Krümmung mit dem Haken verbunden und die, hier stark wirken müssende, Maschine in Bewegung gesetzt worden ist.

Auch kann nöthigenfalls das Durchströmen, so wie das Funkenziehen in der Umgegend des Auges angewendet werden, nur mufs man stets von dem schwächeren zu dem stärkeren Grade stufenweise übergehen.

Anfangs kann man 3 bis 5 bis 10 Minuten, nach und nach bis 15 und 20 Minuten und täglich höchstens zweimal, zu electrisiren fortfahren.

Die Fomentationen.

Sie erfordern, besonders wenn sie gleichmäfsig warm angewendet werden sollen, die gröfste Aufmerksamkeit und Abwartung.

Was bei Augenkrankheiten darüber erinnert werden kann, hat der Ritter Graefe gesagt, und ich wiederhole daher hier nur dasselbe, weil ich nichts Besseres zu sagen weifs:

Die Fomentationen können schädlich werden durch den Druck, den die befeuchteten Compressen auf das Auge üben, wenn letztere aus grober Leinwand bereitet, zu dick gefertigt oder ungeschickt aufgebunden werden. Sie müssen hinreichende Gröfse haben, da-

mit sie sich im Umkreise, wie die *Cataplasmata*, auf den Orbitalrand stützen, und blofs durch ihre Nässe haftend, den Augapfel weniger belästigen. Sie dürfen nie auf die Augen festgebunden, sondern nur auf dieselben gelegt werden, wobei freilich eine horizontale Lage des Kranken nöthig ist. Die Fomentationen können ferner dadurch schaden, dafs sie dem Auge eine unzweckmäfsige Temperatur zuführen; dafs sie kühlen, wo erwärmt werden soll; dafs sie erwärmen, wo man Kühlung beabsichtigt. Die Temperatur des Zimmers mufs daher auch kühl sein bei kühlen und warm bei warmen Fomentationen.

Sollen lauwarme Fomentationen gemacht werden, so läfst man am zweckmäfsigsten einen hinreichend grofsen, mit heifsem Sande gefüllten Sack neben dem Kranken auf einen Stuhl legen, bedeckt ihn mit einer Serviette und drückt denselben auf der oberen Seite etwas ein, damit sich eine passende Vertiefung zum Einsetzen einer Untertasse in ihm gestalte. Letztere wird hierauf mit der mäfsig erwärmten Flüssigkeit gefüllt und mehrere Compressen in dieselbe gelegt. So oft der Sand die Wärme verliert, was nach Verschiedenheit der Umstände alle Stunden oder alle 2 Stunden geschieht, so oft mufs ein frisch erwärmter Sack aufgelegt werden. Lampenlicht oder Kohlenfeuer erwärmen die Geschirre leicht zu stark und heben die Dunkelheit auf, die dem Kranken nothwendig sein kann.

Nach jedem Aufhören mit dem feuchten Umschlage, vergesse man nicht die Augenlieder sanft und vorsichtig abzutrocknen, damit nicht durch das Verdunsten der auf denselben haftenden Feuchtigkeit eine Erkältung der Augenlieder herbeigeführt werde. Wo Idiosyncrasien den Gebrauch feuchter Mittel verbieten, da mufs man auf die Anwendung derselben nicht bestehen. Wo man endlich nicht hoffen kann, dafs das Gesagte vollkommen und sorgfältig berücksichtigt wird, da mufs man die Fomentationen ebenfalls unterlassen.

Der

Der Galvanismus.

Die Wirkung desselben ist der Electricität ähnlich, nur soll der erstere die Mischung der Theile mehr umstimmen und die Wirkung andauernder sein, weſshalb ihn manche der Electricität vorziehen. Uebrigens wird der Galvanismus in allen Fällen empfohlen, in denen man von der Electricität Gebrauch macht.

Insgemein wendet man den negativen Pol bei den Krankheiten der Augen an, welcher gleich dem Lichte zu wirken scheint, die Sensibilität und die thierischen Verrichtungen steigert und überhaupt bessere Wirkung bei den sensibeln Störungen des Auges äuſsert als der positive Pol.

Die Art, den Galvanismus anzuwenden, ist verschieden. Ich halte diejenige, welche Burdach und Beck beschrieben, für die zweckmäſsigste, weſswegen ich sie hier wiedergebe.

In Fällen, wo man sehr stark wirken will, bringt man den negativen Pol auf der Hornhaut oder auf den Augenliedern an; selten ist es jedoch angezeigt, diese Stellen zu wählen. Meistens sucht man die Augennerven durch die drei Aeste des 5ten Paares zu erregen. Man leite den negativen Pol über die Augenbraune in die Gegend des *foramen supraorbitale*, oder an die innere Fläche der Nase, oder des Oberkiefers in der Gegend der Backenzähne, oder an die Schläfe. Den anderen Pol bringe man ganz entfernt an, z. B. an der in ein Gefäſs mit Wasser getauchten Hand. Die Dauer der Wirkung ist verschieden. Die Construction der Säule richtet sich nach der individuellen Reitzbarkeit des Kranken und erheischt 15 bis 40 Lagen.

Um den negativen Pol leicht an der Stelle anzubringen, wo man dessen Anwendung wünscht, nimmt man eine etwas concave Metallplatte, die, um nicht oxydirt zu werden, an ihrer inneren Fläche vergoldet, oder, um die Haut nirgends unmittelbar zu berühren, auf ihrem Rande, so wie auf der äuſseren Fläche lackirt ist. Auf die innere Fläche wird ein in Salzwasser, Lackmusbrühe oder Rindsgalle getränktes, doch

nicht zu nasses Stück dünnen Schwammes gelegt, und mittelst des durch den Bügel der Platte durchgezogenen Bandes an der gehörigen Stelle befestigt, so dafs die Platte den Schwamm mit einiger Festigkeit an den zu galvanisirenden Theil andrückt. In das an der äufseren Fläche befindliche Oehr, wird nun die Kette vom negativen Pole eingehängt. Zur Wirkung auf das Auge selbst, bedient man sich am zweckmäfsigsten einer kupfernen, inwendig vergoldeten, äufserlich lackirten Augenwanne, von deren Mitte ein metallener Stab ausgeht, der, um isolirt zu sein, grofsentheils in einer Glasröhre steckt und am unteren Ende ein Oehr zum Einhängen der Kette hat. Die Augenwanne wird mit lauem Wasser gefüllt, das offne Auge in die Wanne gebracht und die Kette geschlossen.

Die Gasbäder.

Diese lassen für die Zukunft ein weites und grofses Feld zu Versuchen übrig, die jetzt zwar noch im ersten Beginnen sind, allein wohl heilsame und wichtige Resultate hoffen lassen.

Diejenigen, welche bisher bei Augenübeln örtlich versucht wurden, sind besonders das kohlensaure Gas, *Gas carbonicum*, und das Wasserstoffgas, *Gas Hydrogenium*.

Man hat sie gemischt oder rein dem Auge zugeführt. Auf erstere Art benutzt man sie gebunden an tropfbare Flüssigkeiten, in Form der Mineralwässer, oder vorzüglicher noch, als reines mit Gase auf künstliche Weise übersättigtes Quellwasser; eine Form, die jeder Apotheker ohne Umstände bereiten wird. Rein, läfst man die Gasarten, aus, mit Sicherheitsventilen versehenen Entbindungsflaschen, vermöge eines von Blase gefertigten Schlauches an die Augen gehen, nachdem derselbe mit seinem einen Ende hermetisch um die *Orbita* befestigt worden. Der berühmte Ritter Graefe hat einen dergleichen zweckmäfsigen Apparat in seinem Repertorio augenärztlicher Heilformeln angegeben. Dieser Apparat läfst sich leichter anwendbar und dauern-

der machen, wenn statt des Schlauches eine jagdhornförmig gebogene Glasröhre das Gas an das Auge leitet. Das Uebrige wird man ohne Schwierigkeit selbst modificiren können, wenn man darüber die eben angeführte Schrift nachliest.

Die Bereitung des aus $\frac{72}{100}$ Kohlenstoff und $\frac{28}{100}$ Sauerstoff bestehenden kohlensauren Gases, welches von gleichen Theilen Wasser durch Schütteln verschluckt wird, geschieht am wohlfeilsten, aus grob zerstofsener Kreide, die in eine Entbindungsflasche gebracht und von, mit zweimal so viel Wasser verdünnter Schwefelsäure überschüttet wird.

Man hat sich bisher des kohlensauren Gases rein, oder als Moorrübenbrei, oder in Form von kohlensauren Wässern bei scorbutischen Augenentzündungen und bei Augenliedbrand mit Nutzen bedient, wo es fortgesetzt und oft ununterbrochen angewendet werden kann.

Das Wasserstoffgas wird während der Auflösung verschiedener Metalle, z. B. des Eisens, des Zinkes etc. in, mit 5 bis 6 Theilen Wasser, verdünnter Schwefel- oder Salzsäure erzeugt.

Man hat die Hydrogengasbäder bis jetzt besonders gegen *Amblyopie* und *Amaurose* örtlich angewendet, und braucht sie täglich 2 bis 4 und mehrere Male, nach Erfordernifs zu einer viertel, halben und ganzen Stunde.

Die Hautreitze,

welche im Allgemeinen als Gegenreitz und Ableitung, und gleichsam als Vicarii der zu heilenden Krankheit dienen sollen, sind sehr verschieden.

Die vorzüglichsten sind: die *Vesicatoria*, die Brechweinstein-Pflaster und Salben, der Brei aus Aetzkali, das Fontanell, das Haarseil, der Seidelbast, die Moxa, die Senfpflaster, der Meerrettigbrei und dergl.

Die Anwendung dieser Mittel kann bei allen Krankheiten des Auges Statt finden, bei denen wir neben der vermehrten Gefäfsthätigkeit und krankhaft verstärkten Absonderung in und neben dem leidenden

Organe, zugleich eine gesunkene Lebensthätigkeit und Neigung zu immer wiederkehrenden krankhaften Reactionen bemerken. Sie wirken sämmtlich ableitend und zugleich reitzend auf das sensible und irritable System des Auges; daher sie auch gemeiniglich schaden, wenn man sie in dem ersten Stadium der Augenentzündungen anwendet, wo letztere noch einen synochösen Charakter zeigen, oder wenn man sie überhaupt bei Augenübeln gebraucht, so lange diese noch eine wahre antiphlogistische Behandlung erfordern.

Am häufigsten werden sie mit Nutzen angewendet, bei immer wiederkehrenden gichtischen, rheumatischen, scrofulösen, exanthematischen Augenentzündungen, bei dem *Pannus*, bei *Glaucom* und *Amaurose* mit torpidem Charakter, bei Augenliedlähmungen, bei krampfhaften Affectionen der Augenlieder, bei Mydriasis, etc. etc.

Vesicatoria. — Deren giebt es bekanntlich mehrere Arten. Bei Augenübeln sind es besonders das *Emplastrum cantharidum ordinarium, perpetuum* und eine Abart des letzteren, des sogenannten *Empl. canth. perp. Drouetii*, welche am gewöhnlichsten angewendet werden. Das letztere wirkt am schnellsten, insgemein schon nach einer oder nach 2 Stunden, und besteht aus einem Aufguſs von *Canthariden* und Seidelbast mit Essigäther, womit ausgespannter Taffet mehrmals überstrichen wird. Es ist gut, wenn der Apotheker etwas venetianischen Terpenthin oder Colophonium dazu nimmt, weil es aufserdem schlecht klebt. Es ist unstreitig das zarteste Canthariden pflaster und kommt in der Wirkung dem Meerrettig sehr nahe. Dieses und das officinelle *Empl. canth. perp.* können Tage lang liegen bleiben und auch erneuert auf dieselbe Stelle gebracht werden. Man pflegt sie auf die Arme, in den Nacken, hinter die Ohren, in die Schläfegegend und über die Augenbraunen zu legen und macht sie, dem erwählten Orte, so wie den übrigen Umständen gemäfs, bald so klein als ein Groschen, bald so grofs als ein Speciesthaler ist, und gröfser. Beide Arten erregen einen gelinden Gegenreitz und sind bei leichten Uebeln, oder da wo sie ganz in der Nähe des Auges applicirt

werden sollen, z. B. über den Augenbraunen, um den *Nervus supraciliaris* in gröfsere Action zu setzen, sehr nützlich.

Anhaltender und heftiger, aber auch ungleichförmiger, wirkt das *Empl. cantharid. ord.* wenn die geöffnete Hautblase täglich mit einer reitzenden Salbe verbunden wird. Immer mufs ein solcher Verband des Morgens gemacht werden, damit der dadurch erneuerte oft stundenlang anhaltende Schmerz den Schlaf nicht störet.

Brechweinsteinpflaster. — Man läfst es am besten jedesmal frisch bereiten, wobei zu bemerken ist, dafs der bereits alcoholisirte *Tartarus stibiatus* auf das innigste mit etwas venetianischem Terpenthin, in einem erwärmten Mörser gerieben sein mufs, bevor das *Emplastrum adhaesivum* auf das vollkommenste dazu gemischt werden darf. Das Verhältnifs des Brechweinsteins zu dem Heftpflaster kann sich wie 1 zu 2 oder wie 1 zu 3 verhalten, je nachdem man eine schnellere oder langsamere Wirkung beabsichtigt und das Subject unempfindlicher oder empfindlicher ist. Die Pocken erscheinen binnen 2 bis 5 Tagen. Es ist gut, wenn man es so lange liegen lassen kann, bis jene Pocken in offne Eiterung übergegangen sind. Sollen die Pflaster klein sein, so kann man zu ihrem Substrate Taffet oder Leinwand wählen, sollen sie aber grofs werden, so ist es besser, dazu feines Leder zu nehmen, welches sich nicht so leicht als jene Gewebe, auf der Haut zusammenschiebt. Immer mufs man die Haut mit einem Flanelllappen reiben, bevor man das Pflaster applicirt. Es darf übrigens niemals ganz in die Nähe des Auges gelegt werden. Die Arme, der Nacken, die haarlosen Parthien hinter den Ohren, sind die geeignetsten Stellen.

Die Wirkung dieses Pflasters scheint von den meisten Ableitungen durch Hautreitz, wesentlich unterschieden zu sein. Es ist, wenn es bis zum *Acme* seiner Wirkung gebraucht wird, kräftiger und tiefer eingreifend, als alle übrigen hautreitzenden Mittel, indem

es einen zwar unschädlichen aber höchst intensiven Krankheitsprocefs in der Haut erweckt.

Inveterirte Augenentzündungen der hartnäckigsten Art, *Pannus*, *Glaucom* oder *Amaurosis arthritica*, bei welcher die *Phlogosis* bereits gemindert und Congestionen des Blutes nach den Augen nicht Statt finden etc., sind es besonders, bei welchen ein zweckmäfsig gebrauchtes *Emplastrum stibiatum* nicht selten die trefflichsten Erfolge herbeiführt, besonders wenn man den erregten krankhaften Procefs durch eine Salbe aus einigen Granen Sublimat und Brechweinstein mit 3 Drachmen *Ungt. canthar.* und eben soviel *Ungt. basilic.* längere Zeit hindurch unterhält. Niemals darf man Leibesverstopfung dulden, wenn man die Wirkung des *Empl. stibiat.* bis zum *Acme* steigern will.

Brei aus Aetzkali. — Er ist als Reitz und Gegenreitz besonders bei *Blepharoplegie* und *Blepharospasmus tonicus* von Adam Schmidt empfohlen worden, wie aus den darüber handelnden Kapiteln S. 85. etc. zu ersehen ist. Ich bemerke daher hier nur noch, dafs er, meinen Erfahrungen zu Folge, da fast immer Heilung bewirkte, wo die *Blepharoplegie* unlängst und ohne zum Grunde liegende organische Fehler entstanden, und diese, so wie der *Blepharospasmus tonicus* nicht als ein unbedeutenderes Nebenzeichen weit wichtigerer allgemeiner dergleichen Beschwerden dastand. Ich erinnere ferner, dafs sich die hinter dem Ohre entstandene Brandkruste der Haut, bei weitem nicht immer nach 8 Tagen abstöfst, in welchem Falle man daher wohl thut, dieselbe vorsichtig mittelst einer Pincette und Scheere loszutrennen und zu entfernen.

Fontanell. — Wie es gemacht und kräftig unterhalten wird, ist bekannt; ebenso, dafs es bei Augenübeln besonders auf die Arme gelegt zu werden pflegt. Allein ich glaube erinnern zu müssen, dafs das Einlegen einer einzigen Erbse sehr selten hinreichend ist, um eine heilsame Wirkung auf das Leiden des Auges hervorzubringen, daher lege man 2 bis 3 bis 6 Erbsen oder Pommeranzen in das Geschwür und erwarte demungeachtet keine schnelle sichtbare Wirkung auf das

im Auge haftende Uebel. Nur erst nach 2 bis 3 Monaten kann man das Fontanell als ein von dem Sehorgane kräftig ableitendes Mittel betrachten.

Man bedient sich desselben in nicht dringenden Fällen bei wiederkehrenden oder inveterirten catarrhalischen, gichtischen, rheumatischen, scrofulösen etc. Augenentzündungen und braucht es als Präservativmittel, wo Anlage zu solchen Uebeln vorhanden ist. Niemals sollte man die Application eines Fontanelles vergessen, wo durch Gicht nur erst ein einziges Auge verloren gegangen, denn es ist hier oft ein treffliches Vorbeugungsmittel, des, im anderen Auge in Zukunft immer zu befürchtenden gichtischen Processes.

Haarseil. — Es ist dieses, wie bekannt, ein künstliches Geschwür, welches dadurch zu Stande kommt, dafs man die Haut mit dem Daumen und Zeigefinger an der zweckmäfsigen Stelle zu einer länglichen Falte aufhebt, den unteren Theil derselben von einem Gehülfen auf dieselbe Weise fassen läfst, die Mitte der gut angespannten Hautfalte mittelst einer Haarseilnadel durchsticht und das in das Oehr der letzteren zuvor eingelegte leinene Bändchen, indem man die Nadel völlig durchzieht, in die durchstochene Haut einlegt. In Ermangelung einer Haarseilnadel kann die Hautfalte auch mit einer Lanzette durchstochen werden, worauf man das Bändchen oder einen Leinwandstreifen, mittelst einer Nadelsonde in die Wunde einzieht, welches Verfahren für den Leidenden freilich etwas schmerzhafter, so wie für den Arzt umständlicher ist. Nach Einlegung des Haarseils befestigt man das durchgezogene kürzere Ende desselben mit einem Streifen Heftpflaster, das längere Ende aber wickelt man in ein Stück Leinwand oder Papier und befestigt es zur Seite der Wunde, doch etwas mehr oberwärts, damit es von dem in Zukunft abfliefsenden Eiter nicht verunreinigt wird. Das Bändchen bleibt dann einige Tage ruhig liegen, bis die Eiterung es löset, wird aber von diesem Zeitpunkte an, täglich ein- auch zweimal etwas weiter gezogen, je nachdem die schwächere oder stärkere Eitererzeugung dieses er-

fordert. So oft der Verband erneuert wird, ist der zunächst der Wunde liegende Theil des noch nicht durchgezogenen Endes des Bandes, mit Digestivsalbe, welche bei zu geringer Eiterung mit Canthariden-pulver vermischt werden kann, zu bestreichen und behutsam durch die Wunde zu ziehen, worauf das alte, mit vertrocknetem Eiter beschmutzte Ende abgeschnitten wird. Nachdem auf solche Weise das längere Ende des Bändchens fast verbraucht worden, wird ein neues vorsichtig angenähet und dieses Annähen so oft als nöthig, wiederholt.

Das Haarseil ist insgemein schmerzhafter als das Fontanell und wird dem letzteren da vorgezogen, wo man eine schnellere, und vom Auge kräftiger ableitende Wirkung verlangt, auch es dem Auge näher bringen will, weſswegen dasselbe bei Augenkranken auch gewöhnlich in den Nacken gelegt zu werden pflegt.

Seidelbastrinde. — Ich bin der Meinung, daſs die Seidelbastrinde durch unterhaltene *Vesicatoria*, Fontanelle etc. wohl zu ersetzen ist und vor letzteren keine besonderen Vorzüge besitzt; nur scheint sie sich dadurch von diesen zu unterscheiden, daſs sie insgemein weniger Ausfluſs, aber mehr Schmerzen erregt.

Man bedient sich derselben bei chronischen rheumatischen, scrofulösen etc. Augenentzündungen und wendet sie auf folgende Weise an: Nachdem man eine Parthie zolllange Streifen der Rinde in etwas Wasser oder in einer Mischung aus Wasser und Weinessig erweicht hat, bindet man Morgens und Abends ein Stück davon auf den Arm, so lange, bis die Haut sich röthet, worauf, je nachdem der entstandene Ausfluſs schwächer oder stärker ist, ein neues Stück nur täglich einmal, oder einen Tag um den anderen, aufgelegt zu werden braucht. Zuweilen, besonders bei blonden, mit einer zarten Haut begabten Personen, entsteht rings um die gewählte Stelle ein höchst brennender Blatterausschlag, in welchem Falle man wohl thut, die leidende Parthie mit *Ceratum Galeni* oder einer anderen milden Salbe zu verbinden.

Brennzylinder. — Man sollte sich desselben nur

bei torpiden, unempfindlichen, nicht an Blutcongestionen oder an Ueberfluſs von Blut leidenden Subjecten und da bedienen, wo man einen schnell wirkenden, höchst schmerzhaften, tief eingreifenden Reitz verlangt.

Obgleich der Brennzylinder selten angewendet wird, so ist er doch bei manchen Arten von Amaurose etc. nicht zu verwerfen. Die Anwendung desselben ist bekannt. Man wählt übrigens zur Applicationsstelle gemeiniglich die Gegend des *Processus mastoid.*, seltener die Gegend oberhalb der Augenbraunen.

Die Senfteige mit und ohne *Pulv. piperis nigri*, der zu Brei geriebene Meerrettig u. s. w. sind zu bekannt und zu gewöhnlich, als daſs ich mich auch bei ihnen aufhalten dürfte.

Die Kälte.

Am rechten Orte angewendet, ist die Kälte unstreitig eines der kräftigsten und heilsamsten Mittel; diesen gehörig auszumitteln und zu würdigen, wird daher vor allen nöthig.

Die Kälte, welche theils in Form von, mit kaltem Wasser durchfeuchteten leinenen Compressen, theils, aber weit seltener, in Form von, mit fein zerstoſsenem Eise angefüllten kleinen Blasen, auf das Auge und dessen Umgegend angewendet wird, nützt vor allen bei den sogenannten traumatischen *Ophthalmien* in ihrem ersten Zeitraume, zu welchen sich aber nicht die mindeste Spur irgend eines vorhandenen chronischen Allgemeinleidens, z. B. Gicht, Rheumatismus, *Lues*, Scrofeln etc. gesellt haben darf. Sie nützt ferner bei einfachen Blutcongestionen nach den Augen, welche unter anderen häufig durch übermäſsige Anstrengung des Gesichts veranlaſst, bei vollkommen gesunden Individuen vorgefunden werden. Sie schadet dahingegen, wenn sie bei gesteigerter Hautthätigkeit angewendet, oder zu lange fortgesetzt wird. Sobald sich daher die Symptome der Entzündung und des Blutandranges überhaupt, bedeutend gemindert haben, muſs die Kälte beseitigt und zu anderen nun zweckmäſsigeren Mitteln

übergegangen werden. Wo die Kälte nützen soll, da dürfen sich die Compressen auf dem Auge nicht eben sehr erwärmen, vielmehr mufs man sie fleifsig wiederum in den bereitstehenden Vorrath von kaltem Wasser tauchen, und sie ununterbrochen, wenigstens halbe Stunden hindurch, auflegen und niemals dürfen die Leidenden den Kopf dabei niederbeugen.

Am häufigsten bedient man sich der Kälte bei solchen *Ophthalmien*, welche durch Operationen verursacht wurden; doch ist dabei zu erinnern, dafs sie bei der Extraction niemals gleich Anfangs anwendbar ist, vielmehr mufs man hier das Ende des zweiten oder dritten Tages erwarten, wo die Hornhautwunde sich zu schliefsen begonnen hat. Da ohnedem die Entzündungszufälle nach der Extraction, meistentheils erst einige Tage nach verrichteter Operation eintreten, wenn sich die Wunde der *Cornea* bereits grofsentheils geschlossen hat, so würde die frühere Anwendung der Kälte, auch aus diesem Grunde unstatthaft sein.

Das Kräuterkissen.

Es ist dieses eine Form, welche bei Augenkrankheiten häufig angewendet wird, um das Auge mit einem permanenten Dunst trockner, mehr oder weniger aromatischer Wärme zu umgeben.

Man beabsichtigt damit einmal, das Sehorgan und dessen Umgegend, in einer gleichmäfsigen, zuglosen und warmen Luft zu erhalten, um dadurch und besonders durch das den Kissen inwohnende Aroma, einen gelinden Reitz auf die Oberfläche des Augapfels und dessen Umgebungen anzubringen, und somit die Hautthätigkeit dieser Parthien zu steigern.

Daraus nun wird klar, wo dieselben mit Erfolg anzuwenden sind.

Besonders nützlich sind sie in dem zweiten Zeitraume, vorzüglich der specifischen Augenentzündungen, vor allen derjenigen, welche in Folge unterdrückter Hautausdünstung entstanden sind, weil sie hier die örtliche Crisis befördern und zu Stande bringen. Sie

dienen als Spern für die resorbirenden Kräfte des Auges und tragen aus diesem Grunde viel bei, die etwa entstandenen Producte der Entzündung wegzuschaffen.

Sie schaden, wenn man sie zu schwer macht oder wohl gar fest auf das Auge bindet, anstatt sie auf der Stirn zu befestigen und von dieser über das Sehorgan herabhängen zu lassen. Sie schaden, wenn grobe Stiele der Kräuter das Augenlied stechen, oder wenn die Kräuter zu fein gehackt wurden, und somit durch das Material des Kissens durchstäuben, weil solcher Staub gar leicht zwischen die Augenlieder dringen und eine Verschlimmerung der *Ophthalmie* herbeiführen kann. Sie schaden endlich, wenn sie der Kranke nur stundenlang trägt, weil die dadurch veranlafste Ungleichheit in der Temperatur den Zweck des Mittels zum Theil vernichtet, oder die vielleicht bereits hervorgerufene Hautthätigkeit unterbricht.

Allein es ist auch überdiefs eine besondere Umsicht erforderlich, um stets den rechten Ort zur Anwendung der trocknen aromatischen Wärme, so wie den Grad derselben, zu finden.

So z. B. pafst sie fast niemals in den ersten Stadien der *Ophthalmien*, auch bei weitem nicht immer gleich zu Anfange des zweiten Zeitraumes selbst der specifischen Augenentzündungen; vielmehr wird man hier sehr wohl thun, zuvor trockne, nicht aromatische Wärme, welche mittelst vierfacher leinener Compressen zu appliciren ist, zu versuchen, dann zu den schwach duftenden Kräutersäckchen mit Chamomillen, Hollunderblüthen, Königskerzen, Bohnenmehl etc. überzugehen und endlich die stärker riechenden Gemische, z. B. *Spec. aromat. Ph. Borufs., flor. lavendulae, Herb. serpylli, menth. pip. etc.* am reinlichen Ofen oder an Wärmflaschen erwärmt, zu versuchen.

Der Camphor, welchen man häufig zu den Kräutern zu mischen pflegt, wird bei weitem nicht immer vertragen. Ein sicheres Zeichen, dafs dem so ist, wird es sein, wenn dem Kranken der Geruch des Camphors auch in gesunden Tagen unangenehm ist, oder gar Kopfschmerz erregt. Uebrigens sind es besonders sen-

sible, blonde, mit vulnerablem Hautorgane begabte Personen, auf welche der äufsere Gebrauch desselben einen unangenehmen und zweckwidrigen Eindruck macht.

Bei inveterirten rheumatischen Beschwerden des Auges und dessen Umgegend, welche sich im Auge durch Thränen, öfter wiederkehrende Röthe und flüchtige Stiche, in der Umgegend aber durch umherziehende flüchtige rheumatische Schmerzen äufsern, die bei jedem Wechsel der Witterung beginnen oder sich dann vermehren, ist der Gebrauch einer Gesichtsmaske von Wachstaffet oft vortrefflich und den Kräuterkissen vorzuziehen, weil sie das Auge und dessen Umgegend in einen heilsamen Schweifs bringet, welcher dann nur nicht durch erkältende Einflüsse unterdrückt werden darf.

Hinsichtlich der Bereitung der Kräutersäckchen, bemerke ich, dafs sie von feiner, doch nicht zu sehr abgenutzter Leinwand, in der Gröfse von 3 oder $3\frac{1}{2}$ Quadratzoll und in der Dicke eines halben Fingers, verfertigt werden und dabei über Ecke gut durchnähet sein müssen, damit sich die darin befindenden Species, nicht auf einer Stelle häufen. Uebrigens mufs der Apotheker den feinen Staub der sorgfältig zerschnittenen und gewiegten Species jedesmal absieben, damit der letztere nicht durch die Leinwand dringt und das Auge beleidigt.

Das Licht.

Obgleich die allermeisten Krankheiten der Augen durch irritirende Einflüsse unterhalten und zum Theil hervorgerufen werden, so giebt es doch auch Uebel am Sehorgane, welche reitzende Eindrücke nicht nur ertragen, sondern zur Heilung nothwendig erfordern; welcher Reitz aber ist dem Auge angemessener und natürlicher, als das Licht, das freilich graduell verschieden gegeben werden mufs, je nachdem es das Leiden nöthig macht.

So giebt es manche chronische *Ophthalmien*, die sich bei mäfsigem Lichte vermindern. So haben es manche Erfahrungen hinlänglich dargethan, dafs die

Anwendung des Lichtes bei demjenigen schwarzen Staare und der an ihm gränzenden Gesichtsschwäche, wo alle Zeichen von Blutcongestionen und Vollblütigkeit abwesend, die der allgemeinen wahren Nervenschwäche aber vorhanden waren, sich sehr wohlthätig bewiesen hat. Aber nicht nur bei'm schwarzen Staare und der sich zu ihm hinneigenden Gesichtsschwäche, sondern auch bei fast alle denen unter Electricität aufgeführten Formen von Augenübeln, wo die letztere wirklich angezeigt ist, wird auch der Lichtreitz vortrefflich sein.

Ja bei manchen jener *Amaurosen* ist es sogar vortheilhaft, das Licht concentrirt durch Lupen und Staarbrillen oder gar durch das Anschauen der Sonne, in das Auge fallen zu lassen.

Ungünstig wirkt aber das Licht, wo das Auge einen natürlichen Abscheu dagegen äufsert, so wie bei derjenigen Gattung der Amaurose, welche nicht allein mit Lichtscheu, sondern auch mit starker Zusammenziehung der Pupille und feurigen und schön bunten Erscheinungen, Blitzen etc. anfängt.

Die Lichtverminderung

ist eines der vorzüglichsten Hülfsmittel zur Heilung vieler Krankheiten des Sehorgans. Sie ist besonders da nöthig, wo das Auge eine gesteigerte Reitzbarkeit zeigt. In allen Fällen, ausgenommen unmittelbar nach Operationen am Augapfel, wo immer ziemliche Lichtlosigkeit herrschen soll, mufs die Dunkelheit dem Grade der Reitzbarkeit angemessen sein, und diesen kann Niemand besser bestimmen, als der Kranke selbst. In allen Fällen mufs die nöthige Verdunkelung gleichmäfsig sein, nirgends dürfen Lichtreflexe Statt finden; glänzende Meubles müssen verhüllt, zur Seite der Rouleaux einfallende Lichtstrahlen vermieden und Seiten- und Vorzimmer verdunkelt werden, wenn der Kranke gezwungen ist, sei es auch nur auf Augenblicke, in diese überzugehen; denn fast nichts ist so afficirten

Sehwerkzeugen nachtheiliger, als plötzlicher und greller Wechsel von Dunkelheit und Licht.

Die Verminderung des Lichtes wird am besten durch graue oder grüne Rouleaux bewirkt, welche die Fenster vollkommen decken und nach Umständen doppelt genommen werden müssen.

Die Wirkung der Dunkelheit auf die empfindlichen Augen ist natürlich reitzmildernd, weil ja der Hauptreitz für das Auge eben das Licht ist, daher beruhigend, besänftigend, die anzuwendenden Mittel unterstützend.

Nach Abnahme der Krankheit der Augen lasse man nie plötzlich zum vollen Genufse des Lichtes übergehen, sondern nur stufenweise, und auch hierin ist das eigne Gefühl des Reconvaleszenten der beste Leiter.

Nie sei in den Zimmern der Augenkranken Rauch oder Staub, weſswegen das Streuen von Sand in denselben, welches in manchen kleinen und mittleren Städten unter der Bürgerklasse üblich, durchaus zu verwerfen ist.

Wenn dem Kranken mehr Licht gegeben werden soll, so lasse man dasselbe nie horizontal oder gar von unten in die Augen dringen, sondern sorge dafür, dafs dasselbe von oben herabfalle, was durch das Lüften eines Theiles der obersten Parthie der Rouleaux leicht zu bewerkstelligen ist. Bei Instituten ist es vorzuziehen, jene letzteren so anfertigen zu lassen, dafs dieselben von oben nach unten, und nicht von unten nach oben aufzurollen sind, was durch die Hülfe eines geschickten Schlössers ohne Umstände zu erreichen ist.

Die Luft.

Es ist bekannt, dafs die atmosphärische Luft den Menschen, wie den Pflanzen, wohlthut und zu ihrem Gedeihen, zu ihrer Gesundheit wesentlich beiträgt.

Insbesondere bedarf nun auch das Auge des Luftbades, wenn es sich wohlbefinden soll; es bedarf des-

selben aber auch bei vielen krankhaften Zuständen, wobei indefs manches zu erinnern übrig bleibt.

Im Allgemeinen ist eine reine, trockne, zuglose Luft von mittlerer Temperatur, auch dem erkrankten Sehorgane am wohlthuendsten, doch wird immer das eigne Gefühl des letzteren, so wie die Krankheit selbst, dabei wohl zu beachten und die Luft in dem Krankenzimmer danach mit zu regeln sein.

Eine mit Rauch geschwängerte Luft ist dem Auge immer schädlich, daher dürfen solchen weder Oefen noch Räucherungen mit Räucherkerzen, Räucherpulver oder Taback erzeugen. Man bedenke übrigens, dafs das zweckmäfsigste Verbesserungsmittel chemisch verdorbener und verunreinigter Luft der Zimmer, in dem Einlassen frischer Luft, nicht aber in sinnenschmeichelnden Gerüchen besteht, welche die Luft nur noch mehr verpesten. Ebenso nachtheilig ist die mit Staub erfüllte Luft; obgleich sich nun dieser leider wohl immer, auch in den sorgfältigst gereinigten Zimmern, vorfindet, so mufs man doch Sorge tragen, dafs derselbe auf keine Weise vermehrt werde.

Die Pflaster.

Im Allgemeinen müssen alle Pflaster, welche am Auge anzuwenden sind, auf das innigste gemischt, auf das gleichförmigste gestrichen und überhaupt *par excellence*, zarter und sorgfältiger geformt werden.

Ich übergehe hier die verschiedenen Arten, und will allein bei dem sogenannten englischen Pflaster verweilen.

Dieses Pflaster, welches in den gewöhnlichen Fällen kaum eine Erwähnung verdient, ist bei vielen Augenleiden ein bedeutendes Hülfsmittel, und um so mehr der Berücksichtigung werth: als es meistens nur schlecht und zweckwidrig bereitet wird, und somit den Nutzen nicht stiftet, welchen es bei manchen Augenübeln wirklich gewähren kann.

Es dient am Auge, um kleine, aber für dieses Organ doch nicht immer unbedeutende Wunden der Um-

gegend auf das zarteste zu heften und so die Heilung *per primam intentionem*, auf eine Weise zu unterstützen, welche nichts zu wünschen übrig läfst. Es dient aber auch dazu, die Augenlieder sorgfältig, zart und doch fest geschlossen zu erhalten, wo künstliche oder durch Zufall entstandene Verletzungen des Augapfels diefs erfordern. In beiden Fällen können wir das auf Leinwand zu streichende *Emplastrum adhaesivum* nicht gebrauchen, weil es weder die nothwendige Zartheit bei seiner Anwendung darbietet, noch reitzlos genug ist, um jede, auch die geringste Eiterung oder rosenartige Hautröthe in den Augenliedern zu verhüten. Allein auch das gewöhnliche käufliche englische Heftpflaster ist aus den letzteren Gründen selten anwendbar, denn es enthält Benzoe, Perubalsam u. a. Dinge, welche zwar dem Geruche schmeicheln, aber bei feiner zarter Oberhaut, besonders bei empfindlichen Damen, dieselben Zufälle erregen können, welche bei Anwendung des gewöhnlichen Heftpflasters beobachtet werden; dann aber ist das käufliche englische Pflaster auch fast immer auf so feinen Taffet und so dünn aufgetragen, dafs es weder gehörig klebt, noch im Stande ist, in schmalen Streifen aufgelegt, ohne zu zerreifsen, die Augenlieder gut zusammenzuhalten.

Aus diesen Gründen rathe ich jedem Augenarzte: sich das englische Heftpflaster besonders bereiten zu lassen, und den Apotheker zu veranlassen, als Substrat nicht nur guten *Gros de Naple*, sondern auch ganz reine Hausenblasenauflösung zu nehmen, welche so oft aufzupinseln ist, bis das trockne Präparat ein gleichförmiges, glänzendes, nicht mattes oder nur theilweise glänzendes Ansehn erlangt hat. So kann man sicher sein, dafs dieses Pflaster alle Forderungen erfüllt, welche man billigerweise nur immer machen kann.

Es versteht sich übrigens, dafs dasselbe da, wo es in Streifen aufzulegen ist, immer dem Laufe der Hauptfäden des Taffet nach, geschnitten werden mufs.

Die

Die Pinsel.

Was von den Asbestpinseln zu halten ist, habe ich oben bereits gesagt.

Charpiepinsel, welche auf das sorgfältigste angefertigt worden, sind nur dann erst zu brauchen, nachdem man sie mehrere Male in heifsem Wasser ausgespühlt und getrocknet hat, weil sie aufserdem leicht kleine, kaum sichtbare Fädchen im Auge zurücklassen, welche dasselbe beunruhigen können.

Die besten und zweckmäfsigsten Pinsel sind unstreitig die weichen feinen Haarpinsel, nur bemerke ich, dafs auch sie vor dem Gebrauche in heifsem Wasser ausgewaschen werden müssen, und dafs man sich zu hüten hat, die der Form nach, ähnlichen sogenannten Fischpinsel zu wählen, welche viel härtere Haare enthalten, und nur bei der Oehlmalerei zu gebrauchen sind.

Dafs übrigens die Pinsel nach jedesmaligem Gebrauch bei Augenübeln in reinem Wasser sorgfältig ausgespühlt, getrocknet und dann in Papier gewickelt, vor allen Unreinigkeiten bewahrt werden müssen, ist leicht einzusehen.

Die Scarificationen am Auge.

Diese werden vorzüglich bei der *Chemosis* und *Ophthalmoblennorrhoe* angewendet. Sie wirken nur dann heilsam, wenn der allgemeine synochöse Zustand durch andere passende Blutausleerungen zuvor gehoben worden ist und die rothe Geschwulst der Bindehaut nur als örtliches Symptom der Synocha übrig geblieben. Wo die Geschwulst nur unbedeutend ist, können Scarificationen nicht Statt finden, und wo erstere sich so grofs zeigt, dafs sie sich förmlich über die *Cornea* herübergelegt hat, da ist der Scarification das Ausschneiden der hervorragenden geschwollenen Masse vorzuziehen. Dasselbe gilt auch da, wo nach Abnahme der Entzündung die Geschwulst in eine fast sarcomatöse Substanzwucherung der Bindehaut übergegangen zu sein scheint.

Man verrichtet die Scarification am besten mittelst eines scharfen Staarmessers oder mittelst einer Lanzette. Alle jene halb quetschenden, halb zerreissenden Instrumente, welche unsere Vorfahren zu diesem Behufe erfanden und anwandten, sind zu verwerfen, weil sie viel zu unzart auf unser so höchst reitzbares Organ eingreifen.

Die in Folge der Scarification entstehende Blutung mufs durch Aufschlagen von warmem Wasser unterstützt werden.

Die Durchschneidung der Gefäfse sammt der Bindehaut, in welcher sie sich bei dem *Pannus* befinden, kann auch zur Scarification gerechnet werden, ist aber insgemein unnütz, weil sie den Zweck: das Hinlaufen der Blutgefäfse zu dem *Pannus* aufzuheben und somit dem letzteren die Nahrungsquelle zu nehmen, nicht erfüllen. Dagegen ist hier, wie ich schon gesagt habe, das stückweise Ausschneiden der Bindehaut, in welcher sich die Gefäfse befinden, zu empfehlen, welches folgendermaafsen zu bewerkstelligen ist. Man fafst mit einer zweckmäfsigen, feinen Pincette die Bindehaut, hebt diese ein wenig, macht mit einer kleinen Cooper'schen Scheere einen Einschnitt in die Falte, fafst sodann fest den dadurch entstandenen Lappen der Bindehaut, und schneidet nun, nach Bedürfnifs mehr oder weniger umfafsend und in der Breite von 1 bis $1\frac{1}{2}$ Linie die Bindehaut sammt den Blutgefäfsen aus.

Register.

Absceſs in dem Augenliede, 27.
Absorptionsproceſs der Linse, 275.
Accouchement der Linse, 272.
Achlys, Aegis, 196.
Achromatopsia, 342.
Aderhautstaar, *Cataracta chorioidalis,* 222.
Aegilops simplex, 57.
Aetzmittel, 529.
Akrochordon, 116.
Albugo, 197.
Alopecia, 498. 503.
Alumen ustum, 531.
Amaurosis, 340.
— — die durch Verwundungen der Augenbraunen entstandene, 62.
— — *periodica,* 393.
Amblyopia amaurotica, 341.
— — *crepuscularis,* 392.
— — *meridiana,* 391.
— — von einer deprimirten Linse verursachte, 259.
Anchylops erysipelatosa, 55.
Anchyloblepharon, 106. *perfectum et imperfectum,* ebendaselbst, *spurium et verum.* Die Operation des *Anchyloblepharon.* 107.
Ancylops, 55.
Angiectasia palpebrarum, 115.
Anhang, 528.
Anomalien der Pupille, 319.
— — des Gesichts, 378.
Aneurysmen in der Orbita, 167.
Aqua ophthalmica Conradi, 21.
— *opii,* 3.
Arcus senilis, 197.
Aridura bulbi, 431.
Arsenik, 531.
Arthritische Augenentzündung, 474.
Atonia palpebrae, 83.
Atoniatonblepharon, 83.
Atresie des Nasenschlauches. 154.
— der Thränenkanälchen, 152.
Atresia ductuum excretoriorum glandulae lacrymalis. 135.
— *pupillae,* 321.
Atrophia bulbi, 431.
— — *corneae,* 433.
Aufsaugungsproceſs der Linse, 275.
Auflösung des Glaskörpers, *Synchysis,* 298.
Augapfel, das Schwinden desselben, 431.

Augapfelentzündung, äufsere, reine 404.
— — innere, reine, 409.
— — reine, totale, 428.
— — variolöse, 483.
Augapfelkrankheiten, 168.
Augapfelverknöcherungen, 446.
Augapfelwunden, 168.
Augenausrottung, 445.
Augen, künstliche, 433.
— scirrhöse, 440.
— von Natur fehlende, 447.
— — — überflüssige. 447.
Augenbäder, 532.
Augendämpfe, 533.
Augen-Douche, 534.
Augenentzündung, aegyptische, 457.
— — asthenische, 6.
— — reine, im Allgemeinen, 1. u. 12.
— — catarrhalische, 453.
— — catarrhalisch-rheumatische, 454.
— — der Neugebornen. 43.
— — gichtische, 474.
— — morbillöse, 487.
— — psorische, 501.
— — rheumatische, 470.
— — scarlatinöse, 487.
— — scorbutische, 526.
— — scrofulöse, 512.
— — specifische, 449.
— — syphilitische, 491.
— — variolöse, 481.
Augenfell, das dichte, *Pannus*, 180.
Augengläser, 534.
— — concave, 534.
— — convexe, 534.
— — grüne, 545.
Augenhöhlenentzündung überhaupt, die reine, 120.
Augenhöhlenkrankheiten, 120.
Augenkrankheiten, die Anwendung der äufsern Mittel bei denselben, 528.
Augenkrebs, 440.
Augenlieder, künstliche, nach Dzondi, 88. 438.
Augenliederkrankheiten, 23.
Augenliedauswärtswendung, 100.
Augenliedblinzeln, 86.
Augenliederentzündung, reine, 23.
— — — rosenartige, 28.
— — gonorrhoische, 491.
— — eiterige, 31.
— — variolöse, 481.
Augenliederdrüsenentzündung, reine, 31.
— — variolöse, 485.
Augenliederhirsekorn, 115.
Augenliedkarbunkel, 79.
Augenliedkrampf, 86.
Augenliedlähmung, 83.
Augenliederrauhigkeit, 502.
Augenliederschwiele, 70.

Augenliedspalt, 69.
Augenliedeinwärtswendung, 90.
Augenliedverwachsung, 106.
Augenliedvorfall, 82.
Augenliedtripper der Neugebornen, 43.
Augenliederwassersucht, 80.
Augenliedwarze, 115.
Augenliederwunden, 60.
Augenoperateur, 10.
Augenpulver, 547.
Augensalben, 548.
Augenschirme, 551.
Augenschwäche, von unterdrücktem Schleimflufs der Augenlieder, 42.
Augenschwamm, 443.
Augentripper der Neugebornen, 43.
Augenvorfall, 369.
Augenwasser, Conradi's, 21.
Augenwässer, bleihaltige, 170.
Augenwässer, überh. 551.
Augenwassersucht, 299.
Augenwinkelzerfressung, 37.
Ausleerung der wässrigen Feuchtigkeit, 195. 318.
— — — als Beförderungsmittel der Resorption der Linse, 283.
Ausschälung der Brei- und Speckgeschwülste der Augenlieder und ihrer Umgegend, 111.
Auswärtsstülpung des Augenliedes, 100.
Ausziehung des Staares, 260.
Ausziehung der Staarlinse sammt der Kapsel, 267.

Bäumchenförmiger Staar, 222.
Balggeschwülste in der Augenhöhle, 166.
— — der Augenlieder, 109.
Balgstaar, 224.
Balkenstaar, 226.
Bate'sche Liquor, 48.
Beer'sche Staarlanze, 262. F. 12.
Bersten des Augapfels, 413 u. a. m. a. O.
Bleihaltige Augenwässer, 170.
Blennorrhoea sacci lacrymalis, 146.
— — — *scrofulosa*, 525.
Blepharitis, 24.
Blepharoblennorrhoea, 31.
— — *neonatorum*, 43.
Blepharophthalmia variolosa, 481.
— — *glandulosa*, 485.
— *gonorrhoica*, 491.
— *glandulosa scrofulosa*, 514.
Blepharophthalmitis, 24.
— — *erysipelatosa*, 28.
— — *glandulosa*, 31.
Blepharoplegia, 83.
Blepharoptosis, 82.
— — *traumatica*, 60.
Blepharospasmus, 86.
— *tonicus*, ebend.
Blinzeln der Augenlieder, ebend.
Blutaderknoten in der Orbita, 167.

Blutaustretungen in den Augenkammern, 259. 526.
Blutextravasate in der Augenhöhle, 124.
Blutigel, 556.
Blutschwamm der Markhaut des Auges, 396.
Blutstaar, 322.
Blutweinen, 133. Siehe auch scorbutische Augenentz.
Brand des Augapfels, 431.
— der Augenlieder, 25.
Brechweinsteinpflaster, 565.
Brei aus Aetzkali, 566.
Breigeschwülste der Augenlieder und der Umgegend, 109.
— — — Ausschälung ders. 111.
Brennzylinder, 568.
Brillen und Augengläser, 534.
Bruch der Hornhaut, 210.
Buphthalmos, 299.
Butyrum antimonii, 532.

Cancer palpebrae. 74.
— *bulbi*, 440.
Capsellinsenstaar, 220.
— kegelförmiger, *Cataracta capsulo lenticularis pyramidata*, 225.
Capselstaar, 222.
Capsulitis, 212.
Carbunculus palpebrae, 79.
Carcinoma bulbi, 440.
Carcinom der Thränenkarunkel, 165.
Caries der Orbitalknochen, 59.
— im Thränenkanale, 157.
Carunculae conjunctivae, 117. 192.
— *malignae corneae, rebelles*, 444.
Cataplasmata, 557.
Cataracta, grauer Staar, 217.
— *artificialis*, 290.
— *capsularis*, 221.
— *capsularis anterior*, 222.
— — *perfecta*, 223.
— — *posterior*, 222.
— *capsulo lenticularis*, 220.
— — — *arida siliquata*, 225.
— — — *centralis*, 224.
— — — *cum bursa ichorem continente*, 225.
— — — *cystica*, 224.
— — — *dimidiata*, ebend.
— — — *fenestrata*, ebend.
— — — *marmoracea*, ebend.
— — — *natatilis*, ebds.
— — — *punctata*, ebds.
— — — *pyramidata*, 225.
— — — *stellata*, 224.
— — — *trabecularis, seu cum zona*, 226.
— — *tremula*, 224.
— *complicata*, 228.
— *dendritica, arborescens, chorioidalis*, 222.
— *dura*, 226.

Cataracta, hyaloidea, 223.
— *immatura,* 228.
— *lenticularis,* 220.
— *matura,* 227.
— *membranacea,* 221.
— *mollis,* 227.
— *Morgagniana,* 223.
— *nigra,* 226.
— *secundaria,* 291.
— *spuria grumosa,* 322.
— — *lymphatica,* ebend.
— — *purulenta,* ebend.
— *topica,* 228.
— *viridis seu glaucomatosa,* 292.
Catarrhalische Augenentzündung, 453.
Ceratocele, 210.
Chalazion, 72.
Chalazosis, ebend.
Chemosis, 405.
Cicatrix corneae, 197.
Cirsophthalmia, 438.
Clavus, Nagelkopf, 423.
Coecitas diurna, 391.
— *nocturna,* 392.
Coloboma, 69.
— *iridis,* 319.
Condylome der Augenlieder, 115.
— in der Regenbogenhaut, 497.
Conjunctivitis, 179.
Conradisches Augenwasser, 21.
Consistenz des grauen Staares, 227.
Contagiöse Augenentzündung, 457.
Corectomia, 327.
— nach Wenzel, 327.
— — Gibson, 327.
— — Beer, 328.
Coreoncion, 334.
Cornea conica, 209.
Corneitis, 193.
Corodialysis, 330.
— nach Schmidt und Assalini, 332.
— — Beer, 332.
— — Himly, 332.
— — Langenbeck, 333.
— — Reisinger, 334.
Corotomia, 325.
— Maunoir's Methode der, 326.
— Adam's Methode der, 326.
Corrugatio corneae, 432.
Crithe, 53.
Crupsia, 342.
Crystalllinse in der vorderen Augenkammer, 176.
— Accouchement derselben, 272.

Dacryoadenitis, 127.
Dacryoblennorrhoea, 146.
— — *scrofulosa,* 525.
Dacryocystitis, 140.

Dacryocystitis subinflammatoria, 146.
Dacryocystalgia cacochymica, 525.
Dacryohaemarhysis, 133.
Dacryolithen, 134.
Dacryops, 136.
— *blennoideus*, 143.
— *fistulosus*, 138.
Dacryorrhysis, 132.
Dacryostagon, 132.
Dassyma, 502.
Daviel'scher Löffel 265. Fig. 13.
Depressio cataractae, 255.
Diplopia, 342. u. 389.
Distichiasis, 96.
Doppelreihe der Augenliederhaare, 96.
Doppeltsehen, 389.
Dörrsucht des Auges, 431.
Dupuytren's Methode die Thränensackfistel zu heilen, 159.
Durchbohrung des Thränenbeins, 161.
Dysopia tenebrarum, 392.

Ecblepharon, 438.
Ekchymose auf der Iris, 317.
Ectropium, Ectropion, 100.
— *sarcomatosum vel luxurians*, ebend.
— *senile*, ebend. u. 37.
Einleitung, 1.
Einwärtskehrung der *Cilien*, 96.
Einwärtswendung der Augenliedränder, 90.
Eiterauge, 308 u. a. a. O.
Eiterbälge in der *Iris*, ebend.
Eiterstaar, 214. 322.
Eitertriefen, 31.
Electricität, 558.
Emphysema palpebrarum, 81.
Encanthis inflammatoria, 163.
— *scirrhosa, carcinomatosa vel maligna*, 165.
Enothes, 106.
Entropium, 90.
Entzündung der Augen im Allgemeinen, 12.
— in der Augenhöhle, 120.
— der Augenlieder, 23 u. s. w.
— der Augenliederdrüsen, 31.
— catarrhalische, 453.
— catarrhalisch-rheumatische, 454.
— der *Conjunctiva*, reine, 179.
— der *Cornea*, 193.
— der Descemet'schen Haut, 194.
— des ganzen Augapfels, 428.
— der Krystalllinse und ihrer Kapsel, 212.
— gichtische, 474.
— der Markhaut, 339.
— der Neugebornen, 43.
— rheumatische, 470.
— der Regenbogenhaut, reine, 307.
— — — gichtische, 476.
— der *Sclerotica*, 179.
— specifische, 449.

Entzündungen nach Staaroperationen, 291.
— der Thränendrüse, 127.
— der Thränenkarunkel, 163.
— des Thränensackes, 140.
Epanastemata, 192.
Epicauma, 487.
Epiphora, Thränenfluſs, 132.
Erbrechen von Verletzung der Ciliarnerven, 176. 259.
Erschütterung des Augapfels, 63. 174.
Erweiterung der Pupille, 319.
— — — künstliche, 278. 284.
Exophthalmia, 369.
Exophthalmos, ebend.
Exostosen der Orbitalknochen, 118.
Exstirpatio oculi, 445.
Extractio cataractae. 260.

Facetten der Hornhaut, 471, u. a. a. O.
Farbensehen, *Chrupsia*, 342.
Feigwarzen der Augenlieder, 116.
Fernsichtigkeit, 388.
Fettfell, 190.
Flachgläser, 535.
Flecken der Hornhaut, 196.
Fleischauswüchse an den Augenliedern, 117.
Fleischgewächse am Augapfel, 443.
Fleisch- und Fettauswüchse auf der *Conjunctiva*, 191.
Flügelfell, 188.
Fisteln am Augenliede, 27.
Fistula corneae, 172.
— *sacci lacrymalis*, 151.
Fomentationen, 559.
Fontanell, 566.
Fungus haematodes retinae, 396.

Galvanismus, 561.
Gangraena oculi, 431.
— *palpebrae*, 25.
Gasbäder, 562.
Gerontoxon, 197.
Gerstenkorn, 53.
— scrofulöses, 524.
Geschichte der Staaroperation, 249.
Geschwüre der Hornhaut und des Augapfels überhaupt, 21, 509. 515. u. a. m. a. O.
— in der *Iris*, 389.
Gesichtsschwäche, amaurotische, 341.
Glandula lacrymalis hydatoidea, 138.
Glaskörper, Vorfall desselben nach der Extraction, 271.
Glaucom, *Glaucoma*, *Glaucosis*, 292.
Glaucomatöse *Cataract*, ebend.
Gibson's und Ware's Art, die in eine Hornhautwunde gefallene *Iris* zurückzubringen, 173.
Gichtische Augenentzündung, 474.
Gonorrhoische Augenlieder- und Augapfelentzündung, 491.
Grando, 72.
Grauer Staar, 217.
Gutta serena, 340.

Haarseil, 567.
— durch die Cornea, 208.
— — — Linse, 288.
Haasenauge, 88.
Hagelkorn, 72.
Hahnenkämme in der *Iris*, 497.
Hautorgan, vulnerables, 57.
Hautreitze, 563.
Hautwassersucht der Augenlieder, 80.
Helling's Methode das *Entropium* zu heilen, 93.
Hemeralopia, 392.
Hemiopsia, 342. 391.
Hernia corneae, 210.
— *sacci lacrymalis*, 149.
Hervortreibung der Hornhaut, kegelförmige, 208.
Hippus pupillae, 364.
Hirsekorn des Augenliedes, 115.
Höllenstein, 530.
Honiggeschwülste der Augenlieder und der Umgegend, 109.
Hordeolum, 53.
— *scrofulosum*, 524.
Hornhaut, die Krankheiten der, 193.
— die conische, 208.
Hornhautbruch, 210.
Hornhautabscefs, vertrockneter, 197. 487.
Hornhautentzündung, 193.
Hornhautfistel, 172.
Hornhautgeschwüre, 21. 509. 515. etc.
Hornhautnagel, 487.
Hornhautnarbe, 197.
Hornhautflecken, 196.
Hornhautschnitt bei der Staarextraction, 261.
Hornhautstaphylom, 412.
— — Beer's Methode dasselbe zu verhüten, 310.
— — totales, kegel- und kugelförmiges, 413.
— — partielles, 416.
— — Operation des Totalstaphyloms, 421.
Hornhautstich, 274.
Hornhautverdunkelung, 196.
Hornhautverknöcherung, 197, u. a. a. O.
Hornhautverschrumpfung, 433.
Hornhautzusammenrunzlung, 432.
Hühnerblindheit, 392.
Hydatis glandulae lacrymalis, 138.
— *palpebrae*, 115.
Hydatocapsulitis, 315.
Hydrophthalmia, Hydrophthalmus, 299.
Hydrops sacci lacrymalis, 149.
Hylon, Clavus, Nagelkopf, 423.
Hyperkeratosis, 208.
Hypoblepharon, 433.
Hypochyma, 217.
Hypopyon verum, 308.

Jäger's Heilart der Trichiasis, 98.
Janinische Augensalbe, 39.
Inflammatio capsulae humoris aquei, 315.

Introversio palpebrarum, 90.
Inversio palpebrarum, 100.
Iriankistron, 335.
Iris, mangelnde, 448.
Iritis arthritica, 476.
— bei empfindlichen Subjecten, 477.
— bei unempfindlichen Subjecten, 478.
— *medorrhoica*, 491.
— *pura*, 307.
— — *acuta*, 307.
— — *chronica*, 312.
— — *subacuta*, 315.
— *scarlatinosa*, 489.
— *syphilitica*, 496.
Iridectomia, 327.
Iridodialysis. 330.
Iridotomia, 325.

Kälte, 569.
Kapsellinsenstaar, 224.
— — der kegelförmige, 225.
— — mit dem Eiterbalge, 225.
— — der schwimmende, 224.
— — der trockenhülsige, 225.
— — der zitternde, 224.
Kapselstaar, 221.
— der vordere, 222.
— der hintere, 222.
— der vollkommene, 223.
Kapselnachstaar, 291.
Karbunkel der Augenlieder, 79.
Katzenauge, amaurotisches, 361.
Kegelförmige Hervortreibung der Hornhaut, 208.
Keratitis, 193.
Keratokele, 210.
Keratonyxis, 274.
Klugheitsregeln, augenärztliche, 8, u. a. O.
Knochenfrafs im Thränenkanale, 157.
Knochenstücke in der *Cornea*. 198.
Krampf der Augenlieder, 86.
Krätzige Augenentzündung, 501.
Kräuterkissen, 570.
Krankheiten des Augapfels, 168.
— der Theile, welche den Augapfel umgeben, 23.
— der *Conjunctiva*, 179.
— der Hornhaut, 193.
— der äufsern Umgebungen des Auges, 23.
— der durchsichtigen Theile des *Bulbus*, 179.
— welche durchsichtige und undurchsichtige Gebilde des Auges zugleich ergreifen, 404.
— der undurchsichtigen Gebilde des Augapfels, 307.
— welche den *Bulbus* in seiner Totalität ergreifen, 428.
— des Glaskörpers und der wässrigen Feuchtigkeit, 292.
— der *Iris*, 307.
— der Linse, 212.
— der Orbitalknochen, 119.

Krankheiten der *Retina* und des Sehnerven, 339.
— der Thränendrüse, 127.
— der Thränenkarunkel, 163.
— des Thränensackes, 140.
Krebs am Augapfel, 440.
— am Augenliede, 74.
Kurzsichtigkeit, 385.

Lähmung der Augenlieder, 83.
— der Thränenkanälchen, 153.
Laeyson'sches Augenpulver, 356.
Lagophthalmos, 88.
Lapis causticus, 530.
— *divinus, St. Y.*, 40.
— *infernalis*, 530.
— *palpebrae*, 72.
Lapsus palpebrae superioris, 82.
Leber'sches Scalpell, 111.
Lemositas, 33.
Lentitis, 212.
Lesegläser, 545.
Leucoma, 196.
— *cretaceum*, 197.
Leucomatöse Verdunklung, ebend.
Leucophlegmatia palpebrarum, 80.
Licht, 572.
Lichtscheu, *Photophobia*, 342 u. a. a. O.
Lichtverminderung, 573.
Linsenentzündung, 212.
Linsenkapsel, Verhalten derselben nach der Ausziehung des Staares, 265.
Linsennachstaar, 291.
Linsenstaar, 221.
Lippitudo, 31.
— *angularis*, 33.
— *neonatorum*, 43.
Lithiasis, 72.
Lorgnetten, 544.
— einfache, 545.
— doppelte, 545.
Luft, 574.
Luftgeschwulst der Augenlieder, 81.
Luscitas, 383.
Lymphstaar, 322.

Macula arcuata, 197.
— *corneae*, 196.
— — *margaritacea*, 197.
Madarosis, 498. u. a. a. O.
Mangelnde Iris, 448.
Markschwamm der Netzhaut, 396.
Marmaryge Hippocratis, 342.
Maulbeere der Augenlieder, 115.
Merc. praecip. ruber, 531.
Metamorphopsia, 343.
Milium palpebrae, 115.
Milphosis, 516.
Morbillöse Augenentzündung, 487.

Morgagnischer Staar, 223.
Mouches volantes, 394.
Mückensehen, 394.
Mydriasis, 319.
Myocephalon, 423.
Myodesopsia, 394.
Myopia, 385.
Myosis, 320.

Nachstaar, 291.
Nachtblindheit, 392.
Nagel der Hornhaut, 487.
Narbe der Hornhaut, 197.
Narcotica, deren Nutzen bei Augenkrankheiten, 278. u. 284.
Nasenschlauch, Untersuchung ob er durchgängig ist, 153.
Nasenwinkelgeschwür, einfaches, 57.
Nasenwinkelgeschwulst, die reine rosenartige, 55.
Nebelsehen, 342.
Nebula corneae, 196.
Necrose im Thränenkanale, 157.
Netzsehen, 342.
Nephelium, 196.
Nictitatio palpebrarum, 86.
Niederdrückung des Staares, 255.
Nubecula corneae, 196.
Nyctalopia, 391.
Nystagmus bulbi, 364.

Obscuratio corneae, 196.
— — *leucomatosa*, 197.
Oculus artificialis, 433.
— *leporinus*, 88.
— *purulentus*, 43.
Ochsenauge, *Buphthalmos*, 299.
Oedema palpebrarum, 80.
— — *calidum*, 28.
Onyx, 487.
Operation der verwachsenen Augenlieder, 107.
— der Brei- und Speckgeschwülste der Augenlieder und Umgegend, 111.
— des *Ectropii*, eigene, 104.
— des Eiterauges, 312.
— des Flügelfelles, 189.
— des grauen Staares, 255.
— des Staphyloms, 421.
— des *Symblepharon*, 108.
Ophthalmia aegyptiaca, 457.
— *angularis*, 405.
— *arthritica*, 474.
— *catarrhalis*, 453.
— *contagiosa*, 457.
— *externa*, 404.
— *gonorrhoica*, 491.
— — *vera*. ebend.
— — *chronica*, 493.
— *levis*, 404.
— *morbillosa*, 487.
— *neonatorum*, 43.

Ophthalmia puriformis, 43.
— *purulenta*, ebend.
— *rheumatica*, 470.
— *scarlatinosa*, 487.
— *scorbutica*, 526.
— *scrofulosa*, 512.
— — *externa*, 514.
— *senilis*, 455.
— *serosa*, 31.
— *sicca*, 31. 405.
— *syphilitica*, 491.
— *variolosa*, 481.
— — *externa*, 483.
— *vetularum*, 31.
Ophthalmitis, 428.
— *externa*, 404.
— *interna*, 409.
Ophthalmoblennorrhoea neonatorum, 43.
— — *syphilitica scorbutica*, 500.
Ophthalmoplegia, 66.
Ophthalmoptosis, 369.
— — *paralytica*, ebend. 66. 84. 125.
Ossificatio oculi partium, 446.
Osteosarcome der Orbitalknochen, 119.
Oxyopia, 342.

Pachyblepharosis, 70.
Pacheablephara, ebend.
Pachytes, ebend.
Palpebra ficosa, 35. 502.
Pannus, 180.
Papula conjunctivae, 191.
— *rebellis*, 75.
Paracentesis corneae bei Augenwassersucht, 301.
Paralampsis, 197.
Peribrosis, 33.
Perivrasis, ebend.
Perlenfleck der Hornhaut, 197.
Pflaster, 575.
Phalangosis, 96.
Phlyctaenulae oculi, 471, u. a. a. O.
— *palpebrae*, 115.
Photophobia, 342.
Photopsia, ebend.
Phthisis bulbi, 432.
— *corneae*, 432.
Pinguecula, Fettfell, 190.
Pinsel, 577.
Platläuse in der Bindehaut, 17.
Plärrauge, 100.
Pocken auf dem Auge, 483.
Politik, augenärztliche, 8, u a. a. O.
Porosis, 72.
Presbyopia, 388.
Prolapsus humoris vitrei, 271.
— *iridis*, 273. 422.
Prophysis, 106.
Psilosis, 71.

Psorophthalmia, krätzige Augenentzündung, 501.
Pterygium, 188.
— Operation desselben, 189.
Ptilosis, 71. 516.
Ptosis iridis, 422.
— *palpebrae superioris*, 82.
Pupille, doppelte, 174.
— künstliche, 324.
— krankhafte Erweiterung der, 319.
— krankhaft verengerte, 320.
— Verwachsung derselben, 321.
Pupillenbildung, künstliche, 324.
— durch blofse Einschneidung der *Iris*, 325.
— durch Ausschneidung eines Stückes der *Iris*, 327.
— durch Losreifsung der *Iris* von dem Ciliarbande, 330.
— nach Adams Methode, 326.
— nach Autenrieth's Vorschlag, 330.
— nach Beer's Methoden, 328. 332.
— nach Cheselden, 325.
— nach Gibson's Methode, 327.
— nach Himly's Methode, 329. 332.
— nach Langenbeck, 333.
— nach Maunoir's Methode, 326.
— nach Reisinger's Methode, 334.
— nach Ad. Schmidt's Methode, 332.
— nach Wenzel, 327.
— nach eigner Methode, 337.
Pupillensperre, 321.

Quetschungen der Augengegend, 61.

Reclinatio cataractae, 255.
Regenbogenhaut, fehlende, 448.
Regenbogenhautentzündung, reine, 307.
— — gichtische, 476.
— — scarlatinöse, 489.
— — syphilitische, 496.
Regenbogenhautstaphylom, 422.
Reisinger's Hakenpincette, 334, und Tab. V. Fig. 16.
— Pupillenbildung, 334.
Retinitis, 339.
Rheumatische Augenentzündung, 470.
Rhexis, Rhegma oculi, 413. 429. u. a. a. O.
Rhyas, 163.
Rhytidosis, 433.
Röhrenbrillen, 320.
Rutidosis, 433.

Sarcoma oculi, 443.
Saunders Heilung des *Entropium*, 95.
Scarificationen am Auge, 577.
Scarlatinöse Augenentzündung, 487.
Schlagschatten der Regenbogenhaut, 218.
Schmidt's Art, die nach aufsen gestülpte *Palpebra* zu reponiren, 49.

Schmidt's Heilmethode der *Blepharoplegie* und des anhaltenden *Blepharospasmus*, 87.
— Nadel zur *Corodialysis*, 332.
Scheroma, 136.
Schiefsehen, 383.
Schiefstehen des Auges, 383.
Schielen, 378.
Schmeerbläschen, Hirsekorn der Augenlieder, 115.
Schwäche der Augen in Folge eines unterdrückten Schleimflusses der Augenlieder, 42.
Schwarzer Staar, 340.
Schwiele der Augenlieder, *Tylosis*, 70.
Schwinden des Augapfels, 431.
Scirrhus bulbi, 440.
— der *Palpebra*, 74.
— der Thränendrüse, 130.
— der Thränenkarunkel, 165.
Sclerotitis, 179.
— *arthritica*, 476.
Scotoma, 342 u. 394.
Scorbutische Augenentzündung, 526.
Scrofulöse Augenentzündung, 512.
Spasmus palpebrarum, 86.
Specifische Augenentzündung, 449.
Specksackgeschwülste an der Augengegend, 109.
— — deren Ausschälung, 111.
Staar, grauer, 217.
— — Genesis desselben, 231.
— Behandlung nach Extraction desselben, 267.
— Modificationen bei der Extraction desselben, 266.
— grüner, 292.
Staarausziehung, 260.
Staarbrillen, 543.
Staarhaken, 266, 328, u. Taf. V. F. 15.
Staarmesser, verschiedene Arten, 260.
Staarnadel, lanzenförmige, 255. Taf. V. F. 10.
Staarniederdrückung, 255.
Staaroperationen, 255.
— Werth der verschiedenen Arten derselb., 242.
Staar, schwarzer, 340.
— — rein dynamischer, von gesteigerter Vitalität, 358.
— — von herabgestimmter Vitalität, 360.
— — von Mangel des Pigmentes, 361.
— — von übermäfsigem Gebrauch narkotischer, bitterer, und Bleimittel entstandener, 362.
— — als Symptom bei Hypochondrie, Hysterie u. s. w. 363.
— — von Infarkten des Unterleibes, 367.
— — gastrischer, 365.
— — von unterdrückten Hautausschlägen, 366.
— — rheumatischer, 367.
— — von unterdrücktem Schnupfen, 369 u. 375.
— — paralytischer, 369.
— — als Symptom des Wasserkopfes, auch bei Brustwassersucht, 371.

Staar, schwarzer, traumatischer, 62.
— — gichtischer, 371.
— — von unterdrückten Kopfausschlägen, alten Fufsgeschwüren u. s. w. 373.
— — von verbissenem Zorne entstandener, 374.
— — von plötzlich unterdrückter Milchabsonderung bei Wöchnerinnen, 376.
— — von Fehlern des Sehnerven, der Knochen der Schädelhöhle und des Gehirns, 377.
Staarumlegung, 255.
Staarzerstückelung, 274.
Staphyloma corneae, 412.
— — *partiale*, 416.
— — *totale sphaericum*, 413.
— — — *conicum*, 413.
— — *iridis*, 422.
— — *racemosum*, 424.
— — *scleroticae*, 419.
Staubbrillen, 547.
Stillicidium lacrymarum, 56. 71. 132.
Strabismus, Strabositas, 378.
— *divergens et convergens*, etc. 379.
St. Yves göttlicher Stein, 40.
Subsidentia pupillae, 272.
Suffusio oculi, 217.
Sycosis, 35. 502.
Symblepharon, 107.
— Operation des, 108.
— *perfectum et imperfectum*, 106.
Synchysis, 298.
Synechia anterior, 425.
— *posterior*, 426.
Synizesis, 272.
Syphilitische Augenentzündung, 491.
— Regenbogenhautentzündung, 496.
Syphilitisch-scorbutische *Ophthalmoblennorrhoe*, 500.

Tageblindheit, 391.
Taraxis, 405.
Telangectasia oculi, 438.
Tetrastichiasis, 97.
Thränendrüsenentzündung, 127.
Thränendrüsenfistel, 130.
Thränendrüsenhaaröffnung, 130.
Thränendrüsenkrankheiten, 127.
Thränendrüsenscirrhus, 130.
Thränendrüsenwasserblase, 138.
Thränenfeuchtigkeit, abnorm veränderte, 134.
Thränenfluſs, 132.
Thränenkanälchen, Untersuchung ob sie verwachsen sind, 152.
Thränenkarunkelentzündung, 163.
Thränenkarunkelkrankheiten, 163.
Thränensackbruch, 149.
Thränensackentzündung, 140.
Thränensackfistel, 151.
— cariöse, 157.
— unächte, 56.

Thränensackkrankheiten, 140.
Thränensacktripper, 149.
— — scrofulöser, 525.
Thränensackwassersucht, 149.
Thränenträufeln, 132.
Thränenzellgeschwulst, 136.
Tinctura Thebaica Pharm. Lond. 20.
Tophus, 72.
Totalstaphylom der Hornhaut 412.
— — — sphärisches, 413.
— — — kegelförmiges, 413.
Trachoma, 71.
Traubenstaphylom, 424.
Trichiasis, 96.
Trichosis, ebend.
— *bulbi*, 192.
Triefauge der Neugebornen, 43.
Tristichiasis, 97.
Trübheit des Glaskörpers, 292.
Tylosis, 70.

Ueberfluſs an Augen, 447.
Uebersichtigkeit, 379.
Umlegung des Staares, 255.
Unguentum citrinum, 41.
— *ophthalmicum Janini*, 39.
Ungula corneae, 487.
Unguis corneae, 487.
Unterschied zwischen *Hypopyon*, *Onyx* und dem Hornhautflecke 487.

Varices in der Augenhöhle, 167.
Varicositas oculi universalis, 438.
Variolöse Augenentzündung, 481
— äuſsere Augapfelentzündung, 483.
— Augenliederdrüsenentzündung, 485.
— Augenliederentzündung, 481.
Venerische Augenentzündung, 491,
Verband nach der Staarextraction, 267.
Verbrennung des Auges, 178.
Verdunkelung der Hornhaut, 196.
Verhärtung der Augenlieder, 74.
Verknöcherungen des Augapfels, 446.
Verletzungen des Augapfels, 168.
— — — chemische, 177.
— der Augengegend, 61.
— der Augenlieder, 68.
— der Thränenröhrchen, 67.
Verlust der Augenbraunen, 498.
— der Cilien, 71. 516.
— der Glasfeuchtigkeit, 271.
Verrucae palpebrarum, 115.
Verschrumpfung der Hornhaut, 433.
— des Tarsus, 95.
Verwachsung der Augenlieder unter sich, und mit dem Augapfel, 106.
— der Ausführungsgänge der Thränendrüse, 135.

Verwachsung der Pupille, 321.
— der Thränenkanälchen, 152.
Vesicatoria, 564.
Visus defiguratus, 343.
— *dimidiatus*, 342.
— *diurnus*, 392.
— *duplicatus*, 389.
— *interruptus*, 342.
— *lucidus*, 342.
— *muscorum*, 342 u. 394.
— *nebulosus*, 342.
— *obliquus*, 383.
— *reticulatus*, 342.
— *senilis*, 388.
Vorfall des obern Augenliedes, 82.
— des Glaskörpers, 271.
— der Regenbogenhaut, 273. 422.
Vulnerables Hautorgan, 57.

Ware und Gibson's Art, die in eine Hornhautwunde gefallene *Iris* zurückzubringen, 173.
Warzen der Augenlieder, 115.
Wasserbläschen der Augenlieder, 115.
Wasserblase der Thränendrüse, 138.
Wassergeschwulst der Augenlieder, 80.
Wassersucht des Auges, 299.
— des Glaskörpers, 301.
— des Thränensackes, 149.
— der wässrigen Feuchtigkeit, 299.
Wiederkäuerpupille, 294 u. 478.
Wunden des Augapfels, 168.
— der Augenbraunen, 65.
— der Augengegend, 60.
— der Augengrube, 123.
— der Augenlieder, 68.
— — — durchdringende, ebend.
— — — nicht durchdringende, ebd.
— der Commissuren der Augenlieder, 69.
— der *Conjunctiva*, 168.
— der *Cornea*, 169.
— der *Iris*, 173.
— der Linse, 175.
— der *Retina* und der Ciliarnerven, 176. 259.
— der Schläfegegend, 64.
— der *Sclerotica* und des Ciliarkörpers, 175.
— der Stirn, 60.

Xerophthalmia, Xeroma, 407.
Xerophthalmos, 136 u. a. m. a. O.

Zerfressung der *Ligam. interpalp.*, 41.
Zerreifsung der Markhaut, 62.
Zerstückelung des Staares, 274.
Zitterstaar, 224.
Zusammenrunzelung der Hornhaut, 432.

Erklärung der Kupfertafeln.

Erste Tafel.

1. Figur.

Dieses Bild versinnlicht zwei verschiedene Krankheiten, welche an dem linken Auge eines fast 70jährigen Landmannes vorhanden waren. Man sieht nämlich einmal: ein ziemlich bedeutendes *Ectropium* des untern Augenliedes, dessen Heilung bei so alten Personen viele Schwierigkeiten hat; und zweitens: ein sogenanntes Fettfell.

2. Figur

ist das Auge der 50jährigen Frau eines Hufschmidts, an welchem ich vor $\frac{1}{2}$ Jahre, die Ausziehung des Staares mit dem besten Erfolge vorgenommen hatte; man sieht daher auch eine halbmondförmige Narbe an der untern Hälfte der Hornhautperipherie, welche der Hornhautschnitt hinterlassen hat.

Am obern Augenliede erblickt man zwei nebeneinander liegende Bläschen, die sogenannten *Phlyctaenen* oder *Hydatiden* der Augenlieder, die ein weifsliches, durchscheinendes Ansehn haben und besonders bei älteren Leuten vorzukommen pflegen.

Die 3. Figur

stellt das Auge eines 26jährigen, übrigens gesunden Mädchens dar, an dessen innerer Fläche des obern Augenliedes, sich ein nicht unbedeutender Fleischauswuchs befindet, der fast die ganze Pupille verdeckt und von mir durch die Scheere und durch nachheriges Betupfen der Wundstelle mit *Lap. infern.* dauernd gehoben wurde.

Die 4 Figur

giebt das Bild einer bis jetzt gutartigen *Encanthis* am rechten Auge einer 30jährigen Frau. Es ist, wie man sieht, besonders die *Membrana semilunaris*, welche hier krankhaft vergröfsert erscheint, und die um so merkwürdiger ist, als sie eine schwanzförmige Fortsetzung hat, die bis zum äufsern Augenwinkel reicht, welche ich an der Figur durch Abwärtsziehen des untern Augenliedes möglichst sichtbar zu machen gesucht. Die Thränenpunkte wurden durch die

Geschwulst so zusammengedrückt und verdeckt, dafs das Auge stets in Thränen schwamm, welche bei der geringsten Veranlassung über die Wange liefen und den Augapfel gegen Licht sehr empfindlich machten.

Die 5. Figur

zeigt den *Pannus* eines in den 30iger Jahren sich befindenden Mädchens, der rheumatisch scrofulöser Natur ist und an welchem die Person schon viele Jahre hindurch gelitten. Das Uebel verspottete die Remedien mehrerer Augenärzte und konnte, ungeachtet der kräftigsten Anwendung der gerühmtesten Mittel, bis jetzt auch von mir nur gemindert, aber noch nicht ganz gehoben werden.

Die 6. Figur

ist das von Beer entlehnte Bild eines *Pterygii crassi* am linken Auge eines 69jährigen Tagelöhners, welches sich von dem *Pannus* gar sehr unterscheidet und hier ein merkwürdiges Auslaufen des Flügelfelles in eine doppelte Spitze zeigt, welches nur selten gefunden wird.

Figur 7,

stellt das höchst reitzbare Auge einer 27jährigen Schneiderfrau dar, an welchem ich unlängst die Zerstückelung des Staares in der Mitte desselben allein, verrichtete. Man sieht die Fortschritte der Resorption deutlich, nur die Peripherie des Staares ist noch sichtbar, das Centrum der Pupille völlig schwarz, so dafs die Frau die kleinsten Gegenstände ohne Brille zu sehen im Stande ist. Die Partikeln des Staares, welche ich in die vordere Augenkammer brachte, waren schon 13 Tage nach der Operation aufgesogen. Seitdem ich das Bild entnahm, ist auch die Peripherie der Cataract bis auf einen schmalen luftigen Ring verschwunden.

8. Figur.

Ein merkwürdiges Auge! Es ist von einem alten Landmanne, welchem, wie ich im Texte schon erzählt, die *Iris* bis auf ein kleines Restchen gewaltsam aus dem Auge gerissen wurde. Man sieht nur eine geringe Andeutung der Stelle der Hornhaut, wo die Wunde gewesen. Der ganze Umfang, wo früher die Regenbogenhaut gesessen, erschien schwarz: eine getrübte Linse etc., war nirgends zu bemerken. Ueberhaupt hatte dieser Fall so viel Aufserordentliches, dafs man demselben gewifs sehr selten einen ähnlichen an die Seite stellen können wird.

Zweite Tafel.

1. Figur.

Man sieht auf der *Cornea* dieses Auges zwei Narben, wovon die kleinere *a* völlig rein erscheint, die gröfsere *b* aber mit einem nubeculösen Umfang versehen ist, der sich besonders nach der Pupille hin verbreitet und in diesem Falle das Gesicht mehr beschränkt, als die Narbe selbst. Da man nun

wohl dergleichen neblichte Trübungen der Hornhaut beseitigen kann, die Narbe selbst aber immer unheilbar bleibt; so leuchtet daraus hervor, wie viel bei diesem Auge für die Verbesserung des Gesichts zu gewinnen sei. (Beer)

2 und 3 Figur.

Beide Figuren versinnlichen die conische Hervortreibung der Hornhaut. An beiden bemerkt man, dafs der höchste Punkt der vorgetriebenen Hornhaut die Mitte der letztern einnimmt, wie diefs fast immer so der Fall ist. In der nach Wardrop copirten, nur im Umrifs entworfenen zweiten Figur, ist die Krankheit ziemlich ausgebildet; in Fig. 3. aber findet man eine aufserordentlich grofse conische Hervortreibung der *Cornea*, wie sie selten vorkommt. Uebrigens erkennt man hier deutlich eine völlig durchsichtige Hornhaut. (Demours a. a. O.)

4. Figur.

Dieses Bild stellt das Auge eines 83jährigen, von jeher vollkommen gesunden Mannes dar, welches einen vollkommnen, reinen, ziemlich harten Linsenstaar enthält, der $\frac{5}{4}$ Jahre zu seiner Ausbildung bedurfte. Die Crystalllinse hat hier eine gleichförmige, grauliche, etwas in's gelblich Grüne schillernde Farbe angenommen, und ist von der *Iris* noch entfernt, weswegen man auch hinter der schwarzen Einfassung des Pupillarrandes der *Iris* einen deutlichen Schlagschatten erkennt, den die Regenbogenhaut auf die jetzt sichtbar gewordene Linse macht. Dafs nur in der Linse die Trübung ihren Sitz haben könne, läfst die Ansicht dieses Auges mehr als muthmafsen. Die *Iris* ist dabei zwar träge, aber doch beweglich, und hat ihre vormals blaulich graue Farbe nach und nach in die hier vorgestellte verändert. Zugleich bemerkt man einen dunkeln Saum am Pupillarrande der Regenbogenhaut, der in denen Fällen nimmer sichtbar wird, wenn die im normalen Zustande schwarze Pupille, durch in der hintern Augenkammer und tiefer noch sich befindende Trübungen, dem Beobachter in lichterer Farbe erscheint. — Uebrigens hatte der Kranke, dessen Auge ich so getreu als möglich gezeichnet, zwar deutliche Lichtempfindung, konnte aber mit demselben auch gegen Abend (wo also die Pupille erweitert war) nichts erkennen.

5. Figur.

Dieses Bild zeigt, so weit es dem Pinsel darzustellen möglich war, einen reinen *Morgagni'schen* Staar, wo also weder die Linse, noch die vordere Linsenkapsel getrübt ist. Man bemerkt hier in der Pupille wolkige, blaugraue Schattierungen, welche die geronnene Morgagni'sche Feuchtigkeit darstellen. Der festere dickere Theil dieses geronnenen Liquors, setzt sich bei längerer Ruhe des Kopfes tiefer, so dafs über diesem dickern dunklern Theil, immer eine dünnere durchsichtigere Schichte merkbar wird, die Pr. Beer, nach welchem ich die Figur genau copirt habe, ebenfalls abzubilden gesucht hat. Befindet sich die Linse oder deren Kapsel auch schon in einem getrübten Zustande, so fallen jene Er-

scheinungen weg. Uebrigens fehlt der Schlagschatten der *Iris*, allein der dunklere Saum des Pupillarrandes derselben ist sichtbar.

6. Figur.

In diesem, nach dem sehr grofsen Auge eines 62jährigen Mannes von mir gemalten, Bilde erkennt man gewifs ohne Mühe eine *Cataracta capsulo-lenticularis*. Deutlich erblickt man die vordere Kapsel, die in Form von vier, wie Wallrath glänzenden Zacken, in der Pupille erscheint, welche ein graues Kreutz einschliefsen, bei dem man durch die, an dieser Stelle noch klare Linsenkapsel, die ebenfalls getrübte blafsgraue Linse sehen kann. Der Staar ist so voluminös, dafs nicht nur nicht jede Spur von Schlagschatten auf dem Staare mangelt, sondern letzterer sogar die *Iris* etwas nach vorn vordrängt und diese wölbt. Dafs hier die hintere Augenkammer völlig aufgehoben, der dunkle Rand am kleinen Ringe der *Iris* immer sehr sichtbar und letztere unbeweglich sein müsse, geht aus dem Vorhergehenden von selbst hervor. Merkwürdig ist es übrigens, dafs die Verdunklung der Kapsel hier von dem hintern Theile derselben nach vorn vorgeschritten ist, da sich diefs sonst bei alten Leuten gewöhnlich umgekehrt zu verhalten scheint.

Die 7. Figur

zeigt einen von Beer nach der Natur gezeichneten trokkenhülsigen Kapsellinsenstaar in einem kindlichen Subjecte. Man entdeckt leicht die verschrumpfte Linsenkapsel, die hier weit hinter der Pupille liegen mufs, weil die *Iris* einen bedeutend breiten Schlagschatten auf den Staar wirft, wefswegen sich denn auch der dunkle Saum an dem kleinen Kreise derselben wenig heraushebt.

Die 8. Figur

stellt eine *Cataracta glaucomatosa* vor, die hier durchaus mit keiner arthritischen Entzündung in Verbindung stand und Folge eines schon früher ausgebildeten *Glaucoms* war. Diesen Staar besafs eine 48jährige sehr pastose Frau, welche nach dem Aufhören der Menstruation an der heftigsten allgemeinen Gicht litt. Der Staar hat hier jene meergrüne Farbe, die demselben den Namen *Cataracta viridis* verschaffte; indefs fehlt die grünliche Farbe nicht selten, wefswegen auch letztere Benennung nicht statthaft ist, und zwar um so weniger, da es in's Grünlichte schimmernde Linsenstaare giebt, die im übrigen durchaus keine Aehnlichkeit mit einer glaucomatösen *Cataract* besitzen. Die sehr angewulstete, noch in ihrer Kapsel eingeschlossene, Linse drängt sich in dieser Figur über den untern Pupillarrand der *Iris* vor, wobei der obere Pupillarrand dieser Haut deutlich nach rückwärts eingestülpt erscheint. Die Wiederkäuerpupille, so wie der blaulichte, kaum sichtbare Rand um die Hornhaut, die schmutzige Farbe der *Sclerotica*, so wie das zerstreute Netz von varicösen Blutgefäfsen in der Bindehaut des Augapfels, lassen übrigens diese Art der *Cataract* nicht verkennen. (Beer.)

Alle jene abgebildeten Staararten werden besonders interessant und nützlich, wenn man jede einzelne mit den andern vergleicht.

9. Figur.

Als ich im Jahre 1817 von Rom nach Ancona reiste, ward mir in Loretto in einer Locanda (unweit der *santa Casa*) wo ich logirte, die Gelegenheit, dieſs interessante, einer 42jährigen Frau gehörende, wassersüchtige Auge zu copiren. Schon der bloſse Anblick zeigt, daſs vorzüglich die wässrige Feuchtigkeit übermäſsig angehäuft ist; indeſs scheint der Glaskörper ebenfalls einigermaſsen mit zu leiden, denn schon sieht man die schwärzliche *Iris* etwas nach vorn gedrängt. Der ganze Augapfel war offenbar länglich und lieſs sich nur träge bewegen, wenigstens weit träger als das andere völlig gesunde Auge; die Pupille war nicht viel gröſser, als im normalen Zustande, aber völlig unbeweglich, rings um die *Cornea* erschien die *Sclerotica* bläulich, im übrigen aber hatte das Weiſse des Auges eine etwas in's Livide spielende Farbe angenommen. Varicöse Gefäſse sah man an der äussern Fläche des *Bulbus* nur wenige. Die *Cornea* war klar und durchsichtig und das ganze Auge hatte ein ganz eignes gläsernes Ansehn, was man bei der Augenwassersucht immer findet. Das Sehvermögen war sehr schwach und die Augenliedränder erhielten sich immer feucht und klebrig. Die cholerische Kranke erzählte mir, daſs sie vor längerer Zeit einen Fauststoſs in dieſs Auge bekommen, der ihr geraume Zeit viel Schmerzen und Röthe verursacht habe; seit diesem Unfall war das Gesicht immer sehr schwach und beständiges Mückensehen zugegen. Nach und nach hatte sich der gegenwärtige hydropische Zustand im *Bulbus* entwickelt.

10. Figur.

Dieses braune Auge leidet an einer reinen *Iritis*, welche sich noch im ersten Zeitraume befindet. Die Pupille, welche hier zwar noch rund, aber bedeutend verengert ist, erscheint nicht mehr lebhaft schwarz, wie im normalen Zustande, sondern (vorzüglich mit bewaffnetem Auge betrachtet) schon matt und bleichschwarz, wobei der Pupillarrand der Regenbogenhaut undeutlich geworden ist. Zugleich bemerkt man die durch die Entzündung bewirkte Farbenveränderung der *Iris*, welche vorzüglich vom innern kleinern Kreise ausgeht, wobei das wulstige Hervordrängen der letztern gegen die Hornhaut hin, nicht zu verkennen ist.

Vorzüglich interessant wird diese Figur, wenn man sie mit dem 7ten Bilde der III. Taf., welches die reine innere, von den innersten Gebilden des *Bulbus* ausgehende *Ophthalmitis* bezeichnet, vergleicht und davon unterscheidet. (Beer.)

Dritte Tafel.

1. Figur.

Dieſs Auge versinnlicht den Moment des zweiten Zeitraumes einer reinen *Iritis*, wo sich schon zwei verschiedene Eiterbälge an der Regenbogenhaut gebildet haben. Der

eine dieser Eiterbälge ist schon geborsten und hat seinen Inhalt in die vordere Augenkammer ergossen, wodurch ein wirkliches *Hypopyum* entstanden ist. Der auf dem Boden jener Augenkammer ruhende Eiter, bewegte sich nach den Bewegungen des Kopfes, und die an der *Iris* hängenden Flokken des geborstenen Balges fluctuirten noch in der wässrigen Feuchtigkeit. Der andere, hier noch unversehrte, Eiterbalg berstete ganz kurze Zeit nachdem Beer dieses Bild aufgenommen hatte. Uebrigens ist die früher blaue *Iris* grünlicht entfärbt, rings um die Pupille angewulstet, und letztere erscheint verengert, winklicht, ist durch angeschossene coagulable Lymphe getrübt und der Pupillarrand der Regenbogenhaut trichterförmig, nach der vordern Linsenkapsel hin, eingekehrt.

2. Figur.

Diefs nach Beer copirte amaurotische Katzenauge, besafs eine 42jährige Frau, die dadurch völlig erblindet war. Die *Iris* ist, wie man bemerkt, sehr blafs, die Pupille erweitert und in der Tiefe des Auges gewahrt man bei jeder Beleuchtung die concave (hier röthlich gefärbte) hintere Oberfläche des *Bulbus*. Das Leuchtende im Auge, welches man nur bei gewissen Stellungen des Augapfels im Halbdunkel beobachtet und welches eigentlich die Gelegenheit zu jener Benennung des schwarzen Staares gab, konnte hier im Bilde nicht versinnlicht werden.

3. Figur.

Ohne Mühe wird man wohl das von Beer nach der Natur gemalte Bild für einen völlig ausgebildeten gichtischen schwarzen Staar erkennen. Deutlich bemerkt man in der grofsen ovalen, dem Sehloche bei wiederkäuenden Thieren ähnlichen, Pupille, die schwarzgrünlichte Trübung des alienirten Glaskörpers; ebenso sieht man die in ihrer Farbe veränderte *Iris* und die Varicositäten im Weissen des Auges. Leicht kommt zu dieser Amaurose, in längerer oder kürzerer Zeit, glaucomatöse *Cataract* und endlich Atrophie des *Bulbus* hinzu, womit dann die Gicht in diesem Organe aufhört.

4. Figur.

Diese Figur giebt ein anschauliches Bild von einem Blutschwamm der Netzhaut. Der Kranke wurde von Astley Cooper behandelt, indefs von diesem kein Kurversuch gemacht, weil die Krankheit, als er sie zuerst beobachtete, schon so weit gediehen war, wie sie hier dargestellt ist. Die aus der *Orbita* ragende Geschwulst war weifsfarbig, ungleich, aber glatt und wurde vor dem Tode des Kranken noch sphacelös.

An diesem Bilde sieht man zugleich, welche aufserordentliche Gröfse die lymphatischen Drüsen zuweilen in dieser Krankheit erreichen können. Die hier vorgestellte vergröfserte Drüse stand an ihrer Oberfläche in Verschwärung. (S. Wardrop, Beobacht. über den *Fung. haematodes.*) Auch die

5. Figur

versinnlicht einen *Fung. haemat. retinae*, jedoch in einem geöffneten Augapfel. Diese Ausartung der Netzhaut fing bei dem Kranken, von welchem die, den Ursprung des Schwammes so deutlich nachweisende Zeichnung entnommen ist, nicht in dem hier aufgenommenen rechten Auge, sondern zuerst im linken, in einem Alter von 9 Monaten an. Das letztere Auge war nicht entzündet, aber doch gefäfsreich und ein wenig vergröfsert. Die Regenbogenhaut insbesondere war voll von Blutgefäfsen, und das Sehloch sehr erweitert und starr. Die Markhaut erschien in dem hintern Theile des *Bulbus* wie eine hohle Silberplatte. Das Auge war blind, allein ohne Schmerzen und der Patient übrigens auch gesund. In einem Alter von 15 Monaten wurde das rechte (hier abgebildete) Auge ebenfalls ergriffen und liefs ähnliche Erscheinungen entdecken. — Das linke Auge veränderte sich bald noch mehr: Die Krystalllinse war aus ihrer Lage gebracht und lag verdunkelt in dem untern Theile des Glaskörpers. Ohngefähr drei Monate vor dem Tode des Kranken vergröfserte sich das linke Auge, nachdem es einige Zeit empfindlich gewesen war, schnell und fing an, sich zwischen den Augenliedern in Gestalt einer rothen Masse hervorzudrängen, welche endlich die Gröfse eines grofsen Apfels erreichte. Ungefähr 14 Tage vor seinem Tode fiel er in einen schlafsüchtigen Zustand, wobei er zuweilen aufschrie. Er bekam leicht Zuckungen und starb in einem Anfalle derselben. — Man untersuchte das rechte Auge einige Tage vor dem Tode und fand, dafs das, was vorher das Ansehn einer metallenen hohlen Platte in der Gegend der Netzhaut hatte, vorwärts gerückt war und wahrscheinlich alles was hinter der *Iris* lag ausfüllte. Jener Körper schien die Blendung zu berühren, und das Auge sah aus, als wenn eine weifsfarbige *Cataract* mit einem erweiterten Sehloche zugegen wäre: Diefs war aber Täuschung, indem der fremde Körper blofs den Raum des Glaskörpers einnahm; die Linse hatte übrigens ihre natürliche Lage und war durchsichtig.

Da man nach dem Tode des Kranken die Geschwulst des linken Auges durchschnitt, sah man, dafs sie aus einer harten, fibrösen und gefäfsreichen Masse bestand: von den ursprünglichen Theilen konnte man keinen mehr erkennen. Nachdem der Kopf geöffnet worden, fand man, dafs sich die Krankheit längs dem Laufe des linken Sehnerven bis zum *Ganglion* erstreckte, welches ganz in eine blutige Geschwulst verwandelt worden war, die man wegen grofser Weichheit derselben nicht genau untersuchen konnte. Den rechten Sehnerven fand man auf jeder Seite des *Ganglion* gesund. Die Hirnhöhlen waren ungewöhnlich erweitert und voll Wasser.

Das rechte geöffnete, hier abgebildete Auge, zeigt *a* den Sehnerven, *bb.* die krankhafte Masse, in welche die *Retina* ausgeartet ist, *cc.* die *Sclerotica* und endlich *dd.* die *Chorioidea.* (S. Saunders *l. c. pag.* 145. auch Wardrop's Beobacht. üb. d. *F. h. ret.* S. 42 und 179.)

Die 6. Figur

stellt eine äufsere, reine, aber sehr heftige Augapfelentzündung (*Chemosis*) dar, die von Beer gegen Ende des ersten

Zeitraumes, wo in diesem Falle eine Eiterung kaum mehr zu verhüten ist, gezeichnet wurde. Rings um die Hornhaut ist die Bindehaut des Augapfels gleichmäfsig wie ein Wall angewulstet, allein der Augapfel selbst ist nicht angeschwollen, wodurch sich auch diese Figur von der *Ophthalmitis universalis*, die im zweiten Bilde der IV. Tafel vorgestellt ist, gleich beim ersten Anblick unterscheidet. Die *Cornea* ist schon völlig röthlichgrau, getrübt und keine Spur von *Iris* oder Pupille mehr bemerkbar.

7. Figur.

Wenn man diefs Auge genau betrachtet, die früher graublaue, jetzt grünlich entfärbte, rings um das Centrum derselben etwas angewulstete *Iris* wohl bemerkt, wenn man den, nach dem Mittelpunkt hin trichterförmig in sich zurückgezogenen Pupillarrand der *Iris*, sammt der so sehr verschlossenen Pupille berücksichtigt, so wird man schon einen heftigen entzündlichen Zustand im Auge ahnen; nimmt man nun noch subjective Zeichen zu Hülfe und vergleicht mit allem diesen, die nur schwache Rosenröthe der *Sclerotica*, so wird gewifs kein Zweifel übrig bleiben, dafs man eine, von den innersten Gebilden des *Bulbus* ausgehende Augapfelentzündung vor sich hat, welche zu den reinen gehört und nach Beer's Originalzeichnung copirt ist.

8. Figur.

Ein kugelförmiges Totalstaphylom der Hornhaut ist in diesem Bilde wohl nicht zu verkennen. Es gehört einem 25jährigen Mann und entstand nach einer Augenentzündung, welche auf eine vor zwei Jahren erlittene Verwundung des Auges mit einem scharf spitzigen Instrumente folgte. Die *Cornea* bildet eine genau kugelförmige, mit einigen Gefäfsen versehene Geschwulst, von undurchsichtig weifslicher Farbe, die auf der Spitze ins blaulich perlfarbne fällt. Die *Sclerotica* hat ihre normale Weifse und ihren Glanz verloren, und die Augenlieder sind ein wenig entzündet. (Wardrop.)

9. Figur.

Diefs gewifs ohne Mühe zu erkennende partielle Hornhautstaphylom, habe ich von einem 16jährigen, übrigens ganz gesunden Mädchen genau copirt. Es ist die Folge einer variolösen Augenentzündung, die sie, nach der Mutter Aussage, vor ungefähr 10 Jahren erlitten hatte. Das Staphylom nimmt hier die ganze untere Hälfte der *Cornea* ein, hat ein blaulich weifsliches, glänzendes, etwas ungleiches Ansehn, und ragt ziemlich stark vor, wie man an dem halb von der Seite gezeichneten Auge, bemerkt. Die obere Hälfte der Hornhaut ist völlig durchsichtig und klar, weswegen man auch die dunkel grau blau gefärbte, an der *Cornea* fast anliegende *Iris*, so deutlich gewahr wird. Von der halb verwachsenen Pupille ist kaum noch der dritte Theil sichtbar.

Vierte Tafel.

1. Figur.

Diefs Auge zeigt einen Nagelkopf, *Clavus*, gehörte einem 23jährigen Mädchen und wurde von Hrn. Prof. Beer nach der Natur gezeichnet. Das Mädchen trug den *Clavus*, der gleich nach dem Entstehen erhabener und dunkler gefärbt war als jetzt, schon über 7 Jahre; dieser hatte sich nach und nach, mit einer wenig durchsichtigen und so festen *Membran* überzogen, dafs, als man ihn beseitigen wollte, die stärksten Aetzmittel nicht eingriffen und er defswegen an seiner Basis weggeschnitten werden mufste.

Die 2. Figur

versinnlicht eine reine allgemeine *Ophthalmitis* im zweiten Zeitraume, die sich von der *Chemosis* in der 6. Figur der dritten Tafel, besonders durch die bedeutende Anschwellung des ganzen *Bulbus* unterscheidet. Der vergröfserte Augapfel überhaupt, so wie auch die rings um die *Cornea* angewulstete, hochroth gefärbte Bindehaut desselben, hat nicht nur das obere, auch schon entzündete Augenlied über das Auge zurückgeschoben, sondern auch den untern Augendeckel nach aufsen umgestülpt. Die *Cornea* bildet hier schon gleichsam einen, in der Mitte etwas matschen Eiterpfropf, der sich aus der Grube, welche durch die wallförmige Anwulstung der Bindehaut rings um die Hornhaut, die im ersten Zeitraum zugegen war, bereits heraus gehoben hat, wefswegen denn an dieser Stelle ein Bersten des *Bulbus* zu befürchten steht.

3. Figur.

Dieses gewifs merkwürdige Auge, welches eine *Atrophie* des *Bulbus*, einen *Scirrhus palpebrae* und ein *Anchyloblepharon partiale* vereinigt enthält, gehört einem 82jährigen, seit mehr als 40 Jahren an Gicht leidenden Manne. Vor acht Jahren zeigte sich (wie er sich selbst ausdrückte) die Gicht zuerst im rechten Auge; er litt an heftigen, reifsenden, vorzüglich in der Supraorbitalgegend haftenden Schmerzen, beständiger Röthe der äufsern Fläche des Augapfels und der Augenlieder. Bei gänzlicher Vernachlässigung schlich die entzündliche *Affection* hin, das Sehvermögen nahm ab, die Entzündung und die Schmerzen hörten zuweilen, vorzüglich zur Sommerszeit auf und kehrten wieder, wenn Erkältung oder nafskalte Witterung eintrat. Nach und nach ging das Sehvermögen immer mehr und mehr verloren, das Auge verkleinerte sich, zog sich mehr und mehr in die *Orbita* zurück, und die Augendeckel senkten sich dem gemäfs tiefer. Dabei thränte das Auge, und die Meibom'schen Drüsen sonderten Schleim aus, der die Augendeckel über Nacht zusammenklebte; dadurch, und weil sich die Augenliedränder in einem beständigen Entzündungszustande befanden, sich öfters excoriirten, und weil der Patient das Auge immer sorgfältig mit einem Tuche verband

und dabei nicht reinlich hielt, verwuchsen nach und nach die Augenliedränder im äufsern Augenwinkel bis zu dem Grade, wie ich sie hier genau gezeichnet habe. — Schon früher zeigten sich in dem obern Augenliede, Anfangs am Rande, hernach weiter umher, Verhärtungen, und drei der Haut an Farbe ähnliche und unschmerzhafte Erhabenheiten. Die Cilien gingen in Folge der schleichenden Entzündung hinweg, und kamen an beiden Deckeln nicht wieder. Jetzt ist fast der ganze obere Augendeckel verhärtet und die drei Geschwülste sind bei Berührung äufserst stechend, brennend, schmerzhaft, und kündigen, neben den übrigen Zeichen, den Anfang einer carcinomatösen Ausartung an. Der *Bulbus* selbst hat kaum den dritten Theil seiner natürlichen Gröfse, ist schmutzig roth und nur die verschrumpfte *Cornea* hat ein grauliches Ansehn, läfst aber demohngeachtet eine unterliegende *Iris* ahnen. — Als ich das Auge zeichnete, war die Augenliedspalte schon völlig geschlossen, wefswegen ich das untere Augenlied herabziehen mufste, um den hier angedeuteten Theil des *Bulbus* sichtbar zu machen.

4. und 5. Figur.

Beide, von Beer nach der Natur gemalte Augen, versinnlichen die genuine arthritische *Iritis* und zwar in der 4. Figur, bei einem grofsen, hagern, rigiden, empfindlichen männlichen Individuum, mit blauen Augen, wo die Pupille sehr enge, winklicht, der Pupillarrand der *Iris* trichterförmig nach der vordern Linsenkapsel zurückgezogen erscheint, und mit letzterer durch ein zartes, schon mit unbewaffnetem Auge sichtbares Netz von coagulirtem Eiweifsstoff verbunden ist: — in der 5. Figur hingegen bei einer kleinen, dicken, pastosen, unempfindlichen, 48jährigen Frau, mit bräunlichen Augen, bei welcher sich vor zwei Jahren die *Menstruation* verlor, wo die Pupille erweitert und derjenigen der wiederkäuenden Thiere an Form ähnlich ist, und wo der kleinere Ring der Regenbogenhaut nach der hintern Augenkammer eingestülpt und dadurch unsichtbar geworden ist. Zugleich bemerkt man in der Pupille durchaus keinen angeschossenen Eiweifsstoff, dafür aber entdeckt man im Hintergrunde des *Bulbus* eine grünlich grau schillernde Trübung des Glaskörpers, die das vollkommen entwickelte *Glaucom* andeutet, und eine, bei unempfindlichen pastosen Gichtkranken ganz eigenthümliche Erscheinung ist. In diesem Auge ist daher auch jede Spur von äufserer Lichtempfindung verschwunden, dahingegen das Auge der vierten Figur, nicht allein Lichtempfindung besitzt, sondern auch gröfsere Gegenstände noch zu unterscheiden im Stande ist.

In beiden Augen bemerkt man übrigens eine blasse Röthe der *Sclerotica*, und über dieser ein dunkelrothes Blutgefäfsnetz in der *Conjunctiva*, welches sich im Umfange der *Cornea* in einen ziemlich dichten Kranz zusammendrängt, aber hie und da sehr auffallend von dem Rande der Hornhaut durch einen ungleichen, schmalen, schmutzig bläulichten Ring wie abgeschnitten erscheint. Ebenso sind weder in der verfärbten blauen, noch in der alienirten braunen, nach vorwärts angewulsteten *Iris* die varicösen, nach der Pupille hinlaufenden Blutgefäfse zu verkennen.

Die 6. Figur

ist eine der sprechendsten Abbildungen und stellt die genuine syphilitische *Iritis* vor. Man bemerkt eine über die ganze *Conjunctiva* und *Sclerotica* verbreitete blasse eigenthümliche Röthe, die sich rings um die Hornhaut in einen Kranz verdichtet; dabei ist die Regenbogenhaut grünlich verfärbt, die Pupille winklicht in diagonaler Richtung nach der Nasenwurzel hingestellt und das ganze Auge matt und glanzlos. Drei vollkommen entwickelte condylomatöse Aftergebilde, die sich theils am Ciliar theils am Pupillarrande der *Iris* befinden, lassen übrigens keinen Zweifel über die Natur dieser Entzündung übrig.

7. Figur.

Dieses Bild, welches eine arthritisch-syphilitische *Iritis* versinnlicht, habe ich genau nach dem Auge einer hagern cholerischen Frau von mittlern Jahren gemalt, welche vor 9 Jahren von ihrem eignen Manne angesteckt ward, darauf syphilitische Geschwüre im Halse und auch Feigwarzen bekam, von einem Arzte aber scheinbar geheilt wurde. Vor 5 Jahren wurde sie von einem ziemlich heftigen Gichtanfall heimgesucht, befand sich aber seit jener Zeit immer wohl, als sie vor kurzem, nach einer vorhergegangenen Erkältung, sehr plötzlich eine Augenentzündung bekam, die sich 15 Tage nach ihrem Auftreten, wo ich sie zuerst sah, als eine gichtisch-syphilitische *Iritis* offenbarte. Ungeachtet ich ihr sogleich die gewöhnlichen Einreibungen von *Ungt. hydrarg. ciner.* mit *Opium*, nebst innern Gebrauch von *Mercur* verordnete; so bildeten sich doch am untern Theile des Ciliarrandes der *Iris* zwei condylomatöse Gebilde von schmutzig weifsgelblicher Farbe aus, wie man sie im Bilde gewahr wird. Uebrigens sieht man einen deutlichen rosenrothen Gefäfskranz um die *Cornea*, und zwischen jenen und dieser den eigenthümlichen weifslich blauen Ring. Die blaugraue *Iris* ist grünlich braungrau entfärbt, die Pupille verengert, nach der Nasenwurzel hin verzogen und nicht mehr normal schwarz, vielmehr bemerkt man mit bewaffnetem Auge einen zarten Anflug von coagulirtem Eiweifsstoff. Das Gesicht war zwar sehr geschwächt, indefs konnte die Patientin selbst kleinere Gegenstände noch unterscheiden. Bei fortgesetzter Behandlung wurde die Entzündung in Kurzem geheilt.

Das untere Augenlied habe ich hier übrigens etwas herabgezogen, um den Gefäfskranz im Weifsen des Auges deutlicher sehen zu lassen.

8. Figur.

Diefs Bild stellt die genuine scrofulöse Augapfelentzündung vor, wie sie bei unempfindlichen, pastosen, geduldigen, scrofulösen Kindern vorzukommen pflegt. Die hochroth gefärbten, bündelartig zerstreuten, der scrofulösen Entzündung eigenen Blutgefäfsnetze der Bindehaut des *Bulbus*, stechen sonderbar gegen die sehr blasse, gleichförmig vertheilte Röthe der *Sclerotica* ab. Auf der Hornhaut befinden sich hier zwei Eiterpusteln, von denen die gröfsere,

fast in der Mitte der *Cornea* liegende, geborsten ist, und jetzt ein tiefes Geschwür darstellt, welches an seinem Rande rings herum etwas wuchert. (Beer.)

Die 9. Figur

ist eine nach Beer copirte genuine scorbutische Augapfelentzündung, die sich in einem vollkommen scorbutischen Subjecte befand. Die *Sclerotica* ist schmutzig livid entfärbt, in der überliegenden *Conjunctiva* bemerkt man ein dichtes bläulichrothes Blutgefäfsnetz, die *Cornea*, die wässrige Feuchtigkeit, ja das ganze Auge ist getrübt, matt und glanzlos, und selbst im Innern des Augapfels alles undeutlich, wefswegen man denn auch die Gränzen der normal grofsen Pupille nur verwischt sehen kann. In der *Iris* gewahrt man varicöse dunkle Blutgefäfse, die nach der Pupille hinlaufen. Der Kranke war natürlich völlig blind, bekam aber nach Heilung des *Scorbuts* eine geringe Lichtempfindung wieder. Ungeachtet diefs Auge noch nicht den höchsten Grad der genuinen scorbutischen Augapfelentzündung anschaulich macht, so wird dennoch auch dieser Grad äufserst selten beobachtet.

In allen diesen hier beschriebenen Bildern sind freilich nur abbildbare Krankheitserscheinungen dargestellt; will man sich demnach die vollständige Erkenntnifs jener pathologischen Augen sichern: so ist es nöthig, bei dem Betrachten jeder einzelnen Figur, oder was dasselbe sagt, bei Betrachten der abbildbaren objectiven Zeichen, auch die durch den Pinsel nicht nachzuahmenden objectiven Symptome, neben den subjectiven in's Gedächtnifs zu rufen.

Fünfte Tafel.

1. Figur.

Die Balkenzange, zur Bildung einer Hautfalte bei Operation des *Entropii* und der *Ptosis palpebrae superioris*. Die Querbalken *a. b.* welche auf der Fläche, wo sie sich bei'm Oeffnen der Handhaben berühren, etwas ausgehöhlt sind, hat man bald concav nach der Wölbung des oberen Augenliedes, bald convex, um damit in der Mitte der fest zu haltenden Parthie der Augenliedhaut desto mehr zu fassen, zu machen empfohlen; indefs sind beides Extreme, denen man sehr wohl entgehen kann, wenn man sie, wie hier, gerade machen läfst, worin sehr treffliche Chirurgen mit mir übereinstimmen.

2. Figur.

Ein doppeltes Häkchen, sehr bequem zum Fassen der wegzuschneidenden *Caruncula lacrymalis* und der Balggeschwülste. Die beiden Häkchen *a.* können auch etwas stärker gekrümmt sein als hier.

3. Figur.

Die gewöhnliche Anel'sche Spritze, mit einem geraden, sehr feinen Röhrchen *a.* und mit einem gekrümmten, merklich geräumigeren *b.*

4. Figur.

Ein lanzettenförmiges, in seinem Hefte befestigtes, an beiden Rändern *a. b.* sehr scharf schneidendes Messer, welches nicht nur zur Eröffnung des von Eiter oder Schleim überfüllten Thränensackes, sondern auch zum Hornhautstich, bei der künstlichen Pupillenbildung, so wie zum Oeffnen des Hypopii und der Hornhautabscesse nützlich ist.

5. Figur.

Dr. Bloemer's feine Augenpincette. Sie unterscheidet sich von den bisher zu denselben Zwecken dienenden, vorzüglich durch die zum Fassen bestimmten drei hakenförmigen Spitzen, deren eine am Schenkel *b.* die beiden anderen, am Schenkel *a.* so angebracht sind, dafs sie unter einem stumpfen Winkel von 120° mit dem Schenkel zusammenstofsen. Die Spitze bei *b.* legt sich bei der Schliefsung genau zwischen die beiden Spitzen bei *a.*; alle sind scharf zugespitzt und nur mäfsig gehärtet. Bei'm Schliefsen der Pincette decken sich dieselben vollkommen, so dafs beide Schenkel, welche an ihrer äufsern Seite convex, an der innern gerade sind, zusammen einer etwas conisch geformten abgestumpften Sonde ähnlich werden. — *c.* stellt den Schenkel *a.* in der Fläche dar.

Man kann dieses Instrument offenbar mit gröfserm Vortheil überall gebrauchen, wozu Beer seine Zahnpincette bestimmte. — Siehe Graefe und Walther, Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. 1820. B. 1. St. 4. S. 730.

6. Figur.

Das Beer'sche Staphylommesser, von ihm allein dazu bestimmt, das *Staphyloma corneae totale* zu exstirpiren. Es unterscheidet sich von seinem Staarmesser nur durch die vermehrte Gröfse aller Dimensionen.

7. Figur.

Der Richter'sche Silberdrahthaken, zur Befestigung des oberen Augenliedes bei mancherlei Operationen.

8. Figur.

Die Langenbeck'sche Nadel zur *Keratonyxe,* deren eine von der Seite, die andere in der Fläche abgebildet worden ist. Sie darf nur mäfsig gebogen und der schneidende Rand an beiden Seiten, sehr kurz sein. Uebrigens ist die scharfe Spitze sehr schmal und der Hals ein wenig schmäler als die gröfste Breite der Spitze, damit dieser die gemachte Hornhautöffnung nicht ganz ausfüllt, um die leichte und freie Einbringung und Bewegung der Nadel nicht zu behindern.

9. Figur.

Das Langenbeck'sche *Keratom*, zur Zerstückelung des Staares. Es ist in der That wahr, dafs man mit der gewöhnlichen Langenbeck'schen gekrümmten Nadel, den Staar nicht immer leicht und vielseitig zerstückeln kann; defswegen ist die Langenbeck'sche Abänderung seines Instrumentes sehr zweckmäfsig. Der Unterschied von der gewöhnlichen Nadel besteht darin: dafs das *Keratom* da, wo an der Nadel die convexe Fläche ist, eine convexe Schneide hat, die Concavität aber, wie der Rücken beim Staarmesser, nicht schneidend ist; folglich sind da, wo an der vorigen Nadel zwei Ränder sind, zwei Flächen. Diese beiden Flächen verlaufen in einen runden Hals, welcher so eingerichtet sein mufs: dafs er die Oeffnung der *Cornea* ausfüllt und das zu frühzeitige Auslaufen der wässrigen Feuchtigkeit verhüthet.

10. Figur.

Eine gerade lanzenförmige Staarnadel, welche besonders zur *reclinatio et depressio cataractae per scleroticam*, gebraucht wird.

11. Figur.

Das Beer'sche Staarmesser, zur Fertigung des Hornhautschnittes. Es mufs genau die hier dargestellten Dimensionen haben, auch darf der achteckigte Stiel *e. f.* wenigstens nicht kürzer sein, als hier. *a. b.* zeigt die gröfste Breite der Klinge; der Rücken *d. e.* mufs zwar stumpf, aber nicht breit und eckigt, sondern abgerundet sein, damit die wässrige Feuchtigkeit nicht zu früh ausläuft. Die Schneide *c. a.* ist sehr scharf, ebenso die lanzettenförmige Spitze des Rückens *c. d.* welche bei *d.* sanft in die Fortsetzung des stumpfen abgerundeten Rückens übergeht. Die Klinge ist übrigens sanft und unmerklich gewölbt, damit dieselbe nicht federn kann.

12. Figur.

Die Beer'sche Staarlanze, zur vielseitigen, fensterförmigen Zerschneidung der vordern Wand der Linsenkapsel bei der Staarextraction, und zur Trennung der ganzen Kapsel von ihren organischen Verbindungen bei der Beer'schen Methode, die cataractöse Linse sammt der Kapsel auszuziehen. Die Spitze *a.* so wie die Ränder *a. b.* und *a. c.* müssen sehr scharf schneidend, und die ganze Lanze wohl polirt sein.

13. Figur.

Bei *a.* der bekannte Daviel'sche Löffel; bei *b.* ein leicht federnder silberner oder goldener sehr elastischer Spatel, welcher an den Rändern *c.* und *d.* scharf, und zu verschiedenen Manöuvern am Auge zu gebrauchen ist.

14. Figur.

Die Daviel'sche Scheere mit doppelter Krümmung, nämlich in dem Rande und in der Fläche, welche stumpfe, fein polirte Spitzen haben mufs und zur Vergröfserung des Horn-

hautschnittes gebraucht wird, wenn dieser unglücklicherweise zu klein ausfiel; defswegen bedarf man auch zwei dieser Scheeren, deren Krümmungen einander entgegenstehen. Sie können übrigens bei mancherlei anderen Operationen mit Vortheil benutzt werden. Die tüchtige Fertigung dieser Scheeren ist für den Instrumentenmacher keine kleine Aufgabe, weil die beiden Blätter einer jeden, nicht blofs genau harmoniren, sondern auch sehr scharf geschliffen sein müssen, (was bei so gekrümmten Flächen nicht leicht ist,) damit sie in keinem Falle kneifen.

15. Figur.

Das Häkchen, bei Anlegung einer künstlichen Pupille besonders brauchbar. Es mufs äufserst fein und sauber von Stahl gearbeitet und die Spitze desselben sehr scharf sein.

16. Figur.

Die Reisinger'sche Hakenpincette; bei *a.* geöffnet und in den Rand gesehen, bei *b.* geschlossen und von der Seite, weswegen man auch die Häkchen hier sieht, welche so genau über- und aneinander passen müssen, dafs sie nur ein einziges Häkchen auszumachen scheinen.

17. Figur.

Ein an der Spitze sehr scharfes Häkchen, welches zum Festhalten des Augapfels bei künstlichen Pupillenbildungen anzuwenden ist, und besonders dann nützlich werden kann, wenn man mit dem Regenbogenhauthäkchen ohne alle Hakendecker operirt. In diesem Falle stimme ich mit Hrn Prof. Zang (Darstellung blutiger heilkünstlerischer Operationen. Wien, 1818. 2. B. S. 234.) überein, wenn er bei Gelegenheit dieses Feststellungsinstrumentes sagt: „Es ist indessen zu rathen, dafs in allen Fällen der Bildung einer künstlichen Sehe, auf die eine oder auf die andere Weise, Gebrauch von diesem Häkchen gemacht werde."

Man setzt dieses Instrument übrigens in die Bindehaut der *Sclerotica,* am unteren Theile des Augapfels ein und läfst es von einem Gehülfen so kurz halten, dafs bei'm ruhigen Stehen des Auges, dieses zwar nicht incommodirt wird, dennoch aber für dasselbe kein Raum zum Entfliehen übrig bleibt.

Gedruckt bei Johann Friedrich Starcke.

T. I.

1.



2.



3.

4.



5.

6.



7.

8.

Prof. F. Guimpel. sc.

1.



2.

3.



4.

5.

6.



7.

8.

9.

10.

Prof. F. Guimpel. fc.

T. III.

1.

2.

3.

4.

5.

8.



7.

6.



9.

Prof. F. Quimpel. fe:

T. IV.

1.



2.



3.

4.



5.



6.

7.

8.

9.



Prof. F. Guimpel. fc.



Prof. F. Guimpel. sculp.